

Авиаль, КЭ

(тебуконазол 125 г/л + триадимефон 100 г/л)

Высокоэффективный двухкомпонентный системный фунгицид для защиты зерновых культур от широкого спектра болезней

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА АВИАЛЬ, КЭ:

- широкий спектр действия;
- прекрасный препарат для защиты листового аппарата и колоса от поражения болезнями;
- оперативное предотвращение потерь от фузариоза колоса пшеницы;
- профилактическое, лечущее и искореняющее (куративное) действие;
- высокая начальная активность;
- длительный период защитного действия;
- снижение вероятности возникновения резистентности;
- оригинальная рецептура препаративной формы.

Спектр действия: бурая, желтая, карликовая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз.

Механизм действия: ингибирует превращение ланостерина в эргостерин, входящий в состав клеточных мембран грибов, что приводит к нарушению роста мицелия и прекращению спорообразования.

Период защитного действия: в зависимости от погодных условий обеспечивает защиту культуры в течение двух-четырех недель и более.

Скорость воздействия: в течение двух-шести часов после опрыскивания.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
0,8–1,0	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая и желтая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа – выдвигание колоса – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	40(1)
1,0		Септориоз листьев и колоса, пиренофороз		
1,25	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
1,0		Септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа – выдвигание колоса – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
0,7–1,0	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина карликовая и стеблевая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы 2-х узлов – выдвигания колоса. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
1,0		Сетчатая и темно-бурая пятнистость		
	Рожь озимая	Ржавчина бурая и стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы 2-х узлов – появления флагового листа. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Совместимость: совместим с большинством фунгицидов, инсектицидов, стимуляторов роста, а также адъювантами Агропол и Агропол Супер. В каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость; рекомендуемая температура воды для приготовления рабочей жидкости – не ниже 10°C.

Температурный интервал хранения: от -10°C до +30°C

Фасовка: канистра 5 л.