

МИНИСТЕРСТВО РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2410 от « 23 » сентября 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930 (взамен ранее выданного свидетельства
о государственной регистрации от 6 июня 2016 г. № 1129)

(наименование Регистрации, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Минеральные удобрения Фолирус О марки: Фолирус Бор,
Фолирус Кальций-Магний, Фолирус Комплекс, Фолирус Марганец,
(наименование пестицида или агрохимиката)
Фолирус Медь, Фолирус Сера, Фолирус Цинк

получил государственную регистрацию за № 010-11-2410-1

на срок по « 5 » июня 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАРЕВ В.В.



№ 002748

М. П.



Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Бор	3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная</i> - некорневая подкормка растений в фазе 10-15 листьев
		1,0 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры</i> - некорневая подкормка растений до цветения и после сбора урожая
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Подсолнечник</i> - некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Соя</i> - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Рапс яровой</i> - некорневая подкормка растений в фазе ветвления
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Рапс озимый</i> - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (осенью)
2	Фолирус Кальций- Магний	5,0 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры</i> - некорневая подкормка растений после образования завязей 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
		5,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Овощные культуры</i> - некорневая подкормка растений после образования завязей 3-4 раза с интервалом 10-15 дней
		5,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Бахчевые культуры</i> - некорневая подкормка растений после образования завязей 3-4 раза с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Комплекс	2,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Света сахарная</i> - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры</i> - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Соя</i> - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Рапс яровой</i> - некорневая подкормка растений в фазе ветвления
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Рапс озимый</i> - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (осенью)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАРЕВ В.В.




Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Минеральные удобрения Фолирус О марки: Фолирус Бор, Фолирус Кальций-Магний, Фолирус Комплекс, Фолирус Марганец, Фолирус Медь, Фолирус Сера, Фолирус Цинк от 23 сентября 2019 г.

№ 2410


1	2	3	4
4	Фолирус Марганец	2,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Свекла сахарная - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев
		1,0 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений до цветения и после образования завязей 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		2,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Соя - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Рапс яровой - некорневая подкормка растений в фазе ветвления
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Рапс озимый - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (осенью)
5	Фолирус Медь	2,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов
6	Фолирус Сера	2,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Свекла сахарная - некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Соя - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Рапс яровой - некорневая подкормка растений в фазе ветвления
		3,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Рапс озимый - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (осенью)
7	Фолирус Цинк	1,0 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений после сбора урожая

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАРЕВ В.В.

В.В. Зарев



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Минеральные удобрения Фолирус О марки: Фолирус Бор, Фолирус Кальций-Магний, Фолирус Комплекс, Фолирус Марганец, Фолирус Медь, Фолирус Сера, Фолирус Цинк от 23 сентября 2019 г.
№ 2410

1	2	3	4
7	Фолирус Цинк	1,0 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и фазе начала кущения

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Бор	10,0 мл/15 л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений до цветения и после сбора урожая
2	Фолирус Кальций-Магний	50,0 мл/15 л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений после образования завязей 3-4 раза с интервалом 15-20 дней
		50,0 мл/2-3 л воды Расход рабочего раствора - 1,0-1,5 л/10 м ²	Овоцные культуры - некорневая подкормка растений после образования завязей 3-4 раза с интервалом 10-15 дней
		50,0 мл/2-3 л воды Расход рабочего раствора - 1,0-1,5 л/10 м ²	Арбуз, дыня - некорневая подкормка растений после образования завязей 3-4 раза с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Марганец	10,0 мл/15 л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений до цветения и после образования завязей 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
4	Фолирус Цинк	10,0 мл/15 л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений после сбора урожая

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАРЕВ В.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

В.В. Зарев

