



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3047 от « 5 » марта 2021 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930

(наименование регистрата, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Комфорт, КС (500 г/л карбендинзима)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 010-02-3047-1

на срок по « 4 » марта 2031 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАРЕВ В. В.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№ 003445

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата (л/га, л/т) | Культура                               | Вредный объект   | Способ, время, особенности применения   | Срок ожидания (кратность обработок) |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1                                      | 2                                      | 3  | 4   | 5                                   |
| 0,3-0,6                                | Пшеница и ячмень, рожь яровые и озимые | Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания   | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га                 | 35(1)                               |
| 0,5-0,6                                |  | Мучнистая роса, гельминтоспориоз   |   | 35(2)                               |
| 0,6-0,8                                | Свекла сахарная                        | Церкоспороз, мучнистая роса  | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га             | 30(3)                               |
| 1,0-1,5                                | Рожь озимая и яровая                   | Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня                                   | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1)                                |
|  | Пшеница, ячмень яровые и озимые        | Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная, фузариозная корневые гнили, снежная плесень |   |                                     |
| 1,5-2,0                                | Подсолнечник                           | Альтернириоз, белая гниль, серая гниль, фузариозная корневая гниль, фомопсис, фомоз              | Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |                                     |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.



КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАРЕВ В. В.