



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4036 от « 16 » марта 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»


агрохимикат Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино,
Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино,
Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино,
Фолирус 5:23:35 Амино

получил государственную регистрацию за № 010-13-4036-1

на срок по « 15 » марта 2033 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Алгина Л.В.



Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

М. П.



№ 004498

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус 20:20:20 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Виноград – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней



КОПИЯ БЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Алгина Л.В.



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
1	Фолирус 20:20:20 Амино	3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
2	Фолирус 34:5:5 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Л. В. Л. В.



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р. В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
2	Фолирус 34:5:5 Амино	2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	<i>Виноград</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Виноград</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	<i>Капуста белокочанная</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Бахчевые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Бахчевые культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
3	Фолирус 15:5:30 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная, свекла столовая</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Плодовые культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Г.В. Некрасов



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
3	Фолирус 15:5:30 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Виноград – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
4	Фолирус 8:13:36 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней



Генеральный директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р. В. Некрасов



Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
4	Фолирус 8:13:36 Амино	1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Виноград – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней




Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов
КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АЛГИНИНА Л.В.



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036


1	2	3	4
4	Фолирус 8:13:36 Амино	3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
5	Фолирус 15:39:15 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза



И.А. ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Л.В. ГИНИНА

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений



В.В. Некрасов

Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус
 Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино,
 Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8
 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
5	Фолирус 15:39:15 Амино	2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	<i>Виноград</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Виноград</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	<i>Капуста белокочанная</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Бахчевые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Бахчевые культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
6	Фолирус 11:7:34 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная, свекла столовая</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Плодовые культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза



КОНИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АЛГИНИНА Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
 химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
6	Фолирус 11:7:34 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Виноград – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
	Фолирус 12:48:8 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 8 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
7	Фолирус 12:48:8 Амино	1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		2-5 кг/га Расход рабочего раствора 1000-1500 л/га	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Виноград – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней




ТОПОНИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Алгинина Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 9 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
7	Фолирус 12:48:8 Амино	3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
8	Фолирус 5:23:35 Амино	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник, рапс, картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-10 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		2-8 кг/га Расход рабочего раствора – 500-700 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Овощные культуры (открытый грунт) – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза



Юлия Верни
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Л.В. ЛГИННА

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 10 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
8	Фолирус 5:23:35 Амино	2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	<i>Виноград</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Виноград</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	<i>Капуста белокочанная</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		3-7 кг/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Бахчевые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Бахчевые культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза

Для личных подсобных хозяйств:


№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус 20:20:20 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м ²	<i>Овощные культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	<i>Овощные культуры</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/растение	<i>Плодовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений **Ф. В. Некрасов**

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л. В.

Приложение № 11 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
1	Фолирус 20:20:20 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Плодовые культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/растение	Ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/растение	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Виноград – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м ²	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
2	Фолирус 34:5:5 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м ²	Овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	Овощные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 12 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
2	Фолирус 34:5:5 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/растение	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Плодовые культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/растение	Ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/растение	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Виноград – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 13 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
2	Фолирус 34:5:5 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м ²	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	Бахчевые культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
3	Фолирус 8:13:36 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м ²	Овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	Овощные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/растение	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Плодовые культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/растение	Ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/растение	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней



КСЕНИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений **Р.В. Некрасов**



Приложение № 14 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино, Фолирус 34:5:5 Амино, Фолирус 15:5:30 Амино, Фолирус 8:13:36 Амино, Фолирус 15:39:15 Амино, Фолирус 11:7:34 Амино, Фолирус 12:48:8 Амино, Фолирус 5:23:35 Амино от 16 марта 2023 г. № 4036

1	2	3	4
3	Фолирус 8:13:36 Амино	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	<i>Виноград</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 1,5-2 л/10 м ²	<i>Бахчевые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	<i>Бахчевые культуры</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 4-10 л/м ²	<i>Картофель</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней



Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

