

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации



**Выписка**  
**из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930**

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Ризет, КС (200 г/л пикоксистробина + 80 г/л ципроконазола)

*(наименование пестицида или агрохимиката)*

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

010-02-9841-0

дата государственной регистрации

18 марта 2026 г.

на срок по

17 марта 2029 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработок) <sup>1</sup>	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
0,5-0,6 л/га	Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков заболеваний.  Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40 (1)	-/3



0,7 л/га	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении флаг-листа начало выметывания метелки. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом.  Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60 (1)	-/3
0,5-0,6 л/га	Кукуруза	Пузырчатая головня, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации в фазе образования междоузлий – выбрасывание метелки.  Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40 (1)	-/3
0,5-0,6 л/га	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков заболеваний.  Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40 (1)	-/3
0,5-0,6 л/га	Рапс яровой и озимый	Склеротиниоз, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации.  Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40 (1)	-/3
0,5-0,6 л/га	Соя	Пероноспороз, церкоспороз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков заболеваний.  Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40 (1)	-/3
0,5-0,7 л/га	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков заболеваний.  Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40 (1)	-/3

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.



