

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз России)**

**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ
ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ»,
РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Часть I
ПЕСТИЦИДЫ**

Издание официальное

При цитировании ссылка на данное издание обязательна

Информация в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации»,
приведена по состоянию на 3 апреля 2025.

МОСКВА 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Пестициды

Сокращения и условные обозначения

Инсектициды и акарициды

Нематициды

Родентициды

Моллюскоциды

Репелленты

Феромоны

Фунгициды

Гербициды

Десиканты

Регуляторы роста растений

Микробиологические и биологические пестициды

Приложения

ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее – Каталог), ведет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз).

Минсельхоз России ведет Каталог на официальном сайте Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.mcsx.gov.ru>).

Каталог является официальным документом, содержит перечень пестицидов (часть 1) и агрохимикатов (часть 2), разрешенных к обороту на территории Российской Федерации, в том числе для применения гражданами и юридическими лицами в сельском, лесном, коммунальном и личном подсобном хозяйстве, а также основные регламенты применения пестицидов, установленные в ходе их регистрационных испытаний.

Указанные в Каталоге пестициды и агрохимикаты зарегистрированы в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее – Закон).

В соответствии со статьей 3 Закона допуском к обороту (ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, производство, реализация, реклама, применение, хранение, транспортировка, уничтожение) пестицидов и агрохимикатов является их государственная регистрация с последующим внесением в Каталог.

Пестициды в Каталоге расположены по группам согласно их назначению, внутри групп – в алфавитном порядке по названиям их действующих веществ.

Названия действующих веществ пестицидов указаны по номенклатуре ИСО (ISO) или ИЮПАК (IUPAC). Обозначения международных названий действующих веществ приведены в русской транскрипции.

Информация о пестицидах дана в виде таблицы.

В колонке 1 указаны наименование пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, заявитель, номер государственной регистрации, ограничения по применению и дата окончания срока государственной регистрации.

Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после указания заявителя означают классы опасности препаратов. В числителе – класс опасности для человека, в знаменателе – класс опасности для пчел в полевых условиях. Расшифровка классов опасности для пчел и соответствующие им условия применения пестицидов приведены в Приложении 2.

В колонке 2 указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых препаративных форм – в кг/га (для протравителей семян – в кг/т), для жидких препаративных форм – в л/га (для протравителей семян – в л/т).

В остальных случаях нормы применения, приведенные в других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. Нормы применения гербицидов даны из расчета сплошной обработки почвы, при ленточном способе внесения норма применения сокращается пропорционально уменьшению обрабатываемой площади.

В колонке 3 указаны культуры, на которых разрешено применение данного пестицида. Две культуры, например, томат и огурец указаны как для открытого, так и защищенного грунта, если это не оговаривается специально.

В колонке 4 указаны вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид, для десикантов и регуляторов роста растений – назначение препарата.

В колонке 5 размещены способ, время обработки, особенности применения. Выражение “Расход – 400 л/га”, “Расход – 12 л/т” и т.п. означает расход рабочей жидкости (раствора, эмульсии или суспензии), если не указано “Расход рабочей жидкости”.

В колонке 6 указаны сроки ожидания, в скобках – кратность обработок. Срок ожидания – это временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая, указывается в днях. Если применение пестицида однозначно однократное, например, предпосевная обработка семян, то в шестой колонке может быть указан прочерк (-) или (1).

В колонке 7 сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных (механизированных) работ по уходу за растениями приводятся в днях.

В соответствии со статьей 65 пункта 15 подпункта 6 «Водного кодекса Российской Федерации» от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ запрещено применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранных зон водных объектов.

Буквенные символы означают:

(А) в колонке 2 – разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.

(Л) – разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. Регламенты применения препарата в личных подсобных хозяйствах представлены отдельной строкой.

Двойными линейками в таблице ограничены регламенты применения одного препарата или группы препаратов, а также регламенты применения препаратов в личных подсобных хозяйствах.

Агрохимикаты расположены в таблице по группам согласно их назначению, внутри групп – в алфавитном порядке названий.

В колонке 1 указаны: название (марка) агрохимиката, область применения.

Буквенные обозначения перед названием агрохимиката означают:

С – разрешен для применения только в сельскохозяйственном производстве;

ЛС – разрешен для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах;

Л – разрешен для применения только в личных подсобных хозяйствах.

В колонке 2 указывается заявитель или заявители.

В колонке 3 указывается номер государственной регистрации.

В колонке 4 указывается дата окончания срока регистрации (число, месяц, год).

Необходимая информация – регламенты и особенности применения агрохимиката приводятся в рекомендациях о транспортировке, применении и хранении, утвержденных регистрантами и представленных в соответствии с приказом Минсельхоза России от 21 января 2022 г. № 23 «Об установлении требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке» (далее – приказ № 23) в установленном порядке в соответствии с заключениями экспертизы результатов регистрационных испытаний агрохимикатов.

На тарных этикетках агрохимикатов в обязательном порядке должны быть указаны номера государственной регистрации агрохимикатов, а также информация в соответствии с требованиями, установленными приказом № 23.

Каждое тарное место пестицида или агрохимиката должно быть снабжено подробными рекомендациями о транспортировке, применении и хранении, обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, с указанием регламентов их применения и тарными этикетками.

Ответственность за правильное хранение агрохимикатов, строгое выполнение требований технологии и регламентов их применения возлагается на сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе коллективные, фермерские хозяйства и другие организации, а также частных лиц, применяющих агрохимикаты.

Поскольку ни заявитель агрохимикатов, ни их производитель не оказывают влияния на их хранение и применение потребителем и не могут контролировать соответствие их применения регламентам, они не несут ответственности за последствия их неправильного хранения и применения.

Для консультаций в экстренных случаях при отравлениях необходимо обращаться в ФГУ “Научно-практический токсикологический центр ФМБА России” по адресу:

129090, г. Москва, Сухаревская площадь, д. 3, корп. 7 или по телефонам: (495) 628-16-87; (495) 621-68-85 (круглосуточно).

Дополнительную информацию и разъяснения, связанные с использованием настоящего Каталога, можно получить в Отделе химизации.

защиты растений и карантина Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по адресу:

107996, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11 или по телефонам (495) 608-62-84, 607-82-27.

Сокращения и условные обозначения

Б – брикеты
ВГ, ВРГ – водорастворимые гранулы
ВГР – водно-гликолевый раствор
ВДГ – водно-диспергируемые гранулы
ВК, ВРК – водорастворимый концентрат
ВКР – водный коллоидный раствор
ВКС – водный концентрат суспензии
ВР – водный раствор
ВРКАП – водорастворимые капсулы
ВРП – водорастворимый порошок
ВС – водная суспензия
ВСК – водно-суспензионный концентрат
ВСП – водно-спиртовой раствор
ВСХ – воздушно-сухая масса
ВЭ – водная эмульсия
Г – гранулы
ГР – гликолевый раствор
Д – диспенсер
д.в. – действующее вещество
Ж – жидкость
ККР – концентрат коллоидного раствора
КМЭ – концентрат микроэмульсии
КНЭ – концентрат наноэмульсии
КОЛР – коллоидный раствор
КРП – кристаллический порошок
КС – концентрат суспензии
КЭ – концентрат эмульсии
МБ – мягкие брикеты
МГ – микрогранулы
МД – масляная дисперсия
МК – масляный концентрат
МКС – микрокапсулированная суспензия
МКЭ – масляный концентрат эмульсии
ММС – минерально-масляная суспензия
ММЭ – минерально-масляная эмульсия
МС – масляная суспензия
МСК – масляно-суспензионный концентрат
МЭ – микроэмульсия
П – порошок
ПР – приманка
ПС – паста
ПТП – пленкообразующая текучая паста
Р – раствор
РК – растворимый концентрат
РП – растворимый порошок
СК – суспензионный концентрат
СК-М – суспензионный концентрат масляный
СП – смачивающийся порошок
СТС – сухая текучая суспензия
СХП – сухой порошок
СЭ – суспензионная эмульсия
ТАБ – таблетки
ТБ – твердые брикеты
ТКС – текучий концентрат суспензии
ТПС – текучая паста
ТС – текучая суспензия
УМО – ультрамалообъемное опрыскивание
ФЛО – суспензионный концентрат
ЭМВ – эмульсия масляно-водная

Инсектицид (акарицид)

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Bacillus thuringiensis

Биослип БТ, П (1x10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 IV/III 173-01-1751-1 09.02.2018 08.02.2028	2 - 2,5	Томат защищенного грунта,	Совка хлопковая (личинки 1 – 2-го возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 3000 л/га	5(2)	1(1)	Активен
	1,5	Лук	Луковая моль (личинки 1 – 3-го возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	5(2)	1(1)	
	1,5	Картофель	Жук колорадский, картофельная моль (личинки 1 – 3-го возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	5(2)	1(1)	
	2-2,5	Капуста	Капустная совка, капустная белянка (личинки 1 – 2-го возраста), тля капустная	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	5(2)	1(1)	
	2 - 2,5	Огурец защищенного грунта	Тля бахчевая	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 3000 л/га	5(2)	1(1)	
	2-2,5	Перец открытого грунта	Тля бахчевая, совка хлопковая (личинки 1 – 2-го возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	5(2)	1(1)	
	2-2,5	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	5(2)	1(1)	

Bacillus thuringiensis B-501

Дефилигум, СК (10 ¹⁰ КОЕ/Мл) ООО «БИОТА» ОГРН: 1137746933125 IV/III 805-01-3621-1 13.04.2022 12.04.2032	0,5	Дуб, сосна и другие лиственные и хвойные леса и насаждения	Непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд и другие хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы 1-3 возраста), дубовый клоп кружевница и другие сосущие	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	0,5	Свекла сахарная, подсолнечник, кукуруза	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	

Bacillus thuringiensis, subsp. *Thuringiensis*, ИПМ-1140

Инсетим, Ж (2х10 ⁹ КОЕ/см ³) ООО «ПАРАДИГМА» ОГРН: 1132311008004 IV/II 430-1-2118-1 22.02.2019 21.02.2029	3,0	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)	1(1)	Активен
	30 мл/3 л воды (JI)	Подсолнечник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	5(1)	1(1)	
	50 мл/10 л воды (JI)	Яблоня	Яблоневая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от сорта и возраста)	5(4)	1(1)	
	5,0	Яблоня	Яблоневая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	5(4)	1(1)	
	3,0	Подсолнечник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)	1(1)	

Bacillus thuringiensis, var. kurstaki Z-52(спорово-кристаллический комплекс)

Лепидобактерицид, Ж (10х10 ⁹ спор/г+2000ЕА/мг) ООО НПФ «ЭКОСЕРВИС С» ОГРН: 1022300522199 IV/III 435-01-1492-1 04.05.2017 03.05.2027	3	Береза, сосна и другие лиственные и хвойные леса и насаждения	Непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд, сосновый пилильщики и другие хвое- и листогрызущие вредители	Ультрамалообъемное опрыскивание в период развития гусениц Расход рабочей жидкости - 3 л/га	-(1)	-(-)	Активен
--	---	---	---	---	------	------	---------

Bacillus thuringiensis, var. Thuringiensis, штамм 98

Битоксибациллин, П (20х10 ⁹ спор/г+1500ЕА/мг) ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 III/III 034-01-2881-1 18.11.2020 17.11.2030	5-30	Цветочные и декоративные культуры открытого грунта	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5-1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(3)	1(1)	Активен
	40-50 г/10 л воды (JI)	Капуста белокочанная	Капустная совка, капустная и репная белянки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м ²	5(2)	1(-)	
	1-3	Береза, дуб, самшит, фундук и лиственные деревья и кустарники	Непарный и кольчатый шелкопряды, павлиноглазка айлантовая, огневка самшитовая, летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-2 возраста), златогузка (гусеницы 1-3 возраста), дубовый клоп-кружевница, мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	1(1)	
	50-100 г/10 л воды (JI)	Цветочные и декоративные культуры открытого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5-1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м ²	-(1)	1(-)	
	2,5-10	Роза открытого грунта	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5-1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(3)	1(1)	

4-5	Груша, яблоня	Медяница (листоблешка)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	5(3)	1(1)
50 г/10 л воды (Л)	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,5% рабочим раствором с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2	5(6)	1(-)
40-50 г/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста. Интервал между обработками при среднесуточной температуре выше 20°C – 6-7 дней, ниже 20°C – 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м2	5(3)	1(-)
1-3	Береза, дуб, самшит, фундук и лиственные деревья и кустарники	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (2)	1(1)
4-5	Черешня, вишня, слива, алыча	Тли	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	5(3)	1(1)
1-3	Сосна, пихта, кедр и хвойные породы	Сибирский коконопряд (весной – перезимовавшие гусеницы, летом – гусеницы 1-2 возраста нового поколения), рыжий сосновый пилильщик, сосновый семенной клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (2)	1(1)
40-50 г/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Клещи, медяницы (листоблешки)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Во время цветения обработки запрещены Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(3)	1(-)
1-3	Береза, дуб, самшит, фундук и лиственные деревья и кустарники	Непарный и кольчатый шелкопряды, павлиноглазка айлантовая, огневка самшитовая, летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-2 возраста), златогузка (гусеницы 1-3 возраста), дубовый клоп-кружевница, мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	- (1)	1(1)
2-5	Капуста белокочанная	Капустная совка, капустная и репная белянки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	1(1)

1-3	Береза, дуб, самшит, фундук и лиственные деревья и кустарники	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	1(1)
1-3	Сосна, пихта, кедр и хвойные породы	Сибирский коконопряд (весной – перезимовавшие гусеницы, летом – гусеницы 1-2 возраста нового поколения), рыжий сосновый пилильщик, сосновый семенной клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	1(1)
50-100 г/10 л воды(Л)	Роза, цветочные и декоративные культуры защищенного грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5-1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 1-2 л/10 м2	-(1)	1(-)
2-5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период массового отрождения личинок каждого поколения вредителя с интервалом 6-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	1(1)
1-3	Береза, дуб, самшит, фундук и лиственные деревья и кустарники	Непарный и кольчатый шелкопряды, павлиноглазка айлантовая, огневка самшитовая, летне-осенний комплекс чешуекрылых вредителей (гусеницы 1-2 возраста), златогузка (гусеницы 1-3 возраста), дубовый клоп-кружевница, мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	-(1)	1(1)
5	Яблоня, груша, айва	Клещи	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	5(3)	1(1)
60-80 г/10 л воды(Л)	Виноград	Трипсы, клещи, цикадки	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 1-3 л на куст	5(2)	1(-)
1-3	Сосна, пихта, кедр и хвойные породы	Сибирский коконопряд (весной – перезимовавшие гусеницы, летом – гусеницы 1-2 возраста нового поколения), рыжий сосновый пилильщик, сосновый семенной клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	-(2)	1(1)
5-20	Роза, цветочные и декоративные культуры защищенного грунта	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5-1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	-(3)	1(1)

3-5	Виноград	Трипсы, клещи, цикадки	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	5(2)	1(1)
1-3	Береза, дуб, самшит, фундук и лиственные деревья и кустарники	Американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	- (2)	1(1)
5-15	Огурец защищенного грунта	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5% рабочим раствором с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(3-6)	1(1)
50-100 г/10 л воды(Л)	Роза открытого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации 0,5-1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м2	- (1)	1(-)

Bacillus thuringiensis, var. *Thuringiensis*, штамм B-501

Лептоцид, Ж (10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО «Инвиво» ОГРН: 1082323000495 IV/III 242-01-1570-1 30.10.2017 29.10.2027	2-3	Свекла сахарная, подсолнечник, кукуруза	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)	Активен
	3	Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало, непарный шелкопряд, листовёртка зеленая дубовая, златогузка, кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	5(2)	1(1)	
	3	Сосна	Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	5(2)	1(1)	
	3	Пихта, кедр, лиственный	Сибирский шелкопряд, пихтовая пяденица (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - Самолет Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га	5(2)	1(1)	
	3	Сосна	Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - Самолет Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га	5(2)	1(1)	

3	Пихта, кедр, лиственница	Сибирский шелкопряд, пихтовая пяденица (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - Вертолет Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га	5(2)	1(1)	
3	Пихта, кедр, лиственница	Сибирский шелкопряд, пихтовая пяденица (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	5(2)	1(1)	
3	Сосна	Сосновый шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - Вертолет Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га	5(2)	1(1)	
3	Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало, непарный шелкопряд, листовёртка зеленая дубовая, златогузка, кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - Самолет Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га	5(2)	1(1)	
3	Дуб и другие лиственные	Пяденицы зимняя и обдирало, непарный шелкопряд, листовёртка зеленая дубовая, златогузка, кольчатый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней с помощью самолета Ан-2 с расходом рабочей жидкости 10-50 л/га и вертолета Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га, 3-5 л/га УМО Расход рабочей жидкости - Вертолет Ми-2 с расходом рабочей жидкости 25-50 л/га	5(2)	1(1)	

Bacillus thuringiensis B-82 + Bacillus subtilis B-76

Инсектобактерин, СП (10 ⁹ КОЕ/г + 10 ⁹ КОЕ/г) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 ПП/П 033-01(02)-3392-1 03.12.2021 02.12.2031	10 г/10 л (Л)	Огурец защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	7(4)	1(1)	Активен
	20 г/10 л (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	- (4)	1(1)	
	10 г/10 л (Л)	Томат открытого грунта	Совки	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	7(6)	1(1)	

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Z-52 (споро-кристаллический комплекс) + Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Z-52 (споро-кристаллический комп.)

<p>Лепидодид, П, СК (60х10⁹ спор/г+3000ЕА/мг + 10х10⁹ спор/Мл+2000ЕА/мг) ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 IV/III, ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 IV/III 034-01-2882-1 14.12.2020 13.12.2030</p>	1-3	Дуб, береза, липа и лиственны е леса и насаждени я	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), зеленая дубовая листовертка, непарный и кольчатый шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-2 возраста), дубовый клоп-кружевница (имаго, нимфы), ивовая минирующая златка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	1-1,5	Яблоня, груша, вишня, черешня, айва и плодовые и декоративн ые породы	Яблонная и плодовая моли, американская белая бабочка, златогузка, пяденицы, листовертки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	5(2)	1(1)	
	3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждени я	Сибирский конопряд	Опрыскивание в период вегетации: первое – по перезимовавшим гусеницам старших возрастов, второе – по гусеницам 1-2 возраста нового поколения Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	1(1)	
	3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждени я	Сосновый семенной клоп (имаго, нимфы), рыжий сосновый пилильщик (ложногусеницы 2-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	-(1)	1(1)	
	3	Дуб, береза и лиственны е породы	Листогрызущие вредители: непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд, дубовая листовертка, пяденицы и гусеницы 1-3 возраста	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	-(1)	1(1)	
	1-3	Декоратив ные кустарник и и насаждени я (айлант, сирень, лимонник китайский, черемуха)	Павлиноглазка айлантовая, горностаевые моли (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	1(1)	
	1-3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждени я	Сосновый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста), шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	-(1)	1(1)	
	20-30 г/10 л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки, капустная совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м2	5(2)	1(-)	
	1-3	Капуста кочанная	Капуста и репная белянка, капустная моль, капустная совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)	
	3-4	Виноград	Хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	5(2)	1(1)	

2-3	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	5(3)	1(1)
3	Фундук	Мраморный клоп (имаго, нимфы)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
2-3	Томат открытого и защищенного грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)
3	Дуб, береза и лиственные породы	Листогрызущие вредители: непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд, дубовая листовертка, пяденицы и гусеницы 1-3 возраста	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждения	Сибирский конопряд	Опрыскивание в период вегетации: первое – по перезимовавшим гусеницам старших возрастов, второе – по гусеницам 1-2 возраста нового поколения Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (2)	1(1)
1-3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждения	Сосновый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста), шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	- (1)	1(1)
1-2	Томат открытого грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(-)
2-4	Подсолнечник, свекла сахарная, столовая, кормовая, люцерна	Луговой мотылек (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	5(2)	1(1)
3	Сосна, пихта, ель, кедр и хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, шелкопряд монашенка, пяденицы и гусеницы 1-3 возраста. Рыжий сосновый пилильщик (личинки 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	- (1)	1(1)
20-30 г/10 л воды (Л)	Смородина, крыжовник, малина, рябина, черноплодная	Листовертки, огневки (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики (ложногусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 2-10 л/10 м ²	5(2)	1(-)
2-3	Смородина черная, красная, белая, крыжовник	Листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(2)	1(1)

2-3	Соя	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)
1-3	Смородин а, крыжовник, малина, рябина черноплодная	Листовертки, огневки (гусеницы 1-3 возраста), пилильщики (ложногусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 400-800 л/га	5(2)	1(1)
20-30 г/10 л воды (II)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней (на плодовых культурах – 7-8 дней) Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта деревьев)	5(3)	1(-)
30-40 мл/10 л воды	Томат открытого грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,4 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м ²	5(1-3)	1(-)
2-3	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га (2-5 л/дерево в зависимости от возраста и размеров кроны)	5(3)	1(1)
1-2	Соя	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)
20-30 мл/10 л воды	Подсолнечник	Луговой мотылек (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации 0,2-0,3 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м ²	5(1-3)	1(-)
2-3	Соя	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(2)	1(1)
3	Самшит	Самшитовая огневка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
1-2	Рапс озимый и яровой	Подгрызающие совки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
1-3	Дуб, береза, липа и лиственные леса и насаждения	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), зеленая дубовая листовертка, непарный и кольчатый шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-2 возраста), дубовый клоп-кружевница (имаго, нимфы), ивовая минирующая златка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (1)	1(1)
2-3	Томат открытого и защищенного грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(2)	1(1)

3-4	Подсолнечник	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(2)	1(1)
1-3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждения	Сосновый шелкопряд (гусеницы 1-3 возраста), шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, сосновая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
20-30 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	5(3)	1(-)
3	Самшит	Самшитовая огневка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (1)	1(1)
30-40 мл/10 л воды	Томат защищенного грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,4 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м ²	5(1-3)	1(-)
3	Сосна, пихта, ель, кедр и хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, шелкопряд монашенка, пяденицы и гусеницы 1-3 возраста. Рыжий сосновый пилильщик (личинки 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
30-50 мл/10 л воды	Виноград	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,5 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,6-1 л/10 м ²	5(1-3)	1(-)
2-4	Томат защищенного грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(3)	1(-)
3	Фундук	Мраморный клоп (имаго, нимфы)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (1)	1(1)
1-1,5	Яблоня, груша, вишня, черешня, айва и плодовые и декоративные породы	Яблонная и плодовая моли, американская белая бабочка, златогузка, пяденицы, листовёртки весенней группы, шелкопряды (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га (2-5 л/дерево в зависимости от возраста и размеров кроны)	5(2)	1(1)
40 мл/10 л воды	Подсолнечник	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации 0,4 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м ²	5(1-3)	1(-)
3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждения	Сосновый семенной клоп (имаго, нимфы), рыжий сосновый пилильщик (ложногусеницы 2-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)

2-4	Кукуруза	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(3)	1(1)
1-2	Рапс озимый и яровой	Капустная моль (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)
3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждения	Сосновый семенной клоп (имаго, нимфы), рыжий сосновый пилильщик (ложногусеницы 2-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-25 л/га	- (1)	1(1)
2-3	Подсолнечник	Луговой мотылек (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(2)	1(1)
3	Сосна, пихта, кедр и хвойные леса и насаждения	Сибирский конопряд	Опрыскивание в период вегетации: первое – по перезимовавшим гусеницам старших возрастов, второе – по гусеницам 1-2 возраста нового поколения Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	- (2)	1(1)
1-3	Дуб, береза, липа и лиственные леса и насаждения	Златогузка (гусеницы 2-3 возраста), зеленая дубовая листовертка, непарный и кольчатый шелкопряды, пяденицы (гусеницы 1-2 возраста), дубовый клоп-кружевница (имаго, нимфы), ивовая минирующая златка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	- (1)	1(1)
0,7	Картофель	Картофельная моль	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1% рабочий раствор Расход рабочей жидкости - 100 л на 15 т клубней	- (1)	- (-)
20-30 г/10 л воды (Л)	Плодовые культуры	Яблонная моль и плодовая моли, боярышница, листовертки, шелкопряды, пяденицы, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней (на плодовых культурах – 7-8 дней) Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта деревьев)	5(2)	1(-)
30-40 г/10 л (Л)	Томат защищенного грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,4 % рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м ²	5(1)	1(-)
1-2	Капуста белокочанная	Капустная и репная белянки, капустная моль, капустная совка, огневки (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(1)
20-30 мл/10 л воды	Смородина, крыжовник	Листовертки (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 2-3 л/10 м ²	5(2)	1(-)

	20-30 мл/10 л воды (Л)	Капуста кочанная	Капустная и репная белянки, капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/10 м2	5(2)	1(-)	
	1	Картофель	Картофельная моль	Погружение клубней перед закладкой на хранение в 1% раствор Расход рабочей жидкости - 100 л на 15 т клубней	-(-)	-(-)	

Bacillusthuringiensis var. *thuringiensis* штамм БФ/15Л + *Beauveria bassiana* штамм 119/ЛТ + *Streptomyces* sp., штамм Н/15 + *Metarhiziumanisopliae* ш

Метавайт, Ж (10 ⁹ КОЕ/Мл + 10 ⁸ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁷ КОЕ/Мл) ООО «ОРГАНИК ЛАЙН» ОГРН: 1115027001154 III/III 196-01-3937-1 10.01.2023 09.01.2033	2-5	Соя	Луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации с интервалом - 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	7(2)	1(1)	Активен
	20-50 мл/литр воды (Л)	Картофель	Проволочники	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 1 л/100м2	-(-)	-(-)	
	20-80 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Бахчевая тля, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(-)	1(1)	
	2-8	Огурец защищенн ого грунта	Бахчевая тля, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800 - 3000 л/га	7(3)	1(1)	
	2-5	Картофель	Проволочники	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 80 -120 л/га	-(-)	-(-)	

Beauveria bassiana

Зеленый барьер, СП (10 ⁸ КОЕ/г) ООО «ФУНГИПАК» ОГРН: 1145030000664 IV/III 369-01-1123-1 24.05.2016 23.05.2026	0,05	Пастбища, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок с помощью самолета Ан-2, вертолета Ми-2 Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	5(1)	1(1)	Активен
	0,05	Пастбища, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые	При ультрамалообъемном опрыскивании (УМО) 3-5 л/га Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	5(1)	1(1)	
	0,05	Пастбища, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	5(1)	1(1)	

Beauveria bassiana (ОПВ-43) + *Beauveria bassiana* (ОПВ-43)

Биослип БВ, Ж (1-7х10 ⁸ КОЕ/Мл + 1х10 ⁸ КОЕ/Мл) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 IV/III, ООО «Алмавит Эксперт» ОГРН: - IV/III 502-01-1963-1 10.07.2018 24.10.2033	2,0	Подсолнеч ник	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	5(2)	1(1)	Активен
	2,0	Нут	Хлопковая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)	
	2,0	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)	
	3,0	Огурец защищенн ого грунта	Тля бахчевая	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 3000 л/га	5(2)	-(-)	
	3,0	Яблоня	Яблонная плодожорка, розанная листовертка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	5(2)	-(-)	

3,0	Лук-репка	Луковая моль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	-(3)
2,0-4,0	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	5(2)	1(1)
2,0	Горох	Гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)
2,0	Свекла сахарная	Свекловичная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)
2,0	Соя	Хлопковая совка, акациевая (бобовая) огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)
2,0	Подсолнечник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)
2,0-4,0	Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	1(1)
3,0	Картофель	Жук колорадский, картофельная моль (личинки 1-3-го возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	-(3)
3,0	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	5(2)	-(3)
3,0	Томат защищенного грунта	Совка хлопковая (личинки 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 3000 л/га	5(2)	-(3)

Beauveria bassiana BB1 + Bacillus thuringiensis Hi

Биостоп Супер, микроконте (3x10 ⁶ КОЕ/г + 3x10 ⁶ КОЕ/г) ООО «БИОТА» ОГРН: 1137746933125 III/III 805-01-4071-1 25.04.2023 24.04.2023	0,05-0,1	Пшеница озимая	Пьявица, тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)	Активен
	0,07-0,1	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(1-2)	-(-)	
	0,05-0,1	Дуб, сосна и другие лиственные и хвойные леса и насаждения	Непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд и другие хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы 1-3 возраста), дубовый клоп кружевница и другие сосущие	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-50 л/га	-(1)	-(-)	
	0,05-0,1	Перец открытого грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1-2)	-(-)	
	0,07-0,1	Яблоня	Яблонная плодожорка, розанная листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(1-4)	-(-)	
	0,05-0,1	Подсолнечник	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)	

0,05-0,1	Дыня, арбуз	Бахчевая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Томат открытого грунта	Бахчевая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-50 л/га	-(1)	-(-)
0,05-0,1	Соя	Луговой мотылек, хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Огурец открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/га	-(1)	-(-)
0,05-0,1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, блошки, тли, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Кукуруза	Луговой мотылек, хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)
0,05-0,1	Свекла сахарная	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1-2)	-(-)

Lecanicillium lecanii штамм В-80

Биоверт, СП (10 ⁶ КОЕ/г споры) ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 III/III 034-01-1314-1 23.12.2016 22.12.2026	7-10	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс, обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	1(3)	1(1)	Активен
	7-10	Цветочные культуры защищенного грунта	Тепличная белокрылка, западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-1000 л/га	1(3)	1(1)	
	7-10 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры защищенного грунта	Тепличная белокрылка, западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,2-1 л/10 м2	1(3)	1(-)	
	7-10 г/10 м2 (Л)	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс, обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2	1(3)	1(-)	

Metarhizium anisopliae P-72

Метаризин, Ж (10 ⁸ КОЕ/Мл)	100 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Проволочники	Внесение в почву при посадке. Расход рабочей жидкости - 2 л/100м2	-(1)	-(-)	Не активен
--	-------------------	-----------	--------------	--	------	------	------------

ООО «Инвиво» ОГРН: 1082323000495 IV/III 242-01-416-1 23.09.2014 22.09.2024	2-5	Пастбища, участки заселенны е саранчовы ми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(-)	
Биофорт, Г (10^8 КОЕ/г) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-01-4383-1 25.01.2024 24.01.2034	100-300 г/ 100 м2 (Л)	Картофель	Проволочники	Внесение в почву при посадке..вручную с последующей заделкой	-(1)	-(-)	Активен

Streptomycessp. + Beauveria bassiana + Bacillus thuringiensis

Биостоп, Ж (10x10^8 КОЕ/Мл+2 000ЕА/мл + 10x10^8 КОЕ/Мл+2 000ЕА/мл + 10x10^9 КОЕ/Мл+2 000ЕА/мл) ООО «Инвиво» ОГРН: 1082323000495 III/III 242-01-621-1 06.04.2015 05.04.2025	7	Самшит	Самшитовая огневка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(10)	-(-)	Активен
	2-3	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-430 л/га	-(2)	-(-)	
	2-3	Соя	Луговой мотылек, хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-430 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Кукуруза	Луговой мотылек, хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Дыня, арбуз, огурец открытого грунта	Паутинный клещ, бахчевая тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Свекла сахарная и кормовая	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста), свекловичные блошки, свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Капуста	Капустная тля, табачный трипс, капустная совка (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Подсолнеч ник	Луговой мотылек (гусеницы 1-3 возраста)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	4-5	Томат и перец открытого грунта	Хлопковая совка (гусеницы 1-3 возраста), бахчевая тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	5	Яблоня	Яблонная плодожорка, розовая листовертка	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)	
	3-5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(-)	

Абамектин

Сарейп, КЭ (18 г/л) «РОТАМ Лтд» ОГРН: - П/И 102-01-2019-1 10.10.2018 09.10.2028	0,75-1	Виноград (столовые сорта)	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	28(2)	7(3)	Активен
	0,75-1	Виноград (техническ ие сорта)	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	60(2)	7(3)	
	1-1,5	Виноград (столовые сорта)	Виноградный войлочный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	28(2)	7(3)	
	1-1,5	Виноград (техническ ие сорта)	Виноградный войлочный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	60(2)	7(3)	
	0,75	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	34(2)	7(3)	
	0,75-1	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	34(2)	7(3)	
Вертимек, КЭ (18 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/И 041-01-913-1 22.12.2015 041-01-913-1/473 473 21.12.2025	0,7-1,0	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,5	Горшечны е культуры защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ, западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации в концентрации -0,05% Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(3)	3(3)	
	0,75-1	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	28(2)	3(3)	
	1-1,5	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,1% Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	3(3)	3(3)	
	0,8-1,2	Огурец защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ, табачный и оранжерейный трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	3(3)	
	0,75-1	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)	
	0,5-1,5	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	3(3)	
	0,75	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	28(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Перец, баклажан, томат защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	3(3)	
Биокилл, КЭ (10 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 П/И 008-01-1156-1 18.07.2016 008-01-1156-1/375 375 17.07.2026	8-12 мл/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(-)	Активен
	8 мл/10 л воды (Л)	Капуста	Капустнаябелянка	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	3(3)	1(-)	
	4 мл/10 л воды(Л)	Комнатные цветочные декоративн ые растения	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	3(3)	1(1)	

	3 мл/10 л воды (Л)	Смородин а	Тли, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	3(2)	1(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, клещи, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - от 2 л до 5л/дерево	3(3)	1(-)	
	4 мл/2 л воды(Л)	Томат защищенн ого грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(1)	
	4-8 мл/5 л воды(Л)	Лук (кроме лука на перо)	Клещи, луковая муха	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	3(3)	1(1)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенн ого грунта	Паутинныйклещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(-)	
	4 мл/5 л воды(Л)	Малина, земляника	Малинно-земляничн ый долгоносик	Опрыскивание в фазе бутонизации и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	3(2)	1(1)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Смородин а	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	3(2)	1(-)	
	4 мл/5 л воды(Л)	Роза открытого грунта	Тля, листовертки, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	- (3)	1(1)	
	20 мл/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенн ого грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(-)	
Крафт, ВЭ (36 г/кг) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/Л 058-01-4338-1 12.01.2024 11.01.2034	0,3-0,5	Соя	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	1(3)	Активен
	0,5-0,6	Роза защищенн ого грунта	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	- (1)	1(3)	
	0,4-0,6	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	36(2)	1(3)	
	0,5-0,6	Огурец защищенн ого грунта	Паутинные клещи, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	1(3)	
	0,4	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	36(2)	1(3)	
	0,4-0,6	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	49(2)	1(3)	
Мабет, КЭ (18 г/л) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 П/Л 389-01-4294-1 11.12.2023 10.12.2033	0,75-1,0	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	2(2)	1(1)	Активен
	0,75	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	2(2)	1(1)	
	0,75-1,0	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	2(2)	1(1)	
Мекар, МЭ (18 г/л)	0,75	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 800 л/га	28(2)	3(3)	Активен

ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Л 018-01-1989-1 25.09.2018 018-01-1989-1/345 345 24.09.2028	0,75-1,0	Виноград	Паутинные клещи, виноградный войлочный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	34(2)	3(3)	
	0,75-1,0	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	28(2)	3(3)	
	0,4-0,6	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	3(3)	
Клеопатра, КЭ (18 г/л) «РОТАМ Лтд» ОГРН: - П/Л 102-01-2165-1 25.03.2019 24.03.2029	0,6-0,7	Соя	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
Шанситек, КЭ (18 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-2936-1 17.12.2020 16.12.2030	0,75-1	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	40(2)	3(3)	Активен
	0,75	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	30(1)	3(3)	
	0,75-1	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	3(3)	

Абамектин + Индоксакарб

Стилет, МД (40 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-3340-1 21.10.2021 20.10.2031	0,3-0,4	Лук	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Лук	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Подсолнечник	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	25(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Капуста: белокочанная, цветная, кольраби, пекинская, китайская	Капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Соя	Акациевая огневка, луговой мотылек, хлопковая совка, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(1)	-(3)	
	0,45-0,55	Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка, медяница, минирующая моль, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	

	0,35-0,45	Виноград	Гроздевая листовертка, трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	28(1)	-(3)	
--	-----------	----------	--	--	-------	------	--

Абамектин + Спиromезифен

Оберон Репид, КС (11,4 г/л + 228,6 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/Л 019-01-1233-1 19.09.2016 019-01-1233-1/176 176 18.09.2026	0,6-0,8	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	3(3)	Активен
	0,5-0,8	Огурец и томат защищенн ого грунта	Паутинные клещи, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	30(2)	1(-)	

Абамектин + Циантринилипрол

Лирум, СК (18 г/л + 60 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Л 041-01-2682-1 21.05.2020 20.05.2030	1,0-1,5	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	10(2)	3(3)	Активен
	1,2-1,5	Огурец защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	1(-)	
	1,0-1,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, минирующие моли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	10(2)	3(3)	
	1,2-1,5	Томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс, южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	1(-)	

Аверсектин С

Фитоверм М, КЭ (2 г/л) ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 Ш/Ш 930-01-4566-1 14.05.2024 13.05.2034	1,6-2,4	Цитрусовы е культуры	Серебристый цитрусовый клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,1% Расход рабочей жидкости - 1600-2400 л/га	3(2)	1(1)	Активен
	5,0-15,0	Огурец, томат защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,5% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	1(1)	
Фитоверм Экстра, КЭ (50 г/л) ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 Ш/Л 930-01-4746-1 03.12.2024 02.12.2034	0,4-1,2	Огурец защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	1(1)	Активен
	0,14	Кукуруза	Восточный кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500 л/га	2(2)	1(1)	
	0,075-0,15	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	1(2)	1(1)	

Аверсектин С + Аверсектин С

Фитоверм, КЭ (50 г/л + 10 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/Ш, ООО «Фармбиомедсервис» ОГРН: - Ш/Ш 112-01-379-1 23.06.2014 12.01.2027	0,32 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(3)	1(1)	Активен
	0,08 мл/л воды (Л)	Комнатные растения	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/ м2	-(4)	1(1)	
	0,08 мл/л воды (Л)	Смородин а	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	3(2)	1(1)	
	0,4 мл/л воды (Л)	Огурец, томат, перец, баклажан защищенн ого грунта	Табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2	3(3)	1(1)	

0,08 мл/0,25 л воды (Л)	Комнатные растения	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/ м2	-(4)	1(1)
4 мл/10 л воды (Л)	Смородин а	Клещи, листовертки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	3(2)	1(-)
0,032-0,04	Смородин а	Пяденицы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	3(2)	1(1)
4 мл/10 л воды (Л)	Розы защищенн ого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	2(3)	1(-)
0,08 мл/0,2 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	1(4)	1(1)
0,06-0,08	Хмель	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 750-1000 л/га	2(3)	1(1)
0,08 мл/0,25 л воды	Цветочные культуры открытого грунта	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	1(4)	1(1)
16 мл/10 л воды (Л)	Огурец, томат, перец, баклажан защищенн ого грунта	Персиковая, бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(-)
0,4-0,12	Огурец, томат, перец, баклажан защищенн ого грунта	Паутинный клещ, табачный, западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 3000 л/га	3(3)	1(1)
0,02	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	1(2)	1(1)
0,06-0,09	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 400 - 600 л/га	3(2)	1(1)
0,08 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	1(4)	1(1)
0,8 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации по личинкам вредителя Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	1(3)	1(-)
0,048	Смородин а	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 л/га	3(2)	1(1)
3 мл/100 м2 (Л)	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	3(3)	1(-)
0,16-0,24 мл/л воды (Л)	Огурец, томат, перец, баклажан защищенн ого грунта	Персиковая и бахчевая тли	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2	3(3)	1(1)

20 мл/10 л воды (Л)	Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта	Паутинный клещ, табачный и западный цветочный трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	3(3)	1(-)
0,06 мл/л воды (Л)	Смородина	Пяденицы, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	3(2)	1(1)
0,06 мл/л воды (Л)	Яблоня	Клещи, листовертки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева)	3(2)	1(1)
0,32-0,96	Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта	Персиковая и бахчевая тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 3000 л/га	3(3)	1(1)
0,04 мл/л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	1(3)	1(1)
0,6-1,2	Роза защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 1500 л/га	1(3)	1(1)
0,08-0,16	Яблоня	Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	3(1)	1(1)
4 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации по личинкам вредителя Расход рабочей жидкости - 5 л/дерево	3(1)	1(-)
0,08 мл/л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева)	3(1)	1(1)
0,036-0,072	Яблоня	Клещи, листовертки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	3(1)	1(1)
30 мл/10 л воды (Л)	Облепиха	Облепиховая муха	Опрыскивание в период вегетации по личинкам вредителя Расход рабочей жидкости - 2 л/дерево	3(2)	1(-)
0,16 мл/л воды (Л)	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	3(2)	1(1)
0,08 мл/л воды (Л)	Груша	Листовертки, долгоносики, тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и формы кроны дерева)	3(3)	1(1)
8 мл/10 л воды (Л)	Розы защищенного грунта	Зеленная розанная тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	2(3)	1(-)
0,24-0,48	Роза защищенного грунта	Зеленая розанная тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 1500 л/га	1(3)	1(1)
3 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Клещи, лвертки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации по личинкам вредителя Расход рабочей жидкости - 5 л/дерево	3(1)	1(-)

0,08 мл/0,2 л воды (Л)	Комнатные растения	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/ м2	- (4)	1 (1)
16 мл/10 л воды (Л)	Розы защищенного грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	2 (3)	1 (-)
0,6-1,2	Роза защищенного грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 1000 - 1500 л/га	1 (3)	1 (1)
0,16 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры защищенного грунта	Зеленая розанная тля	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-16 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1 (3)	1 (1)
0,04 мл/л воды (Л)	Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2	3 (2)	1 (1)
0,1-0,14	Кукуруза	Кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 500 л/га	2 (2)	1 (1)
0,08 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1 (3)	1 (1)

Аверсектин С + Аверсектин С + Аверсектин С

Фитоверм, КЭ, П (10 г/л + 2 г/л + 8 г/кг) ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 Ш/Ш, ООО НБЦ «Фармбиомед» ОГРН: - Ш/Ш, ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 Ш/Ш 045-05-194-1 18.12.2013 02.12.2034	0,8	Картофель	Картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	1 (3)	1 (1)	Активен
	10 мл/л воды (Л)	Комнатные растения	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 1,0 л/10 растений	1 (4)	1 (1)	
	2,4-3,0	Розы защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	(6)	1 (1)	
	20-30	Огурец, защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 1,0% Расход рабочей жидкости - 2000-3000 л/га	3 (2)	1 (1)	
	20-30	Томат защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 1,0% Расход рабочей жидкости - 2000-3000 л/га	3 (3)	1 (1)	
	10 мл/л воды (Л)	Огурец, защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3 (2)	1 (1)	
	8 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1 (4)	1 (1)	
	2,0-6,0	Огурец защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,2% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3 (3)	1 (1)	
	2 мл/л воды (Л)	Цветочные культуры защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1 (3)	1 (1)	
	10 мл/л воды (Л)	Комнатные растения	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 1,0 л/10 растений	1 (4)	1 (1)	
	10-30 мл/100 м2 (Л)	Земляника садовая защищенного грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,2% Расход рабочей жидкости - 5-15 л/100 м2	15 (2)	1 (1)	

10 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Трипсы	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(4)	1(1)	
2,1-3,6	Облепиха	Облепиховая муха	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,3% Расход рабочей жидкости - 700-1200 л/га	3(3)	1(1)	
2,0-6,0	Томат защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,2% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	1(1)	
4 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Розанная зеленая тля	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(3)	1(1)	
2 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(4)	1(1)	
1,0-3,0	Земляника садовая защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,2% Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	15(23)	1(1)	
8 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(3)	1(1)	
8-24	Перец защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,8% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	1(1)	
8 мл/л воды(Л)	Комнатные растения	Тли	Опрыскивание по мере появления вредителей Расход рабочей жидкости - 1,0 л/10 растений	1(4)	1(1)	
10 мл/л воды(Л)	Томат защищенн ого грунта	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(1)	
1,6-2,0	Хмель	Обыкновенный паутинный клещ, хмелевая тля	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,2% Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	2(3)	1(1)	

Азадирахтин

Ойкос, КЭ (26 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - III/III 528-01-4201-1 15.09.2023 14.09.2033	1,5-2,0	Томат, огурец, перец, баклажан защищенн ого грунта	Тли, трипсы, тепличная белокрылка, паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(4)	1(1)	Активен
--	---------	---	---	---	------	------	---------

Азоксистробин + Протиоконазол + Прохлораз + Ацетамиприд

Квартет, КС (39 г/л + 39 г/л + 100 г/л + 150 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/-, ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/- 178-02-2654-1 21.04.2020 20.04.2030	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи, лиственные хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-1,5	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи, лиственные хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	

Азоксистробин + Ципроконазол

Амистар Нэкст, МД (200 г/л + 80 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271	0,5-1,0	Пшеница озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	48(1-2)	-(3)	Активен
---	---------	-------------------	---	---	---------	------	---------

III/III 041-02-2059-1 16.11.2018 041-02-2059-1/315 315 15.11.2028	0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	48(1-2)	-(3)
	0,5-1,0	Пшеница озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	48(1-2)	-(3)
	0,5-0,75	Горох	Аскохитоз мучнистая роса, ржавчина	Обработка в период вегетации: первая – профилактическая или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующая – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	40(2)	-(3)
	0,5-0,75	Соя	Церкоспороз, аскохитоз, пероноспороз, септориоз	Обработка в период вегетации: первая – профилактическая или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующая – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	50(2)	-(3)
	0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	48(1-2)	-(3)

Альфа-циперметрин

Альтаир, КЭ (100 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Л 010-01-2656-1 21.04.2020 20.04.2030	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,3	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки, сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Мамба, КЭ (150 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-3102-1 09.04.2021 08.04.2031	0,15-0,2	Яблоня	Яблоневая плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	21(1)	7(3)	Активен
	0,07	Пшеница яровая и озимая	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)	7(3)	
	0,07	Пшеница яровая и озимая	Пьявицы, трипсы, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	

	0,07	Горох	Гороховая тля, гороховая плодоярка, гороховая зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	7(3)	
	0,07-0,1	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	7(3)	
	0,07	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	7(3)	
	0,07-0,1	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	7(3)	
	0,1-0,15	Люцерна	Долгоносики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	
	0,15-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	
	0,16-0,24	Виноград	Гроздевая листовертка, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	21(1)	7(3)	
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	7(3)	
	0,07-0,1	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	14(1)	7(3)	
Цунами, КЭ (100 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 ПП, ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 ПП, ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 ПП 043(042,424)-01-2253-1 30.05.2019 29.05.2029	0,07	Ячмень яровой	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	Активен
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс (семена, масло), горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	50(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	

	0,1	Свекла сахарная, свекла кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Ци-Альфа, КЭ (100 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 Ш/Л 097-01-2546-1 28.02.2020 27.02.2030	3 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	50(2)	3(-)	Активен
	0,1	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс (зерно, масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	50(2)	-(3)	
	0,1	Горох (овощной и на зерно)	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	1 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(1)	3(-)	
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Альфа-Ципи, КЭ (100 г/л) Агрия АД ОГРН: - Ш/Л, ООО «Агрорус и Ко»	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 21 дня после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1037739582825 П/И 184(026)-01-2445-1 31.10.2019 184(026)-01-2445-1/411 411 30.10.2029	0,2-0,3	Свекла сахарная	Долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	45(1)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	48(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Лен - долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	-(3)	
	0,3	Кукуруза на силос и зерно	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	42(2)	-(3)	
	0,1	Свекла кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(3)	
Альфашанс, КЭ (100 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/И, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/И 050(360)-01-4461-1 25.03.2024 24.03.2034	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Трипсы, цикадки, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Сельскохозяйственные культуры с участков, где проводилась обработка против саранчовых, могут быть использованы для пищевых целей только по результатам аналитических исследований	-(1)	-(3)	
	0,1	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)	-(3)	

	0,1-0,15	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)	-(3)	
Альтерр, КЭ (100 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 Ш/Л 192-01-2333-1 25.07.2019 24.07.2029	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	Активен
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод в сезоны обработки дикой растительности не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс (семена, масло), горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
АлтАльф, КЭ (100 г/л) ООО «Резерв» ОГРН: 1082224012738 Ш/Л 130-01-3479-1 19.01.2022 18.01.2032	0,1	Свекла сахарная и кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Рапс озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, блошки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Альфа метрин, КЭ (100 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 Ш/Л 653-01-3756-1 15.07.2022 14.07.2032	0,1	Свекла кормовая и сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	35(2)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	28(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации	36(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации	28(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница озимая	Блошки, трипсы, цикадки, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	28(2)	-(3)	
Альфацин, КЭ (100 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 Ш/Л, ООО ХИМСНАБ	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	-(3)	Активен
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	

ОГРН: 1072312011617 Ш/Л 682(913)-01-4415-1 06.03.2024 24.03.2032	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	35(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	-(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая пложорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	27(1)	-(3)	
	3 мл/10 л (Л)	Яблоня	Яблонная пложорка, листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	54(2)	3(-)	
	0,1	Свекла кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(3)	
	0,3	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 21 дня после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень яровой и озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	-(3)	
Альфатек, КЭ (100 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 Ш/Л 070-01-3367-1 16.11.2021 15.11.2031	1 мл/100 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м²	14(1)	3(-)	Активен
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая пложорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Сельскохозяйственные культуры с участков, где проводилась обработка против саранчовых, могут быть использованы для пищевых целей только по результатам аналитических исследований, подтверждающих содержание в них альфа-циперметрина в концентрациях, не превышающих установленных	-(1)	-(3)	

	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень яровой и озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Аккорд, КЭ (100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 ПП/Л 082-01-2856-1 10.11.2020 09.11.2030	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	1 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л на 100м2	20(1)	3(-)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс (на зерно, на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Ньюстар Экстра, КЭ (100 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - ПП/Л 064-01-4175-1 14.08.2023 13.08.2033	0,1-0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
Острог, МК (100 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 ПП/Л, ООО «Франдеса» ОГРН: - ПП/Л 590(297)-01-2509-1 30.12.2019 29.12.2029	0,1-0,15	Рапс яровой (семена и масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Фаскорд, КЭ (100 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/Л 018-01-1841-1 22.03.2018 21.03.2028	0,1-0,15	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	

0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
0,15-0,2	Кукуруза	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первой волны вредителей, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1-2)	-(3)
0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,15	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,15	Лен масличный	Льняной трипс, льняная плодоярка, совка-гамма, люцерновая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	35(1)	-(3)
0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,15	Лен масличный	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	35(1)	-(3)
0,1	Свекла сахарная, кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)
0,1	Горох овощной, горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)
0,1-0,15	Лен - долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)
0,1-0,15	Лен - долгунец	Льняной трипс, льняная плодоярка, совка-гамма, люцерновая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
0,2-0,25	Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка, многоядные совки, тли	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первой волны вредителей, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1-2)	-(3)
0,1-0,15	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	7(3)
0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,24-0,36	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	30(2)	7(3)
0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)

	0,1	Ячень яровой и озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
Цепеллин, КЭ (100 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Л 178-01-2217-1 07.05.2019 178-01-2217-1/431 431 06.05.2029	0,15-0,25	Кукуруза	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Лен	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Подсолнеч ник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	6 мл/м2	Древесина хвойных и лиственны х пород	Стволовые и технические насекомые- вредители: жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые	Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях. Норма расхода на 1 м2поверхности штабеля Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	1(-)	
	0,1-0,15	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Злаковые тли, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Айвенго, КЭ (100 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/Л, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/Л 004(549)-01-5003-1 01.10.2020 30.09.2030	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый (зерно, масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	

	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Фатрин, КЭ (100 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Л 085-01-3001-1 03.02.2021 02.02.2031	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый, горчица (в том числе на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, трипсы, цикадки, тля, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,25	Подсолнечник	Долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1	Ячмень яровой и озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, в том числе стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Кукуруза	Луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	20(1)	-(3)	
Фасшанс, КЭ (100 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-4546-1 03.05.2024 126-01-4546-1/495 495 02.05.2034	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, многоядная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	3(3)	Активен
	0,1-0,15	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Злаковые мухи, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(3)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(3)	
	0,1-0,15	Капуста белокочанная	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)	3(3)	
	0,1-0,15	Овес яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	10(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	

	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,1-0,15	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,15-0,25	Виноград	Гроздевая листовёртка, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(2)	3(3)	
	0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(3)	
	0,1-0,15	Лен масличный	Льняные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	3(3)	
Армин, КЭ (100 г/л) Батор Агри Кфт. ОГРН: - П/Л 606-01-3745-1 15.12.2014 14.12.2024	0,15	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(3)	Не активен
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	10(3)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,1	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,1-0,15	Рапс (семена, масло), горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
Альфабел, КЭ (100 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/Л 277-01-570-1 25.02.2015 24.02.2025	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Не активен
	0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	

	0,1-0,15	Рапс яровой (семена, масло), горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Альфаплан, КС (200 г/л) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - ПП/Л, Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - ПП/Л 322-01-4716-1 16.04.2015 15.04.2025	0,05	Пшеница	Блошки, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,05	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	
	0,05	Пшеница	Блошки, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,05-0,075	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,05	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	
	0,05-0,075	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	
	0,035-0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,035-0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	
	0,05-0,075	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	45(2)	-(3)	

	0,05-0,075	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	45(2)	-(3)	
	0,05	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,05	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,05-0,075	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Ринг Экстра, КС (200 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - Ш/Л 062-01-4212-1 27.09.2023 26.09.2033	0,05-0,075	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка блошки, тли, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Активен
Цезарь, КЭ (100 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 Ш/Л, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 Ш/Л 023(197)-01-2223-1 13.05.2019 12.05.2029	0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Блошки, тли, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Фитонемус, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание по вегетации в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	45(1)	-(3)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Альфа-циперметрин + Имидаклоприд + Клотиаиндин							
Борей Нео, СК	0,1-0,2	Горох	Клубеньковыедолгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	7(3)	Активен

(125 г/л + 100 г/л + 50 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 -/- 021-01-1738-1 21.04.2015 021-01-1738-1/259 20.04.2025	0,1-0,2	Нут	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	7(3)
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой клоп, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	7(3)
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Луговой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
	0,1-0,2	Лиственные породы деревьев	Листогрызущие и сосущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	7(3)
	0,1-0,2	Яблоня	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(2)	7(3)
	0,1-0,2	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	20(2)	7(3)
	0,1-0,2	Нут	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	7(3)
	0,1-0,2	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	20(2)	7(3)
	0,1-0,2	Люпин	Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)
	0,1-0,2	Хвойные породы деревьев	Хвоегрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	7(3)
	0,1-0,2	Яблоня	Калифорнийская щитовка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(2)	7(3)
	0,1-0,2	Лиственные породы деревьев	Листогрызущие и сосущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	7(3)
	0,1-0,15	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	7(3)
	0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок мввозможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней; сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	7(3)
	0,1-0,2	Хвойные породы деревьев	Хвоегрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	7(3)
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
	0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок мввозможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней; сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)

0,1-0,2	Капуста	Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,2	Нут	Акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)
0,1-0,2	Кукуруза	Злаковые мухи, тли, коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	7(3)
0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед, семенной рапсовый скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)
0,1-0,2	Соя	Тли, акациевая (бобовая) огневка, хлопковая совка, соевая плодожорка, луговой мотылек, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(2)	7(3)
0,1-0,2	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,2	Персик	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	14(2)	7(3)
0,1-0,2	Соя	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	48(2)	7(3)
0,1- 0,15	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,2	Пшеница	Вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пядицы, злаковые мухи, трипсы	Авиационное опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(1-2)	-(3)
0,1-0,2	Овес	Злаковые мухи, пядицы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,2	Томат открытого грунта	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,2	Подсолнечник	Долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(1)	7(3)
0,1-0,2	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	7(3)
0,1-0,2	Груша	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,2	Ячмень	Тли, пядицы, злаковые мухи, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пядицы, злаковые мухи, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,2	Люцерна	Люцерновый долгоносик, люцерновый клоп, люцерновая огневка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)
0,1-0,2	Пшеница	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)

Альфа-циперметрин + Клотиадин + Имидаклоприд

Пиноцид, СК (125 г/л + 50 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-1899-1 28.04.2018 27.04.2028	2 мл/10 л воды (Л)	Хвойные декоративн ые растения	Хермесы, тли, щитовки, ложнощитовки, мучнистые червецы, пилильщики, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дереву	-(1)	3(-)	Активен
	2 мл/10 л воды (Л)	Хвойные декоративн ые растения	Хермесы, тли, щитовки, ложнощитовки, мучнистые червецы, пилильщики, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,5 л/куст	-(1)	3(-)	

альфа-циперметрин + Бифентрин + Тиаметоксам

Беретта, МД (30 г/л + 60 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Л 018-01-2828-1 08.10.2020 018-01-2828-1/410 410 07.10.2030	0,4	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	3(3)	Активен
	0,3	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	3(3)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	3(3)	
	5 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 4-5 л/100 м2	30(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, капустная моль, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Свекла сахарная	Свекловичные минирующие мухи, луговой мотылек, тли, свекловичный долгоносик-стеблелеед, паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,4	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	3(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)	3(3)	
0,3-0,4	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)		

альфа-циперметрин + Имидаклоприд

Имидж Плюс, КЭ (75 г/л + 150 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Л, Левей Маркетинг Актиенгезелльшафт ОГРН: - П/Л 184(040)-01-1478-1 24.04.2017 23.04.2027	0,08-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница, ячмень	Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,05-0,1	Пастбища, дикая растительн ость, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые	Опрыскивание в период отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадах не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	

Эсперо, КС (120 г/л + 200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/П 018-01-864-1 16.10.2015 018-01-864-1/128 128 15.10.2025	1 мл/10 л воды	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик, рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву	-(1)	3(-)	Активен
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, скрытнохоботник рапсовый семенной, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	34(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	21(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, скрытнохоботник рапсовый семенной, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	34(2)	-(3)	
	0,15 - 0,20	Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек, хлопковая совка, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Подсолнеч ник	Хлопковая совка, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	31(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Подсолнеч ник	Хлопковая совка, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	31(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	34(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница, ячмень	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1	Ячмень	Злаковые тли, трипсы, злаковые мухи, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Кукуруза	Коричнево-мраморны й клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Соя	Хлопковая совка, соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Подсолнеч ник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	31(2)	-(3)	

0,15-0,2	Соя	Хлопковая совка, соевая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)
0,1-0,15	Горох	Гороховая зерновка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	-(3)
0,1-0,2	Нут	Хлопковая совка, нутовый минер, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	-(3)
0,1-0,15	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)
0,1	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	-(3)
0,05-0,07	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	-(3)
0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	21(2)	-(3)
0,1-0,15	Горох	Гороховая зерновка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	14(2)	-(3)
0,1 - 0,15	Кукуруза	Луговой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)
0,15 - 0,20	Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек, хлопковая совка, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)
0,1-0,2	Кукуруза	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)
0,1 - 0,15	Кукуруза	Луговой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)
0,05-0,07	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(3)
0,15-0,2	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	34(2)	-(3)
0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(2)	-(3)
0,1-0,15	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)

0,1	Ячмень	Злаковые тли, трипсы, злаковые мухи, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	34(2)	-(3)
0,15-0,2	Горох	Гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	-(3)
0,1-0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	31(2)	-(3)
0,05-0,07	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(2)	-(3)
0,15-0,2	Горох	Гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	14(2)	-(3)
0,07	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание в период развития гусениц, личинок и имаго с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Ширина эффективного захвата – 140-480 м Расход рабочей жидкости -	-(1)	-(3)
1 мл/10 л воды	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	-(2)	3(-)
0,05-0,07	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)
0,07	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Ширина эффективного захвата – 140-480 м Расход рабочей жидкости - 1-3 л/га	-(1)	-(3)

альфа-циперметрин + Тиаметоксам

Питомец, КС (150 г/л + 150 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 Ш/Л 010-01-2824-1 06.10.2020 05.10.2030	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	Активен
	0,1-0,15	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	20(2)	3(3)	
	0,1-0,15	Ячмень озимый и яровой	Внутривеблевые злаковые мухи, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
Тяльф, КС (100 г/л + 200 г/л) ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» ОГРН: 1152312010740 Ш/Л 661-01-4054-1 30.03.2023 29.03.2033	0,07-0,12	Рапс яровой и озимый	Капустная моль, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,07-0,12	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, внутривеблевые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,07-0,12	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка. Хлебные жуки, внутривеблевые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	

Алюминия фосфид

ФлагАгро, ТАБ (560 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 506774638150 Л/- 197-01-2397-1 01.10.2019 30.09.2029	6 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна – выше 15 °С. Погружение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция – до 3 суток. Дегазация зерна после разгрузки – не менее 8 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м3 для насекомых образующих	-(1)	-(-)	Активен
	2,4-6 г/м3	Зерно злаковых культур, соя-бобы, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах, а также в иностранных судах в части их	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна – выше 15 °С с использованием технологии рециркуляции газовой воздушной смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при нормальном расходе	-(1)	-(-)	
	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре: воздуха выше 15 °С. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция – 5 суток, дегазация – не менее 2 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МЛВ	-(1)	-(-)	

	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 10 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна и 25 г·ч/м3	-(1)	-(-)	
Алфос, ТАБ (560 г/кг) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 I/- 424-01-4618-1 18.06.2024 17.06.2034	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в силосах элеваторов (партии массой не более 200 т, насыпью до 2,5 м) и затаренное в мешки под пл	Насекомые вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре зерна выше 15°С. В элеваторах - введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. Под пленкой - раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ - 25 г·ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен
	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции ПКЭ - 25 г·ч/м3. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	-(1)	-(-)	
Квикфос, ТАБ (560 г/кг) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 I/- 148-01-4354-1 10.01.2024 09.01.2034	6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10 °С, внутри помещения в пределах от выше 15 °С до 25 °С. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция 2-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(1)	-(-)	Активен
	5 г/м3	Сухие овощи и фрукты в складах или под пленкой	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, продукта - выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ – 7 г·ч/м3 для насекомых и 450 г·ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 1 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	

6 г/м3	Древесина под пленкой или в других герметичных емкостях	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложках равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ не менее 25 г·ч/м3. Дегазация не менее суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука, крупа в складах или под пленкой	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, продукта - выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности, и 450 г·ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 2 суток	-(1)	-(-)
2,4-6 г/м3	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна - выше 15°С с использованием технологии рециркуляции газовой смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при норме расхода	-(1)	-(-)
6 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов в пути следования с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и зерна выше 15 °С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция 3 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна и 450 г·ч/м3 для хлебных	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе через каждый грузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна и 450	-(1)	-(-)

	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10 °С, внутри помещения в пределах от выше 15 °С до 25 °С. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция 2-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное и семена бобовых и масличных культур насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренные в мешки	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна - выше 15 °С. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ – 7	-(1)	-(-)	
Катфос, ТАБ (560 г/кг) ООО «Русинвест» ОГРН: 1057746502604 I/- 092-01-2136-1 04.03.2019 03.03.2029	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ – 25 г·ч/м3. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м3. Дегазация не менее 11 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция – 10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация не менее 11 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	

6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для муки и 25 г·ч/м3 для крупы. Дегазация не менее 2 сут. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция – 2 суток. Дегазация – 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 2 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для муки и 25 г·ч/м3 для крупы. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция – 2 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

Фоском,
ТАБ
(560 г/кг)
ООО «Русинвест»
ОГРН: 1057746502604
И/
092-01-2137-1
04.03.2019
03.03.2029

Активен

	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция –2 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ –450 г·ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция –10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация – не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция –5 суток. ПКЭ – 25 г·ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
Фостоксин, ТАБ (560 г/кг) Детиа Дегеш ГмбХ ОГРН: - I/- 057-01-1999-1 25.09.2018 24.09.2028	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в силосах элеваторов (партии массой не более 200 т, насыпью до 2,5 м) и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°С . В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. Под пленкой – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ – 25 г·ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен
Фумфайтер, ТАБ (560 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 I/- 002-01-2959-1 24.12.2020 23.12.2030	2,4-6 г/м3	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°С, зерна – выше 15°С с использованием технологии рециркуляции газовой смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при норм. расхода	-(-)	-(-)	Активен

	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°C до 25°C. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция – 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г·ч/м3 для насекомых не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(-)	-(-)	
	6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, внутри помещений - выше 15°C и не выше 25°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 2 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, и 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при	-(-)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна – выше 15°C. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в смеси с зерном в соотношении 1:4 в зерновую насыпь на глубину 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(-)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна – выше 15°C. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 5 суток для насекомых и 9 суток для клещей. ПКЭ - 7 г·ч/м3 для	-(-)	-(-)	
Фумифаст, ТАБ (560 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 -/- 178-01-1396-1 06.03.2017 178-01-1396-1/388 388 05.03.2027	6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ для муки 7 г·ч/м3, для крупы только с явной формой зараженности – 7 г·ч/м3, со скрытой формой зараженности - 25 г·ч/м3. Дегазация – не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПЛК	-(1)	-(-)	Активен

9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15 оС. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация зерна в вагоне перед загрузкой не менее 1 часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
0,8 г/м3	Смородина	Западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 4 г*ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
1,0 г/м3	Яблоки, слива, хурма, гранат	Восточная плодожорка, американская белая бабочка, многоядная муха-горбатка, западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 48 часов ПКЭ – 4 г*ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
0,8 г/м3	Персик, нектарин, абрикос, груша, айва, вишня	Восточная плодожорка, американская белая бабочка, многоядная муха-горбатка, западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 48 часов ПКЭ – 4 г*ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
1,0 г/м3	Томат, перец сладкий, картофель	Картофельная моль	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 48 часов ПКЭ – 4 г*ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
0,6 г/м3	Капуста	Западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 48 часов ПКЭ – 4 г*ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

2,4 г/м3	Зерно злаковых культур, тапиока и шроты в трюмах судов балкерного типа и танкерах	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция при использовании: технологии “фитозексплофумигация” – 16 суток; метода рециркуляции – не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м – не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна – не выше 50 мг/м3. Реализация при остатке фосфина – не выше МДУ	-(1)	-(-)
5 г/м3	Сухие овощи в складах или под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
0,4 г/м3	Голубика, клубника, малина, ежевика, крыжовник, черника, виноград	Западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 3 г·ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители и запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. ПКЭ – 25 г·ч/м3. Экспозиция – 5 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны – не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м3. Дегазация – не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2-3 суток. ПКЭ для муки 7 г·ч/м3 для крупы только с явной формой зараженности – 7 г·ч/м3, со скрытой формой зараженности – 25 г·ч/м3. Дегазация – не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

2,5 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 3 г*ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
1,0 г/м3	Апельсины, грейпфруты, мандарины, минеола	Средиземноморская муха	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 72 часов ПКЭ – 5 г*ч/м3. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 оС. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ – 25 г*ч/м3. Дегазация зерна в вагоне перед загрузкой не менее 1 часа. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха выше 15 0С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8-10 суток. Произведение концентрации на время экспозиции ПКЭ – 450 г*ч/м3. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – введение таблеток в насыпь зерна с помощью зондов. Затаренное в мешки – раскладка на подложки. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ 25 г*ч/м3. Дегазация – не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина – не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны – не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Сухие овощи в складах или под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ 7 г*ч/м3. Дегазация – не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – введение таблеток в насыпь зерна с помощью зондов. Затаренное в мешки – раскладка на подложках. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ – 450 г·ч/м ³ . Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе не выше ПЛК	-(1)	-(-)	
<p>Фумифос, ТАБ (560 г/кг) Рейнбоу Кропсайенсиз Кфт. ОГРН: - И/- 606-01-3747-1 03.03.2022 02.03.2032</p>	6 г/м ³	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10 °С, внутри помещения в пределах от выше 15 °С до 25 °С. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция – 2 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г·ч/м ³ для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м ³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Реализация при остатке	-(-)	-(-)	Активен
	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10 °С, внутри помещения в пределах от выше 15 °С до 25 °С. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция – 2 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г·ч/м ³ для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м ³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Реализация при остатке	-(-)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна – выше 15° С. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах – погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м ³ для насекомых, не образующих скрытую форму	-(-)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в металлических силосах, оборудованных системой рециркуляции газовой	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна – выше 15° С с использованием технологии рециркуляции газовой смеси через зерновую массу внутри силоса при полной его загрузке зерном. Раскладка таблеток в генератор фосфина, установленный за пределами силоса. Экспозиция 5 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м ³ для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м ³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(-)	-(-)	

<p>Фумишанс, ТАБ (560 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 I/- 126-01-1128-1 03.06.2016 02.06.2026</p>	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители и запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15° С. В складах - погружение таблеток в зерновую массу с помощью специальных зондов. В элеваторах – внесение таблеток в поток зерна с помощью автоматических дозаторов. Для затаренного зерна – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(1)	-(-)	Активен
	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители и запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15° С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и для для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПЛК	-(1)	-(-)	
<p>Дакфосал, ТАБ (570 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 I/- 018-01-1407-1 10.03.2017 018-01-1407-1/353 353 09.03.2027</p>	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция –5 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны – не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен
	6 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые –вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 оС, зерна – выше 15 оС. Погружение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма только после полной загрузки герметичных трюмов. После введения капсул крышки трюмов должны быть тщательно задраены. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 7 г×ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 оС, зерна – выше 15 оС. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в смеси с зерном в соотношении 1:4 в зерновую насыпь на глубину 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ – 7 г×ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г×ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму	-(1)	-(-)	

	2,4 г/м3	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их	Насекомые –вредители запасов кроме клещей	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 оС, зерна – выше 15 оС с использованием технологии рециркуляции газовой смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции – 5 суток. Экспозиция не менее 10 суток	-(1)	-(-)	
	6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые –вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 оС, внутри помещений – выше 15 оС и не выше 25 оС. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 7 г×ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, и 25 г×ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности. Дегазация не менее 2 суток. Реализация зерна после полной дегазации (но не ранее 10 суток) при остатке фосфина не выше МЛУ. В период дегазации	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов (партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м) и затаренное в меш	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция –5 суток для насекомых и 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 25 г·ч/м3 для насекомых и 450 г·ч/м3 для клещей. Дегазация – не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина – не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания, не ранее 11 дней после дегазации и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые и клещи – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 оС, продукта – выше 15 оС. Раскладка таблеток на подложки. Кспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. ПКЭ – 7 г×ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г×ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности и 450 г×ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 2 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МЛУ	-(1)	-(-)	
Альфин, ТАБ (560 г/кг) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 I/- 085-01-4163-1 20.07.2023 19.07.2033	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°С. Экспозиция 5 суток. ПКЭ-25 г*ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоне не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен

	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Экспозиция 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ)-7 г*ч/м3. Допуск людей и загрузка хранилищ после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоне не выше ПДК	-(1)	-(-)	
<p>Фумихелл, ТАБ (560 г/кг) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - И/- 064-01-4008-1 07.03.2023 06.03.2033</p>	6 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов в пути следования с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и зерна выше 15 °С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция до 5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м3. Проветривание в рейсе или на рейде перед разгрузкой не менее часа. Дегазация зерна после разгрузки не менее 8 суток. Реализация при остатке фосфина в зерне не выше МДУ. Допуск людей после полного	-(1)	-(-)	Активен
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное, затаренное в мешки под пленкой	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна – выше 15°C Раскладка таблеток на подложки под штабели зерна в мешках, укрытые пленкой. Экспозиция 5 суток для насекомых. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при	-(1)	-(-)	
	2,4-6 г/м3	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 °С, зерна – выше 15°C с использованием технологии рециркуляции газо-воздушной смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при норме расхода	-(1)	-(-)	

Алюминия фосфид + Алюминия фосфид

<p>Фосфин, ТАБ (560 г/кг + 560 г/кг) ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 И/-, ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 И/- 004-01-5022-1 18.12.2014 22.01.2035</p>	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в металлических силосах, оборудованных системой рециркуляции газовойдушной	Насекомые и клещи - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C с использованием технологии рециркуляции газовойдушной смеси через зерновую массу внутри силоса при полной его загрузке зерном. Раскладка таблеток в генератор фосфина, установленный за пределами силоса. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых не образующих	-(1)	-(-)	Активен
---	-------	--	---------------------------------------	--	------	------	---------

6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые-вредители и запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция – 2 суток, дегазация – не менее 2 суток. Производственные концентрации на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г*ч/м3. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/т	Зерно в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах. Экспозиция до 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 25 г*ч/м3. Дегазация в рейсе и на рейде. Допуск людей к работе с зерном после тщательного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Реализация зерна при	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука, крупа в складах или под пленкой	Насекомые и клещи - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, продукта - выше 15°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности, и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 2 суток	-(1)	-(-)
6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые - вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°C до 25 °С. Экспозиция 2 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3. Дегазация - не менее суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Сухие овощи в складах или под пленкой	Насекомые и клещи - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, продукта - выше 15°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 5 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в	-(1)	-(-)

9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренное в меш	Насекомые и клещи - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в смеси с зерном в соотношении 1:4 в зерновую насыпь на глубину 2 м через каждый грузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Производство концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна 25 г*ч/м3	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренное в меш	Насекомые и клещи - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C. В элеваторах - введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах - погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой - раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и 9 суток для клещей. Производство концентрации на время	-(1)	-(-)
5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители и запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °C. Экспозиция –5 суток. Производственная концентрация на время экспозиции (ПКЭ) – 25 г.ч/м3. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые и клещи - вредители запасов	Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°C до 25°C. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция - 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Производство концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов (партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м) и затаренное в меш	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продуктов выше 15 °C. Экспозиция 5 суток. ПКЭ – 5 г·ч/ м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после завершения дегазации, не ранее 10 суток и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше не выше ПДК	-(1)	-(-)

2,4-6 г/м3	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их	Насекомые - вредители запасов	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C с использованием технологии рециркуляции газовой смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при нормальном расходе	-(1)	-(-)
2,4 г/м3	Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и иностранных судах в части их	Насекомые-вредители и запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция при использовании: технологии «фитоксеплофумигации» – не менее 16 суток, метода рециркуляции – не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м – не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна – не выше 50 мг/м2. Реализация при остатке	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука, крупа в складах или под пленкой	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продуктов выше 15 °С. Экспозиция 5 суток. ПКЭ – 5 г·ч/ м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после завершения дегазации, не ранее 2 суток и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Древесина под пленкой или в других герметичных емкостях	Насекомые-вредители древесины	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Раскладка таблеток на подложках равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ не менее 25 г·ч/м3. Дегазация не менее суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

Ацетамиприд

Моспилан, РП (200 г/кг) Ниппон Сода Ко., Лтд ОГРН: - П/П 094-01-1159-1 18.07.2016 17.07.2026	0,15-0,2	Томат и огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	1(1)	3(3)	Активен
	0,5-0,7	Пшеница, ячмень	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,25/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	14(1)	3(-)	
	0,05-0,075	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	3(3)	
	0,025-0,04	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	14(1)	3(-)	

	0,06-0,08	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (дикая растительность) – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 3 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)	
	0,1-0,125	Картофель	Картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	3(3)	
	0,15-0,175	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/	28(1)	3(3)	
	0,025-0,04	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	3(3)	
Снейк, РП (200 г/кг) Агрия АД ОГРН: - III/III, ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III 184(026)-01-4422-0 20.02.2024 19.02.2027	0,15-0,2	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(1)	1(1)	Активен
	0,05-0,075	Пшеница яровая, озимая	Клоп вредная черепашка	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(1)	
	0,025-0,03	Картофель	Колорадский жук	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)	-(3)	
Газель, РП (200 г/кг) НиппонСодаКо., Лтд ОГРН: - -/- 126-01-4547-1 03.05.2024 02.05.2034	0,08-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
Альфа-Амиприд, РП (200 г/кг) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - III/III 062-01-324-1 15.04.2014 14.04.2024	0,075-0,15	Рапс	Стеблевой капустный скрытнохоботник, клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	Не активен
Медоуз, МД (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-01-4170-1 21.08.2023 20.08.2033	0,15-0,3	Виноград	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,03% Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	21(1)	3(3)	Активен
	0,18-0,24	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,03% Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	15(1)	3(3)	
	3,0 мл/10 л воды	Виноград	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	21(1)	3(3)	
	0,05 - 0,075	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, цикадки, зерновые совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
	0,075-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(1)	3(3)	

	0,075-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	3(3)	
	3,0 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-2 л/дерево	15(1)	3(3)	
	0,05 - 0,075	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	30(1)	3(3)	
	0,05 - 0,075	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 -200 л/га	30(1)	3(3)	
	0,18-0,36	Яблоня	Яблонная плодоярка, тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,03% Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	15(1)	3(3)	
	3,0 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонная плодоярка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	15(1)	3(3)	
	0,05 - 0,075	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 -400 л/га	30(1)	3(3)	
	0,1-0,25	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	3(3)	
Стожар, РП (20 г/кг) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 П/П 008-01-673-1 02.06.2015 01.06.2025	40 г/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/дерево (в зависимости от сорта и возраста дерева)	14(1)	3(-)	Активен
	2,5-4 г /5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	14(1)	3(-)	
Индоальф, РП (200 г/кг) ООО Грин Планта ОГРН: 1175029028790 П/П, ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 617(082)-01-4564-1 22.05.2024 21.05.2034	0,05-0,07	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,04	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)	-(3)	
	0,15-0,17	Пшеница озимая	Хлебная жуелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
Агент Пауер, МКС (320 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/П 192-01-4742-1 03.12.2024 02.12.2034	0,4-0,6 л/т	Зерновые колосовые озимые, яровые, за исключени ем овса	Хлебная жуелица, злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница озимая	Хлебная жуелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,03	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(1)	-(3)	
	0,05-0,1	Рапс	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Ацетамиприд + альфа-циперметрин							
Эсперо Евро, МД (100 г/л + 60 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим»	0,2-0,3	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	14(2)	-(3)	Активен

ОГРН: 1025006519427 П/Л 018-01-3296-1 17.09.2021 16.09.2031	0,4-0,5	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	-(3)	
---	---------	--------------------	-------------------------------------	---	-------	------	--

Ацетамиприд + Клотианидин + лямбда-цигалотрин

Декстер Турбо, СЭ (115 г/л + 70 г/л + 106 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Л 178-01-3897-1 02.12.2022 01.12.2032	0,1 - 0,2	Ячмень яровой и озимый	Злаковые тли, хлебные жуки, трипсы, пядьницы, злаковые мухи, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,1 - 0,2	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1 - 0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, трипсы, пядьницы, злаковые мухи, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1 - 0,2	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	40(2)	-(3)	

Ацетамиприд + Фипронил

Агент Супер, СК (200 г/л + 100 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/Л/- 192-01-3892-1 01.12.2022 30.11.2032	1,0	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключени ем овса	Хлебная жужелица, проволочники, злаковые мухи, хлебные блошки, тли	Обработка семян с увлажнением непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,5	Картофель	Колорадский жук, проволочники	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 80 - 120 л/га	-(1)	-(3)	
	5,0-7,0	Кукуруза на зерно и масло	Проволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(3)	
Фендрик, КС (400 г/л + 100 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Л 010-01-4055-1 30.03.2023 29.03.2033	0,4-0,6	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней одновременно с посадкой Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	3(3)	Активен
	0,05-0,15	Зерновые колосовые яровые и озимые (за исключени ем овса)	Тли, трипсы, пядьницы, пилильщики, хлебные жуки, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Соя	Подгрызающие совки, долгоносики	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(3)	
	6,0-8,0	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	3(3)	
	0,5-0,8	Зерновые колосовые яровые и озимые (за исключени ем овса)	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(3)	

Ацетамиприд + Флудиоксонил + Ципроконазол

Кинг Комби, КС (100 г/л + 34 г/л + 8,3 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Л/- 178-01-2614-1 19.03.2020 18.03.2030	1,2-1,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(3)	Активен
	1,2-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(3)	
	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до или во время посадки (до посадки) Расход рабочей жидкости - 10 л/т клубней	-(1)	-(3)	

	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до или во время посадки (до посадки) Расход рабочей жидкости - 25 л/т клубней	-(1)	-(-)	
--	-----	-----------	------------------------------------	--	------	------	--

ацетамиприда + лямбда-цигалотрин

Декстер, КС (115 г/л + 106 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/И 178-01-2201-1 12.04.2019 11.04.2029	0,15	Свёкла сахарная	Свекловичные долгоносики, блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,15	Свёкла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,25	Морковь	Морковная листоблошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,25	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, стеблевые пилильщики, тли, трипсы, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1	Капуста белокочанная	Капустная совка, капустная моль, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Лук (кроме лука на перо)	Трипсы, луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, трипсы, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,08	Рапс	Рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	49(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,1-0,14	Рапс	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	49(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук, тли-переносчики вирусов	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	-(3)	
	0,1	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,08	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	49(2)	-(3)	

бета-цифлутрин + Клотиаиндин

Модесто, КС (80 г/л + 400 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/И 019-01-2794-1 11.09.2020 10.09.2030	12,5-25,0	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян. Разрешается обработка семян препаратом на территории Российской Федерации Расход рабочей жидкости - 35 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	-----------	------	----------------------	--	------	------	---------

Пончо Бета, КС (53 г/л + 400 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/- 019-01-2817-1 13.10.2020 12.10.2030	25,0-50,0	Свекла сахарная	Вредители всходов: свекловичные блошки и долгоносики	Обработка семян. Разрешается обработка семян препаратом на территории Российской Федерации Расход рабочей жидкости - 35-60 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	-----------	--------------------	---	---	------	------	---------

Бифентрин

Вулкан, ТНС, ТПС (200 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/-, ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/- 050-01-4250-1 13.11.2023 12.11.2033	2-2,5	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян за 14 дней и более дней до посева. Расход рабочей жидкости - до 12,5 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2	Подсолнеч ник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян за 14 дней и более дней до посева Расход рабочей жидкости - 12,5 л/т	-(1)	-(-)	
Клипер, КЭ (100 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/Л 050-01-3833-1 21.10.2022 20.10.2032	0,2-0,3	Соя	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	1(3)	Активен
	0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	1(3)	
	2-3 мл/100 м2 поверхн ости коры	Хвойные и лиственны е лесообразу ющие породы, в том числе пихта, кедр, сосна	Стволовые вредители, в том числе короед-типограф, шестизубчатый короед и уссурийский полиграф	Опрыскивание в период вегетации и лёта взрослых особей Расход рабочей жидкости - 2 л/100м2	-(1)	1(3)	
	2-3 мл/100 м2 поверхнос ти штабеля	Заготовлен ная древесина в штабелях	Стволовые и технические вредители, в том числе короед-типограф, шестизубчатый короед и уссурийский полиграф	Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях в период лёта взрослых особей стволовых вредителей Расход рабочей жидкости - 2 л/100м2	-(2)	1(3)	
Семафор, ТПС (200 г/л) ФМС Кемикал ОГРН: - III/- 051-01-2151-1 06.03.2019 05.03.2029	2	Подсолнеч ник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2-2,5	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян за 14 и более дней до посева Расход рабочей жидкости - 12,5 л/т	-(1)	-(-)	

Бифентрин + Имидаклоприд

Кофенрин Плюс, КС (50 г/л + 250 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/Л 699-01-4707-1 05.11.2024 04.11.2034	0,2-0,3	Картофель	Тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	-(3)	Активен
	0,15-0,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	-(3)	

Бифентрин + Хлорпирифос

Пирелли, КЭ (20 г/л + 400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/И 018-01-2801-1 16.09.2020 018-01-2801-1/389 389 15.09.2030	0,5	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Соя	Хлопковая совка, луговой мотылек, акациевая (бобовая) огневка, паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5	Свекла сахарная	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Свекла сахарная	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
Пиринекс Супер, КЭ (20 г/л + 400 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/И 156-01-3984-1 15.02.2023 14.02.2033	0,8-1,0	Свекла сахарная	Долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	37(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	37(1)	-(3)	
	0,5	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Свекла сахарная	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)	
	0,5	Рапс озимый и яровой	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	

бифентрина + Метомил

Метомакс, КС (25 г/л + 250 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/И, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/И 050(360)-01-2978-1 15.01.2021 050(360)-01-2978-1/468 468 14.01.2031	1-1,2	Подсолнеч ник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(1)	3(3)	Активен
	1,0-1,2	Мандарин	Коричнево-мраморны й клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	20(4)	3(3)	
	1,0-1,2	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	3(3)	
	1,0-1,2	Соя	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	3(3)	
	1,0-1,2	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	28(3)	3(3)	
	1,0-1,2	Фундук	Коричнево-мраморны й клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	60(2)	3(3)	
	1-1,2	Соя	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, гороховая зерновка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(2)	3(3)	

1,0-1,2	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	3(3)	
1,0-1,2	Горох, нут	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, гороховая зерновка, тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(2)	3(3)	
1-1,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, клещи, клопы, в т.ч. мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	15(2)	3(3)	

Бупрофезин

Апплауд, СП (250 г/кг) Ничино Юроп Ко. Лтд. ОГРН: - III/III 782-01-3477-1 25.01.2022 24.01.2032	0,5	Томат и огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	3(-)	Активен
--	-----	-----------------------------------	----------------------	---	------	------	---------

Вазелиновое масло

Профилактин Лайт, ВЭ (658 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-01-2322-1 24.07.2019 23.07.2029	0,5 л/10 л воды (Л)	Декоративные кустарники	Зимующие стадии вредителей: щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +40С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 0,5 - 1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	-(1)	3(-)	Активен
	0,5 л/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Зимующие стадии вредителей: щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, листоверток, молей	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +40С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л /дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Виноград	Зимующие стадии вредителей: щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +40С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 0,5 - 1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	-(1)	3(-)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Крыжовник	Зимующие стадии вредителей: щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +40С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 0,5 - 1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	-(1)	3(-)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Смородина	Зимующие стадии вредителей: щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +40С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 0,5 - 1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	-(1)	3(-)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Вишня, черешня, слива, алыча	Зимующие стадии вредителей: щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +40С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л /дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)	

Препарат 30 Плюс, ММЭ (760 г/кг) ООО НПФ «Собер» ОГРН: - III/III 089-01-2641-1 06.04.2020 05.04.2030	0,5 л/10 л воды (Л)	Крыжовни к, малина, смородина	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С Расход рабочей жидкости - 2 л/куст	-(1)	2(1)	Активен
	0,5 л/10 л воды (Л)	Цитрусовы е культуры	Щитовки, ложнощитовки, клещи, белокрылка, червецы	Опрыскивание в период относительного покоя культуры при температуре не ниже +4 °С Расход рабочей жидкости - 4-10 л/дерево	-(1)	2(1)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва, слива, вишня, черешня	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	-(1)	2(1)	
	12-37	Виноград	Зимующие стадии ложнощитовок, клещей, тлей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(1)	-(3)	
	40-100	Яблоня, груша, слива, вишня	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Виноград	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной Расход рабочей жидкости - 2-5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	-(1)	2(1)	
	0,5 л/10 л воды (Л)	Декоратив ные культуры	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, червецов	Опрыскивание – первое весной до распускания почек, при температуре не ниже +4 °С, второе – летом при появлении вредителей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	2(1)	
	40-100	Крыжовни к, малина, смородина	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(1)	-(3)	
	20-50	Декоратив ные культуры	Щитовки	Опрыскивание – первое весной до распускания почек, второе – летом при появлении вредителей Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(2)	-(3)	
	40-100	Декоратив ные культуры	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, молей, червецов	Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	-(1)	-(3)	
	20-50	Цитрусовы е	Щитовки, ложнощитовки, клещи, белокрылка, червецы	Опрыскивание в период относительного покоя культуры при температуре не ниже +4 °С с концентрацией рабочего раствора 3-4% Расход рабочей жидкости - 2000-4000 л/га	-(1)	-(3)	

Вазелиновое масло + Матрин

Профилектин Био, ВЭ (658 г/л + 2,2 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-01-2703-1	0,5 л/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяниц, листоверток, молей	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)	Активен
---	------------------------	---------------------------	---	--	------	------	---------

18.06.2020 17.06.2030	0,5 л/10 л воды (Л)	Крыжовни к	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C (в зависимости от возраста и типа формировки куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)
	0,5 л/10 л воды (Л)	Вишня, черешня, слива, алыча	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C (в зависимости от возраста и типа формировки куста) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)
	0,5 л/10 л воды (Л)	Декоратив ные кустарник и	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C (в зависимости от возраста и типа формировки куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)
	0,5 л/10 л воды (Л)	Виноград	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C (в зависимости от возраста и типа формировки куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)
	0,5 л/10 л воды (Л)	Вишня, черешня, слива, алыча	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)
	0,5 л/10 л воды (Л)	Смородин а	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C (в зависимости от возраста и типа формировки куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)

Вирус гранулеза яблонной плодожорки

Карповирусин, СК (11013 гранул/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - IV/III 201-01-1488-1 02.05.2017 01.05.2027	1 л/га	Персик, нектарин	Восточная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-1000 л/га	-(6)	-(-)	Активен
	10 мл/10 л воды (Л)	Персик, нектарин	Восточная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и сорта) Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	-(6)	-(-)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и сорта) Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	-(6)	-(-)	
	1 л/га	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-1000 л/га	-(6)	-(-)	

Вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки

Хеликовекс, СК (7,5×10 ¹² полиэдров/л) Андерматт Биоконтрол АГ	0,2	Кукуруза, томат, перец, баклажан открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(-)	Активен
---	-----	--	-----------------	---	------	------	---------

ОГРН: - IV/III 160-01-743-1 04.08.2015 03.08.2025	2 мл/100 м2 (Л)	Томат, перец, баклажан открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(3)	-(3)	
---	--------------------	---	-----------------	--	------	------	--

Гамма-цигалотрин

Вантекс, МКС (60 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/L 058-01-2702-1 09.06.2020 08.06.2030	0,04-0,06	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	47(1)	-(3)	Активен
	0,06-0,07	Ячмень яровой	Злаковые мухи, трипсы, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	22(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Кукуруза	Хлопковая совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	56(1)	-(3)	
	0,05-0,07	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)	-(3)	
	0,05-0,08	Морковь	Морковная листоблошка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,06-0,08	Пастбища, участки, заселенны е саранчовы ми, дикая растительн ость	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок младших возрастов. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	47(1)	-(3)	
	0,04-0,06	Рапс яровой и озимый	Тли, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	47(1)	-(3)	
	0,1-0,125	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,35	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовер тки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	47(1)	-(3)	
	0,04-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(1)	-(3)	
	0,06-0,07	Пшеница яровая	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	36(2)	-(3)	
	0,04-0,06	Лён масличный	Льняной трипс, льнаная плодoжорка, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	51(1)	-(3)	
	0,04-0,06	Горох (в том числе на зеленый горошек)	Гороховая зерновка, гороховая плодoжорка, гороховая тля, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	43(1)	-(3)	
	0,04-0,06	Лён- долгунец	Льняной трипс, льнаная плодoжорка, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Подсолнеч ник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	43(1)	-(3)	
	0,08-0,1	Лук	Табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	-(3)	
	0,06-0,07	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, тли, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	36(1)	-(3)	

0,04-0,06	Горох (в том числе на зеленый горошек)	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	43(1)	-(3)
0,04-0,06	Лён масличный	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	51(1)	-(3)
0,07-0,15	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)
0,04-0,06	Лён-долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)
0,04-0,06	Рапс яровой и озимый	Рапсовыйцветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	47(1)	-(3)
0,06-0,07	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, трипсы хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(1)	-(3)
0,07	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	22(1)	-(3)
0,15-0,2	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	-(3)
0,05-0,07	Свекла сахарная	Листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(1)	-(3)
0,12-0,16	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок старших возрастов. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	47(1)	-(3)
0,06-0,08	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок младших возрастов. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	47(1)	-(3)

Гамма-цигалотрин + Диметоат

Данадим Пауер, КЭ (6,4 г/л + 400 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/Л 058-01-418-1 02.10.2014 058-01-418-1/114 114 01.10.2024	0,3-0,6	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	Не активен
	0,3-0,6	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Ячмень	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Свекла сахарная	Свекловичная минирующая моль, минирующая муха, листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	

Гекситиазокс

Ниссоран, СК (250 г/л) Ниппон Сода Ко., Лтд ОГРН: - III/III 094-01-1333-1 19.01.2017 18.01.2027	0,1-0,2	Соя	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,25	Яблоня	Паутинный клещ и бурый плодовой клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	50(1)	-(3)	
	0,15-0,25	Виноград	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	47(1)	-(3)	

Дельтаметрин

Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/II 019-01-507-1 28.01.2015 019-01-507-1/253 253 27.01.2025	0,05-0,1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	7(3)	Не активен
	0,1-0,15	Лук	Трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	7(3)	
	0,05-0,125	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	30(2)	7(3)	
	0,05-0,075	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	7(3)	
	0,05-0,1	Подсолнеч ник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,05-0,075	Лен - долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)	
	0,125-0,15	Свекла сахарная	Долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(2)	7(3)	
	0,075	Виноград	Гроздевая листовертка: первое поколение	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	21(2)	7(3)	
	0,05-0,075	Лен долгунец, лен масличный (на техническ ие цели)	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)	
	0,05-0,075	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	
	0,125	Рапс	Рапсовый цветоед, клопы, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	55(2)	7(3)	
	0,125	Капуста	Капустная моль, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	7(3)	
	0,075-0,12 5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пядица, тли, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	7(3)	
	0,1-0,2	Кукуруза	Хлопковая совка, кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	7(3)	
	0,05-0,1	Соя	Акациевая огневка, луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,075	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	7(3)	

0,05-0,125	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	30(2)	7(3)
0,125	Рапс	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	55(2)	7(3)
0,175	Виноград	Гроздевая листовёртка: второе поколение	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	21(2)	7(3)
0,05-0,1	Клевер, люцерна	Долгоносики, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)
0,075	Пшеница	Зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	7(3)
0,05	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(2)	7(3)
0,05-0,075	Ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	7(3)
0,075-0,125	Горох	Гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	26(2)	7(3)
0,075-0,1	Томат открытого грунта	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)
0,05-0,075	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	7(3)
0,05-0,075	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(2)	7(3)
0,1-0,175	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)
0,05-0,075	Свекла сахарная	Свекловичные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(2)	7(3)
Орбита, КЭ (25 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Л 010-01-3109-1 23.04.2021 22.04.2031	0,075-0,1	Картофель	Колорадский жук, картофельная блошка, цикадки	20(2)	7(3)
	0,1	Пшеница озимая и яровая	Зерновые совки	38(2)	7(3)
	0,1-0,125	Пшеница озимая и яровая	Злаковые мухи, стеблевые пилильщики, северная стеблевая совка	38(2)	7(3)
	0,2-0,25	Капуста	Белянки, многоядные совки, блошки, капустный листоед, капустная огневка, тли, капустный скрытнохоботник, капустная моль, клопы	21(2)	7(3)

Активен

0,2-0,35	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод и сельхозпродукции в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)
0,1-0,125	Лен - долгунец	Льняные блошки, клопы, льняной долгоносик, льняной трипс, долгоножка вредная, луговой мотылек, льняная плодоярка, многоядные совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)
0,1	Ячмень озимый и яровой	Зерновые совки, тли, трипсы, пьявица, хлебные жуки, цикадки, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	7(3)
0,25-0,35	Виноград	Блошка виноградная, дымчатая почковая пяденица, гроздевая листовертка, двулетняя листовертка, скосарь турецкий, трипс виноградный, цикады, осы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)
0,15-0,2	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, пьявица, хлебные жуки, цикадки, хлебные блошки, остроголовый клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	7(3)
0,25-0,35	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодоярка, листовертки, тли, моли, яблонная метлица, пяденицы, пилильщик яблонный плодовой	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)
0,2-0,25	Свекла сахарная, кормовая	Долгоносики, щитовоски, клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,125	Люпин	Тли, клубеньковые долгоносики, многоядные совки, минёры	Опрыскивание в начале цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)
0,25-0,35	Груша	Боярышница, пяденицы, галлица грушевая, грушевый пилильщик, обыкновенная грушевая медяница, плодоярки, листовертки, тля, грушевый цветоед, яблоневый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)
0,075-0,1	Свекла сахарная, кормовая	Свекловичные блошки, луговой мотылёк, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,125	Ячмень озимый и яровой	Злаковые мухи, стеблевые пилильщики, северная стеблевая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	7(3)
0,15-0,2	Ячмень озимый и яровой	Клоп вредная черепашка, остроголовый клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	7(3)

К-Обиоль, КЭ (25 г/л) Байер САС ОГРН: - П/- 213-01-4704-1 05.11.2024 04.11.2034	0,4 мл/м2	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости - 200 мл/м2	-(1)	2(-)	Активен
	0,2-0,6 мл/м2	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий	Вредители запасов	Дезинсекция холодным туманом. Обработка с помощью генераторов холодного тумана. Экспозиция 24 часа. Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки	-(1)	2(-)	
	0,2 мл/м2	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки. Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2	-(1)	2(-)	
	10-20 мл/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное	Вредители запасов	Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Расход рабочей жидкости - 500 мл/т	40(1)	2(-)	

Дельтаметрин + Фенитротион

Орбита Люкс, КЭ (50 г/л + 400 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Л 010-01-2905-1 02.12.2020 01.12.2030	0,3-0,5	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)	Активен
	0,3-0,6	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	3(3)	
	0,2-0,5	Ячмень яровой и озимый	Тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,2-0,5	Пшеница яровая и озимая	Хлебные блошки, злаковые мухи	Опрыскивание в фазу всходов – кушение Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,2-0,5	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи	Опрыскивание в фазу всходов – кушение Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,4-0,6	Виноград	Гроздевая листовёртка, цикадки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	38(2)	3(3)	
	0,3-0,5	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)	
	0,2-0,5	Пшеница яровая и озимая	Тли, трипсы, цикадки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	

Диазинон

Баргузин, Г (100 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/- 002-01-2108-1 06.02.2019 05.02.2029	1 г/м2(Л)	Цветочные культуры	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	-(1)	10(-)	Активен
	150 г/100 м2(Л)	Картофель	Проволочники	Внесение в почву при посадке	40(1)	10(-)	
Почин, Г (50 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 III/- 012-01-2615-1 19.03.2020 18.03.2030	30 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Проволочники	Проволочники	-(1)	-(7)	Активен
	30 г/10 м2 (Л)	Картофель (кроме ранне- и среднеспелых сортов)	Проволочники	Внесение в почву при посадке	40(1)	-(7)	
	20 г/10 м2(Л)	Капуста	Капустные мухи, крестоцветные блошки	Внесение на поверхность почвы в районе корневой шейки с одновременной заделкой при высадке рассады	40(1)	-(7)	
	30 г/10 м2 (Л)	Участки, заселенные муравьями	Муравьи	Муравьи	-(1)	-(7)	
Провотокс, Г (40 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01-2700-1 08.06.2020 07.06.2030	40 г/10 м2 (Л)	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Проволочники	Проволочники	-(1)	7(-)	Активен
Гризли, Г (40 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01-2995-1 26.01.2021 25.01.2031	20 г/10 м2 (Л)	Земляника (после сбора урожая)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая	-(-)	7(-)	Активен
	20 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации	-(2)	7(-)	
	20 г/10 м2 (Л)	Капуста (кроме раннеспелых сортов)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см в период высадки рассады, при необходимости повторно через 10-14 дней	60(2)	7(-)	
	20 г/10 м2 (Л)	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Медведка	Внесение в почву при высадке клубней на глубину 2-5 см	60(1)	7(-)	
Валлар, Г (40 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01-2745-1 16.07.2020 15.07.2030	40-50 г/10 м2 (Л)	Сеянцы и саженцы хвойных и лиственных пород деревьев, плодовых и декоративных культур	Майские жуки, проволочники и ложнопроволочники	Поверхностное внесение препарата после высадки растений в грунт с последующей заделкой на глубину 5-10 см	-(2)	7(-)	Активен
Землин, Г (50 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/- 046-01-2938-1 18.12.2020 17.12.2030	30 г/10 м2 (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение в почву на глубину 3-5 см при высадке луковиц с одновременным рыхлением	60(1)	3(-)	Активен
	30 г/10 м2 (Л)	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Проволочники	Внесение в почву при посадке	60(1)	3(-)	
	30 г/10 м2 (Л)	Капуста (кроме раннеспелых сортов)	Капустные мухи	Внесение в почву на глубину 3-5 см при высадке рассады с одновременным рыхлением	60(1)	3(-)	
Мухоед, Г (40 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01-2606-1	50 г/10 м2(Л)	Лук (кроме лука на перо)	Луковая муха	Внесение на поверхность почвы при высадке луковиц с последующей заделкой путем рыхления почвы	60(1)	7(-)	Активен
	40 г/10 м2(Л)	Капуста (кроме раннеспелых сортов)	Капустные мухи	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады с последующей заделкой путем рыхления почвы	60(1)	7(-)	

17.03.2020 16.03.2030	2-3 г/м2(Л)	Цветочные растения (кроме горшечных)	Почвенные комарики, бороздчатый долгоносик	Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующей заделкой путем рыхления почвы	-(1)	7(-)	
Муравьин, Г (50 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 Ш/- 046-01-3040-1 03.03.2021 02.03.2031	30 г/10 м2	Картофель	Муравьи	Внесение в места скопления муравьев в период вегетации	60(1)	3(-)	Активен
	30 г/10 м2	Лук (кроме лука на перо), капуста (кроме раннеспелых сортов)	Муравьи	Внесение на грядки сразу после посева или высадки рассады в грунт	60(1)	3(-)	
	30 г/10 м2	Цветочные культуры	Муравьи	Внесение в места скопления муравьев в период вегетации	-(1)	3(-)	
Медветокс, Г (50 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 Ш/- 046-01-3041-1 03.03.2021 02.03.2031	20-30 г/ 10 м2 (Л)	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Медведка	Внесение в почву не глубину 3-5 см в период вегетации	60(1)	3(-)	Активен
	20-30 г/ 10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Медведка	Внесение в почву не глубину 3-5 см в период вегетации	-(2)	3(-)	
Гром, Г (30 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/- 012-01-760-1 24.08.2015 23.08.2025	30 г/ 10 м2 (Л)	Овощные, цветочные культуры, земляника, картофель	Медведка	Внесение в почву на глубину 3-5 см в период вегетации	-(1)	-(-)	Активен
Гром-2, Г (30 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/- 012-01-761-1 24.08.2015 23.08.2025	2-3 г/м2 (Л)	Горшечные цветочные растения	Почвенные мушки, грибные комарики	Внесение на поверхность почвы в горшке вокруг растений с последующей заделкой в почву	-(1)	1(-)	Активен
	20-30 г/10 м2 (Л)	Овощные, цветочные культуры, земляника, картофель, защищенный грунт, плодовые деревья, кустарники, около строений	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	-(1)	7(-)	
	2-3 г/м2 (Л)	Рассада овощных и цветочных культур	Почвенные мушки, грибные комарики	Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующей заделкой в почву	-(1)	1(-)	
Медвегон, Г (40 г/кг) ЗАО «НКФ РЭТ» ОГРН: - Ш/- 144-01-568-1 20.02.2015 19.02.2025	20 г/10 м2 (Л)	Земляника (после сбора урожая)	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см (с последующей заделкой) после сбора урожая	-(1)	10(-)	Не активен
	20 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Медведка	Внесение в почву на глубину 2-5 см (с последующей заделкой) до высадки рассады в грунт или в период вегетации	-(1)	10(-)	
Энлиль, КЭ (600 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Л 021-01-4251-0 13.11.2023 12.11.2026	0,8	Свекла сахарная	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	1,5-1,8	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	1,8-2,0	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(2)	-(3)	

	0,8	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
--	-----	-----------------	---------------------------	---	-------	------	--

Диметоат

Биммер, КЭ (400 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Л 085-01-3713-1 14.06.2022 13.06.2032	0,8-1,0	Рапс яровой и озимый, горчица	Рапсовый пилильщик, капустная совка, капустная моль, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание до цветения культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, пьявица, внутривеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Свекла сахарная	Клопы, листовая тля, минирующая муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,5-1,0	Лен - долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	1,0-1,2	Рожь озимая, ячмень яровой и озимый	Пьявица, внутривеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя, горох	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(1)	-(3)	
Евродим, КЭ (400 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Л 097-01-2844-1 16.10.2020 15.10.2030	1,0-1,2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	10(4)	Активен
	1,0	Рожь озимая, ячмень яровой и озимый	Пьявица, мухи внутривеблевые, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Лен - долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1,0	Овес	Мухи внутривеблевые, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1,5-1,8	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1,0-1,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, мухи внутривеблевые, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1,5-2,0	Картофель (семенные посевы)	Тли, картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1,5	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	0,7	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	

	0,8-2,0	Яблоня	Листовертки, плодожорки, яблонный пилильщик	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(2)	10(4)	
	1,5-1,8	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(4)	
	1,2-2,0	Виноград	Листовертка (гроздевая, двулентная), клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	40(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Свекла сахарная	Листовая тля, минирующие мухи, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
Димекс, КЭ (400 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 Ш/Л 653-01-4160-0 20.07.2023 19.07.2026	0,5-1,0	Горох	Гороховая плодожорка, бобовая огневка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,2	Ячмень озимый	Пьявицы, внутривеблевые двукрылые, злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя	Бобовая огневка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Свекла кормовая и сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная минирующая муха, свекловичная листовая тля, матовый мертвезд, свекловичная минирующая моль, клопы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка, пьявицы, внутривеблевые двукрылые, злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	-(3)	
Би-58 Топ, КЭ (400 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - Ш/Л 058-01-1959-1 04.07.2018 03.07.2028	0,5-1	Свекла сахарная	Листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	Активен
	1,2-2	Слива	Тли	Опрыскивание после цветения Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(1)	10(4)	
	1-1,2	Ячмень	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,8-2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	10(4)	
	1-1,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявицы, тли, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1,5	Яблоня	Яблонный цветезд	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	40(1)	10(4)	
	1-1,5	Рапс (семенные посеы)	Рапсовый цветезд	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	0,7-1,2	Рапс	Рапсовый пилильщик, капустная моль, капустная совка, белянки, тли, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	

	1-1,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	10(4)	
	1,2-2,8	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	20(2)	10(4)	
Террадим, КЭ (400 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 Ш/Л, ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 Ш/Л 192(424)-01-2787-1 28.08.2020 27.08.2030	0,5-1,0	Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки	Опрыскивание в фазе вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)	Активен
	1,0-1,5	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключени ем овса	Хлебная жужелица, вредная черепашка, пьявица, мухи злаковые внутристеблевые, тли, трипсы	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	7(3)	
	0,8-2,0	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(2)	7(3)	
	0,5-1,0	Зернобобо вые культуры	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание в фазе вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)	
Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - Ш/Л 058-01-2879-1 16.11.2020 15.11.2030	1-1,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	Активен
	0,5-1	Соя (семенные посевы)	Акациевая (бобовая) огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1	Капуста (семенные посевы)	Капустная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	0,5-1	Свекла сахарная	Листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1,2-2,8	Виноград	Гроздевая листовертка, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	20(2)	10(4)	
	1,2-2	Слива	Тли, клещи	Опрыскивание после цветения Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(1)	10(4)	
	1,5	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	40(1)	10(4)	
	1-1,2	Пшеница яровая	Хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	10(4)	
	1-1,2	Овес	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,7-1,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, капустная моль, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,6	Горчица (семенные посевы)	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	1-1,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	

	0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, клещи, толстоножка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	0,7-1,2	Рапс яровой	Капустная совка, белянки, тли,	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	1-1,5	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	0,5-1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	10(4)	
	0,8-2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, медяница, щитовки, моли, тли, клещи	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	10(4)	
	0,5-1	Свекла сахарная	Минирующая муха и моль, свекловичный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(4)	
	2-2,25	Картофель (семенные участки)	Тли – переносчики вирусов	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
Тагор, КЭ (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/Л 018-01-2827-1 08.10.2020 07.10.2030	1-1,2	Овес	Пьявицы, злаковые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	10(4)	Активен
	1,2-3	Виноград	Листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	28(2)	10(4)	
	1-1,2	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	10(4)	
	1-1,5	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	10(4)	
Сирокко, КЭ (400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Л 021-01-3721-1 24.06.2022 23.06.2032	2	Картофель (семенные участки)	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	Активен
	1	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Горох	Гороховая зерновка, плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1-1,5	Томат открытого грунта (семенные посевы)	Тли, цикадки, трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1-1,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1-1,5	Лук (семенные посевы)	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1,5	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(2)	10(4)	

	0,8-1,9	Яблоня	Яблонная плодожорка, медяница, моли, листовёртки, щитовки, тли, клещи	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Свекла сахарная и кормовая	Свекловичные долгоносики, клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, цикадки, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1-1,5	Томат открытого грунта (семенные посевы)	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Лук (семенные посевы)	Трипсы, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1,1-2,8	Виноград	Гроздевая и двулётная листовёртки, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	40(2)	10(4)	
Димефос, КЭ (400 г/л) ООО ЭЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/Л 278-01-4107-1 22.12.2014 21.12.2024	1-1,5	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые мухи, тли, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Не активен
Дишанс, КЭ (400 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-01-4044-1 21.03.2023 20.03.2033	1-1,2	Ячмень яровой	Злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,5-1	Горох	Гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
Альфа-Директор, КЭ (400 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - П/Л 062-01-657-1 30.04.2015 29.04.2025	2	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	-(2)	10(4)	Активен
	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	10(4)	
Диметус, КЭ (400 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/Л, Кингтай Кемикалз Ко., Лтд ОГРН: - П/Л 023(396)-01-1257-1 26.10.2016 25.10.2026	1-1,2	Овес	Внутри стеблевые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	10(4)	Активен
	0,5-0,1	Лен - долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(2)	10(4)	
	0,8	Люпин (семенные посевы)	Стеблевая минирующая муха, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(1)	10(4)	
	0,5-1	Свекла сахарная и кормовая	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,5-1	Овощные культуры (семенные посевы)	Клещи, тли, трипсы, клопы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(2)	10(4)	

1-1,5	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, пьявица злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	10(4)
1,5-2	Картофель (семенные посевы)	Картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(2)	10(4)
1,2-1,6	Смородин а (питомник и, маточники)	Листовертки,галлицы , тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800 - 1200 л/га	-(2)	10(4)
0,5-1	Зернобобовые культуры	Огневка бобовая, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(1)	10(4)
1,5	Кенаф	Клопы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(1)	10(4)
1,2-2	Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в Российской Федерации)	Листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(2)	10(4)
1-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	30(1)	10(4)
0,5-1	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(2)	10(4)
0,6-1,2	Малина (маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800 - 1200 л/га	-(1)	10(4)
2-2,25	Картофель (семенные посевы)	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(2)	10(4)
0,8-2	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, плодоярка, листовертки, тли, клещи, медяница, моли, листогрызущие гусеницы, жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 - 1500 л/га	40(2)	10(4)
1-1,2	Рожь, ячмень	Пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	10(4)
1-1,2	Злаковые травы (семенные посевы)	Злаковые мухи и листогрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(3)
1-1,2	Ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)
0,5-1	Зернобобовые культуры (семенные посевы)	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
1-1,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)

	1	Овес, рожь	Злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,7-0,9	Зернобобовые культуры	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,5-0,9	Лен - долгунец	Плодожорки, трипсы, совка-гамма	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Ранголи-Дункан, КЭ (400 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 И/И 134-01-1910-1 11.05.2018 10.05.2028	1-1,2	Овес	Внутрстеблевые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	1-1,2	Рожь, ячмень	Пьявица, внутрстеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	1-1,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, внутрстеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	1-1,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
Ди-68, КЭ (400 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 И/И 010-01-2153-1 12.03.2019 11.03.2029	0,5-0,9	Свекла сахарная	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,5-1,0	Зернобобовые культуры	Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
Рогор-С, КЭ (400 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 И/И 178-01-2216-1 07.05.2019 06.05.2029	1-1,5	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 260-1200 л/га	40(2)	10(4)	Активен
	0,6	Горчица	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)	10(4)	
	0,6	Рапс (семенные участки)	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	10(4)	
	0,5-0,9	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичные блошки, свекловичный долгоносик-стеблелест	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1,0-1,5	Рапс (семенные участки)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	
	2-2,25	Картофель (семенные участки)	Тли	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	1-1,5	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 260-1200 л/га	40(2)	10(4)	
	0,5-0,9	Лен	Льняные блошки	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	10(4)	
	1-1,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	10(4)	

	1	Рожь, ячмень	Пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
	1-1,5	Пшеница	Вредная черепашка, пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации (интервал между обработками 14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)	
Фостран, КЭ (400 г/л) ООО «ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 ПП/Л 063-01-2850-1 21.10.2020 20.10.2030	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка, пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(4)	Активен
Диметек, КЭ (400 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 ПП/Л 070-01-3374-1 17.11.2021 16.11.2031	0,5-1,0	Соя	Бобовая огневка, соевая плодоярка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, мухи злаковые внутристеблевые, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	1,0-1,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	0,5-1,0	Горох	Гороховая плодоярка, гороховая зерновка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Огурец (семенные посевы)	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)	
	0,5-1,0	Свекла сахарная	Листовая тля, минирующие муха и моль, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	1,0-1,2	Рожь озимая	Пьявица, внутристеблевые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	0,8-2,0	Яблоня, груша	Клещи, листовертки, тли, медяница, яблонный цветоед, плодожорки	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(2)	7(3)	
Дитокс, КЭ (400 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 ПП/Л 082-01-3658-1 27.04.2022 26.04.2032	1,0- 1,5	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная чере-пашка, пьявица, злаковые внутристеблевые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	10(4)	Активен
	0,5 - 1,0	Свекла сахарная	Клопы, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки	Опрыскивание в фазе вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	10(4)	
	0,8 - 2,0	Яблоня, груша	Медяница, яблонный цветоед	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(2)	10(4)	
Бинадин, КЭ (400 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт»	0,5-1,0	Зернобобо вые культуры, за исключени ем сои	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли	Опрыскивание в период вегетации, интервал между обработками 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен

ОГРН: 1025005325070 П/Л 046-01-4744-1 03.12.2024 02.12.2034	1,0-1,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации, интервал между обработками 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5-0,9	Свекла сахарная	Листовая тля	Опрыскивание в период вегетации, интервал между обработками 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, пьявицы, злаковые мухи, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации, интервал между обработками 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	

Диметоат + альфа-циперметрин

Кинфос Нео, КЭ (300 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Л 018-01-3335-1 19.10.2021 18.10.2031	0,3 - 0,4	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,2 - 0,3	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	

Диметоат + бета-циперметрин

Кинфос, КЭ (300 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Л 018-01-2221-1 07.05.2019 06.05.2029	0,25-0,4	Подсолнеч ник	Капустная и хлопковая совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	4(4)	Активен
	0,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	4(4)	
	0,25-0,4	Подсолнеч ник	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	4(4)	
	0,3-0,4	Пастбища, участки, заселенны е саранчовы ми, дикая растительн ость	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	4(4)	
	0,25-0,4	Кукуруза	Хлопковая совка, кукурузный стеблевой мотылек, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	4(4)	
	0,15-0,2	Ячмень, овес	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	4(4)	
	0,25	Кукуруза	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	4(4)	
	0,25	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	4(4)	
	0,3-0,5	Виноград	Коричнево-мраморны й клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	60(2)	4(4)	
	0,3-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	4(4)	
	0,25-0,4	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	4(4)	
	0,4-0,5	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	60(2)	4(4)	

0,25-0,4	Свекла сахарная	Свекловичные блошки,долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	4(4)
0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	4(4)
0,25-0,4	Горох	Гороховая зерновка,гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(1)	4(4)
0,4-0,5	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	21(2)	4(4)
0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	4(4)
0,25-0,4	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	4(4)
0,4-0,5	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	21(2)	4(4)
0,25-0,4	Нут	Хлопковая совка, нутовый минер	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(1)	4(4)
0,15-0,25	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	4(4)
0,3-0,5	Мандарин (питомники)	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	-(3)	4(4)
0,3	Соя	Соевая плодоярка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	4(4)
0,3-0,4	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание в период появления личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
0,25	Свекла сахарная	Свекловичная тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)
0,3-0,5	Соя	Совки, бобовая огневка, паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)
0,15-0,25	Подсолнечник	Подгрызающие совки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	-(3)
0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)
0,15-0,2	Ячмень, овес	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)
0,15-0,25	Подсолнечник	Совки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)
0,3-0,5	Соя	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)
0,15-0,25	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)

	0,25	Свекла сахарная	Блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	-(3)	
--	------	-----------------	---------------------	---	-------	------	--

Динитрил щавелевой кислоты

ДЩК, Газ (995 г/кг) ООО «АГРОКОНСАЛТ» ОГРН: 1157746892820 И/- 753-01-3270-1 15.11.2021 14.11.2031	50 г/м3	Древесина под пленкой или в других герметичных емкостях	Насекомые-вредители и древесины	Фумигация при температуре воздуха выше 0 0С. Введение препарата ДЩК, Газ (995 г/кг динитрил щавелевой кислоты) в фумигируемый объект. Обеззараживание древесины под черной пленкой (толщина 120-150 микрон) или в герметичных емкостях. Экспозиция до 10 часов. ПКЭ не менее 25 г×ч/м3. Дегазация не менее 1 часа. Допуск людей после полного проветривания и при содержании ДЩК, Газ (995 г/кг динитрил щавелевой кислоты) в воздухе рабочей	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	---	---------------------------------	---	------	-------	---------

Диоксид кремния

Агростраж, П (800 г/кг) ООО «ВОРОНЕЖПЕНОСТЕК ЛО» ОГРН: 1133668052627 III/- 811-01-3647-1 22.04.2022 21.04.2032	1 г/м2	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий, надзерновое пространство	Насекомые и клещи – вредители хлебных запасов	Обработка путем взмучивания порошка с использованием воздухоуловков. Допуск людей и загрузка складов после оседания препарата на поверхности (через 1 сутки после обработки)	-(1)	-(-)	Активен
	1 кг/т	Зерно сухое и средней сухости продовольственное, семенное, фуражное, семена бобовых и масличных культур в зернохранилищах всех типов	Насекомые (кроме мучных хрущаков) и клещи – вредители хлебных запасов	Введение препарата внутрь самотека с использованием специальной аппаратуры во время перемещения зерна и семян. Допуск людей через 1 сутки после обработки. Использование зерна и семян на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ	-(1)	-(-)	
	3 кг/т	Зерно сухое и средней сухости продовольственное, семенное, фуражное, семена бобовых и масличных культур в зернохранилищах всех типов	Мучные хрущаки – вредители хлебных запасов	Введение препарата внутрь самотека с использованием специальной аппаратуры во время перемещения зерна и семян. Допуск людей через 1 сутки после обработки. Использование зерна и семян на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ	-(1)	-(-)	
Дисектис, П (800 г/кг) ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ КВАНТ» ОГРН: 1095834000272 III/- 822-01-3716-1 17.06.2022 16.06.2032	50 г/м2	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Насекомые – вредители хлебных запасов	Обработка препаратом. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки и проветривания	-(1)	-(-)	Активен

	3 кг/т	Зерно средней сухости (влажность до 15,5%) продовольственное, семенное, фуражное, семена бобовых и масличных культур со сроком хранения	Насекомые – вредители хлебных запасов	Обработка при перемещении зерна и семян. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки и проветривания.	-(1)	-(-)	
	1 кг/т	Зерно сухое (влажность до 14%) продовольственное, семенное, фуражное, семена бобовых и масличных культур со сроком хранения не менее 3	Насекомые – вредители хлебных запасов	Обработка препаратом при перемещении зерна и семян. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки	-(1)	-(-)	

Дифеноконазол + Имидаклоприд + Тебуконазол

Хет-Трик, СК (67 г/л + 333 г/л + 17 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/- 021-01(02)-2728-1 06.06.2020 05.06.2030	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, тли	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-1,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, тли	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Ячмень озимый	Хлебные жужелица	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Дифеноконазол + Тиаметоксам + Флудиоксонил

Селест Топ, КС (25 г/л + 262,5 г/л + 25	1,2-1,5	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
---	---------	-------------------------------	------------------	---	------	------	---------

г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/- 041-01(02)-4007-1 07.03.2023 06.03.2023	12,5-15	Рапс яровой	Стеблевой капустный скрытнохоботник	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 22-25 л/т	-(1)	-(1)	
	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	12,5-15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 22-25 л/т	-(1)	-(1)	

дифеноконазол + Флудиоксонил + Ацетамиприд

Грифон, КС (25 г/л + 25 г/л + 100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/- 082-01(02)-3947-1 12.01.2023 11.01.2023	1,2-1,5	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т клубней	-(1)	-(1)	
	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	1,2-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней при посадке Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(1)	

Дифлоvidaзин

Дифломaйт, СК (200 г/л) «Агро-Кeми Кфт.» ОГРН: - III/III 262-01-2679-1 20.05.2020 19.05.2030	4 мл/10 л воды (JI)	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево или 10 л/100 м2	30(1)	3(-)	Активен
	0,2-0,4	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04% Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	30(1)	7(3)	
	3 мл/10 л воды (JI)	Огурец защищенн ого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(1)	1(-)	
	4 мл/10 л воды (JI)	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	30(1)	3(-)	
	0,24-0,45	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04% Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(1)	7(3)	
	3 мл/10 л воды (JI)	Роза защищенн ого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)	
	0,3	Соя	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	36(1)	7(3)	

Дифлyбензурон

Герольд, ВСК (240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-01-1679-1	0,5	Яблоня	Моль-малютка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(2)	3(3)	Активен
	10 мл/10 л воды (JI)	Декоратив ные кустарник и	Пяденицы, боярышница, бражник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	-(1)	3(-)	

12.01.2018
021-01-1679-1/420 420
11.01.2028

0,5-1,0	Кукуруза, подсолнечник, соя	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(1)	-(3)
0,05	Пастбища, участки, заселённые саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 40 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных авиаметодом площадях – не ранее 7 дней Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	3(3)
0,15	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)
0,05	Пастбища, луга, участки, заселённые саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)
0,5-1,0	Рапс	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(1)	-(3)
10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	40(2)	3(-)
10 мл/10 л воды (Л)	Смородина	Тли, смородиновая почковая моль, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	30(1)	3(-)
5 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Агатова совка, совка-гамма, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	-(1)	3(-)
0,2	Яблоня	Кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(2)	3(3)
1	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(2)	3(3)
5 мл/10 л воды (Л)	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	30(1)	3(-)
0,003 кг/м3	Шампиньоны (защищенный грунт)	Грибные мухи и комарики	Опрыскивание субстрата. Срок безопасного выхода в камеры для выращивания шампиньонов – 2 дня Расход рабочей жидкости - 0,25 л/м2	25(2)	7(3)
0,04-0,08	Лиственные и хвойные породы	Листогрызущие и хвоегрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 30 дней Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	7(7)
0,14	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 30 дней Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	7(7)

Димилин, СП (250 г/кг)
Ариста ЛайфСайенс Регистрейшнс Грейт Британ Лтд.
ОГРН: - III/II
379-01-2033-1
30.10.2018
29.10.2028

Активен

	0,14	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок.Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	
	0,1-0,2	Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	-(2)	7(3)	
	0,5	Яблоня	Минирующие моли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	
	1,0-2,0	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	
	0,2	Яблоня	Кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	
Дифлуцид, СП (250 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 Ш/Ш 389-01-2210-1 26.04.2019 25.04.2029	0,05 (0,14 - в барьере)0,14	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок барьерным (ленточным) способом по ширине барьера – 80-120 м и межбарьерного пространства 300 м Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,04-0,1	Лиственные и хвойные породы	Листогрызущие и хвоегрызущие насекомые	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	-(3)	
	0,05 (0,14- в барьере)	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок барьерным (ленточным) способом при ширине барьера 80-120 м и межбарьерного пространства 300 м Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,04-0,1	Лиственные и хвойные породы	Листогрызущие и хвоегрызущие насекомые,личинки и гусеницы младших возрастов	Опрыскивание в период питания личинок или гусениц Расход рабочей жидкости - 100- 200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,05 (0,14 - в барьере)0,14	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,14	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-2,0	Яблоня	Яблоннаяплодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	-(3)	
Шансилин, ВДГ (800 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 Ш/Ш 126-01-2612-1 19.03.2020 18.03.2030	0,3-0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	60(2)	3(3)	Активен

Новинс, КС (480 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-01-3935-1 10.01.2023 09.01.2033	0,025	Пастбища, луга, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)	Активен
	0,075	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период отрождения личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,25	Яблоня	Минирующие моли	Опрыскивание в период отрождения личинок Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	50(1)	3(3)	
	0,5-1,0	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период отрождения личинок Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	50(1-3)	3(3)	

Дифлубензурон + Ацетамиприд

Твинго Евро, МД (180 г/л + 45 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-01-3283-1 03.09.2021 02.09.2031	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	28(2)	3(3)	Активен
	0,75 - 1,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	28(2)	3(3)	
	0,75 - 1,2	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	28(2)	3(3)	

Дифлубензурон + Эсфенвалерат

Скарабей, СЭ (300 г/л + 88 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-01-3397-1 07.12.2021 021-01-3397-1/438 438 06.12.2031	3,5-7 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,07 % Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	28(2)	3(3)	Активен
	2-4 мл/3 л воды (Л)	Капуста белокочанная, капуста цветная	Капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100м2	21(1)	3(3)	
	3-6 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,06% Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	28(2)	3(3)	
	0,2-0,4	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Соя	Луговой мотылек, акациевая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	21(1)	-(3)	

0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (пастбища и дикая растительность) – не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)
0,2	Подсолнечник	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)
0,2-0,4	Капуста белокочанная, капуста цветная	Капустная моль, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	3(3)
0,35-0,7	Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,07 % Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)
0,1-0,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)
0,3-0,6	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,06 % Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	28(2)	3(3)
0,2	Кукуруза	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)
0,5	Подсолнечник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	21(1)	-(3)

Зета-циперметрин

Таран, ВЭ (100 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/I 050-01-992-1 28.04.2015 27.04.2025	1 мл/10 л воды	Малина	Землянично-малинный долгоносик	Опрыскивание в период выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 0,2 л/куст	30(1)	3(-)	Активен
	0,07-0,1	Ячмень	Пьявица, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	1 мл/10 л воды	Смородина	Тли	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 1,5 л/куст	30(1)	3(-)	
	0,1	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5 мл/100 м2	Земляника	Землянично-малинный долгоносик	Опрыскивание в период выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	30(1)	3(-)	
	0,07-0,1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Ячмень	Пьявица, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	

	0,1-0,15	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки; сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Фьюри, ВЭ (100 г/л) ФМС Кемикал ОГРН: - П/Л 051-01-653-1 29.04.2015 28.04.2025	1 мл/10 л воды	Малина	Землянично-малинный долгоносик	Опрыскивание в период выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 0,2 л/куст	30(1)	3(-)	Активен
	1 мл/10 л воды	Смородина	Тли	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 1,5 л/куст	30(1)	3(-)	
	0,1	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки; сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,07-0,1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5 мл/100 м2	Земляника	Землянично-малинный долгоносик	Опрыскивание в период выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	30(1)	3(-)	
	0,07-0,1	Ячмень	Пьявица, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,07-0,1	Ячмень	Пьявица, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки; сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	

Зета-циперметрин + Клотиаиндин

Клонрин, КЭ (100 г/л + 150 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/Л, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207	0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	3(3)	Активен
--	---------	---	------------	---	------	------	---------

III/1
050(360)-01-1066-1
07.04.2016
050(360)-01-1066-1/169
169
06.04.2026

0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	3(3)
0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-50 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Соя	Акациевая огневка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)
0,1-0,2	Пшеница, ячмень	Вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Пшеница, ячмень	Вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	20(2)	3(3)
0,06 - 0,09 л/га	Хвойные и лиственные породы	Хвое-и листогрызущие вредители, в т.ч. непарный шелкопряд, сосновый пилильщик и самшитовая огневка	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младшего возраста. В регионах, где планируется применение препарата, в сезон обработки не рекомендуется сбор грибов, ягод, кедровых шишек. Заблаговременно, не менее чем за 10 дней до начала обработок, население через средства массовой информации должно быть оповещено о необходимых мерах предосторожности, о сроках возможного сенокошения и выпаса животных. На границах	-(1)	3(3)
0,1-0,2	Пшеница, ячмень	Вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	3(3)
0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)

0,1-0,2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 10-50 л/га	-(1)	3(3)
0,1-0,2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)	3(3)
0,1-0,2	Пшеница, ячмень	Вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-50 л/га	20(2)	3(3)
0,06 - 0,09 л/га	Хвойные и лиственные породы	Хвое-и листогрызущие вредители, в т.ч. непарный шелкопряд, сосновый пилильщик и самшитовая огневка	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младшего возраста. В регионах, где планируется применение препарата, в сезон обработки не рекомендуется сбор грибов, ягод, кедровых шишек. Заблаговременно, не менее чем за 10 дней до начала обработок, население через средства массовой информации должно быть оповещено о необходимых мерах предосторожности, о сроках возможного сенокошения и выпаса животных. На границах	-(1)	3(3)

Имазалил + Тебуконазол + Имидаклоприд

Туарег, СМЭ (34 г/л + 20 г/л + 280 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-01(02)-732-1 30.07.2015 29.07.2025	1-1,4	Пшеница, ячмень, в том числе пивоваренный	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, тли, цикадки	Протравливание семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	-------	---	---	--	------	------	---------

Имидаклоприд

Имидор Про, КС (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/-, ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-07-3032-1 25.02.2021 17.03.2032	25	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 4,5-5,5 мм Расход рабочей жидкости - 35 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	2-2,5	Лен - долгунец	Льняные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,75-1,25	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	12,5-15	Кукуруза	Проволочники, подгрызающие совки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 22-25 л/т семян	-(1)	-(-)	
	20-25 мл/л воды (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т клубней	-(1)	-(-)	
	15-20	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 25-30 л/т семян	-(1)	-(-)	
	25-30	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 3,5-4,5 мм Расход рабочей жидкости - 35-40 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,75-1,25	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,2-0,25	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до или во время посадки (во время посадки) Расход рабочей жидкости - 25 л/т клубней	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Соя	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т семян	-(1)	-(-)	
	15	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 25 л/т семян	-(1)	-(-)	
Акиба, ВСК (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/- 178-01-3990-1 27.02.2023 26.02.2023	6-8	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	6-7	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 17 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница, ячмень	Злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10,5 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Лен масличный	Льняные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10,8 л/т	-(1)	-(-)	
	5-6	Кукуруза (на зерно)	Проволочники, подгрызающие совки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 16 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Соя	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(-)	
	0,08-0,1	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли, цикадки	Обработка клубней (при посадке) Расход рабочей жидкости - 25 л/т клубней	-(1)	-(-)	
Табу, ВСК (500 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/- 005-01-2072-1 07.02.2019 005-01-2072-1/349 349 06.02.2029	10-13	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Обработка семян перед посевом фракций 4,5-5,5 мм Расход рабочей жидкости - 20-23 л/т	-(1)	3(3)	Активен
	1 мл/1 л воды (Л)	Лук севок (на репку)	Луковая муха 1-го поколения	Обработка лука севка перед посадкой путем погружения в 0,1% раствор с экспозицией 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	3(-)	
	0,6-0,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-11 л/т	-(1)	3(3)	
	0,6-1,2	Люпин	Клубеньковые долгоносики	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11-12 л/т	-(1)	3(-)	
	0,8-1,0	Лен - долгунец	Блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-11 л/т	-(1)	3(3)	
	6-8	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 16-18 л/т	-(1)	3(3)	
	0,4-0,5	Пшеница, ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-11 л/т	-(1)	3(3)	
	8 мл /1 л воды (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	3(-)	
	12-15	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Обработка семян перед посевом фракций 3,5-4,5 мм Расход рабочей жидкости - 22-25 л/т	-(1)	3(3)	
	0,3-0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Опрыскивание дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	90(1)	3(3)	
	6-7	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	3(3)	
	0,08-0,1	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(3)	

	5-6	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	3(3)	
	4 мл /100 м2 (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Опрыскивание дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	90(1)	3(-)	
	0,8-1,0	Соя	Вредители всходов	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-11 л/т	-(1)	3(3)	
Биотлин, ВРК (200 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/Л 021-01-2767-1 16.07.2020 15.07.2030	5 мл/10 л воды(Л)	Цветочные культуры	Тли, цикадки, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	3(-)	Активен
	3,0 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 1-2 л/дерево	60(1)	3(-)	
	3,0 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	60(1)	3(-)	
	5 мл/10 л воды(Л)	Огурец и томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	1(-)	
	3,0 мл/10 л воды(Л)	Смородин а	Тли	Опрыскивание до цветения (в зависимости от возраста и типа формировки куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	60(1)	3(-)	
Биотлин Бау, ВР (0,1 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/Л 021-01-3455-1 28.12.2021 27.12.2031	700 мл/1,5-7 кустов (Л)	Смородин а	Тли	Опрыскивание до цветения. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	7(1)	3(-)	Активен
	700 мл/7 м2 (Л)	Огурец и томат защищенн ого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	1(1)	1(-)	
	700 мл/35 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	20(1)	3(-)	
Витакс, КС (600 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - ПП/- 064-01-2889-1 23.11.2020 22.11.2030	0,3-0,6	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
Заман, ВРК (200 г/л) ООО «ТПК «РОСТИ» ОГРН: 1062312034223 ПП/Л 286-01-1157-1 18.07.2016 17.07.2026	1 мл/4 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание во время вегетации Расход рабочей жидкости - 4 мл/100м2	20(1)	4(-)	Активен
	2,5-5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Тля	Опрыскивание во время вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л /дерево	20(1)	3(-)	
Землин Форте, Г (5 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/- 046-01-4133-1 05.07.2023 04.07.2033	30 г/10 м2	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Проволочники	Внесение в почву при посадке с последующей заделкой на глубину 3-5 см	60(1)	1(-)	Активен
	30 г/10 м2	Лук-севок (кроме лука на перо)	Луковая муха I поколения	Внесение в почву при посадке с последующей заделкой на глубину 3-5 см	1(-)	1(-)	
	30 г/10 м2	Цветочные луковичны е культуры	Проволочники	Внесение в почву при посадке с последующей заделкой на глубину 3-5 см	-(2)	1(-)	

Искра Золотая Просто, ВР (0,1 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 Ш/Л 046-01-2710-1 19.06.2020 18.06.2030	1,0 л/10 м2 (Л)	Цветочные растения открытого и защищенного грунта	Тли, трипсы, цикадки, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Флакон с куроковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(2)	1(-)	Активен
	1,0 л/5-10 кустов (Л)	Декоративные кустарники	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Флакон с куроковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(2)	3(-)	
Имидасид, КС (600 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 Ш/Л 070-01-3348-1 25.10.2021 24.10.2031	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутривебные мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(-)	
	3-6	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Внутривебные мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Конфидой, ВРК (200 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 Ш/Л, ООО «Ипрохим» ОГРН: 5087746217719 Ш/Л, ООО ИПРОХИМ ОГРН: 1163123061419 Ш/Л, ООО «Агросодружество» ОГРН: 1097746427195 Ш/Л, ООО «АГРОМИР» Курская область ОГРН: 1104619000012 Ш/Л 197(100, 932, 120, 933)-01-4575-1 21.05.2024 20.05.2034	0,1-0,15	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Клоп вредная черепашка, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)(20(1))	3(3)	Активен
	0,1-0,15	Яблоня, груша, айва	Яблонный цветоед, яблонная плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1200 л/га	7(1)	3(3)	
	0,05-0,075	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	3(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)(20(1))	3(3)	
	0,2-0,25	Зерновые колосовые озимые, за исключением овса	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	3(3)	
Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - Ш/Л 019-01-2064-1 31.01.2019 30.01.2029	0,03-0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	Активен
	0,05-0,2	Огурец защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,03-0,05	Ячмень	Хлебные блошки, пылявицы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,03	Пшеница	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	

	0,3-0,5 г / 100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(3)	
	1,5 г / 10 л воды (Л)	Огурец, томат открытого грунта	Белокрылка, тли, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	5(1)	3(3)	
	0,4	Огурец защищённого грунта	Тли, табачный трипс	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м	3(1)	1(-)	
	0,15-0,45	Огурец защищённого грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,125	Картофель (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусов	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	- (3)	3(3)	
	0,4	Томат защищённого грунта	Тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м	3(1)	1(-)	
	0,35	Огурец защищённого грунта	Тли, табачный трипс	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м	3(1)	1(-)	
	0,015-0,03	Пастбища, участки, заселённые саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	- (1)	3(3)	
	0,03	Овёс	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,015-0,03	Пастбища, участки, заселённые саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	- (1)	3(3)	
	0,05	Пшеница	Вредная черепашка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,07-0,1	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(1)	3(3)	
	0,15-0,45	Томат защищённого грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
Конфиделин Супер, ВДГ (700 г/кг) ИП Тарасов Юрий Дмитриевич ОГРН: 3147746070014 ПП/Л 231-01-1028-1 11.03.2016 10.03.2026	0,3 г/5л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(-)	Активен
	1,5 г/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищённого грунта	Тепличная белокрылка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	3(-)	
Корадо, ВРК (200 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728	5 мл/5 л воды (Л)	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-4 настоящих листьев (кроме пучковой). Вторая обработка через 20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(2)	3(-)	Активен

ИП/И 008-01-2131-1 04.03.2019 03.03.2029	5 мл/5 л воды (Л)	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев (кроме лука на перо) Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(-)	
Корадо Лайт, КС (50 г/л) ООО ПАРТНЕР ЛПХ ОГРН: 1135257008204 ИП/И 543-01-2178-1 02.04.2019 01.04.2029	4 мл/ 5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(-)	Активен
	5 мл/ 2 л воды (Л)	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/дереву	20(1)	3(-)	
Кортлис, ВРК (200 г/л) ООО «ПАРТНЕР ЛПХ» ОГРН: 1135257008204 ИП/И 356-01-1044-1 18.03.2016 17.03.2026	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/дереву	20(1)	3(-)	Активен
Зубр, ВРК (200 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 ИП/И 012-01-2442-1 10.12.2019 09.12.2029	5 мл/10 л воды (Л)	Томаты и огурцы защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-30 л/100 м2	3(1)	3(-)	Активен
	1 мл/5л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л на 100м2	20(1)	3(-)	
	5 мл/10 л воды(Л)	Цветочные растения открытого грунта	Тли, трипсы, клопы, пенницы, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	3(-)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Горшечны е цветочные растения открытого грунта	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	3(-)	
Командор, ВРК (200 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ИП/И 046-01-1863-1 10.04.2018 09.04.2028	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	Активен
	5 мл/10 лводы (Л)	Томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	1(-)	
	5 мл/10 лводы (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	1(-)	
	20-25 мл/лводы (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	1(-)	
	5 мл/10 лводы (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Тли, калифорнийский трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)	
	0,2-0,25	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до и во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т клубней	-(1)	3(3)	
	1 мл/ 5 лводы (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м 2	20(1)	1(-)	
	0,1-0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	

	2	Подсолнечник (кроме зеленой массы)	Проволочники	Обработка семян. Непосредственно перед посевом или заблаговременно до посева (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 12 л/т семян	-(1)	3(3)	
	1-1,5	Пшеница озимая и яровая	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11,5 л/т семян	-(1)	3(3)	
	0,5-1,5	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 % Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(3)	
	2	Кукуруза (на зерно)	Проволочники	Обработка семян. Непосредственно перед посевом или заблаговременно до посева (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 12 л/т семян	-(1)	3(3)	
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	3(3)	
	0,5-1,5	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 % Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(3)	
Командор Макси, ВДГ (700 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/И 046-01-2713-1 26.06.2020 25.06.2030	0,3 г/100 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	20(1)	3(-)	Активен
	1,5 г/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	3(1)	1(-)	
Муравьин Форте, Г (5 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/- 046-01-3439-1 11.01.2022 10.01.2032	30 г/10 м2 (Л)	Томат защищенного грунта	Муравьи	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см в период вегетации после высадки рассады в грунт	5(1)	1(-)	Активен
Медветокс Форте, Г (5 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/- 046-01-4181-1 14.08.2023 13.08.2033	30 г/10 м2	Цветочные культуры (кроме луковичных)	Медведки	Внесение в почву при посадке с последующей заделкой на глубину –3-5 см. Повторное внесение препарата при необходимости	-(2)	1(-)	Активен
	30 г/10 м2	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Колорадский жук, медведки	Внесение в почву при посадке с последующей заделкой на глубину - 3-5 см	60(1)	1(-)	
Рембек, Г (5 г/кг) ООО «АгроМаг» ОГРН: 1133123015244 ПП/- 406-01-2014-1 10.10.2018 09.10.2028	30 г/10 м2(Л)	Картофель (кроме ранних сортов)	Медведка, проволочник	Внесение в посадочную лунку при посадке клубней	60(1)	3(-)	Активен
	30 г/10 м2(Л)	Цветочные культуры	Проволочник	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 5-10 см	-(2)	3(-)	
	30 г/10 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	60(1)	3(-)	
	30 г/10 м2(Л)	Цветочные культуры	Медведка	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	-(2)	3(-)	
Разряд, Г (5 г/л) ООО «ОРТОН»	30 г/10 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	60(1)	3(-)	Активен

ОГРН: 1025004916573 П/П 033-01-2093-1 01.02.2019 31.01.2029	30 г/10 м2(Л)	Картофель (кроме ранних сортов)	Медведка, проволочник	Внесение в посадочную лунку при высадке клубней	60(1)	3(-)	
Цветолокс Бау, ВР (0,1 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-01-2420-1 08.10.2019 07.10.2029	700 мл/7м2 (Л)	Цветочные растения открытого грунта	Тли, трипсы, цикадки, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(2)	3(-)	Активен
	700 мл/7м2 (Л)	Цветочные растения защищенн ого грунта	Тли, трипсы, цикадки, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(2)	1(-)	
	700 мл/ 0,5-1 дерево (Л)	Декоратив ные деревья	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей до полного смачивания. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(2)	3(-)	
	700 мл/ 1,5-7 кустов (Л)	Декоратив ные кустарник и	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей до полного смачивания. Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(2)	3(-)	
Имидор Экстра, КС (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-01-4582-1 23.05.2024 22.05.2034	0,25-0,4	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(1)	-(3)	
	0,25-0,4	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(1)	-(3)	

	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 20 дней после обработки; сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(1)	-(3)	
	0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 20 дней после обработки; сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,15	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
Имиприд, ВРК (200 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 ПП/П 097-01-559-1 16.02.2015 097-01-559-1/178 178 15.02.2025	0,06	Ячмень яровой и озимый, овес	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(1)	3(3)	Не активен
	0,06-0,07	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(1)	3(3)	
	0,15-0,75	Огурец защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	1 мл/100 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(-)	
	1,5-2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(3)	
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	3(3)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	3(-)	
	1-1,25	Пшеница и ячмень яровые	Внутрстеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(3)	
	0,1-0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	3(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	

	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый, овес	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	3(3)	
	0,5-1,5	Томат и огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 % Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
Имидашанс-С, КС (600 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 ПП/- 126-01-4543-1 03.05.2024 02.05.2024	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутристеблевые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(-)	-(-)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Внутристеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(-)	-(-)	
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(-)	-(-)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(-)	-(-)	
	3-6	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(-)	-(-)	
Альфа-Серф, ВК (200 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - ПП/Л 062-01-349-1 16.05.2014 15.05.2024	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(3)	Не активен
Имидашанс, ВРК (200 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 ПП/Л 126-01-4616-1 17.06.2024 16.06.2034	0,1-0,15	Яблоня	Тли, яблонный цветоед, яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1200 л/га	3(3)	3(3)	Активен
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	-(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(3)	
	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(3)	
	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 20-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп-вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(3)	
Контадор, ВРК (200 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 ПП/Л	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп-вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	

085-01-4494-1 01.04.2024 31.03.2034	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
Контадор Макси, КС (600 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 Ш/- 085-01-4492-1 01.04.2024 31.03.2034	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Внутрстеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутрстеблевые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	
	3-6	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(-)	
Форсер Энто, КС (600 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 Ш/- 042-01-1390-1 06.03.2017 05.03.2027	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Внутрстеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	3-6	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(-)	
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутрстеблевые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(-)	
Рофатокс, Г (5 г/кг) ООО «ТПК «РОСТИ» ОГРН: 1062312034223 Ш/- 286-01-1641-1 07.12.2017 06.12.2027	30 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Проволочник	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 5-10 см	-(2)	3(-)	Активен
	30 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Медведка	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	-(2)	3(-)	
	30 г/10 м2 (Л)	Картофель (кроме ранних сортов)	Медведка, проволочник	Внесение в посадочную лунку при высадке клубней	60(1)	3(-)	
	30 г/10 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	60(1)	3(-)	
Рубеж, Г (5 г/кг) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 Ш/- 008-01-1664-1 18.12.2017 17.12.2027	30 г/10 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	60(1)	3(-)	Активен
	30 г/10 м2 (Л)	Картофель (кроме ранних сортов)	Медведка, проволочник	Внесение в посадочную лунку при высадке клубней	60(1)	3(-)	
	30 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Медведка	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 3-5 см	-(2)	3(-)	
	30 г/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Проволочник	Равномерное внесение в почву с последующей заделкой на глубину 5-10 см	-(2)	3(-)	
Сайдор, ВРК (200 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 Ш/Л 070-01-3851-1 29.11.2022 28.11.2032	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп – вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
Сидоприд, ТС (600 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934	0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Внутрстеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен

П/- 156-01-563-1 19.02.2015 156-01-563-1/199 199 18.02.2025	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	4	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	5-6	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 16 л/т	-(1)	-(-)	
	4	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
Ранголи-Имидоклоприд, ВРК (200 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 П/- 134-01-1343-1 25.01.2017 24.01.2027	1,5-2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый, овес	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)	
	1-1,25	Пшеница и ячмень яровые	Внутрстеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
Стрит, КС (600 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/- 082-01-1489-1 02.05.2017 082-01-1489-1/458 458 01.05.2027	0,8	Соя	Клубеньковые долгоносики, серый свекловичный долгоносик	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-11 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Внутрстеблевая муха, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	3-6	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(-)	
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутрстеблевые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(-)	
Койот, КС (600 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - П/- 297-01-1412-1 15.03.2017 14.03.2027	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Внутрстеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,3-0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	5,0-9,0	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутрстеблевые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(-)	
	8,0-12,0	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	

Тореадор Макси, КС (600 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 ПП/- 446-01-1523-1 11.07.2017 10.07.2027	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Внутривеблевые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	3-6	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(-)	
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутривеблевые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Серф-Экстра, ТКС (600 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - ПП/- 062-01-1837-1 22.03.2018 21.03.2028	0,3-0,6	Пшеница	Хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
Имидж, ВРК (200 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 ПП/, Агрис АД ОГРН: - ПП/, 184-01-2197-1 11.04.2019 184-01-2197-1/380 380 10.04.2029	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	Активен
	0,06	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(1)	7(3)	
	0,07	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(1)	7(3)	
	0,15-0,75	Огурец защищенный грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,5	Огурец защищенный грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,5	Томат защищенный грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,07-0,1	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	7(3)	
	0,06	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	7(3)	
	0,06	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	7(3)	
	0,06	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(1)	7(3)	
	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	

	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней, сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	7(3)	
Имдабел, ВРК (200 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 ПП/П 277-01-2184-1 05.04.2019 04.04.2029	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	3(3)	Активен
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
Кракен, ВРК (200 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 ПП/П 126-01-4045-0 27.03.2023 26.03.2026	5 мл/10 л воды (Л)	Капуста	Тля, листогрызущие	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(1)	-(3)	Активен
	3 мл/10 л воды (Л)	Груша	Тля, медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	7(1)	-(3)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Цветочные растения защищенного грунта и горшечные растения (кроме комнатных растений)	Тля, цикадка, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(1)	
	3 мл/10 л воды (Л)	Смородина	Тля	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 0,5 до 1,5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	7(1)	-(3)	
	2 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	-(3)	
	3 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	7(1)	-(3)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тля, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	-(1)	
	3 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	7(1)	-(3)	
Танрек, ВРК (200 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/П 021-01-2484-1 11.12.2019 10.12.2029	5 мл/ 10 л воды	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Тли, цикадки, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)	Активен
	0,05-0,07	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 14 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)	
	0,5-1,5	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	

	5 мл/ 10 л воды	Огурец, томат защищенного грунта	Тли, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	1(-)	
	0,2-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	3(3)	
	0,5-1,5	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	3,0 мл/ 10 л воды	Смородина	Тли	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	7(1)	3(3)	
	3,0 мл/ 10 л воды	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	7(1)	3(3)	
	1,0	Цветочные культуры защищенного грунта	Тли, тепличная белокрылка, западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	- (1)	1(-)	
	1 мл/ 100 м2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	20(1)	3(3)	
	3,0 мл/ 10 л воды	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от объема культуры) Расход рабочей жидкости - 1,5 л/дерево (в зависимости от объема культуры)	7(1)	3(3)	
	0,15-0,75	Огурец защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	
	0,5	Цветочные культуры открытого грунта	Тли, цикадки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	- (1)	1(-)	
	0,05-0,07	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 14 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	- (1)	3(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(1)	3(3)	
Имидор, ВРК (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/И 018-01-2222-1 07.05.2019 06.05.2029	0,07	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	Активен
	0,25	Картофель (семенные посевы)	Тли	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(3)	
	1-5 мл/10 л воды	Цветочные и горшечные растения (кроме комнатных)	Цикадки, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)	

0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 20-50 л/га	-(1)	-(3)
0,15	Свекла сахарная	Луговой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(1-2)	-(3)
0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(1-2)	-(3)
0,06	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)
0,15	Рапс	Семенной рапсовый скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 20-50 л/га	30(1)	-(3)
0,15	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)
0,15-0,75	Огурцы защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025 % Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	-(1)
0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки идолгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	45(1-2)	-(3)
0,06	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 20-50 л/га	28(1)	-(3)
0,15	Рапс	Семенной рапсовый скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)
0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)
0,15-0,25	Рапс	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)
0,25-0,4	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеяд	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(1-2)	-(3)
0,5-1,5	Огурцы защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	-(1)
0,5-1,5	Томаты защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	-(1)
0,07	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 20-50 л/га	28(1)	-(3)

	0,06	Ячень, овес	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 20-50 л/га	28(1)	-(3)	
	1 мл/100 м2	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(-)	
	5 мл/10 л воды	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-30 л/100 м2	3(1)	1(-)	
	0,06	Ячень, овес	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,15-0,25	Рапс	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 20-50 л /га	30(1)	-(3)	
Гром-2М, Г (20 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/- 012-01-4686-0 03.10.2024 02.10.2027	30 г/10 м2 (Л)	Участки, заселенные муравьями	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	-(1)	-(1)	Активен
	3 г/10 м2 (Л)	Горшечные цветочные растения	Почвенные мушки, грибные комарики	Внесение на поверхность почвы в горшке вокруг растений с последующей заделкой в почву	-(1)	1(-)	
	3 г/10 м2 (Л)	Рассада овощных и цветочных культур	Почвенные мушки, грибные комарики	Внесение на поверхность почвы вокруг растений с последующей заделкой в почву	-(1)	1(-)	
Гром-М, Г (20 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/- 012-01-4735-1 26.11.2024 25.11.2034	30 г/10 м2 (Л)	Земляника, картофель, морковь, томат открытого грунта, цветочные культуры	Медведка	Внесение в почву на глубину 3-5 см в период вегетации	62(1)	1(-)	Активен
	30 г/10 м2 (Л)	Участки, заселенные муравьями	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	-(1)	1(-)	
Почин-М, Г (20 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/- 012-01-4694-1 17.10.2024 16.10.2034	20/10 м2 (Л)	Капуста	Капустные мухи, крестоцветные блошки	Внесение на поверхность почвы в районе корневой шейки с одновременной заделкой при посадке рассады	105(1)	1(-)	Активен
	30 г/10 м2 (Л)	Участки, заселенные муравьями	Муравьи	Внесение в муравейник на глубину 2-3 см	-(1)	1(-)	
	30/10 м2 (Л)	Цветочные культуры	Проволочники	Внесение в почву перед посадкой	-(1)	1(-)	
	30/10 м2 (Л)	Картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов)	Проволочники	Внесение в почву при посадке	94(1)	1(-)	

Имидаклоприд + Альфа-циперметрин + Клотиаинидин

Жукоед, СК (100 г/л + 125 г/л + 50 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Л 021-01-1818-1 05.02.2016 04.02.2026	1,5 мл/3 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(1)	3(-)	Активен
--	---------------------	-----------	-----------------	--	-------	------	---------

Имидаклоприд + альфа-циперметрин

Бифас, КС (300 г/л + 100 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - ПП/Л 062-01-1839-1 22.03.2018 21.03.2028	0,1-0,15	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
---	----------	---------	-------------------	---	-------	------	---------

Имидаклоприд + Бифентрин

Имидалит, ТПС (500 г/л + 50 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 ПП/- 050-01-4568-1 22.05.2024 21.05.2034	6-8	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,1-0,2	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	
	6-8	Капуста (безрассад ная)	Крестоцветные блошки, весенняя капустная муха	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница	Злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Галил, КС (250 г/л + 50 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 ПП/Л 156-01-3843-1 26.10.2022 25.10.2032	0,15-0,2	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблеед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Полосатая хлебная блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка, злаковые мухи, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Горох	Гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Полосатая хлебная блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	

Имидаклоприд + Дифлубензурон

Твинго, КС (45 г/л + 180 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/Л 018-01-1919-1 21.05.2018 018-01-1919-1/240 240 20.05.2028	0,75-1,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,75-1,2	Виноград	Гроздевая листовертка, коричнево-мраморны й клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	20(2)	-(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от объёма кроны)	20(2)	-(3)	

	0,75-1,2	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	20(2)	-(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	20(2)	-(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка, коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	20(2)	-(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	20(2)	-(3)	
	0,75-1,2	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(2)	-(3)	
Локустин, КС (110 г/л + 125 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/Л 018-01-1057-1 07.04.2016 018-01-1057-1/229 229 06.04.2026	0,2-0,4	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(3)	-(3)	Активен
	0,1	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители, в том числе сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младших и старших возрастов и имаго с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Ширина эффективного захвата 140-480 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 1-3 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители, в том числе дубовый клоп-кружевница, блошак дубовый, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период развития личинок и имаго с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Ширина эффективного захвата 140-480 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 1-3 л/га	-(2)	-(3)	
	0,08-0,12	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 20 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	

0,08-0,12	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Ширина эффективного захвата – 140-480 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 20 дней; сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 2-3 л/га	-(1)	-(-)
0,08-0,12	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 20 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(-)
0,07-0,1	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители, в том числе сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младших и старших возрастов. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	-(3)
0,2	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(3)	-(3)
0,07-0,1	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители, в том числе дубовый клоп-кружевница, блошак дубовый, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период развития личинок и имаго. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(3)
0,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(3)	-(3)
0,07-0,1	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители, в том числе сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младших и старших возрастов. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)
0,07-0,1	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители, в том числе дубовый клоп-кружевница, блошак дубовый, непарный шелкопряд	Опрыскивание в период развития личинок и имаго. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях не ранее 20 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(2)	-(3)

Имидаклоприд + Имидаклоприд

Искра Золотая, ВРК, ТАБ (25 г/кг + 200 г/л) ЗАО «ТПК	¼ таблетки/2 л почвы (Л)	Комнатные и балконные цветочные растения	Тли, щитовки, долгоносики	Внесение таблетки под растения с недревесневшими стеблями высотой не более 30-40 см на расстоянии 2-3 см от стебля в предварительно пролитую водой почву	-(1)	1(-)	Активен
--	--------------------------	--	---------------------------	--	------	------	---------

«Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/Л, ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-01-2719-1 30.06.2020 29.06.2030	1 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	20(1)	3(-)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(1)	1(-)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	-(1)	3(-)	
Конрад, КС (600 г/л + 600 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфг. ОГРН: - III/-, Рейнбоу Агросайенс Кфг. ОГРН: - III/- 607-01-3732-1 27.10.2014 23.02.2035	0,3-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Внутривебельные мухи, хлебные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутривебельные мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(1)	
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(1)	
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Внутривебельные мухи, хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	3-6	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-18 л/т	-(1)	-(1)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	5-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутривебельные мухи	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-16 л/т	-(1)	-(1)	
	8-12	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(1)	
Имидаклоприд + Ипродион + Дифеноконазол							
Идикум, СК (100 г/л + 133 г/л + 6,7 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01(02)-2603-1 17.03.2020 16.03.2030	3 - 4,5	Картофель	Ризиктониоз, антракноз, фузариоз, колорадский жук, тли, проволочники	Обработка клубней и дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 50 - 150 л/га	-(1)	-(1)	Активен
Имидаклоприд + пенцикурон							
Престиж, КС (140 г/л + 150 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/-, Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/- 019-02-2401-1 18.09.2019 17.09.2029	1,5-2,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли	Обработка семян до посадки Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(1)	
	0,7-1,0	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней во время посадки Расход рабочей жидкости - 20-30 л/т	-(1)	-(1)	
	2,5-3,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян до посадки Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(1)	

	0,7-1,0	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	-----------	------------------------------------	--	------	------	--

Имидаклоприд + Тебуконазол + Флудиоксонил

Флутеприд, ТС (400 г/л + 30 г/л + 50 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/-, ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/- 156-02-2138-1 05.04.2019 04.04.2029	0,8-1,2	Пшеница озимая, рожь озимая	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Злаковые тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1,2	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,2	Пшеница озимая, рожь озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имидаклоприд + Тиабендазол

Имикар, КС (280 г/л + 80 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/-, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - П/- 010(011)-01(02)-1573-1 05.09.2016 04.09.2026	0,6-0,7	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	-----------	------------------------------------	--	------	------	---------

Индоксакарб

Авант, КЭ (150 г/л) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 П/Л 489-01-2706-1 19.06.2020 18.06.2030	0,17-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная минирующая моль, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	3(4)	Активен
	0,14-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Кукуруза	Озимая совка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	10(2)	3(4)	
	0,14-0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	10(2)	3(4)	
	3,0 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	10(2)	3(4)	
	0,2-0,3	Лук	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(2)	3(4)	
	4,0 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево	10(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(4)	
	3,0 мл/100 м2 (Л)	Лук	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	14(2)	3(4)	
	0,14-0,2	Подсолнечник	Долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(4)	

	0,17-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная минирующая моль, свекловичная минирующая муха, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(4)	
	0,14-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	3(4)	
	0,2-0,25	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	3(4)	
	0,25-0,3	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	10(2)	3(4)	
	0,14-0,2	Свекла сахарная	Щитоноски	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(4)	
	0,14-0,2	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)	3(4)	
	0,2-0,3	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Свекла сахарная	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(4)	
	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	10(2)	3(4)	
	0,17-0,25	Подсолнечник	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(4)	
	3,0 мл/100 м2 (Л)	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	3(2)	3(4)	
Гелифас, КЭ (150 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-4457-1 13.03.2024 12.03.2034	0,35-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	12(2)	3(3)	Активен
	0,14-0,2	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная моль	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	3(3)	
	0,2-0,25	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка, белянка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	3(3)	
	0,25-0,3	Виноград	Листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	12(2)	3(3)	
Индоксакарб + лямбда-цигалотрин							
Промэкс, КЭ (125 г/л + 50 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Л 178-01-4524-1 25.04.2024 24.04.2034	0,2-0,3	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Подсолнечник	Луговой мотылек, хлопковая совка, подсолнечниковая огневка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	-(3)	

0,2-0,3	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, луговой мотылек, хлопковая совка, тли, трипсы, соевая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	-(3)
0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Капустная моль, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	-(3)
0,2-0,3	Свёкла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	14(2)	-(3)
0,2-0,3	Подсолнечник	Подгрызающие совки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)	-(3)
0,2-0,3	Свёкла сахарная	Свекловичные минирующие мухи, луговой мотылек, свекловичная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	-(3)
0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	-(3)
0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)	-(3)

Карбендазим + Тиаметоксам

Доктор Кроп, ТБ, КС (500 г/л + 10 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 И/О, ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - И/И 064-02-2893-1 23.11.2020 22.11.2030	2-3 брикета/растение (Л)	Балконные цветочные растения	Тли, щитовки, белокрылка, червецы, трипсы	Внесение брикетов под растения с неодревесневшими стеблями высотой до 30-40 см на расстоянии 2-3 см от стебля в предварительно политую водой почву	-(1)	-(-)	Активен
	2-5 брикетов/г оршок (Л)	Комнатные растения	Тли, щитовки, белокрылка, червецы, трипсы	Внесение брикетов под растения с неодревесневшими стеблями высотой до 30-40 см на расстоянии 2-3 см от стебля в предварительно политую водой почву	-(1)	-(-)	

Клотианидин

Дракор, ВСК (50 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 И/Л 008-01-3303-1 17.09.2021 16.09.2031	120-180 мл/л (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	3(-)	Активен
	2,5 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	4(1)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Горшечные цветочные растения (кроме комнатных)	Тли, трипсы, белокрылки, личинки почвенных двукрылых	Полив почвы в период вегетации Расход рабочей жидкости - 40 л/40 м2 (1000 горшков)	-(1)	3(-)	
Клотиамет, ВДГ (500 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 И/Л 002-01-4060-1 04.04.2023 03.04.2033	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(1)	3(3)	Активен
	0,05-0,075	Свекла сахарная	Минирующая муха, клопы, листовая тля, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	3(3)	
	0,04-0,06	Томат открытого грунта	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,05-0,075	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	3(3)	

	0,035-0,045	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,25 г/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(1)	3(3)	
	0,03-0,075	Ячмень яровой и озимый	Тли, пшавицы, злаковые мухи, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	3(3)	
	0,03-0,075	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пшавицы, злаковые мухи, трипсы, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	3(3)	
	0,03-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	3(3)	
Клотиапет-С, КС (350 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Л, ООО «АНПП «Агрохим-ХХІ» ОГРН: 1027700119710 П/Л, ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Л 002(023)-01-471-1 15.12.2014 28.08.2035	7-14	Свёкла кормовая и сахарная	Свекловичные блошки и долгоносики, свекловичная минирующая муха	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	7-10	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(1)	
	7-10	Подсолнечник	Проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(1)	
	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	0,2-0,22	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней до или во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т клубней (перед посадкой)	-(1)	-(1)	
	7-10	Подсолнечник	Проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(1)	
	20-22 мл/1л воды(Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л воды/100 кг клубней	-(1)	-(1)	
	7-14	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(1)	
	0,5-1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные блошки, внутрстеблевые двукрылые	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	7-10	Рапс	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(1)	

	0,5-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой и озимый	Хлебные блошки, внутрстеблевые двукрылые	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-1,0	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,22	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней до или во время посадки Расход рабочей жидкости - 25 л/т клубней (при посадке)	-(1)	-(-)	
Такер, КС (600 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 ПП/- 178-01-3853-1 02.11.2022 01.11.2032	0,5-0,7	Пшеница и ячмень озимые	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	4,5 - 6,0	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 14,5- 16 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-0,9	Лен масличный	Льняные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,1 - 0,2	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли, цикадки	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2 - 2,0	Соя	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11- 12 л/т	-(1)	-(-)	
	7,5-8,5	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 17,5-18,5 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-0,7	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Каратель, ВДГ (500 г/кг) ООО «МосАгро» ОГРН: 1057747879342 ПП/Л 175-02-455-1 24.11.2014 23.11.2024	0,2-0,25 г/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(1)	3(-)	Не активен
	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	-(-)	
Бусидо, ВДГ (500 г/кг) ООО «Евро-Семена» ОГРН: - ПП/Л 164-01-478-1 18.12.2014 17.12.2024	7-10	Рапс	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
	0,2-0,25 г/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(1)	3(-)	
Пончо, КС (600 г/л) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - ПП/-, БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - ПП/- 334-01-2791-1/ 23.10.2015 22.10.2025	4,5-6,0	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 16 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	7-10	Подсолнечник	Проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	
	3,0-3,5	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 16 л/т семян	40(1)	-(-)	
	3,0-3,5	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 13,5 л/т семян	40(1)	-(-)	
	7-14	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	
	4,5-6,0	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики	Обработка семян. Расход рабочей жидкости - 13,5 л/т семян	-(1)	-(-)	

Клотианидин Про, КС (350 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/И/ 023-01-1363-1 02.02.2017 023-01-1363-1/412 412 01.02.2027	4,5-6,0	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 16 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	4,5-6,0	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 13,5 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,2	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли – переносчики вирусных заболеваний	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 2-10 л/т	-(1)	-(-)	
	7-10	Подсолнечник	Проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10-17 л/т	-(1)	-(-)	
	7-10	Рапс	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные блошки, внутрстеблевые двукрылые	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	7-14	Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Клотианидин + Bacillus firmus(I-1582)

Пончо Вотиво, КС (508 г/л + 102 г/л) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - П/И/ 334-01-4344-0 28.12.2023 27.12.2026	1,0	Соя	Проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	3,5-4,7	Кукуруза (на зерно)	Проволочники, подгрызающие совки	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)	

Клотианидин + Альфа-циперметрин + Имидаклоприд

Батрайдер, СК (50 г/л + 125 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/И/ 021-01-2591-1 13.03.2020 021-01-2591-1/415 415 12.03.2030	5 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Тли, трипсы, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(3)	Активен
	2 мл/10 л воды (Л)	Смородина черная	Тли, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/ куст	30(1)	-(3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, тли	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	20(1)	-(3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и типа формирования куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	20(1)	-(3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Вишня	Тли, вишневая муха, вишневый долгоносик	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/ дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	20(1)	-(3)	

2 мл/10 л воды (Л)	Вишня	Тли, вишневая муха, вишневый долгоносик	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/ дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	20(1)	-(3)
2 мл/3 л воды (Л)	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период откладки яиц Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(3)
1,5 мл/3 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(1)	-(3)
2 мл/3 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(1)	-(3)
2 мл/10 л воды (Л)	Декоративные кустарники	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/ куст	-(1)	-(3)
2 мл/3 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(3)
2 мл/3 л воды (Л)	Капуста	Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(1)	-(3)
2 мл/10 л воды (Л)	Декоративные деревья	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	-(3)

Клотианидин + Имидаклоприд

Табу Нео, СК (100 г/л + 400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/- 021-01-1804-1 21.04.2015 20.04.2025	0,8-1,2	Соя	Проволочники, долгоносики	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	0,5-1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(1)	
	0,5-1	Пшеница, ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(1)	
	6-8	Подсолнечник, кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(1)	
	6-8	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(1)	
Гаучо Эво, КС (100 г/л + 175 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/- 019-01-2869-1 02.11.2020 01.11.2030	1,5-2,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11,5 л/т семян	-(1)	-(1)	Активен
	1,5-2,0	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица, злаковые мухи, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11,5 л/т семян	-(1)	-(1)	

Клотианидин + Индоксакарб

Кираса, ВДГ (400 г/кг + 130 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 Ш/Л 197-01-3483-1 21.01.2022 20.01.2032	0,04 - 0,075	Кукуруза (на зерно и масло)	Озимая совка, стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(1)	-(3)	Активен
	0,04-0,05	Соя	Многоядные совки, бобовая огневка, соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,04 - 0,075	Рапс яровой и озимый	Капустная моль, капустная совка, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,04 - 0,075	Подсолнечник (на семена и масло)	Долгоносики, подгрызающие совки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	

Клотианидин + лямбда-цигалотрин

Гладиатор Супер, КС (140 г/л + 100 г/л) ООО «АНИП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/Л 023-01-1334-1 20.01.2017 19.01.2027	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветныеблоск и	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	38(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, пшеничный трипс, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,15-0,25	Соя	Клубеньковыйдолгон осик	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Соя	Многолетние совки, бобовая огневка, соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Восторг, КС (140 г/л + 100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/Л 082-01-1527-1 20.07.2017 19.07.2027	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	3(3)	Активен
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	38(2)	3(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	3(3)	
	0,15-0,25	Соя	Клубеньковый долгоносик	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	3(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	3(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, пшеничный трипс, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	3(3)	
	0,15-0,25	Соя	Многолетние совки, бобовая огневка, соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(3)	

Клотианидин + Тиабендазол + Тебуконазол

Нагайна, КС (390 г/л + 40 г/л + 30 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/- 178-01(02)-3957-1 20.01.2023 19.01.2023	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница, ячмень озимые	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	

Клотианидин + флуоксастробин + Флуопиклолид

Модесто Плюс, КС (300 г/л + 90 г/л + 120 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/- 019-02-1151-1 11.07.2016 019-02-1151-1/335 335 10.07.2026	12,6-16,8	Подсолнеч ник	Проволочники, ложно-проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно до 1 года) Расход рабочей жидкости - 25 л/т (включая расход препарата)	-(1)	-(-)	Активен
	15-16,6	Рапс яровой, озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 26,6 л/т	-(1)	-(-)	

Клофентезин

Аполло, КС (500 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-01-4643-1 23.07.2024 22.07.2034	0,2-0,4	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04% Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	60(2)	7(3)	Активен
	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	60(2)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Горшечные цветочные растения открытого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/100 м2	-(2)	3(-)	
	0,3-0,6	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	30(2)	3(-)	
	0,2-0,6	Огурец защищенного грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,02% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	2(2)	7(3)	
	0,2-0,6	Томат защищенного грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,02% Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	4(2)	7(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/100 м2	-(2)	3(-)	

Люфенурон

ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-01-4413-0 15.02.2024 14.02.2027	0,5	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период массовой откладки яиц Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	7(3)	Активен
	1	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массовой откладки яиц Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	30(2)	7(3)	
	0,3	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период массовой откладки яиц Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	7(3)	

Люфенурон + Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин

Эфория Топ, МКС (75 г/л + 150 г/л + 100 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Л 041-01-3488-1 24.01.2022 041-01-3488-1/442 442 23.01.2032	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Полосатая хлебная блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	31(2)	-(3)	Активен
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Полосатая хлебная блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	31(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	31(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	31(1)	-(3)	
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная минирующая моль, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пшеничный трипс, пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	31(2)	-(3)	
	0,2-0,25	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)	-(3)	

	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	31(2)	-(3)	
--	---------	------------------------	--------------------------------------	---	-------	------	--

Люфенурон + Феноксикарб

Люфокс, КЭ (30 г/л + 75 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-01-2538-1 03.03.2020 02.03.2030	0,8-1,2	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(3)	-(3)	Активен
	0,8-1,2	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	35(3)	-(3)	

лямбда-цигалотрин

Самум, КЭ (50 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Л 002-01-3083-1 01.04.2021 31.03.2031	0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	Активен
	0,15-0,2	Ячмень яровой и озимый	Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	-(4)	
	0,1-0,15	Лен - долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(4)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(4)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые нестадные, саранчовые стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(4)	
	0,15	Свекла сахарная	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
Алтын, КЭ (50 г/л) ООО «Резерв» ОГРН: 1082224012738 П/Л 130-01-3344-1 25.10.2021 24.10.2031	0,2-0,4	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	Активен
	0,15	Пшеница яровая, озимая	Клоп вредная черепашка, тли, цикадки, пьявица, пшеничный трипс, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(4)	

	0,1-0,15	Лен-масличный, лен-долгунец	Блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	-(4)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	12(2)	-(4)	
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	27(1)	-(4)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестадные, саранчовые стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	
Бререр, КЭ (50 г/л) ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 П/Л 347-01-3068-1 19.03.2021 18.03.2031	0,15	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, пядица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,15	Ячмень яровой	Шведские мухи, пядица, пшеничный трипс, стеблевой хлебный пилильщик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,15	Пшеница яровая	Хлебные жуки, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
Каратошанс, КЭ (50 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-4022-1 14.03.2023 126-01-4022-1/491 491 13.03.2033	0,4 мл/м2	Незагруженные складские и производственные помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий	Насекомые-вредители и запасы	Опрыскивание. Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 1 сутки после обработки при условии отсутствия лямбда-цигалотрина в воздухе рабочей зоны или его содержание не превышает ориентировочный безопасный уровень воздействия в воздухе рабочей зоны (0,1 мг/м3) Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2.	-(1)	1(1)	Активен
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1	Пшеница	Вредная черепашка, тли, пядица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4	Яблоня, груша	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	7(3)	
	0,2-0,4	Соя	Соевая плодожорка, клубеньковые долгоносики, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	50(2)	7(3)	
	0,15-0,2	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	

	0,8 мл/м2	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	Насекомые-вредители и запасы	Опрыскивание Расход рабочей жидкости - 200 мл/м2	-(1)	1(1)	
	0,15-0,2	Ячмень	Тли, пяденицы, трипсы, злаковые мухи, стеблевые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичная листовая тля	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1-0,125	Горох	Тли, клубеньковые долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
Карачар, КЭ (50 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/П 018-01-3146-1 18.05.2021 17.05.2031	0,1-0,15	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	21(2)	3(3)	Активен
	0,4	Вишня (маточники)	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	-(3)	3(3)	
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
	0,1-0,15	Лен - долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	3(3)	
	1,0-1,5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	21(2)	3(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	21(2)	3(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Паутинные клещи, коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от типа формирования куста и облиственности) Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст (в зависимости от типа формирования куста и облиственности)	30(2)	3(3)	
	0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	21(2)	3(3)	
	0,4	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	3(3)	
	0,32-0,48	Виноград	Коричнево-мраморный клоп, паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	30(2)	3(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Вишня (маточники)	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-4 л/дерево (в зависимости от объема кроны)	-(3)	3(3)	

	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	3(3)	
Кунгфу, КЭ (50 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 Ш/Л, Агрия АД ОГРН: - Ш/Л 184(026)-01-2273-1 17.06.2019 184(026)-01-2273-1/405 405 16.06.2029	0,1-0,125	Горох	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(4)	Активен
	0,1	Горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	56(1)	7(4)	
	0,1-0,125	Горох	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	7(4)	
	0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(4)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, люцерновая толстоножка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(4)	
	0,2-0,4	Неплодоно- сящие сады, лесозащит- ные полосы	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки. Срок сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	7(4)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенны- е саранчовы- ми, дикая растительн- ость	Саранчовые нестадные	Опрыскивание в период развития личинок.Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки. Срок сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(4)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	7(4)	
	0,1	Капуста	Капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	7(4)	
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	7(4)	
	0,5	Земляника (маточник и)	Паутинный клещ, тли, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	-(2)	7(4)	
	0,15	Ячмень	Злаковые мухи, пьявицы, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(4)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	56(2)	7(4)	
	0,3	Крыжовни- к (маточник и)	Паутинный клещ, тли, пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-800 л/га	-(2)	7(4)	

	0,4	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые стадные (личинки старших возрастов и личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок.Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки. Срок сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях – не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(4)	
	0,1	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(1)	7(4)	
	0,4	Вишня (маточники)	Паутинный клещ, тли,листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(2)	7(4)	
	0,1-0,15	Лен - долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	7(4)	
	0,4	Малина (маточники)	Паутинный клещ, тли,листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-800 л/га	-(2)	7(4)	
	0,3-0,4	Смородина (маточники)	Паутинный клещ, тли,листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-800 л/га	-(2)	7(4)	
	0,4	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	28(2)	7(4)	
Лассо, КЭ (50 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/Л 082-01-3049-1 15.03.2021 14.03.2031	0,4	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	Активен
	0,2	Пшеница озимая и яровая	Хлебные жуки, блошки, трипсы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(4)	
	0,4	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(2)	-(4)	
	0,15-0,2	Ячмень озимый и яровой	Мухи, пяденица, цикадки, тли, трипсы, стеблевые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	
	0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, тли, пяденица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый на зерно	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	
Лямбда-С, КЭ (50 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/Л, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/Л 004(549)-01-5024-1 20.03.2020 19.03.2030	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	Активен
	0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, тли, мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	
Молния, КЭ (50 г/л)	0,15	Сахарная свекла	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	10(4)	Активен

ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/Л 046-01-4281-1 04.12.2023 03.12.2033	0,15	Сахарная свекла	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	14(1)	10(4)	
	0,15-0,2	Ячмень озимый и яровой	Мухи, пяденица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	28(2)	10(4)	
	0,1 - 0,15	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	10(4)	
	0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, тли, пяденица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	28(2)	10(4)	
	0,2	Пшеница озимая и яровая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	28(1)	10(4)	
Сенсей, КЭ (50 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Л, АО «Группа компаний «ПРОАГРО» ОГРН: 1157746875109 П/Л 010(535)-01-2646-1 13.04.2020 12.04.2030	0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пяденица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	Активен
	0,15-0,2	Ячмень яровой и озимый	Мухи, пяденица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	-(4)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(4)	
Спарвиэро, МКС (100 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - П/Л 528-01-3552-1 21.03.2022 20.03.2032	0,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	28(2)	3(3)	Активен
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	3(3)	
	0,07-0,1	Пшеница озимая и яровая	Хлебные жуки, полосатая хлебная блошка, клоп вредная черепашка, тли, трипсы, пяденицы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации (озимые опрыскивают весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	3(3)	
	0,05-0,1	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,05-0,07	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль, рапсовый листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	3(3)	
Оперкот, КЭ (50 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Л 063-01-2413-1 30.09.2019 29.09.2029	0,15	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,2	Пшеница озимая и яровая	Хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,2	Пшеница озимая и яровая	Полосатая хлебная блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Тли, пяденица, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	

Гладиатор, КЭ (50 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/Л, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 П/Л 023(197)-01-2851-1 22.10.2020 21.10.2030	0,15	Ячень яровой и озимый	Злаковые мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	Активен
	0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(4)	
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, толстоножка люцерновая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(4)	
	0,1-0,15	Лен - долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(4)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительн ость, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (пастбища и дикая растительность) – не ранее 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	
	0,4	Пастбища, дикая растительн ость, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые стадные (личинки старших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (пастбища и дикая растительность) – не ранее 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	
	0,4	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	-(4)	
	0,1	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(4)	
	0,32-0,48	Виноград	Листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(2)	-(4)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(4)	
	0,1	Горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(4)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительн ость, участки, заселенны е саранчовы ми	Саранчовые нестадные	Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (пастбища и дикая растительность) – не ранее 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(4)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(4)	

Брейк, МЭ (100 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/И 021-01-2846-1 16.10.2020 15.10.2030	0,05-0,07	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	7(3)	Активен
	0,07	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, свекловичные блошки, свекловичные тли	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)	7(3)	
	0,05-0,07	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	50(1)	7(3)	
	0,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	30(2)	7(3)	
	0,07-0,1	Капуста	Капустная моль, капустная совка, репная белянка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	
	0,1-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые (личинки старших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	
	0,07-0,1	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	
	0,07	Овес	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(3)	
	0,07-0,1	Лук	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(2)	7(3)	
	0,07-0,1	Кукуруза	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	
	0,15-0,2	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(2)	7(3)	
	0,07	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(3)	
	0,05-0,07	Лён-долгунец	Блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)	
	0,07-0,1	Ячмень	Злаковые мухи, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(3)	
	0,07	Люцерна	Долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)	
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Хлебные жуки, листовые блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	7(3)	
	0,16-0,24	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	30(2)	7(3)	
	0,05-0,06	Горох, горох овощной	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля, клубеньковые долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	7(3)	

	0,05-0,07	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	
	0,05	Горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	7(3)	
	0,07-0,1	Свекла сахарная и кормовая	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	
Гедeon, КЭ (50 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфг. ОГРН: - П/П 607-01-3730-1 28.04.2015 27.04.2025	0,15	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	5(2)	-(3)	
	0,2	Пшеница	Хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(1)	-(3)	
Дипломат, КЭ (50 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-01-782-1 11.09.2015 10.09.2025	0,15	Ячмень	Клоп вредная черепашка, тли, пядицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,2	Пшеница	Хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
Гранулам, ВДГ (240 г/кг) СУЛФУР МИЛЛЗ ЛИМИТЕД ОГРН: - П/П 452-01-1598-1 21.11.2017 20.11.2027	0,04	Пшеница озимая	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,03-0,04	Ячмень	Злаковые мухи, пядица, пыльные, стеблевые пилильщики.	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	-(3)	
	0,04	Пшеница яровая	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	50(1)	-(3)	
	0,04	Пшеница яровая и озимая	Хлебные жуки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	

	0,03	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	-(3)	
Торег, КЭ (50 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 П/Л 148-01-2028-1 25.10.2018 24.10.2028	0,2	Пшеница	Полосатая хлебная блошка, стеблевая блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	52(2)	3(3)	Активен
	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	52(2)	3(3)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(2)	3(3)	
	0,15-0,2	Ячмень	Злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, стеблевой пилильщик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	52(2)	3(3)	
	0,15	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	52(2)	3(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	3(3)	
Цепеллин Эдванс, КЭ (50 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Л 178-01-2754-1 10.07.2020 09.07.2030	0,1-0,125	Горох	Тли, плодоярка, зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(2)	-(3)	
	0,4	Соя	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявицы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	48(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики, в т.ч. долгоносик-стеблеед, минирующая муха, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи, стеблевые пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1-0,125	Горох	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,2	Картофель	Тли, цикадки – переносчики вирусов	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,2	Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	

Эрколе, Г (4 г/кг) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - П/Л 528-01-3703-1 06.06.2022 05.06.2032	15	Подсолнечник на семена и масло	Проволочники, ложно-проволочники, подгрызающие совки	Внесение в почву одновременно с посевом культуры	60(1)	-(-)	Активен
	15	Кукуруза на зерно и масло	Проволочники, ложно-проволочники	Внесение в почву одновременно с посевом культуры	60(1)	-(-)	
Карагэ Зеон, МКС (50 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Л 041-01-1770-1 26.02.2018 25.02.2028	0,2	Кукуруза (на зерно)	Кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(4)	Активен
	0,1-0,2	Морковь	Морковнаялистоблошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	10(4)	
	0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(4)	
	0,2-0,3	Кукуруза (на зерно)	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	30(1)	10(4)	
	0,2-0,25	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	10(4)	
	0,1-0,125	Горох	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(4)	
	0,2-0,3	Пастбища	Луговой мотылек	Опрыскивание в период развития личинок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(-1)	10(4)	
	0,1	Капуста	Капустная белянка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(4)	
	0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	10(4)	
	0,1	Томат	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(4)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(4)	
	0,2	Картофель	Тли, цикадки – переносчики вирусов	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(1)	10(4)	
	0,3-0,4	Лук (кроме лука на перо)	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	25(2)	10(4)	
	0,15-0,2	Ячмень озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	20(2)	10(4)	
	0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	20(2)	10(4)	
	0,2	Пшеница	Трипсы, злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	10(4)	
	0,32-0,48	Виноград	Клещ паутинный	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(2)	10(4)	

0,4	Томат	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(4)
0,1	Пшеница	Злаковые галлицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	10(4)
0,15-0,2	Лук (кроме лука на перо)	Табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	25(2)	10(4)
0,4	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	10(4)
0,15-0,2	Ячмень озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(4)
0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(1)	10(4)

лямбда-цигалотрин + Ацетамиприд

Гарпун, КС (106 г/л + 115 г/л) ООО ТетраХим ОГРН: 1167746491681 П/Л 642-01-2954-1 24.12.2020 23.12.2030	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой	Пьявица, стеблевые пилильщики, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, хлебные блошки, пшеничные трипсы, тли, внутрестеблевые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Горох, нут	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Соя	Бобовая огневка, соевая плодоярка, клубеньковый долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)	

лямбда-цигалотрин + Ацетамиприд + Тиаметоксам

Гоплит, КС (115 г/л + 95 г/л + 65 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-4699-1 23.10.2024 22.10.2034	0,1-0,2	Яблоня	Яблонный цветоед, яблонная плодоярка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(1)	3(3)	Активен
	0,1-0,2	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	3(3)	
	0,1-0,2	Горох	Гороховая зерновка, плодоярка, тли, клубеньковые долгоносики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, луговой мотылек, совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(1)	3(3)	

0,1-0,2	Картофель	Картофельная моль, колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(1)	3(3)	
0,1-0,2	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Хлебные блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пядица, хлебные жуки, клоп вредная черепашка, пилильщики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(1)	3(3)	
0,1-0,2	Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой мотылек, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	3(3)	
0,1-0,2	Лук репчатый	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(1)	3(3)	
0,1-0,2	Капуста кочанная	Крестоцветные блошки, капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	3(3)	
0,1-0,2	Соя	Гороховая зерновка, плодожорка, тли, клубеньковые долгоносики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	3(3)	

лямбда-цигалотрин + ацетамиприда

<p>Органза, КС (100 г/л + 100 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/П 192-01-1371-0 21.02.2024 192-01-1371-1/402 402 20.02.2027</p>	0,15-0,2	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пшеничные трипсы, внутрстеблевые двукрылые и злаковые тли, хлебные блошки, пядица, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,3	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, скрытнохоботник рапсовый семенной, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)	

лямбда-цигалотрин + Имидаклоприд

<p>Борей, СК (50 г/л + 150 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-2845-1 16.10.2020 15.10.2030</p>	0,12-0,14	Морковь	Морковная листовая блошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	7(3)	Активен
	0,2	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	7(3)	
	0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	30(2)	7(3)	
	0,08-0,1	Рапс	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	7(3)	
	0,1-0,14	Капуста	Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки, капустная тля, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	7(3)	
	0,08-0,1	Пшеница	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)	7(3)	
	0,12-0,15	Горох, горошек овощной	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	7(3)	

	0,08-0,1	Ячмень	Пьявицы, злаковые мухи, пшеничный трипс, стеблевые хлебные пилильщики, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(3)	
	0,08-0,12	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)	
	0,1	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, листовые хлебные блошки	Авиационное опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	28(2)	7(3)	
	0,08-0,12	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,12-0,14	Лук	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(2)	7(3)	
	0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	30(2)	7(3)	
	0,1	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Авиационное опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	7(3)	
	0,08-0,1	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, листовые хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(3)	
	0,1-0,12	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	7(3)	
	0,1-0,12	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,08-0,1	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	38(2)	7(3)	
	0,2-0,25	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(2)	7(3)	
Канонир Дуо, КС (100 г/л + 300 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/И 278-01-4110-1 14.03.2016 13.03.2026	0,04-0,12	Пшеница	Злаковые мухи, трипсы, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен

Имидашанс Плюс, СК (50 г/л + 150 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-1500-1 16.05.2017 126-01-1500-1/471 471 15.05.2027	0,08-0,1	Пшеница яровая, озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,08-0,1	Рапс	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	-(3)	
	0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	10(2)	-(3)	
	0,08-0,1	Ячмень яровой	Пьявицы, шведские мухи, пшеничный трипс, стеблевые пилильщики, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,1	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,08-0,1	Пшеница яровая, озимая	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Оперкот Акро, КС (100 г/л + 300 г/л) ООО «ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Л 063-01-1766-1 22.02.2018 21.02.2028	0,04-0,05	Рапс яровой	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	47(1)	-(3)	Активен
	0,04-0,05	Пшеница озимая	Злаковые тли, трипсы, клоп вредная черепашка	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(1)	-(3)	

лямбда-цигалотрин + Клотиадин

Клотиамет Дуо, КС (100 г/л + 140 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Л, ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/Л 002(023)-01-648-1 27.04.2015 26.04.2025	0,15-0,25	Соя	Многолетние сорняки, бобовая огневка, соевая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,15-0,25	Соя	Клубеньковый долгоносик	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	38(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	

	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	38(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, пшеничный трипс, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
Кастра, КС (100 г/л + 140 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 И/Л 682-01-4629-1 04.07.2024 03.07.2034	0,1-0,15	Зерновые колосовые яровые, за исключени ем овса	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов осенью Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Зерновые колосовые озимые, за исключени ем овса	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,15-0,25	Соя	Клубеньковый долгоносик, многолетние совки, бобовая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	

лямбда-цигалотрин + Тиаметоксам

Готика, КС (106 г/л + 141 г/л) ООО «Тотус» ОГРН: 1104632010933 И/Л 181-01-3292-1 21.09.2021 20.09.2031	0,1-0,15	Соя	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	28(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,2	Ячмень яровой	Цикадки, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	50(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Подсолнечник	Долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	24(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой	Цикадки, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Рапс яровой	Рапсовый листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	41(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	50(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Кукуруза	Коричнево-мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Вредная черепашка, трипсы, пьявицы, злаковых мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	50(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Горох	Гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	21(2)	-(3)	

0,1-0,15	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	60(1)	-(3)
0,05-0,1	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	41(2)	-(3)
0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка, хлебные жуки, цикадки, трипсы, пьявицы, злаковые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)
0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка, хлебные жуки, цикадки, трипсы, пьявицы, злаковые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	50(1)	-(3)
0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Вредная черепашка, трипсы, пьявицы, злаковых мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)
0,15-0,2	Подсолнечник	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	28(1)	-(3)
0,1-0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	28(1)	-(3)
0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	50(1)	-(3)
0,1-0,15	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	28(1)	-(3)
0,2-0,3	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	21(2)	-(3)
0,15-0,2	Подсолнечник	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	28(1)	-(3)
0,1-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)
0,1-0,2	Нут	Акациевая (бобовая) огневка, нутовый минер	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	21(2)	-(3)
0,1-0,2	Соя	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(1)	-(3)
0,2-0,3	Нут	Гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	21(2)	-(3)
0,1-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,1-0,2	Нут	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)	-(3)

0,1-0,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	41(2)	-(3)	
0,05-0,1	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	41(2)	-(3)	
0,1-0,2	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, коричневомраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	28(1)	-(3)	
0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	24(1)	-(3)	

лямбда-цигалотрин + Хлорантранилипрол

Амплиго, МКС (50 г/л + 100 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Л 041-01-1427-1 29.03.2017 041-01-1427-1/216 216 28.03.2027	0,2-0,3	Кукуруза	Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	55(2)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Подсолнечник	Хлопковая совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	50(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Кукуруза	Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	55(2)	-(3)	
	0,3-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Кукуруза	Кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	55(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Капуста	Капустная тля, капустная совка, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Подсолнечник	Хлопковая совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	-(3)	

Магния фосфид

Магна, ТАБ (660 г/кг) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 И/- 148-01-2000-1 25.09.2018 24.09.2028	6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°C. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция до 2 суток. ПКЭ-7 г ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен
	5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция до 2 суток. ПКЭ 7 г ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(-)	-(-)	

	6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые вредители запасов(кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ 7 г ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности продукта, и 25 г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности продукта. Дегазация не менее 2-3 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в	-(-)	-(-)	
	6 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые вредители запасов(кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и зерна выше 15 °С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция до 3-х суток. ПКЭ 7 г ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна. ПКЭ – 25 г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Проветривание в рейсе или на рейде перел разгрузкой	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые вредители запасов(кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3 суток. ПКЭ 7 г ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна. ПКЭ – 25 г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Дегазация вагона перел разгрузкой не	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые вредители запасов(кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. В складах погружение таблеток в зерновую массу с помощью специальных зондов. В элеваторах внесение таблеток или гранул в поток зерна с помощью автоматических дозаторов. Для затаренного зерна-раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ 7 г ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г ч/м3 для насекомых образующих	-(1)	-(-)	
Магнифос, ТАБ (660 г/кг) ООО «Русинвест» ОГРН: 1057746502604 И/- 092-01-2135-1 04.03.2019 03.03.2029	6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 150С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ 7 г*ч/м3 для муки и 25 г*ч/м3 для крупы. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен

9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 150С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 25 г*ч/м3. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре зерна выше 150С. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ – 25 г*ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 150С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ – 450 г*ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 150С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ – 450 г*ч/м3. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
5 г/м3	Незагруженные зернохранилища	Насекомые – вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 150С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ – 450 г*ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта от 5 до 150С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ – 450 г*ч/м3 (гибель яиц клещей до 95%). Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 150С. Экспозиция – 10 суток. ПКЭ – 450 г*ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования	Насекомые-вредители и запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта от 5 до 150С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый грузочный люк вагона. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ – 100 г*ч/м3 (гибель преимагинальных стадий 90%). Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	

Магния фосфид + Магния фосфид

<p>Магтоксин, ТАБ, пластины/л (660 г/кг + 560 г/кг) Детиа Дегеш ГмбХ ОГРН: - И/-, Детиа Дегеш ГмбХ ОГРН: - И/- 057-01-2020-1 18.10.2018 17.10.2028</p>	5 г/м3	Зерноперерабатывающие предприятия	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха в помещениях выше 15°С. Раскладка пластин и лент равномерно по помещениям. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 7 г*ч/м3. Дегазация – не менее 2 суток. Допуск людей и загрузка складов и бункеров после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	Активен
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное, насыпью в силосах элеваторов (партии массой не более 200 т, насыпью до 2,5 м) и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°С. В элеваторах – введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. Под пленкой – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 25 г*ч/м3. Дегазация – не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	
	6 г/м3	Крупа в складах или под пленкой	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°С. Раскладка пластин и лент равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 7 г*ч/м3 для крупы с раздробленными зернами и 25 г*ч/м3 для крупы с цельными зернами. Дегазация – не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)	

6 г/м3	Мука в складах или под пленкой	Насекомые–вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Раскладка пластин и лент равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 7 г·ч/м3. Дегазация – не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Древесина под пленкой или в других герметичных емкостях	Насекомые–вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Раскладка пластин и лент равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ - не менее 25 г·ч/м3. Дегазация – не менее суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)
6 г/м3	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Погружение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газонепроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 (150 г (50 таблеток) и 600 г зерна) по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 25 г·ч/м3. Проветривание в рейсе и на рейде перед разгрузкой не менее часа. Дегазация зерна после разгрузки не менее 8 суток. Реализация при остатке фосфина в зерне не выше МДУ.	-(1)	-(-)
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное, насыпью в вагонах в пути следования	Насекомые–вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°C. Погружение пластин/лент в зерно равномерно по длине вагона на глубину 1 м. Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 25 г·ч/м3. Дегазация – не менее 8 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)	-(-)

Малатион

<p>Алиот, КЭ (570 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-4205-1 20.09.2023 19.09.2033</p>	0,6-1,0 л/га	Соя (семенные посевы)	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,5-1,2 л/га	Пшеница яровая и озимая	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-1,0 л/га	Рапс яровой и озимый (на семенные и технические цели)	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5 л/га	Подсолнечник (семенные посевы)	Хлопковая совка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,8 л/га	Лен масличный (на семенные и технические цели)	Льняная плодожорка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	

	1,5 л/га	Картофель (семенные посадки)	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8 мл/м2	Незагруженные складские помещения	Вредители запасов	Опрыскивание. Допуск людей и загрузка складов после проветривания в течение 1 суток Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5 л/га	Кукуруза (семенные посевы)	Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный стеблевой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Искра М, КЭ (525 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 И/Л 046-01-3587-1 06.04.2022 05.04.2032	2-2,6	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	10(4)	Активен
	0,2-0,6	Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы)	Тли, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
	0,5-1,2	Ячмень яровой и озимый	Злаковые тли, пшеничные трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	10(4)	
	0,5-1,2	Пшеница яровая и озимая	Злаковые тли, пшеничные трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	10(4)	
Карбофот, КЭ (500 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 И/Л 197-01-2600-1 16.03.2020 15.03.2030	0,5-1,2	Горох (кроме сахарных сортов)	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание во время вегетации при массовой яйцекладке с интервалом между обработками 7 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,5-1,2	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, рапсовый листоед, рапсовый цветоед, капустная моль, крестоцветные блошки	Опрыскивание во время вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
Фуфанон, КЭ (570 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - И/Л 058-01-190-1 18.12.2013 17.12.2023	0,5-1,2	Зерновые культуры	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	10(4)	Не активен
	1	Неплодоносящие сады	Клещи, тли, листовертки, медяница, моли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(4)	10(4)	
	1-2,6	Смородина	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(1)	10(4)	
	1	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га	20(2)	10(4)	
	1-1,4	Облепиха (школка)	Галловый клещ, медяница, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-800 л/га	-(3)	10(4)	
	0,4-0,8	Лен технический	Льяная плодожорка, совка-гамма, льяной трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	

	0,2-0,6	Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(4)	
Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/Л 058-01-1537-1 09.08.2017 08.08.2027	1,3-1,7	Смородин а	Тли, моль смородиновая почковая, галлицы, листовёртки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	20(2)	10(3)	Активен
	1,3	Неплодоносящие сады	Клещи, тли, листовёртки, яблонная медяница, минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(4)	10(3)	
	0,7-1,6	Пшеница, ячмень	Тли, пшеничный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	10(3)	
	0,7-1,6	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, тли, бобовая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	1,15	Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, земляничный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	20(2)	10(3)	
	1,5-4,5	Огурец защищен-ного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	1(1)	3(3)	
	0,8-1,6	Томат открытого грунта	Клещи, тли, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	0,6-0,8	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	10(3)	
	0,5-1	Лен - долгунец	Льняная плодоярка, совка-гамма, льняной трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	10(3)	
	1,3-1,6	Свекла сахарная	Клопы, минирующие муха и моль, цикадки, свекловичная тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	1,3	Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодоярки, пилильщики, вишневая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	20(2)	10(3)	
	1,3	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли, долгоносики, плодоярки, листовёртки, яблонная медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	20(2)	10(3)	
	1,5-4,5	Томат защищен-ного грунта	Клещи, трипсы, тепличная белокрылка, пасленовая минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	3(3)	
	1,3-1,8	Облепиха (школка)	Галловый клещ, медяница, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	10(3)	
	0,8-1,6	Огурец открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
	1,3-3,4	Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли, клещи	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	-(2)	10(3)	

0,8-1,6	Капуста	Белянки, капустные совки, моли, тли, трипсы, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	20(2)	10(3)	
0,8-1,3	Соя	Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	10(3)	
0,7-1,6	Кукуруза	Тля листовая, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	10(3)	
0,8-1	Подсолнечник	Клопы, тли	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	40(2)	10(3)	
1,3-1,7	Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	20(2)	10(3)	
1,3	Виноград	Клещи, мучнистый червец	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	20(2)	10(3)	
0,8-1	Рапс	Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, клопы, капустная моль, листоеды	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	10(3)	
0,3-0,8	Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	- (2)	10(3)	

Малатион + циперметрин

<p>Инта-Ц-М, ТАБ (140 г/кг + 29 г/кг) ЗАО «ПРОМЭКС» ОГРН: - Ш/Л 328-01-812-1 20.10.2015 19.10.2025</p>	1 таб./10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Яблонный цветоед, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяницы, пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево в зависимости от возраста и сорта	30(2)	3(-)	Активен
	1 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/10 м ²	5(1)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Смородина черная и красная, крыжовник	Тли, листовертки, пилильщики, огневки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст	20(2)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Картофель	Картофельная моль, колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(2)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Слива, вишня	Тли, плодожорки, пилильщики, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево в зависимости от возраста и сорта	30(2)	3(-)	
	2 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/10 м ²	5(1)	3(-)	
<p>Карбоцин, ТАБ (140 г/кг + 29 г/кг) ООО «ПРОМТЕХ-СП» ОГРН: 1125042005032 Ш/Л 441-01-1513-1 31.05.2017 30.05.2027</p>	1 таб./10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Яблонный цветоед, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяницы, пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево в зависимости от возраста и сорта	30(2)	3(-)	Активен
	1 таб./10 л воды (Л)	Слива, вишня, черешня	Тли, плодожорки, пилильщики, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево в зависимости от возраста и сорта	30(2)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Картофель	Картофельная моль, колорадский жук, картофельная коровка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(2)	3(-)	

1 таб./10 л воды (Л)	Смородин а черная и красная, крыжовник	Тли, плодожорки, пилильщики, листовёртки, огневки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст	20(2)	3(-)	
2 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/10 м2	5(1)	3(-)	
1 таб./10 л воды (Л)	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	25(2)	3(-)	
1 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/10 м2	5(1)	3(-)	

Матрин

МатринБио, ВР (5 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-01-2672-1 13.05.2020 021-01-2672-1/341 341 12.05.2030	1-1,5	Салат	Тли, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)	Активен
	10-15 мл/3 л воды (Л)	Спаржа	Спаржевый листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)	
	1-1,5	Капуста пекинская	Крестоцветные блошки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)	
	1-1,5	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	3(3)	1(1)	
	10-15 мл/10 л воды (Л)	Смородин а	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	3(3)	1(-)	
	10-15 мл/3 л воды (Л)	Салат	Тли, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)	
	1-1,5	Соя	Паутинный клещ, клопы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	1(1)	
	10-15 мл/3 л воды (Л)	Капуста пекинская	Крестоцветные блошки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)	
	1-1,5	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	3(3)	1(-)	
	1-1,5	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)	
	10-15 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(-)	
	1-1,5	Роза защищенного грунта	Паутинный клещ, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	-(3)	1(-)	
	10-15 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	1(-)	
	10-15 мл/10 л воды (Л)	Роза защищенного грунта	Паутинный клещ, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	1(-)	
	10-15 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	1(-)	

1-1,5	Лук	Луковая муха, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)
10-15 мл/3 л воды (Л)	Лук	Луковая муха, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)
1-1,5	Роза открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
10-15 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)
1-1,5	Спаржа	Спаржевый листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)
1-1,5	Огурец открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	1(1)
1-1,5	Томат открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	1(1)
10-15 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	3(3)	1(-)
1-1,5	Виноград	Гроздевая листовёртка, войлочный клещ (зудень), паутинный клещ, трипсы, цикадки, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	3(3)	1(1)
10-15 мл/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Клещи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)
1-1,5	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	3(3)	1(-)
1,5 мл/л воды (Л)	Комнатные растения	Паутинный клещ, тли	Опрыскивание при появлении вредителей Расход рабочей жидкости - 50-500 мл/растение в зависимости от размера	-(3)	1(-)
10-15 мл/3 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)
10-15 мл/3 л воды (Л)	Шпинат	Тли, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)
10-15 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовёртка, войлочный клещ (зудень), паутинный клещ, трипсы, цикадки, совки	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и типа формирования куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	3(3)	1(-)
1-1,5	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)
1-1,5	Шпинат	Тли, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	-(1)

	10-15 мл/3 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	3(3)	1(-)	
МатринБио БАУ, ВР (0,025 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП 021-01-4440-1 05.03.2024 04.03.2024	700 мл/25 м2	Земляника	Земляничный клещ, земляничный листоед	Опрыскивание с помощью флакона с курковым распылителем с готовым рабочим раствором в период вегетации при появлении вредителей	3(3)	1(-)	Активен
	700 мл/10-30 растений	Огурец, томат защищенного грунта	Паутинный клещ, тепличная белокрылка, трипсы	Опрыскивание с помощью флакона с курковым распылителем с готовым рабочим раствором в период вегетации при появлении вредителей	3(3)	1(-)	
	700 мл/4-8 кустов	Смородина	Клещи, тли	Опрыскивание с помощью флакона с курковым распылителем с готовым рабочим раствором в период вегетации при появлении вредителей	3(3)	1(-)	
	700 мл/10-30 растений	Цветочные и декоративные растения, в том числе луковичные	Паутинный клещ, тли, трипсы, листогрызущие гусеницы	Опрыскивание с помощью флакона с курковым распылителем с готовым рабочим раствором в период вегетации при появлении вредителей	3(3)	1(-)	
	700 мл/10-30 растений	Комнатные растения	Паутинный клещ, тли	Опрыскивание с помощью флакона с курковым распылителем с готовым рабочим раствором в период вегетации при появлении вредителей	3(3)	1(-)	

Метилбромид

Метабром-РФО, Газ (980 г/кг) ФГУП «Республиканский фумигационный отряд» ОГРН: - И/- 117-22-1518-1 31.07.2017 30.07.2027	20-25 г/м3	Древесина и тара	Вредители растений, возбудители болезней растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с режимами указанными в «Методических указаниях по фумигации леса и лесоматериалов, отгружаемых на экспорт» (утверждены Госинспекцией по карантину растений Российской Федерации, 2002 г.). Допуск людей после дегазации возможен только после достижения концентрации бромистого метила в воздухе и внутри продукции уровня ПДК (или ниже) для воздуха рабочей	-(1)	Регламентируются требования дегазации(Регламентируются требования дегазации)	Активен
	20-25 г/м3	Продовольственное сырье	Вредители растений, возбудители болезней растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с «Временной инструкцией по обеззараживанию бромистым метилом свежих фруктов косточковых и семечковых пород от американской белой бабочки, восточной плодожорки и персиковой плодожорки» (Министерство сельского хозяйства СССР, 1968 г.).Реализация продукции на территории Российской Федерации при содержании неорганических бромидов не выше МЛУ. Допуск людей	-(1)	Регламентируются требования дегазации(Регламентируются требования дегазации)	

20-25 г/м3	Посадочный материал	Вредители растений, возбудители болезней растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с режимами установленными «Инструкцией по обеззараживанию бромистым метилом посадочного материала плодовых, субтропических, орехоплодных культур, винограда, лесо-декоративных пород и лукович цветочных растений от карантинных и других опасных вредителей» (Министерство сельского хозяйства СССР, 1973 г.). Допуск людей после дегазации возможен только после	-(1)	Регламентируются требованиями дегазации(Регламентируются требованиями дегазации)
20-25 г/м3	Посадочный материал	Вредители растений, возбудители болезней растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с режимами установленными «Инструкцией по обеззараживанию бромистым метилом посадочного материала плодовых, субтропических, орехоплодных культур, винограда, лесо-декоративных пород и лукович цветочных растений от карантинных и других опасных вредителей» (Министерство сельского хозяйства СССР, 1973 г.). Допуск людей после дегазации возможен только после	-(1)	Регламентируются требованиями дегазации(Регламентируются требованиями дегазации)
20-25 г/м3	Корма для животного (арахисовый жмых, шрот)	Вредители запасов, возбудители болезней продукции растениеводства при хранении	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с «Инструкцией по борьбе с вредителями хлебных запасов», утвержденной 27.08.1991. Время экспозиции – 24-48 часов. Допуск людей после дегазации возможен только после достижения концентрации бромистого метила в воздухе и внутри продукции уровня ПДК (или ниже) для воздуха рабочей зоны. Окончание дегазации определяется также в зависимости от содержания	-(1)	Регламентируются требованиями дегазации(Регламентируются требованиями дегазации)
20-25 г/м3	Цитрусовые	Насекомые-вредители и растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с режимами установленными «Инструкцией по обеззараживанию плодов цитрусовых от средиземноморской плодовой мухи методом фумигации бромистым метилом» (Министерство сельского хозяйства СССР, 1968). Реализация продукции на территории Российской Федерации при содержании неорганических бромидов не выше МЛУ. Допуск людей	-(1)	Регламентируются требованиями дегазации(Регламентируются требованиями дегазации)
20-25 г/м3	Продовольственное сырье: плодовые (семечковые, косточковые), гранат, виноград, бобовые (все виды фасоли и гороха), картофель, копра	Вредители растений, возбудители болезней растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с «Временной инструкцией по обеззараживанию бромистым метилом свежих фруктов косточковых и семечковых пород от американской белой бабочки, восточной плодожорки и персиковой плодожорки» (Министерство сельского хозяйства СССР, 1968). Реализация продукции на территории Российской Федерации при содержании неорганических бромидов не выше МЛУ. Допуск людей	-(-)	-(-)

20-25 г/м3	Корма для животноводства	Вредители растений, возбудители болезней растений	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с «Инструкцией по борьбе с вредителями хлебных запасов», утвержденной 27.08.1991. Время экспозиции 24-48 часов. Допуск людей после дегазации возможен только после достижения концентрации бромистого метила в воздухе и внутри продукции уровня ПДК (или ниже) для воздуха рабочей зоны. Окончание дегазации определяется также в зависимости от содержания остаточных количеств бромидов	-(1)	Регламентируются требованиями дегазации(Регламентируются требованиями дегазации)
20-25 г/м3	Зерно хлебных злаков	Вредители запасов, возбудители болезней продукции растение-водства при хранении	Карантинная обработка (фумигация) в соответствии с «Инструкцией по борьбе с вредителями хлебных запасов», утвержденной 27.08.1991 г. Время экспозиции – 24-48 часов. Допуск людей после дегазации возможен только после достижения концентрации бромистого метила в воздухе и внутри продукции уровня ПДК (или ниже) для воздуха рабочей зоны. Окончание дегазации определяется также в зависимости от содержания	-(1)	Регламентируются требованиями дегазации(Регламентируются требованиями дегазации)

Метомил

Ланнат, СП (250 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - П/Л 029-01-808-1 20.10.2015 029-01-808-1/200 200 19.10.2025	0,6-1	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	8(2)	-(3)	Активен
	0,6-1	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(4)	-(3)	
	1,4-1,8	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	7(3)	7(3)	
	0,6-1	Подсолнечник	Подгрызающие совки, серый свекловичный долгоносик	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,8-1	Горох	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	15(2)	7(3)	
	0,6-1	Морковь	Морковная листоблошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	15(4)	-(3)	
	0,6-1	Соя	Бобовая огневка, клубеньковые долгоносики	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – по всходам культуры, вторая – в период формирования бобов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(2)	-(3)	
	0,8-1	Горох	Гороховая тля, гороховая плодожорка, гороховая зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	7(3)	
	0,8-1,0	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	14(3)	7(3)	
	0,6-1	Подсолнечник	Луговой мотылек, подсолнечниковая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,6-1	Кукуруза	Кукурузный стеблевой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	8(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Лук (кроме лука на перо)	Луковая муха, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	7(3)	

	0,8-1,0	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	7(3)	
	0,8-1,0	Капуста	Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(1)	7(3)	
Метонат, СП (250 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 И/И 389-01-3671-1 15.02.2016 14.02.2026	0,5-1,0	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,1% Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	21(3)	7(3)	Активен
	0,9-1,8	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,15% Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	10(3)	7(3)	

Мефеноксам + флудиоксонил + Тиаметоксам

Круйзер Рапс, КС (32,3 г/л + 8 г/л + 280 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 И/И/- 041-01(02)-2548-1 28.02.2020 27.02.2030	15,0	Рапс	Черная ножка, корневые гнили (грибы родов питиум, ризоктония, фузариум), плесневение семян, альтернариоз, фомоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 20-25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	15,0	Рапс	Крестоцветныеблешк и	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 20-25 л/т	-(1)	-(-)	

Никотин

Антитлин, П (9 г/кг) ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ХИМЗАВОД» ОГРН: 1024400511970 И/И/И 560-01-2329-1 24.07.2019 23.07.2029	0,5 кг/10 л воды (Л)	Роза	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром Расход рабочей жидкости - 0,8-1,0 л/куст	20(2)	-(-)	Активен
	0,5 кг/10 л воды (Л)	Капуста	Капустная моль, капустная тля	Опрыскивание в период вегетации настоем или отваром Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	20(2)	-(-)	
	0,5 кг/10 л воды (Л)	Смородин а, крыжовни к	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст	20(2)	-(-)	
Табазол, П (6 г/кг) ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ХИМЗАВОД» ОГРН: 1024400511970 И/И/И 560-01-2332-1 25.07.2019 24.07.2029	0,8-2,0 кг/100 м2(Л)	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации настоем 1:10 Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(2)	-(-)	Активен
	0,5-1,0 кг/100 м2 (Л)	Капуста	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации настоем 1:10 Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(3)	-(-)	
	0,6 кг/5 л воды (Л)	Смородин а, крыжовни к	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром 1:10 Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст	20(2)	-(-)	
	2,5-3,5 кг/100 м2 (Л)	Редис	Крестоцветныеблешк и	Опрыскивание в период вегетации настоем 1:10 Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(3)	-(-)	
	0,6 кг/100 м2 (Л)	Капуста	Капустная тля	Опрыскивание в период вегетации настоем 1:10 Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(3)	-(-)	
ТабаМин, ВРК (2 г/л) ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ХИМЗАВОД» ОГРН: 1024400511970 И/И/И 560-01-3216-1 16.07.2021 15.07.2031	125 мл/10 л воды (Л)	Смородин а	Тли	Опрыскивание до и после цветения Расход рабочей жидкости - 1-2 л/куст	20(2)	-(-)	Активен
	125 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в фазу начала бутионизации и появления вредителей Расход рабочей жидкости - 1-2 л/куст	-(1)	-(-)	

Табачная пыль, П (12 г/кг) ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ХИМЗАВОД» ОГРН: 1024400511970 III/III 560-01-2328-1 24.07.2019 23.07.2029	0,4 кг/5 л воды (Л)	Капуста	Капустная моль, капустная тля	Опрыскивание в период вегетации настоем или отваром Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	20(3)	-(-)	Активен
	0,4 кг/5 л воды (Л)	Роза	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром Расход рабочей жидкости - 0,8-1,0 л/куст	-(2)	-(-)	
	0,4 кг/5 л воды (Л)	Смородин а, крыжовни к	Тли	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст	20(2)	-(-)	

Новалурон + Ацетамиприд

Корморан, КЭ (100 г/л + 80 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-01-3502-1 02.03.2022 29.02.2032	0,3-0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,05 % Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(2)	3(3)	Активен
Новацет, КЭ (100 г/л + 80 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-01-4039-1 17.03.2023 16.03.2033	0,3-0,5	Яблоня, груша	Американская белая бабочка, яблонная плодожорка, листовертка, тли, трипсы, щитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	29(2)	3(3)	Активен

пенфлуфен + Клотинанидин

Эместо Квантум, КС (66,5 г/л + 207 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/- 019-01(02)-670-1 25.05.2015 24.05.2025	0,3-0,35	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до или вовремя посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/га	-(1)	-(-)	Активен
--	----------	-----------	---------------------------------------	---	------	------	---------

пенцикурон + Имидаклоприд

Батор, КС (150 г/л + 140 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - III/- 871-01(02)-4225-1 20.10.2023 19.10.2033	0,7-1	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная, проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
Имидашанс Про, КС (150 г/л + 140 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/- 126-01(02)-246-1 10.02.2014 09.02.2024	0,7-1	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до или во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
Клубнещит, КС (150 г/л + 140 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/- 008-01-591-1 11.03.2015 10.03.2025	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	60(1)	-(-)	Не активен

Покровитель, КС (150 г/л + 140 г/л) ИП Тарасов Юрий Дмитриевич ОГРН: 3147746070014 III/- 231-01-1115-1 03.06.2016 02.06.2026	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, тли, проволочники	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	Активен
Престиж Топ, КС (150 г/л + 140 г/л) Гован Кроп Протекшен Лимитед ОГРН: - III/- 561-01-4296-1 11.12.2023 10.12.2023	2,5-3,5	Ячмень озимый	Ризиктониозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-2,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-1,0	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли, ризиктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5-3,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, ризиктониозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(-)	
	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов, ризиктониоз, парша обыкновенная	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-1,0	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли, ризиктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней во время посадки Расход рабочей жидкости - 20-30 л/т	-(1)	-(-)	

Пиметрозин

Пленум, ВДГ (500 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-01-1295-1 12.12.2016 11.12.2026	0,5-0,6	Огурец защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	-(3)	Активен
	0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	30(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Томат защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(3)	-(3)	
	0,2-0,3	Картофель	Тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	14(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(3)	-(3)	

Пиракlostробин + Фипронил + Тиофанат - метил

Стандак Топ, КС (25 г/л + 250 г/л + 225 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - II/- 015-02-3110-1 15.04.2021 14.04.2031	1,5-2,0	Соя	Фузариоз всходов, фузариозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	---------	-----	--	---	------	------	---------

Пиретрины натуральные масляный экстракт

Доктор Харвест АгроМайт ПРО, ВР (30 г/л) ОООПремьер ОГРН: 1122543012305	0,15 - 4,0	Земляника защищенн ого грунта	Паутинные клещи (в том числе обыкновенный паутинный клещ, ржавый паутинный клещ, красный паутинный клещ)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100 -200 л/га	5(5)	1(1)	Активен
--	------------	-------------------------------------	--	--	------	------	---------

IV/L 909-01-4368-1 17.01.2024 16.01.2034	1,4 - 4,0	Огурец, томат защищенн ого грунта	Паутинные клещи (в том числе обыкновенный паутинный клещ, ржавый паутинный клещ, красный паутинный клещ)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800 -2000 л/га	5(5)	1(1)	
---	-----------	--	--	---	------	------	--

Пиретрины натуральные масляный экстракт + Пиретрины натуральные масляный экстракт

Доктор Харвест Форте Про, МЭ (30 г/л + 250 г/л) ОООПремьер ОГРН: 1122543012305 IV/L 909-01-4367-1 17.01.2024 16.01.2034	1,3-4	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	Активен
	8-20 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенн ого грунта	Мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	1,4-4	Огурец, томат защищенн ого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	
	0,6-1,8	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	
	8-20 мл/100 м2	Огурец, томат защищенн ого грунта	Мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	10-50 мл/100 м2(Л)	Земляника защищенн ого грунта	Тли, паутинный клещ, листовёртки, землянично-малинны й долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	0,8-2	Огурец, томат защищенн ого грунта	Мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	
	14-40 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенн ого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	1,3-4,0	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	
	6-18 мл/100 м2	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	1-5,0	Земляника защищенн ого грунта	Тли, паутинный клещ, листовёртки, землянично-малинны й долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	-(5)	1(1)	
	6-18 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	0,8-2,0	Огурец, томат защищенн ого грунта	Мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	
	10-50 мл/100 м2	Земляника защищенн ого грунта	Тли, паутинный клещ, листовёртки, землянично-малинны й долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	1-5	Земляника защищенн ого грунта	Тли, паутинный клещ, листовёртки, землянично-малинны й долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	-(5)	1(1)	
	13-40 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
	1,4-4,0	Огурец, томат защищенн ого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	-(5)	1(1)	
	14-40 мл/100 м2	Огурец, томат защищенн ого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	

	13-40 мл/100 м2	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	-(5)	1(1)	
--	--------------------	--	--	--	------	------	--

Пиридабен

Санмайт, СП (200 г/кг) Ниссан Кемикал Корпорейшн ОГРН: - П/Ш 234-01-1993-1 02.11.2015 01.11.2025	0,5-0,9	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(1)	-(3)	Активен
---	---------	--------	-------	--	-------	------	---------

Пиримифос-метил

Актеллик, КЭ (500 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Л 041-01-4549-1 02.05.2024 01.05.2034	0,8 мл/м2	Территори я зернопере рабатываю щих предприят ий и зернохран илищ в хозяйствах	Вредители запасов	Опрыскивание. Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обработки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или его содержания не превышает ПДК. Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обработки возможен в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Расход рабочей жидкости - 200 мл/м2	-(1)	-(-)	Активен
	16 мл/т	Зерно семенное, фуражное	Вредители запасов	Опрыскивание. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ. После обработки зерна срок допуска людей в зернохранилище не ранее 1 сутки Расход рабочей жидкости - 500 мл/ м2	-(1)	-(-)	
	0,4 мл/м2	Незагруже нные складские помещени я и оборудова ние зернопере рабатываю щих и пищевых предприят ий	Вредители запасов	Опрыскивание. Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обработки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или его содержание не превышает ПДК. Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обработки возможен в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2	-(1)	-(-)	
Пиригрэн 50, Ж (50 г/л) СОЖАМ САС ОГРН: - П/- 172-01-1121-1 20.05.2016 19.05.2026	80 мл/т	Зерно продоволь ственное, семенное, фуражное	Вредители запасов	Опрыскивание. Допуск людей через сутки после обработки. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ Расход рабочей жидкости - 80 мл/т	-(1)	1(-)	Активен

Пиримифос-метил + Бифентрин

Прокроп, КЭ (450 г/л + 20 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/-, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ ОГРН: 1027743011207 П/- 050(360)-01-1067-1	15 мл/т	Зерно продоволь ственное, семенное, фуражное и семена бобовых и масличных культур	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Допуск людей через 1 сутки после обработки. Использование зерна и семян на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ Расход рабочей жидкости - 500 мл на 1 т зерна и семян	-(1)	1(-)	Активен
---	---------	---	---	--	------	------	---------

07.04.2016 06.04.2026	0,4 мл/м2	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Дезинсекция холодным туманом. Обработка с помощью генераторов холодного тумана. Экспозиция 24 часа. Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки.	-(1)	2(-)	
	0,8 мл/м2	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Расход рабочей жидкости - 200 мл/м2	-(1)	1(-)	
	0,4 мл/м2	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки. Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2	-(1)	1(-)	
Зерноспас, КЭ (400 г/л + 10 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/- 085-01-1251-1 18.10.2016 17.10.2026	3 мл/т - дезинсекция, 8 мл/т - дезинсекция профилактическая обработка (консервирование)	Зерно продовольственное, семенное, фуражное и семена бобовых и масличных культур	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Допуск людей через 1 сутки после обработки. Использование зерна и семян на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ. Расход рабочей жидкости - 500 мл/т зерна и семян	-(1)	1(-)	Активен
	0,2 мл/м2	Незагруженные складские и производственные помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки. Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2	-(1)	1(-)	
	0,2 мл/м2	Незагруженные складские и производственные помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Дезинсекция холодным туманом. Обработка с помощью генераторов холодного тумана. Экспозиция 24 часа. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки. Расход рабочей жидкости - 4 мл/м2	-(1)	1(-)	

	0,4 мл/м2	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	Вредители запасов (насекомые, клещи)	Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей Расход рабочей жидкости - 200 мл/м2	-(1)	1(-)	
--	-----------	---	--------------------------------------	---	------	------	--

Пирипроксифен

Алекс, МКЭ (100 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-01-3914-1 19.12.2022 18.12.2032	0,2-0,3	Томат и огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	1(-)	Активен
	3 мл/10 л воды (Л)	Томат и огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-3 л/10 м2	3(1)	1(-)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Калифорнийская щитовка, яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/ дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	15(3)	3(-)	
	0,5-0,8	Яблоня	Калифорнийская щитовка, яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	15(3)	3(3)	
	0,3-0,5	Рапс яровой и озимый	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(3)	3(3)	
Адмирал, КЭ (100 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. ОГРН: - П/П 032-01-1050-1 29.03.2016 28.03.2026	0,5-0,8	Яблоня	Калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	14(1)	7(3)	Активен
	0,2-0,3	Томат и огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	7(2)	
	0,5-0,8	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	14(1)	7(3)	
Иноксифен, КЭ (100 г/л) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 П/П 389-01-2841-1 15.10.2020 14.10.2030	0,5-0,8	Яблоня	Калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	14(1)	3(7)	Активен
	0,5-0,8	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	14(1)	3(7)	

Пропаргит

Омайт, ВЭ (570 г/л) Ариста ЛайфСайенс Грейт Британ Лтд. ОГРН: - П/П 193-01-2264-1 03.06.2019 02.06.2029	1,3	Соя	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(1)	-(3)	Активен
---	-----	-----	----------------	---	-------	------	---------

Прохлораз + Пираклостробин + Тебуконазол + Ацетамиприд

Поларис Кватро, СМЭ	1,2-1,5	Ячень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
------------------------	---------	-----------------------	--	---	------	--------	---------

(100 г/л + 15 г/л + 20 г/л + 150 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-01(02)-3768-1 22.07.2022 018-01(02)-3768-1/443 443 21.07.2032	1,2-1,5	Ячмень озимый	Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)
	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники, злаковые тли, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)
	1,2-1,5	Пшеница яровая	Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,2-1,5	Пшеница озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, церкоспореллезная гниль корневой шейки, снежная плесень, мучнистая роса, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)
	1,2-1,5	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)
	1,2-1,5	Ячмень яровой	Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Прохлораз + Тиаметоксам + тритиконазол

Квестор Форте, КС (75 г/л + 150 г/л + 25 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/- 192-01(02)-3683-1 16.05.2022 15.05.2032	2,0	Ячмень озимый и яровой	Пыльная головня, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2,0	Пшеница озимая и яровая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, твердая головня, пыльная головня, септориоз, церкоспореллезная гниль корневой шейки, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,0	Пшеница озимая и яровая	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

седаксан + Тиаметоксам + Флудиоксонил

Вайбранс Топ, КС (25 г/л + 262,5 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-01(02)-3080-1 08.04.2021 07.04.2031	0,4-0,7	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т клубней	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	-----------	---------------------------------------	---	------	------	---------

седаксана + Тебуконазол + Флудиоксонил + Тиаметоксам + флудиоксошила + седаксан + тебуконазола

Вайбранс Интеграл, КС (25 г/л + 10 г/л + 25 г/л + 175 г/л + 25 г/л + 25 г/л + 10 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-1753-1 12.02.2018 11.02.2028	1,5-2	Пшеница озимая, ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, проволочники, цикадки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Сера

Климат, серная дым (750 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/- 046-01(02)-2039-1 18.02.2019 17.02.2029	300 г/20 м3(Л)	Пустые парники, теплицы (при условии их герметизац ии), расположе нные вне жилых домов и не примыкаю щих к ним, вдали от помещени й где	Возбудители болезней, бактериальные инфекции, клещи, насекомые	Фумигация сернистым ангидридом перед высадкой рассады. Дегазация до 10 дней. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	Активен
	300 г/10 м3 (Л)	Пустые погреба, расположе нные вне жилых домов и не примыкаю щих к ним, вдали от помещени й, где находятся домашние животные и птица	Возбудители болезней, бактериальные инфекции, клещи, насекомые	Фумигация сернистым ангидридом не позднее, чем за 5 дней до закладки продукции на хранение. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	
	300 г/20 м3(Л)	Пустые парники, теплицы (при условии их герметизац ии), расположе нные вне жилых домов и не примыкаю щих к ним, вдали от помещени й где	Клещи, насекомые	Фумигация сернистым ангидридом перед высадкой рассады. Дегазация до 10 дней. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	

	300 г/10 м3(Л)	Пустые погреба, расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где находятся домашние животные и птица	Клещи, насекомые	Фумигация сернистым ангидридом не позднее, чем за 5 дней до закладки продукции на хранение. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	
	300 г/20 м3 (Л)	Пустые парники, теплицы (при условии их герметизации), расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где	Возбудители болезней, бактериальные инфекции, клещи, насекомые	Фумигация сернистым ангидридом перед высадкой рассады. Дегазация до 10 дней. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	
<p>ФАС, серная шашка (800 г/кг) ЗАО ООО «НПО «Гигиена-Био» ОГРН: 1115001007428 П/-, ЗАО ООО «НПО «Гигиена-Био» ОГРН: 1115001007428 П/- 044-02-2291-1 25.06.2019 24.06.2029</p>	60 г/м3(Л)	Пустые теплицы, парники (при условии их герметизации), расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где	Возбудители болезней, бактериальные инфекции	Фумигация сернистым ангидридом пустых помещений перед посадкой растений. Экспозиция – 24-36 часов. Дегазация – 2-10 суток. Допуск людей после полного проветривания	-(1)	6(-)	Активен
	60 г/м3 (Л)	Пустые теплицы, парники (при условии их герметизации), расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где	Клещи, вредные насекомые	Фумигация сернистым ангидридом пустых помещений перед посадкой растений. Экспозиция – 24-36 часов. Дегазация – 2-10 суток. Допуск людей после полного проветривания	-(1)	6(-)	
	30-60 г/м3(Л)	Пустые погреба (при условии их герметизации), расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где находятся	Возбудители болезней, бактериальные инфекции	Фумигация сернистым ангидридом пустых помещений. Экспозиция – 24-36 часов. Дегазация не менее 2-х суток. Допуск людей после полного проветривания в течение 48 часов после полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида	-(1)	6(-)	

	30-60 г/м3(Л)	Пустые погреба (при условии их герметизации, расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где находятся	Клещи, вредные насекомые	Фумигация сернистым ангидридом пустых помещений. Экспозиция – 24-36 часов. Дегазация не менее 2-х суток. Допуск людей после полного проветривания в течение 48 часов после полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида	-(1)	6(-)	
Сера 400, КС (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-01(02)-3725-1 05.07.2022 04.07.2032	8,0-12,0	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(6)	3(3)	Активен
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней (в зависимости от возраста дерева и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста дерева и объема кроны)	-(6)	3(3)	
	6,0-16,0	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации (при высоком инфекционном фоне): первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(6)	3(3)	
	6,0-10,0	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	-(6)	3(3)	
	10,0-16,0	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	-(6)	3(3)	

Спиносад

Спинтор КА, СК (240 г/л) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 ПП/Л 866-01-4186-1 21.08.2023 20.08.2033	0,3 - 1,2	Огурец, перец защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 –10 дней в концентрации 0,03 – 0,04% Расход рабочей жидкости - 1000 -3000 л/га	5(2)	2(2)	Активен
	0,125 - 0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	30(1)	2(2)	
	0,2 - 0,75	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 –10 дней в концентрации 0,04 – 0,05%. Цикл брабок при необходимости повторить через 28 – 35 дней Расход рабочей жидкости - 500 -1500 л/га	- (2)	2(2)	
Жукоед Био, СК (240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/Л 021-01-4782-1 23.01.2025 22.01.2035	0,2-0,75	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	- (2)	- (3)	Активен
	0,5-1,2	Томат защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(2)	1(-)	
	0,3-1,2	Салат латук защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	5(2)	- (3)	
	5-12 мл/10 л воды(Л)	Томат защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	5(2)	3(-)	
	0,5-1,2	Огурец защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(2)	1(-)	
	0,125-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	- (3)	
	2-7,5 мл/10 л воды(Л)	Цветочные культуры защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	- (2)	3(-)	
	5-12 мл/10 л воды(Л)	Огурец защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	3(2)	3(-)	
	3-12 мл/10 л воды(Л)	Салат латук защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	5(2)	3(-)	
	0,3-1,2	Шпинат защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	5(2)	- (3)	
	3-12 мл/10 л воды(Л)	Шпинат защищенн ого грунта	Западный цветочный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	5(2)	3(-)	
	1,25-1,5 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	10(2)	3(-)	
Муравьед Био, СК (10 г/л) АО Фирма «Август»	15 мл/ 2 л воды(Л)	Земляника (после сбора урожая)	Муравьи	Внесение в почву методом полива в места скопления муравьев в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/1 м2	- (1)	1(-)	Активен

ОГРН: 1025006038958 Ш/- 021-01-4775-1 10.01.2025 09.01.2035	15 мл/ 2 л воды(Л)	Цветочные и декоративн ые однолетни е и многолетн ие, в том числе цветочные луковичны е	Муравьи	Внесение в почву методом полива в места скопления муравьев в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/1 м2	-(1)	1(-)	
	15 мл/ 2 л воды(Л)	Газоны	Муравьи	Внесение в почву методом полива в места скопления муравьев в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/1 м2	-(1)	1(-)	

Спиродиклофен

Акардо, ККР (250 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/Ш 018-01-2796-1 14.09.2020 018-01-2796-1/372 372 13.09.2030	0,4-0,6	Яблоня	Клещи, калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)	Активен
	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Паутинныеклещи,вин оградный войлочный клещ, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	28(2)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Паутинныеклещи,вин оградный войлочный клещ, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	28(2)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста дерева и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево (в зависимости от возраста дерева и объема кроны)	28(2)	3(-)	
	0,4	Виноград	Паутинныеклещи,вин оградный войлочный клещ, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	28(2)	3(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Клещи, калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста дерева и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста дерева и объема кроны)	28(2)	3(-)	
	0,4-0,6	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	28(2)	3(3)	
	0,4-0,5	Соя	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	3(3)	

Спиротетрамат

Сперамет, МД (150 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - Ш/Ш 699-01-4481-1 29.03.2024 28.03.2034	0,25-0,5	Виноград	Листовая филлоксеры, паутинные клещи, восковая цикадка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 500 - 1000 л/га	21(2)	3(3)	Активен
	0,3-0,6	Яблоня	Тли, калифорнийская щитовка	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05% Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	21(2)	3(3)	
Ультор, МД (150 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/Ш 019-01-1950-1	0,5-0,6	Соя	Обыкновенный паутинный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Огурец открытого грунта	Обыкновенный паутинный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	10(2)	-(3)	

07.06.2018 06.06.2028	0,5-0,75	Арбуз	Обыкновенный паутинный клещ, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	10(2)	-(3)	
Спатаро, СК (100 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - Ш/Ш 586-01-4795-1 29.01.2025 28.01.2035	0,7-1,0	Соя	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	3(3)	Активен
	0,6	Виноград	Паутинные клещи, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	21(2)	3(3)	
	0,6-1,2	Яблоня	Тли, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	21(2)	3(3)	

Спиротетрамат + Имидаклоприд

Мовенто Энерджи, КС (120 г/л + 120 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - Ш/Л 019-01-1232-1 19.09.2016 019-01-1232-1/255 255 18.09.2026	0,4-1,2	Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04-0,05% (тепличная белокрылка, тли), в концентрации 0,04-0,06% (трипсы) Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(2)	1(-)	Активен
	0,4-0,6	Лук (кроме лука на перо)	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	7(2)	3(3)	
	0,6	Яблоня	Калифорнийская щитовка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	20(2)	3(3)	
	5 мл/3 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	7(2)	1(-)	
	6 мл/3 л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	7(2)	1(-)	
	0,4-0,6	Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,04-0,05% (тепличная белокрылка, тли), в концентрации 0,04-0,06% (трипсы) Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(2)	1(-)	
	0,4-0,6	Капуста белокочанная	Капустная тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	3(3)	
	0,4-0,5	Картофель	Колорадский жук, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	3(3)	
	0,6	Виноград	Гвоздевая листовёртка, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-800 л/га	20(2)	3(3)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	20(2)	1(-)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Калифорнийская щитовка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	20(2)	1(-)	
	6 мл/3 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Капустная тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	7(2)	1(-)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовёртка, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 4-8 л/100 м ²	20(2)	1(-)	

	0,6	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	20(2)	3(3)	
--	-----	-------	-------------------	--	-------	------	--

Спиротетрамат + Клотиаиндин

Конвент, КС (120 г/л + 70 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/II 010-01-3979-1 08.02.2023 07.02.2023	0,3-0,6	Соя	Паутинный клещ, соевая плодоярка, бобовая огневка, соевый листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	3(3)	Активен
	0,3-0,9	Томат открытого грунта	Трипсы, тли, паутинный клещ, колорадский жук, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	3(3)	
	0,4-0,6	Капуста белокочанная	Капустная тля, капустная моль, крестоцветные блошки, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Яблоня	Щитовки, калифорнийская щитовка, тли, листоблошки, яблонная медяница, клещи, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	20(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Огурец открытого грунта	Трипсы, тли, паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Виноград	Гроздевая листовёртка, листовая филлоксеры, мучнистые червцы, цикадки, клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(2)	3(3)	

Тау-флювалинат

Маврик, ВЭ (240 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-01-2854-1 26.10.2020 25.10.2030	0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	6(3)	Активен
	0,2	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	6(3)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	6(3)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	6(3)	
	0,6	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1200 л/га	30(2)	6(3)	
	0,8	Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1200 л/га	30(2)	6(3)	
	0,24-0,36	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(2)	6(3)	

Тебуконазол + Имидаклоприд + Тиabendазол + Имазалил

Доспех Квадра, КС (30 г/л + 300 г/л + 30 г/л + 20 г/л) ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - II/-, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 II/-, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 II/-, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК.	0,8-1	Рожь озимая	Злаковые мухи	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Овёс	Хлебные блошки, злаковые мухи, пьявицы	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

АГРОХИМИКАТС ТИП. ОГРН: - II/- 010(011)-02-1951-1 19.06.2018 09.07.2028	1-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	-------	-------------------	------------------	---	------	------	--

Тебуфенпирад

Масай, СП (200 г/кг) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - III/III 015-01-722-1 29.07.2015 28.07.2025	0,5	Виноград	Виноградный войлочный и паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	14(1)	7(3)	Активен
	0,5	Яблоня	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	21(1)	7(3)	

Тефлутрин

Тефлутрин, МКС (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/- 018-01-697-1 15.07.2015 14.07.2025	16,5-28,8	Свекла сахарная	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 38,8 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
--	-----------	--------------------	--------------	--	------	------	---------

Тефлутрин + Клотиаинидин

ФортАгро, КС (80 г/л + 350 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 II/- 197-01-4798-0 03.02.2025 02.02.2028	4,0-8,0	Кукуруза на зерно и масло	Проволочники, подгрызающие совки, тли	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	---------	---------------------------------	---	--	------	------	---------

Тефлутрин + Тефлутрин

Форс, Г, МКС (200 г/л + 15 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-2667-1 28.04.2020 27.04.2030	2-5	Подсолнеч ник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12-15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	16,5-28,8	Свекла сахарная	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 26-38,8 л/т	-(1)	-(-)	
	10,0-15,0	Лук (кроме лука на перо)	Проволочники, луковая муха первого поколения	Внесение в почву при посадке (посеве)	60(1)	-(1)	
	10,0-15,0	Картофель	Проволочники	Внесение в почву при посадке	60(1)	-(1)	
	15-20	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 25-30 л/т	-(1)	-(-)	

Тефлутрин + Тиаметоксам

Форс Зеа, КС (80 г/л + 200 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-3370-1 16.11.2021 15.11.2031	5 -10	Кукуруза на зерно	Проволочники, подгрызающие совки, тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15-20 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
--	-------	----------------------	---	---	------	------	---------

Тиабендазол + диперметрин

Бомбер, ДШ (300 г/кг + 130 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01(02)-2836-1 13.10.2020 12.10.2030	5 г/20 м3 (Л)	Пустые погреба, подвалы, расположе нные вне жилых зданий	Вредные членистоногие, возбудители болезней	Фумигация пустых помещений перед закладкой продукции на хранение. Экспозиция – 3 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей после полного проветривания в течение 48 часов	-(1)	через 2 дня после окончания проветрив ания помещени я (дегазации) (через 2 дня после окончания проветрив ания помещени я дегазации)	Активен
--	------------------	--	---	---	------	--	---------

Тиаклоприд

Аспид, СК (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-01-2278-1 17.06.2019 16.06.2029	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	45(2)	-(3)	Активен
Биская, МД (240 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-01-3722-1 29.06.2022 28.06.2032	0,2-0,3	Картофель (продоволь- ственный)	Колорадский жук, тли-переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Картофель (семенной)	Колорадский жук, тли-переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Рапс яровой	Капустная стручковая (рапсовая) галлица, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
Вирий, КС (245 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 П/П 590-01-4191-1 08.09.2023 07.09.2033	0,35-0,6	Яблоня	Листовертки, яблонная плодожорка, яблонный плодовой пилильщик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Рапс озимый и яровой	Рапсовый цветоед, стручковый капустный комарик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	50(2)	-(3)	
	0,35-0,6	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	29(1)	-(3)	
Калина, КС (480 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-01-3210-1 13.07.2021 12.07.2031	0,1 - 0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	3(3)	Активен
	0,18 - 0,3	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	10(1)	3(3)	
	0,3 - 0,45	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	10(2)	3(3)	
	0,2 - 0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	3(3)	
Калипсо, КС (480 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-01-1683-1 16.01.2018 15.01.2028	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	-(3)	Активен
	0,18-0,3	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	30(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(2)	-(3)	
	0,3-0,45	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	-(3)	
Тейя, КС (480 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим»	0,3-0,45	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	10(3)	3(3)	Активен

ОГРН: 1025006519427 П/П 018-01-2113-1 21.02.2019 20.02.2029	0,18-0,3	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период обособления бутонов Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	10(1)	3(3)	
---	----------	--------	------------------	---	-------	------	--

Тиаклоприд + Дельтаметрин

Протеус, МД (100 г/л + 10 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-01-1589-1 07.11.2017 06.11.2027	0,5-1	Кукуруза	Кукурузный мотылек, хлопковая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Горох	Гороховая зерновка, гороховая тля, гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,5-1	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Картофель	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, стеблевой пилильщик, пьявицы, тли, трипсы, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Ячмень	Злаковые мухи, тли, пьявицы, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Свекла столовая (кроме пучкового товара)	Подгрызающие совки, луговой мотылек, свекловичные минирующие мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Морковь (кроме пучкового товара)	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-1	Свекла сахарная	Свекловичный долгоносик-стеблел, свекловичная листовая тля, подгрызающие совки, свекловичная щитовка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Морковь (кроме пучкового товара)	Морковная листоблошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Пшеница	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	-(3)	
	0,5-0,75	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Рапс	Рапсовый пилильщик, стеблевой скрытнохоботник, семенной скрытнохоботник, рапсовый цветоед, стручковая галлица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	

Тиаметоксам

Актара, ВДГ (250 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-01-4386-0	0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	Активен
	0,6 г /100 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	14(1)	7(-)	

26.01.2024
25.01.2027

0,5-1	Томат открытого грунта	Тепличная белокрылка, тли, колорадский жук	Внесение под корень при капельном поливе Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)
0,1-0,4	Розы защищенн ого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-2000 л/га (концентрация - 0,02%)	-(3)	-(-)
0,3-0,4	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	7(3)
0,5-1	Огурцы защищенн ого грунта	Тли, трипсы, тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)
0,3-0,4	Груша	Грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 -1200 л/га	60(1)	7(3)
0,1-0,4	Розы открытого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-2000 л/га (концентрация - 0,02%)	-(1)	-(-)
0,1-0,125	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	60(1)	7(3)
0,2-0,4	Лук	Табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(-)	7(3)
0,5-1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)
0,5-1	Томат защищенн ого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)
0,5-1	Ячмень яровой и озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)
0,3	Капуста	Весенняя капустная муха, крестоцветные блошки	Пролив рассады в кассетах за 1-2 дня до высадки ее в поле. Не допускается переувлажнения. (На 30-50 тыс. штук рассады) Расход рабочей жидкости - 10000 л/га. (На 30-50 тыс. штук рассады)	60(1)	3(-)
0,1-0,3	Виноград	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	21(1)	7(3)
0,5-1	Картофель	Колорадский жук	жидкости– 200-400 л/га	14(1)	7(3)
0,5-1	Огурцы защищенн ого грунта	Тли, трипсы, тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)
0,2-0,3	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 - 1200 л/га	60(1)	7(3)
0,5-1	Томат защищенн ого грунта	Тли, тепличная белокрылка	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)
0,5-1	Перец защищенн ого грунта	Тли, трипсы	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)

	0,5-1	Смородин а	Тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	60(2)	7(3)	
	0,5-1	Баклажан защищенн ого грунта	Тли, трипсы	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)	
	0,5-1	Горох, зеленый горошек	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(1)	7(3)	
	0,5-1	Картофель	Колорадский жук, проволочники	Опрыскивание дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 70-120 л/га	60(1)	7(3)	
	0,5-1	Перец защищенн ого грунта	Тли, трипсы	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)	
	0,5-1	Баклажан защищенн ого грунта	Тли, трипсы	Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	3(1)	7(3)	
	2 г /10 л воды (Л)	Смородин а	Тли	Опрыскивание до цветения или после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	60(2)	7(-)	
	0,5-1	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(1)	7(3)	
	0,5-1	Огурец защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02 %-ным рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3(1)	7(3)	
<p>Аркана, КС (240 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 III/I 012-01-5025-1 09.06.2023 08.06.2033</p>	2 мл/10 л воды (Л)	Смородин а	Тли	Опрыскивание до цветения или после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1,5 л/куст	60(1)	3(-)	Активен
	0,6 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(1)	3(-)	
	1 мл/10 л воды (Л)	Горшечны е цветочные растения	Тли, трипсы, белокрылки, щитовки, ложнощитовки, почвенные мушки, грибные комарики	Полив почвы под растениями в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2 (250 горшков)	- (1)	3(-)	
<p>Инсектор Супра, КС (50 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/I 008-01-3332-1 08.10.2021 07.10.2031</p>	3 мл/100 м2(Л)	Смородин а черная	Тли	Опрыскивание после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1,5 л/куст	60(1)	3(-)	Активен
	3 мл/100 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(-)	
	3 мл/100 м2(Л)	Смородин а черная	Тли	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 1,5 л/куст	60(1)	3(-)	
	3 мл/100 м2(Л)	Декоратив но-цветущ ие растения (кроме комнатных растений)	Комплекс многоядных жуков, включая оленку мохнатую и многоядных листоверток	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	- (1)	3(-)	
<p>Инстиво, КС (350 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-4210-1</p>	0,5-1	Ячмень яровой, озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	- (1)	- (-)	Активен
	0,5-1	Пшеница яровая, озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	- (1)	- (-)	

26.09.2023 25.09.2023	0,5-1	Ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,5-1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
Кайзер, КС (350 г/л) ООО «Тотус» ОГРН: 1104632010933 Ш/- 181-01-4135-1 22.06.2023 21.06.2023	8-10	Подсолнечник	Проволочник и ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	8-10	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	6-9	Кукуруза	Проволочники и ложнопроволочники, внутрестеблевые мухи, блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Внутрестеблевые мухи, хлебная жужелица, цикадки, блошки, тли	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Кайтокс, КС (350 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 Ш/Л 070-01-3461-1 29.12.2021 28.12.2031	8-12	Свекла сахарная	Вредители всходов	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно для фракции 4,5-5,5 мм Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	10-14	Свекла сахарная	Вредители всходов	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно для фракции 3,5-4,5 мм и для дражированных семян Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	
	8-10	Подсолнечник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаго-временно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница	Хлебная жужелица	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаго-временно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,22	Картофель	Колорадский жук, проволочники и ложнопроволочники	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	6-9	Кукуруза на зерно и зеленую массу	Проволочники, ложнопроволочники, внутрестеблевые мухи, блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаго-временно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-1	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Внутри-стеблевые мухи, хлебная жужелица, цикадки, блошки и тли	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаго-временно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	8-10	Рапс, горчица	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаго-временно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
Кругозор, КС (600 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812	5,8	Рапс, горчица	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	5,3	Кукуруза на зерно и масло	Проволочники	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15,3 л/т	-(1)	-(-)	

Ш/- 126-01-3574-1 29.03.2022 126-01-3574-1/493 493 28.03.2032	0,12-0,13	Картофель	Колорадский жук, проволочник, тля	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 2-10 л/т	-(1)	-(-)	
	5,8	Подсолнечник на семена и масло	Проволочники	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15,8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень	Хлебная жужелица, блошки, злаковые мухи, тли, цикадки	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,6	Соя	Подгрызающие совки	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
Тиара, КС (350 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 Ш/Л, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 Ш/Л 004(549)-01-4099-1 13.09.2022 12.09.2032	0,04-0,06	Ячмень яровой и озимый	Клоп черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,04-0,06	Пшеница озимая и яровая	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебная жужелица, внутрстеблевые мухи, блошки, тли, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,07-0,11	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
Панцирь, КС (600 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 Ш/- 278-01-4112-1 30.03.2017 29.03.2027	5,8	Подсолнечник	Проволочники, подгрызающие совки	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15,8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
Сабля, КС (350 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 Ш/- 197-01-3501-1 02.03.2022 29.02.2032	0,75	Ячмень яровой и озимый	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,75	Рожь яровая и озимая	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,75	Полба	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,75	Тритикале яровая и озимая	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,75	Пшеница яровая и озимая	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
Тиамакс, КС (240 г/л) ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207	0,1-0,15	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов осенью Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	3(3)	Активен
	0,3-0,4	Картофель	Колорадский жук, проволочники, ложнопроволочники	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Ш/Л, ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 Ш/Л 050(360)-01-2777-1 21.08.2020 20.08.2030	0,06-0,08	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	3(3)	
	0,06-0,08	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
	0,06-0,08	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
	0,1-0,15	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	60(1)	3(3)	
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная медяница	Опрыскивание до цветения Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	60(1)	3(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки и долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	3(3)	
	12-15	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, проволочники, ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-1,4	Пшеница, ячмень	Хлебная жужелица, внутривеблевые мухи, блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,1	Рапс яровой	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	3(3)	
Харита, КС (600 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/- 018-01-1962-1 10.07.2018 018-01-1962-1/370 370 09.07.2028	4,7 - 5,8	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян в условиях централизованных пунктов протравливания или на семенных заводах Расход рабочей жидкости - 15-16 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	4,7 - 5,8	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян в условиях централизованных пунктов протравливания или на семенных заводах Расход рабочей жидкости - 15-16 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	10-56(в зависимости от специфики семян, условий их посева и вида вредителей)	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники	Обработка (дражирование) семян проводится непосредственно перед посевом или заблаговременно (до года) в условиях семенных заводов Расход рабочей жидкости - 20-60 л/т	-(1)	-(-)	
Тиматерр, КС (350 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 Ш/Л, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277	0,06	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница, ячмень	Хлебная жужелица, внутривеблевые мухи, цикадки, хлебные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

П/Л 424(042)-01-1845-1 30.03.2018 29.03.2028	0,04-0,06	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,07-0,11	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
Кипер, КС (350 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 ПП/- 653-01-2915-1 09.12.2020 08.12.2030	0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	8-10	Подсолнеч ник	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(1)	
	8-10	Рапс озимый, горчица	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(1)	
	0,5-1,0	Пшеница и ячмень озимые	Внутривеблевые мухи, цикадки, блошки и тли	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	6-9	Кукуруза	Проволочники, ложнопроволочники, внутривеблевые мухи, блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	

Тиаметоксам + Дифеноконазол + Мефеноксам

ДивидендСуприм, КС (92,3 г/л + 36,92 г/л + 3,08 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 ПП/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 ПП/- 041-01-496-1 30.12.2014 29.12.2024	2-2,5	Пшеница яровая, озимая	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Не активен
--	-------	------------------------------	---	--	------	------	------------

Тиаметоксам + Дифеноконазол + Флудиоксонил

Триптих, КС (320 г/л + 30 г/л + 30 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 ПП/-, Агрия АД ОГРН: - ПП/- 184(026)-01(02)-4157-1 13.07.2023 12.07.2033	0,33	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 25 л/т клубней (при посадке)	-(1)	-(1)	Активен
	1,0	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	10,0	Рапс яровой	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 15 - 20 л/т	-(1)	-(1)	

Тиаметоксам + Клотнианидин

Клотиамет Энерджи, КС (235,5 г/л + 235,5 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 ПП/- 002-01-4408-1 06.02.2024 05.02.2034	0,4-0,8	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица, злаковые мухи, цикадки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	0,4-0,8	Пшеница яровая, ячмень яровой	Хлебные блошки, злаковые мухи, тли, цикадки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(1)	

Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин

Молния Дуо, КС (141 г/л + 106 г/л) ЗАО «ТПК	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, хлебные жуки, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
--	---------	-------------------------------	--	---	-------	------	---------

«Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/Л 046-01-3116-1 19.04.2021 18.04.2031	0,3-0,4	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Капуста	Капустная моль, капустная совка. Белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	43(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
Куррито, КС (141 г/л + 106 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - ПП/Л 064-01-3548-1 21.03.2022 20.03.2032	0,15-0,18	Ячмень яровой	Злаковые тли, пьявица, внутристеблевые злаковые мухи, блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,18	Пшеница яровая и озимая	Пшеничный трипс, злаковые тли, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 л/га	50(2)	-(3)	
	0,25-0,4	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
Солам, КС (141 г/л + 106 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - ПП/Л 699-01-3609-1 20.04.2022 19.04.2032	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	3(3)	Активен
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Злаковые тли, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	3(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	3(3)	
Кунгфу Супер, КС (141 г/л + 106 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 ПП/Л, Левей Маркетинг Актиенгезелльшафт ОГРН: - ПП/Л 184(040)-01-1160-1 18.07.2016 17.07.2026	0,1-0,15	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	30(1)	7(3)	Активен
	0,2-0,25	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	10(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	30(2)	7(3)	
	0,1	Овес	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	7(3)	
	0,05-0,1	Яблоня	Яблонный цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600- 1500 л/га	21(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	20(1)	7(3)	
	0,05-0,1	Рапс	Рапсовый цветоед, капустная совка, капустная моль, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	31(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600- 1500 л/га	21(2)	7(3)	
	0,2-0,3	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	50(1)	7(3)	
	0,1-0,2	Ячмень	Злаковые мухи, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	7(3)	

	0,1-0,15	Свекла сахарная	Листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(1)	7(3)	
	0,1	Виноград	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	10(2)	7(3)	
	0,1-0,15	Кукуруза	Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	7(3)	
	0,1-0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	7(3)	
	0,1-0,2	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	50(1)	7(3)	
	0,05-0,1	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100- 200 л/га	31(2)	7(3)	
Эфория, КС (141 г/л + 106 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Л 041-01-2607-1 18.03.2020 17.03.2030	0,15-0,25	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичный долгоносик-стеблеяд, свекловичные минирующие мухи, свекловичная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(2)	3(3)	Активен
	0,15-0,25	Картофель	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	3(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	3(3)	
	0,3-0,4	Лук	Трипсы, совки, луковая моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	18(2)	3(3)	
	0,15-0,25	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	44(2)	3(3)	
	0,2	Капуста	Капустная тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	3(3)	
	0,1	Овес озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,1	Овес озимый	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	3(3)	
	0,2-0,3	Капуста	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	3(3)	
	0,25-0,4	Яблоня	Тли, яблонный пилильщик, долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(3)	
	0,2	Горох	Гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	3(3)	
	0,2-0,3	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	3(3)	

	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	3(3)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	3(3)	
Мелория, КС (141 г/л + 106 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 П/Л 653-01-2960-1 25.12.2020 24.12.2030	0,1-0,2	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень озимый	Пьявица, злаковые мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
Эфробел, КС (141 г/л + 106 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/Л 277-01-2727-1 06.07.2020 05.07.2030	0,2-0,3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,1	Овес	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, внутрстебельные мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявица, внутрстебельные мухи, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
Фактория, МКС (141 г/л + 106 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/- 070-01-3653-1 26.04.2022 25.04.2032	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли, пьявицы, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,1	Рапс яровой и озимый	Рапсовый пилильщик, капустная моль, рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания на обработанных площадях пастбищ не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

	0,1-0,2	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания на обработанных площадях пастбищ не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли, пядицы, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	48(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли, пядицы, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	48(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	28(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли, пядицы, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	
	0,05-0,1	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	

Тиаметоксам + Мефеноксам + флудиоксанил + Тиабендазол + семаксан

Вайбранс Круйзер Макс, КС (92,3 г/л + 11,5 г/л + 7,7 г/л + 46,2 г/л + 15,4 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-4239-1 27.10.2023 26.10.2033	2,5 - 3,5	Соя	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль и ризоктониозная корневая гниль, фузариозная семенная инфекция, аскохитоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян с увлажнением Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т семян	-(1)	-(3)	Активен
	2,5 - 3,5	Соя	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т семян	-(1)	-(3)	

Тиаметоксам + Тиаметоксам

Круйзер, КС (600 г/л + 350 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/- 041-07-4165-1 21.07.2023 20.07.2033	14-56 (в зависимости от специфики семян и условий их высева)	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Дражирование семян на специальных установках	-(1)	-(1)	Активен
	5,8	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 15 л/т семян	-(1)	-(1)	
	0,5	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	8-10	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т семян	-(1)	-(1)	
	0,5-1	Пшеница, ячмень	Хлебная жужелица, блошки, злаковые мухи, тли, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	

	0,2-0,22	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусных заболеваний	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 2-10 л/т	-(1)	-(-)	
	8-10	Рапс, горчица	Крестоцветные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т семян	-(1)	-(-)	
	5,3	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 15 л/т семян	-(1)	-(-)	

Тиаметоксам + тритиконазол

Квестор, КС (300 г/л + 50 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/- 192-02-687-1 22.06.2015 21.06.2025	0,8-1	Пшеница яровая	Внутрстеблевые мухи, цикадки, блошки, тли	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Хлебная жужелица, внутрстеблевые мухи, цикадки, блошки	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица, внутрстеблевые мухи, цикадки, блошки	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиаметоксам + Фипронил

Спарринг, МД (150 г/л + 90 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Л 018-01-4315-1 15.12.2023 14.12.2033	0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,1-0,2	Подсолнечник	Подгрызающие совки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи, хлебные жуки, зерновые совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Подсолнечник	Хлопковая совка, капустная совка, подсолнечниковая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,2-0,3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	

Тиаметоксам + флудиоксонил + Мефеноксам

Темифлю, КС (280 г/л + 8 г/л + 32,3 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/- 010-01(02)-3400-1 07.12.2021 06.12.2031	15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	15	Рапс яровой и озимый	Черная ножка, корневые гнили (грибы родов фитиум, ризоктония, фузариум), плесневение семян, альтернариоз, фомоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	

Тиаметоксам + Хлорантрилипрол

Волиам Флекс, СК (200 г/л + 100 г/л)	0,4-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	14(3)	7(3)	Активен
--	---------	--------	---------------------	--	-------	------	---------

ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-4240-0 27.10.2023 26.10.2026	0,4-0,5	Виноград	Гроздевая листовертка, трипсы, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	14(3)	7(3)	
	0,3-0,4	Томат защищен-н ого грунта	Тли, совки, южноамериканская томатная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	5(1)	2(-)	
	0,2	Картофель	Колорадский жук, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	7(3)	
	0,7-0,8	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Опрыскивание дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 100-120 л/га	50(1)	7(3)	

Феназахин

Демитан, СК (200 г/л) Гован Кроп Протекшен Лимитед ОГРН: - II/III 561-01-2338-1 25.07.2019 24.07.2029	0,3-0,45	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	Активен
	0,24-0,36	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	45(1)	7(3)	

Фенитротрион

Нунчак, КЭ (500 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/L, ООО «АНПП «Агрохим-ХХ1» ОГРН: 1027700119710 III/L 197(023)-01-3482-1 21.01.2022 197(023)-01-3482-1/425 425 20.01.2032	1,6-2,5	Яблоня, груша	Моли, тли, щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,6-1,0	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	3	Яблоня, груша	Плодожорки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	-(3)	
Сумитион, КЭ (500 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. ОГРН: - III/L 032-01-2057-1 16.11.2018 15.11.2028	0,8-1	Пшеница	Трипсы, тли, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	Активен
	0,6-1	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	3	Яблоня, груша	Плодожорки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	
	0,5	Ячмень	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	
	1,6-2,5	Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(2)	7(3)	

Феноксикарб

Акарб, ВДГ (250 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 III/III 389-01-1441-1 06.04.2017 389-01-1441-1/194 194 05.04.2027	0,6	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против 2-го поколения вредителя Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	14(1)	7(3)	Активен
	0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	40(3)	7(3)	
	0,4	Слива	Сливовая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	30(3)	7(3)	

Инсегар, ВДГ (250 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-01-2305-1 08.07.2019 07.07.2029	0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(3)	-(3)	Активен
	0,6	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	30(1)	-(3)	
	0,4	Слива	Сливовая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(3)	-(3)	
Фазис, ВДГ (250 г/кг) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 III/III 063-01-2089-1 01.02.2019 31.01.2029	0,6	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации против II-го поколения гроздевой листовертки Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	28(1)	7(3)	Активен

Фенпироксимат

Ортус, СК (50 г/л) Ничино Юроп Ко. Лтд. ОГРН: - III/III 782-01-3960-1 20.01.2023 19.01.2033	0,6-0,9	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	30(2)	3(3)	Активен
	0,5-1,0	Свекла сахарная	Обыкновенный паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	3(3)	
	1,0-1,5	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	40(2)	3(3)	
	0,5-1,0	Соя	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	35(1)	3(3)	

Фипронил

Ария, КС (250 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 II/L 192-01-1473-1 19.04.2017 18.04.2027	0,02	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанные территории – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях – не ранее 7 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Регент, ВДГ (800 г/кг) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - II/L 015-01-1638-1 07.12.2017 06.12.2027	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,02	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,03	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,0225	Пшеница яровая и озимая	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,03	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
Монарх, ВДГ	0,03	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	Активен

(800 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Л, Левой Маркетинг Акционерное общество ОГРН: - П/Л 184(040)-01-1271-1 10.11.2016 09.11.2026	0,02	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,02	Пшеница	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,03	Пшеница	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	
	0,005	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок безопасного выхода для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (дикая растительность) – 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Скутум, СК (250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-3601-1 07.04.2022 06.04.2032	0,1	Пшеница яровая и озимая	Зерновые совки, стеблевые хлебные пилильщики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,06-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(1)	-(3)	
Шанс Профи, ВДГ (800 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-2937-1 17.12.2020 16.12.2030	0,0225	Пшеница озимая, яровая	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,02	Ячмень яровой	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,03	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период появления всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,03	Пшеница озимая, яровая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в фазе молочной спелости при численности личинок не более 1 экз./м2 Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
Койра, КС (250 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Л 178-01-3622-1 13.04.2022 178-01-3622-1/469 469 12.04.2032	0,06-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(2)	-(3)	Активен
	0,06-0,1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(2)	-(3)	
	0,08-0,1	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, пьявицы, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
Хлыст, ВДГ (800 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/Л 197-01-4601-1 07.06.2024 06.06.2034	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	-(3)	Активен
	0,005	Пастбища, дикая растительность, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях (дикая растительность) – 30 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	

Фипронил + Имидаклоприд

<p>Табу Супер, СК (100 г/л + 400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/- 021-01-1898-1 28.04.2018 27.04.2028</p>	8	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1-1,5	Пшеница, ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи, тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,6	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 80-120 л/га	-(1)	-(-)	
	1-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 11 л/т	-(1)	-(-)	
	8	Подсолнеч ник	Подгрызающие совки, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-2	Соя	Подгрызающие совки, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)	

Фипронил + Тиаметоксам

<p>Фипроксам, КС (150 г/л + 350 г/л) ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» ОГРН: 1152312010740 Ш/Л 866-01-4166-1 24.07.2023 23.07.2023</p>	8	Кукуруза на зерно и масло	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,06	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, внутристеблевые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,2	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 80 - 120 л/га	-(1)	-(3)	
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1,25	Соя	Подгрызающие совки, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Хлебные блошки, злаковые мухи, тли	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	8	Подсолнеч ник на семена и масло	Подгрызающие совки, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 18 л/т	-(1)	-(3)	

Фипронил + Тиаметоксам + Имидаклоприд

<p>Бомбарда, КС (60 г/л + 130 г/л + 90 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/- 018-01-2830-1 08.10.2020 07.10.2030</p>	0,8-1,2	Пшеница яровая	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,2	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,8-1,2	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,8-1,2	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	0,5-0,7	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	

Флоникамид

Теппеки, ВГ (500 г/кг) ИСК Биосаенсис Юроп Н.В. ОГРН: - III/III 066-01-1229-1 15.09.2016 14.09.2026	0,13-0,15	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	55(3)	3(3)	Активен
--	-----------	--------	-----	--	-------	------	---------

Флубендиамид

Белт, КС (480 г/л) Байер КропСайенс АГ ОГРН: - III/II 019-01-1231-1 19.09.2016 18.09.2026	0,1-0,15	Капуста белокочан ная	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(3)	3(3)	Активен
	0,1-0,15	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(3)	3(3)	
	0,3-0,4	Виноград	Гвоздевая листовертка, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-800 л/га	21(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	21(2)	3(3)	

Флудиоксонил + Тиаметоксам + Дифеноконазол

Шансометокс Трио, КС (25 г/л + 262,5 г/л + 25 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/- 126-01-1954-1 04.07.2018 03.07.2028	0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней (перед посадкой) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
--	-----	-----------	----------------------------------	--	------	------	---------

Флудиоксонил + Тиаметоксам + Тебуконазол

Селест Макс, КС (25 г/л + 125 г/л + 15 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/- 041-01(02)-842-1 30.10.2015 29.10.2025	1,5-2	Пшеница, ячмень	Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
--	-------	--------------------	--	--	------	------	---------

флуоксастробин + Тебуконазол + Клотиаанидин + Протиокконазол

Сценик Комби, КС (37,5 г/л + 5 г/л + 250 г/л + 37,5 г/л) Байер КропСайенс АГ ОГРН: - II/- 019-01(02)-3932-1 09.01.2023 08.01.2033	1,25-1,5	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи, лиственные хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
	1,25-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	1,25-1,5	Ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	1,25-1,5	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи, лиственные хлебные блошки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	

Фосмет

Имидан, ВДГ (400 г/кг) Гован Кроп Протекшен Лимитед ОГРН: - II/III 561-01-3702-1 06.06.2022 05.06.2032	1,5	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	3(3)	Активен
---	-----	--------	------------------------	---	-------	------	---------

Хлорантрелипрол

Кораген, КС	0,1-0,15	Подсолнеч ник	Озимая совка	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	6(3)	Активен
----------------	----------	------------------	--------------	--	-------	------	---------

(200 г/л)
 ООО «ЭфЭмСи»
 ОГРН: 1037706002773
 III/III
 489-01-2630-1
 27.03.2020
 26.03.2030

0,1-0,15	Кукуруза	Озимая совка	Опрыскивание в период всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	7(2)	6(3)
0,2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка и листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дерево	21(2)	6(3)
0,15-0,2	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	6(3)
4 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	21(1)	6(3)
0,5 мл/100 м2(Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	14(1)	6(3)
0,15-0,25	Горох	Гороховая плодожорка, гороховая зерновка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	6(3)
0,1-0,15	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	7(2)	6(3)
0,15-0,25	Соя	Бобовая (акациевая) огневка	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	20(2)	6(3)
0,04-0,06	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	6(3)
1 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	21(1)	6(3)
0,1-0,15	Подсолнеч ник	Луговой мотылек, подсолнечниковая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	20(2)	6(3)
0,15-0,25	Соя	Бобовая (акациевая) огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	6(3)
2,5 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	21(2)	6(3)
0,04-0,05	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(1)	6(3)
0,15-0,25	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	21(2)	6(3)
0,1-0,15	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(2)	6(3)
0,1-0,15	Подсолнеч ник	Луговой мотылек, подсолнечниковая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	6(3)
0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	21(2)	6(3)
0,075-0,1	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, озимая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	3(3)

Шензи,
 КС
 (400 г/л)
 ЮПЛ Холдингс
 Бельгия, Ю.А.

кооператив Ю.А. ОГРН: - III/III 869-01-4659-0 28.08.2024 27.08.2027	0,02-0,03	Томат открытого грунта	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	3(3)	
--	-----------	------------------------------	-----------------	---	-------	------	--

Хлорпирифос

Европир, КЭ (480 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/I 002-01-911-1 21.12.2015 20.12.2025	0,8	Свекла сахарная	Листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	7(4)	Активен
	1,5	Свекла сахарная	Блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	7(4)	
	2-2,5	Свекла сахарная	Обыкновенный свекловичный долгоносик, совки, крошка, щитоноски	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(4)	
	1,5-2	Свекла сахарная	Луговой мотылек, мертвоеды	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	7(4)	
Сайрен, КЭ (480 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/I 058-01-4339-1 15.01.2024 14.01.2034	0,75-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	42(1)	-(4)	Активен
	2,0	Сахарная свекла	Свекловичные долгоносики, подгрызающие совки, свекловичная крошка	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(4)	
	0,8	Сахарная свекла	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(4)	
	1,5-2,0	Сахарная свекла	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(4)	
	0,25-0,4	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	42(1)	-(4)	
	1,5	Сахарная свекла	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(4)	
	2,0	Сахарная свекла	Свекловичная щитоноска	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(4)	
Тайра, КЭ (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/I 021-01-2480-1 21.11.2019 20.11.2029	1,5	Свекла сахарная	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	1,5-2	Свекла сахарная	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,8	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,8-1,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявицы, хлебные блошки, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8-1,2	Ячмень	Злаковые мухи, тли, трипсы, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	2	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХІ» ОГРН: 1027700119710 П/Л, ООО «Агрохим ХХІ» ОГРН: 5067746338150 П/Л 023(197)-01-3114-1 19.04.2021 18.04.2031	2,0-2,5	Свекла сахарная	Луговой мотылек, совки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	40(1)	-(4)	Активен
	0,8-1,2	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(4)	

Хлорпирифос + циперметрин

Раймир, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/Л 070-01-3798-1 19.09.2022 18.09.2032	0,75-1,00	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пьявицы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	36(2)	-(3)	
	0,75-1,00	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	36(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,6	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
Ранголи-Норил, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 П/Л 134-01-1996-1 25.09.2018 24.09.2028	0,75-1,0	Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75	Ячмень яровой	Пьявицы, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(2)	-(3)	
Сектор, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Л 126-01-4495-1 01.04.2024 31.03.2034	0,6-0,8	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, семенной скрытнох-ботник, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Свекловичные блошки и долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,6	Рапс яровой	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,6-1,0	Пшеница озимая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
Суперкилл, КЭ (500 г/л + 50 г/л) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - П/Л, Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - П/Л 322-01-4715-1 01.09.2015 31.08.2025	0,6	Рапс	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	43(1)	7(3)	Активен
	0,6	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	7(3)	
	0,6	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	42(1)	7(3)	
	0,6	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	42(1)	7(3)	
	0,6	Рапс	Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	43(1)	7(3)	

	0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	43(1)	7(3)	
	0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	43(1)	7(3)	
	0,6	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	42(1)	7(3)	
	0,6	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	42(1)	7(3)	
	0,6	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	7(3)	
Нуримет Экстра, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Л 063-01-1453-1 12.04.2017 11.04.2027	0,75	Ячмень	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,75-1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пьявицы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
Ципи Плюс, КЭ (480 г/л + 50 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Л, Левей Маркетинг Актиенгезеллышафт ОГРН: - П/Л 184(040)-01-1482-1 26.04.2017 25.04.2027	0,5-0,75	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 28 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
Циклон, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Л 097-01-1643-1 12.12.2017 11.12.2027	0,5-0,6	Рапс	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	55(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75	Ячмень яровой	Пьявицы, злаковые тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
Шаман, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Л 085-01-4136-0 22.06.2023 21.06.2026	0,75-1,0	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пьявица, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,6	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	

	0,5-0,75	Ячень яровой	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
Красицелс, КЭ (500 г/л + 50 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 И/Л 010-01-4768-1 10.01.2025 09.01.2035	0,75	Ячень яровой	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пьявицы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Люцерна	Фитонемус	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Сахарная свёкла	Долгоносик	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Картофель (семенные посевы)	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	58(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Соя	Соевая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	26(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	58(2)	-(3)	

Хлорфлуазурон

Атаброн, КС (107 г/л) ИСК Биосаенсис Юроп Н.В. ОГРН: - И/И 066-01-831-1 29.10.2015 28.10.2025	0,5-0,75	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	7(2)	-(3)	Активен
--	----------	--------	---------------------------------------	--	------	------	---------

Циантринилипрол

Беневиа, МД (100 г/л) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 И/И 489-01-2117-1 22.02.2019 21.02.2029	0,75-1,0	Огурец защищен ого грунта	Белокрылка, трипс табачный, тля	Опрыскивание в период вегетации с добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Интервал между обработками 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	1(4)	1(-)	Активен
	0,5-0,75	Капуста белокочан ная	Капустная тля	Опрыскивание в период вегетации совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(2)	1(-)	
	0,5-0,75	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	1(-)	
	0,5	Капуста белокочан ная	Крестоцветные блошки, капустная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(2)	1(-)	

	0,5-0,75	Лук	Трипсы	Опрыскивание в период вегетации совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	1(-)	
	0,25-0,5	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	- (2)	1(-)	
	0,25-0,5	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка, белянка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(2)	1(-)	
	0,75-1,0	Томат защищенного грунта	Белокрылка, трипс табачный, тля	Опрыскивание в период вегетации с добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Интервал между обработками 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	1(4)	1(-)	
	0,5	Огурец защищенного грунта	Чешуекрылые листогрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	1(4)	1(-)	
	0,5	Томат защищенного грунта	Чешуекрылые листогрызущие вредители, минеры	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработки 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	1(4)	1(-)	
	0,5	Морковь	Морковная листовка	Опрыскивание всходов совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	14(2)	1(-)	
	0,5-0,75	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	14(2)	1(-)	
	0,5-0,75	Томат открытого грунта	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла) Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	- (2)	1(-)	
Веримарк, КС (200 г/л) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-01-2094-1 01.02.2019 31.01.2029	0,25-0,5	Огурец защищенного грунта	Белокрылка, табачный трипс, тли	Внесение под корень при капельном поливе в период вегетации. Интервал между обработками 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	1(4)	1(-)	Активен
	0,375-0,5	Томат открытого грунта	Хлопковая совка, колорадский жук, тли, трипсы	Внесение под корень при капельном поливе. Интервал между обработками 10-14 дней	1(2)	1(1)	
	0,375-0,5	Лук	Луковая муха, трипс	Внесение под корень при капельном поливе. Интервал между обработками 10-14 дней	1(2)	1(1)	
	0,25-0,5	Томат защищенного грунта	Белокрылка, пасленовый минер, тли	Внесение под корень при капельном поливе в период вегетации. Интервал между обработками 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 2500-5000 л/га	1(4)	1(-)	
Фортенза, КС (600 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-3074-1 26.03.2021 25.03.2031	3	Кукуруза	Подгрызающие совки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 13 л/т	- (1)	- (-)	Активен
	5-6	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15-16 л/т	- (1)	- (-)	
	10-14	Подсолнечник	Проволочники, подгрызающие совки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 20-24 л/т	- (1)	- (-)	

Люмипоса, ТС (625 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/- 029-01-2241-1 24.05.2019 23.05.2029	13,3-20,0	Подсолнечник	Проволочники, подгрызающие совки, долгоносики	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 23-30 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	2,7-5,4	Кукуруза	Блошки, проволочники, подгрызающие совки	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13-15 л/т семян	-(1)	-(-)	
	11,4-17,8	Рапс	Крестоцветные блошки, песчаный медляк, рапсовый пилильщик, стеблевой капустный скрытнохоботник, капустная моль, капустная тля	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 22-28 л/т семян	-(1)	-(-)	
Люмипоса КА, ТС (625 г/л) ООО Кортвеа Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/- 866-01-4613-1 14.06.2024 13.06.2034	2,7-5,4	Кукуруза	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 13-15 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	13,3-20,0	Подсолнечник	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 23-30 л/т семян	-(1)	-(-)	

циперметрин

Инта-Вир, ТАБ (37,5 г/л) ООО «ФАСКО +» ОГРН: 1025006178614 III/I 149-01-4581-1 21.05.2024 20.05.2034	1 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	3(1)	3(-)	Активен
	1 таб./10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	7(2)	3(-)	
	2 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	3(1)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Плодожорки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2 л/молрое дерево	7(1)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Смородин а черная	Смородинная стеклянница, тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 2 л/10 кустов	17(2)	3(-)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Плодожорки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л /взрослое дерево	7(1)	3(-)	
Ципи, КЭ (250 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 II/I, Агрия АД ОГРН: - II/I 184(026)-01-3570-1 28.03.2022 27.03.2032	0,1-0,16	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	7(3)	Активен
	0,14-0,24	Крестоцветные культуры (семенные посевы)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	7(3)	
	0,32	Соя	Соевая плодожорка, бобовая огнёвка, луговой мотылек, многоядный листоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	34(2)	7(3)	
	0,2	Пшеница озимая и яровая	Злаковая тля,пьявицы, блошки, пшеничный трипс,клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	43(2)	7(3)	
	0,4	Свекла сахарная	Совки подгрызающие	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	49(2)	7(3)	
	0,48	Картофель (семенные посадки)	Тли-переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)	
	0,16	Капуста	Белянка, совка, моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(3)	7(3)	

	0,48	Свекла сахарная (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)	
Патрий, КЭ (250 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Л 010-01-2638-1 01.04.2020 31.03.2030	0,2	Пшеница озимая и яровая	Злаковая тля, клопы, пьявица, блошки, пшеничный трипс, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,32	Соя	Соевая плодожорка, луговой мотылек, соевый листоед, бобовая огневка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,32	Рапс озимый и яровой, в том числе семенные посевы	Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
Циперус, КЭ (250 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/Л 050-01-4331-1 22.12.2023 21.12.2033	0,15	Кукуруза на зерно	Луговой и кукурузный стеблевой мотыльки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(2)	-(3)	Активен
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	23(2)	-(3)	
Шарпей, МЭ (250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Л 021-01-2589-1 13.03.2020 12.03.2030	0,3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	7(3)	Активен
	0,2-0,38	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,04% Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	25(3)	7(3)	
	0,1-0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,16	Картофель	Картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,15-0,2	Пшеница озимая	Злаковые галлицы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Вредная черепашка, злаковые тли, пьявицы, трипсы, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	2,0 мл/5 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,04% Расход рабочей жидкости - 0,3-0,5 л/куст	25(3)	-(3)	
	0,16	Капуста белокочанная	Белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	25(3)	7(3)	
	1,5 мл/3 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук, картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(2)	-(3)	
	0,1-0,2	Горох	Гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	

0,2-0,25	Пшеница яровая и озимая	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,2	Свекла сахарная и кормовая	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)
0,3	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	7(3)
1,5 мл/3 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	25(3)	-(3)
0,14-0,24	Рапс (семенные посевы)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)
0,3	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,15	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Кукурузный стеблевой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,3	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,1-0,16	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
0,2	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	7(3)
0,24	Люцерна	Луговой мотылек, долгоносики-фитономусы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	7(3)
0,2-0,25	Ячмень яровой и озимый	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)
1,5 мл/5 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация – 0,03% Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево	20(2)	-(3)
0,2	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	7(3)
0,2	Подсолнечник	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)
0,4	Свекла сахарная и кормовая	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	20(2)	7(3)
0,2	Свекла сахарная и кормовая	Свекловичные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	7(3)
0,48	Картофель (семенные участки)	Тли – переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(4)	7(3)
0,1-0,15	Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок младшего возраста. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 14 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	7(3)

	0,2	Лен - долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)	
	0,48	Свекла сахарная и кормовая (семенные участки)	Тли – переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(4)	7(3)	
Циракс, КЭ (250 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 И/И 148-01-853-1 23.03.2015 22.03.2025	0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	Не активен
	0,1-0,16	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Арриво, КЭ (250 г/л) ФМС Кемикал ОГРН: - И/И 051-01-668-1 22.05.2015 21.05.2025	0,04-0,1	Сосна	Большой сосновый долгоносик	Предпосадочное опрыскивание саженцев Расход рабочей жидкости - 5 л/саженец	-(1)	-(3)	Активен
	0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	23(2)	-(3)	
	0,32	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,48	Свекла сахарная (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(4)	-(3)	
	0,48	Картофель (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(4)	-(3)	
	2-4 мл/м2	Хвойные породы	Стволовые и технические вредители: жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые	Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях. Норма расхода на 1 м2 поверхности штабеля Расход рабочей жидкости - 5 л /100м2	-(1)	-(3)	
	0,15	Кукуруза	Кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
	0,1-0,15	Пастбища, дикая растительн ость	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3-х дней после обработки. Сбор грибов и ягод в сезон обработки дикой растительности не допускается Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,14-0,24	Крестоце вные культуры (семенные посевы)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(3)	
	3 мл/м2	Лиственны е и хвойные породы	Стволовые вредители	Инъекция под кору. Норма на 1 м2 поверхности коры дерева	-(1)	-(3)	
Цитокс, КЭ (250 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 И/И	0,15	Кукуруза	Стеблевой кукурузный мотылек	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,32	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	

046-01-1378-1 27.02.2017 26.02.2027	0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, хлебные блошки, пьявицы, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)	
Молния Экстра, КЭ (250 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 Ш/Л 046-01-3584-1 27.02.2017 046-01-3584-1/390 26.02.2027	2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	21(2)	1(-)	Активен
	1,5 мл/100 м2 (Л)	Капуста	Капустная моль, капустная и репная белянка, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	20(2)	1(-)	
	1,5 мл/100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	20(2)	1(-)	

циперметрин + перметрин

Искра, ТАБ (21 г/кг + 9 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 Ш/Л 046-01-2708-1 19.06.2020 18.06.2030	1 таб./10 л воды (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	20(2)	-(3)	Активен
	1 таб./10 л воды (Л)	Смородин а (черная, красная)	Тли	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1,5 л/10 м2	60(2)	-(3)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Яблоня	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	20(1)	-(3)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Огурец и томат открытого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10-20 л/100 м2	20(1)	-(3)	
	1 таб./10 л воды (Л)	Цветочные культуры, декоративные кустарники	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1-2 л/10 м2	-(2)	-(3)	

циперметрин + Хлорпирифос

Нурбел, КЭ (50 г/л + 500 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 Ш/Л 277-01-556-1 13.02.2015 12.02.2025	0,75	Ячмень	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Не активен
	0,75- 1	Пшеница яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, пьявицы, тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс	Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,75- 1	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	

Экстракт натуральных пиретринов

Отравы Доктор Харвест, ВР (50 г/л) «РУССКИЙ ПИРЕТРУМ» ОГРН: 1192375070755 Ш/Л 769-01-3326-1 05.10.2021 04.10.2031	8-20 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенного грунта	Мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	5(5)	1(1)	Активен
	6-18 мл/100 м2 (Л)	Огурец, томат защищенного грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	5(5)	1(1)	
	0,8-2	Огурец, томат защищенного грунта	Мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	5(5)	1(1)	
	13-40 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	5(5)	1(1)	
	1,4-4	Огурец, томат защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	5(5)	1(1)	

	14-40 мл/100 м2(Л)	Огурец, томат защищенн ого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 8-12 л/100 м2	5(5)	1(1)	
	1,3-4	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка, табачный трипс	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	5(5)	1(1)	
	0,6-1,8	Огурец, томат защищенн ого грунта	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	5(5)	1(1)	

Эмаметин бензоат

Дюссак, КЭ (50 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/П 021-01-4448-1 11.03.2024 10.03.2034	0,2-0,3	Капуста белокочан ная	Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(2)	3(3)	Активен
	3-4 мл/10 л воды	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и типа формирования куста) Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	10(1)	3(-)	
	4-5 мл/10 л воды	Яблоня, груша	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	12(3)	3(-)	
	2-3 мл/3 л воды	Капуста белокочан ная	Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	5(2)	3(-)	
	0,3-0,4	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	10(1)	3(3)	
	0,4-0,5	Яблоня, груша	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	12(3)	3(3)	
	0,3-0,4	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	8(2)	3(3)	
	3-4 мл/3 л воды	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	8(2)	3(-)	
Эмаклеим, ВРГ (50 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 ПП/П 389-01-3497-1 24.03.2022 23.03.2032	0,4-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	10(3)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	7(1)	-(3)	
Юнона, МЭ (50 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/П 018-01-2946-1 18.12.2020 018-01-2946-1/452 452 17.12.2030	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовертка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	7(2)	3(-)	Активен
	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	10(3)	3(-)	
	0,3-0,4	Томат открытого грунта	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-20 л/га	5(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	3(3)	

	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	7(2)	3(-)	
	0,3-0,4	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	7(2)	-(3)	
	0,4-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	10(3)	-(3)	
Эмаектин, КЭ (100 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 Ш/Л 197-01-4586-0 23.05.2024 22.05.2027	0,2-0,3	Виноград	Листовертки, листовая филлоксеры, клещи	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	35(3)	3(3)	Активен
	0,2-0,3	Яблоня, груша, айва	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	35(3)	3(3)	

Эмаектин бензоат + Эмаектин бензоат + Люфенурон

Проклэйм Фит, ВРГ, ВДГ (50 г/л + 50 г/кг + 400 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Л, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Л 041-02-3036-1 02.03.2021 26.10.2033	0,3-04	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	-(3)	Активен
	0,3-04	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	7(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600 -1500 л/га	10(3)	-(3)	
	0,2-0,3	Капуста белокочанная	Капустная моль, капустная совка, белянки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	-(3)	

Эсфенвалерат

Молетокс, КЭ (50 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Л 021-01-3034-1 25.02.2021 24.02.2031	5 мл/10 л воды(Л)	Садовые культуры (неплодоносящие сады), декоративные деревья и кустарники	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/ дерево или куст (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)	Активен
	5 мл/10 л воды(Л)	Картофель	Картофельная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	7(1)	3(-)	
Суми-альфа, КЭ (50 г/л) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. ОГРН: - Ш/Л 032-01-2058-1 16.11.2018 15.11.2028	0,2-0,3	Рапс, горчица (кроме масла)	Рапсовые цветоеды, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	Активен
	0,2-0,25	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пшеница	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,15-0,25	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	7(3)	
	0,5-1	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(1)	7(3)	
	0,2	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	

	0,3	Горох (кроме зеленого горошка)	Тли	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	7(3)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2-литров на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	30(1)	7(-)	
Сэмпей, КЭ (50 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/Л 021-01-2605-1 17.03.2020 021-01-2605-1/347 347 16.03.2030	0,2	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	Активен
	0,3-0,8	Рапс яровой и озимый	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Лиственны е породы деревьев	Листогрызущие и сосущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Хвойные породы деревьев	Хвоегрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,08% Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Хвойные породы деревьев	Хвоегрызущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	7(3)	
	5 мл/10 л воды	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	30(1)	3(-)	
	0,2	Лен - долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Кукуруза, подсолнеч ник, соя	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	7(3)	
	0,5-1,0	Лиственны е породы деревьев	Листогрызущие и сосущие вредители	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях не ранее 30 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	7(3)	
	2,0 мл/3 л воды	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	30(1)	3(-)	

Фунгицид

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Bacillus amyloliquefaciens KC-2 + Bacillus amyloliquefaciens KC-2

БФТИМ KC-2, Ж (1×10 ⁹ КОЕ/Мл + 1×10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО «ПАРАДИГМА» ОГРН: 1132311008004 III/III 430-02-1644-1 12.12.2017 11.12.2027	5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)	Активен
	2	Пшеница озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(2)	-(-)	
	1,5-2	Пшеница озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса	Обработке семян за 1-2 суток до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	3-4	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков болезней, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	2	Ячмень озимый	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(2)	-(-)	
	5-6	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)	
	5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)	
	2	Пшеница озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(2)	-(-)	
	3-4	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков болезней, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	

	5-6	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)	
	1,5-2	Ячмень озимый	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян за 1-2 суток до почва Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-2	Ячмень озимый	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян за 1-2 суток до почва Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Bacillus amyloliquefaciens, штамм OPS-32

Органика С, Ж (5×10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 IV/III 222-02-1425-1 29.03.2017 28.03.2027	0,4 л/т	Ячмень яровой	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, плесневение семян (при слабом развитии болезни)	Обработка семян за 1-2 суток до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2 л/га	Сахарная свекла	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	0,4	Пшеница яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, ржавчина бурая, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Предпосевная обработка семян за 1-2 суток до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4 л/га	Ячмень яровой	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, плесневение семян (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – образование 3-го узла Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(1)	
	0,4	Пшеница яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, ржавчина бурая, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – образование 3-го узла Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(1)	

Bacillus amyloliquefaciens, штамм QST-713

Серенада АСО, КС (1×10 ⁹ КОЕ/Мл) Байер АГ (Германия) ОГРН: - III/III 780-02-3408-1 10.12.2021 09.12.2031	6,5-8	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	7(5)	1(1)	Активен
	6,5-8	Томат открытого грунта	Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	7(5)	1(1)	

5	Капуста белокочан ная	Черная ножка, фузариозное увядание	Полив почвы до или после посева семян на 1-2 сутки и полив рассады за 3-4 дня до высадки в поле Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
8	Цветочные культуры открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(5)	1(1)
6,5-8	Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	7(5)	1(1)
5-8	Перец защищен ного грунта	Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз (при умеренном развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	7(5)	1(1)
8	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
8	Морковь	Мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	1(1)
5-8	Капуста белокочан ная	Слизистый бактериоз и сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	1(1)
5-8	Перец открытого грунта	Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз (при умеренном развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	7(5)	1(1)
6,5-8	Баклажан защищен ного грунта	Серая гниль, альтернариоз при умеренном развитии болезни	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	7(5)	1(1)
8	Укроп	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(5)	1(1)
6,5-8	Яблоня	Парша, мучнистая роса, бактериальный ожог (на фоне умеренного развития болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	7(5)	1(1)
6,5-8	Цветочные культуры защищен ного грунта (включая розы)	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(5)	1(1)

6,5-8	Томат защищенного грунта	Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	7(5)	1(1)
5-8	Картофель	Альтернариоз, фитофтороз (при умеренном развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	1(1)
8	Салат	Ложная мучнистая роса (на фоне умеренного развития болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(5)	1(1)
6,5-8	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, угловая пятнистость, мучнистая роса (на фоне умеренного развития болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1500-2000 л/га	7(5)	1(1)
8	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, угловая пятнистость, мучнистая роса (на фоне умеренного развития болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	7(5)	1(1)
8	Чеснок яровой и озимый (посадочный материал)	Пероноспороз при умеренном развитии болезни	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	1(1)
6,5-8	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	7(5)	1(1)
8	Лук	Пероноспороз при умеренном развитии болезни	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	1(1)
8	Баклажан открытого грунта	Серая гниль, альтернариоз при умеренном развитии болезни	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	7(5)	1(1)
8	Смородина, крыжовник	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	7(5)	1(1)
6,5-8	Дыня, арбуз	Пероноспороз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	7(5)	1(1)

	2	Картофель	Гнили в период хранения: мокрая бактериальная, фомоз	Обработка перед закладкой на хранение с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 5,0 л/т	-(1)	1(1)	
Bacillus mojavensis штамм PS 17							
Системика М, Ж (1-5×10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 IV/III 173-02-4796-0 30.01.2025 29.01.2028	1,0-1,5 л/га	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения – образование 3-го узла. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	1(1)	Активен
	1,0-1,5 л/га	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, желтая ржавчина, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения – образование 3-го узла. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	1(1)	
	7,0-10,0 л/га	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	1(1)	
	1,0 - 2,0 л/га	Кукуруза	Фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная пятнистость, фузариоз початков	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу 3- 5 листьев, второе – в фазу начала бутонизации, с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	
	1,0-1,5 л/га	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения – образование 3-го узла. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)	
	0,5-0,7 л/т	Пшеница озимая, яровая	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	
	1,0-1,2 л/т	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз, белая гниль	Предпосевная обработка семян за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	
	1,0-2,0 л/га	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу 3- 5 листьев, второе – в фазу начала бутонизации, с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	
	1,0-2,0 л/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу 3- 5 настоящих листьев, второе – перед смыканием рядков, с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	
	0,5-0,7 л/т	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	
	1,0-1,2 л/га	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации для профилактики заболеваний с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	0,5-0,7 л/т	Соя	Корневые гнили, плесневение семян	Предпосевная обработка за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	

	1,0-2,0 л/га	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – образование 3-го узла Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(2)	1(1)	
--	--------------	-----	-----------	--	------	------	--

Bacillus subtilis

<p>Бактерра, СП (10⁹ КОЕ/г) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 ПП/П 008-02-2339-1 26.07.2019 25.07.2029</p>	10-20 г/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, фузариозное(трахеомикозное) увядание, бурая пятнистость, корневые гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)	Активен
	10-20 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядания трахеомикозное увядание, белая и серая гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)	
	30-50 л/3 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кг	-(1)	1(1)	
	30-50 л/3 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кг	-(1)	1(1)	
	20-30 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кг	-(1)	1(1)	
	10-20 г/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, фузариозное(трахеомикозное) увядание, бурая пятнистость, корневые гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	1(1)	
	20-30 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кг	-(1)	1(1)	
	10-20 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядания трахеомикозное увядание, белая и серая гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	1(1)	

Bacillus subtilis B-76

<p>Биосфера-Фунгимен, КС (0,101 КОЕ/Мл) ООО НПП БИОСФЕРА ОГРН: 1170280080453 ПП/П 850-02-3910-1 16.12.2022 15.12.2032</p>	0,5 л/га	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазах смыкания рядков – бутонизация, повторно – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400 - 600 л/га	-(3)	1(1)	Активен
	0,1 л/т	Пшеница яровая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,1 л/га	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина (при слабом развитии болезней), септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период фазы кущения-выход в трубку Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	0,2 л/т	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
<p>Фитобактерин+, СП (10⁹ КОЕ/г) ООО «ОРТОН»</p>	20 г/20 л (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	5(2)	1(1)	Активен

ОГРН: 1025004916573 III/III 033-02-3523-1 14.03.2022 13.03.2032	20 г/20 л (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	5(2)	1(1)
	20 г/20 л (Л)	Огурец открытого грунта	Корневая и прикорневая гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)

Bacillus subtilis BKM B-2604D + Bacillus subtilis BKM B-2605D

Витаплан, СП (10 ¹⁰ КОЕ/г + 10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - III/III 139-02-4602-1 07.06.2024 06.06.2034	80-120 г/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1500-2000 л/га	-(3-4)	1(1)	Активен
	40 г/га	Лен - долгунец	Пасмо	Опрыскивание в период вегетации: в фазу «елочка», в фазу бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	1(1)	
	80-100 г/га	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание по всходам и далее в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(4)	1(1)	
	20-40 г/га	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, корневые гнили (фузариозная и гельминтоспориозная)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	20-30 г/т	Соя	Фузариозные корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	40 г/га	Кукуруза	Стеблевая гниль (фузариозная гниль)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	1(1)	
	80-100 г/га	Лук репка, чеснок	Гниль донца	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(4)	1(1)	
	80-100 г/га	Лук на перо	Гниль донца	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(4)	1(1)	
	20 г/т	Кукуруза	Стеблевая гниль (фузариозная гниль)	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	20 г/т	Лук репка, чеснок	Гниль донца	Предпосевная обработка луковиц, зубков Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	20-40 г/га	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	1(1)	
	80 г/га	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	20-40 г/га	Свекла сахарная и столовая	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	20 г/т	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, корневые гнили (фузариозная и гельминтоспориозная)	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	20 г/т	Капуста (белокочан ная, цветная, брокколи)	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

80-120 г/га	Виноград	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1500-2000 л/га	-(3-4)	1(1)
80-120 г/га	Арбуз, дыня	Антракноз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-28 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(5-6)	1(1)
40-80 г/га	Капуста (белокочанная, цветная, брокколи)	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(4-5)	1(1)
80-120 г/га	Арбуз, дыня	Корневые и прикорневые гнили	Пролив грунта (или внесение в каплю) за 1-3 суток до высева семян, перед высадкой рассады и через 1 месяц после высадки рассады, далее в период вегетации с интервалом 14-28 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(5-6)	-(-)
80 г/га	Подсолнечник	Серая и белая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	1(1)
20 г/т	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз	Предпосевная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
20 г/т	Свекла сахарная и столовая	Корнеед	Предпосевная обработка семян (полусухое протравливание) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Bacillus subtilis штамм Ч-13

<p>БисолбиСан, Ж (100×10⁶ КОЕ/Мл) ООО «Бисолби-Интер» (Санкт-Петербург) ОГРН: - IV/III 174-02-4328-1 21.12.2023 20.12.2033</p>	20-30 мл/10-15 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Черная ножка, сосудистый и слизистый бактериозы	Полив рассады под корень 0,2% рабочим раствором перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 50-100 мл/растение	-(1)	-(-)	Активен
	2 мл/кг семян	Капуста белокочанная	Черная ножка, сосудистый и слизистый бактериозы	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
	20 мл/4 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Альтернариоз, сосудистый и слизистый бактериозы	Опрыскивание по вегетации: первое через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место, последующее – через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²	-(2)	1(1)	
	2 мл/л воды (Л)	Капуста белокочанная	Черная ножка, сосудистый и слизистый бактериозы	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	
	2 л/га	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	
	200 мл/1-2 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1-2 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)	
	20 мл/4 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²	-(2)	1(1)	

2-3 л/га	Капуста белокочанная	Черная ножка, сосудистый и слизистый бактериозы	Полив рассады под корень 0,2% рабочим раствором перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(1)	-(-)
2 л/т семян	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2-3 л/га	Соя	Фузариоз, церкоспороз, альтернариоз при слабом развитии болезни	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу развития боковых побегов, последующие –с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
1 л/т	Соя	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 л/га	Капуста белокочанная	Альтернариоз, сосудистый и слизистый бактериозы	Опрыскивание в период вегетации: первое через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место, последующее – через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
1 л/т	Пшеница яровая и озимая	Фузариозные и гельминтоспориозны е корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян за 5-7 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Bacillus subtilis, B1018

Пралин Экстра, СП (10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО «БИОМ-ПРО» ОГРН: 1075009002254 Ш/Ш 101-02-4366-1 17.01.2024 16.01.2034	60 г/га	Розы защищен ного грунта	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов и далее через 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)	Активен
	60 г/га	Томат защищен ного грунта	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов и далее через 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	1(1)	
	60 г/га	Огурец защищен ного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов и далее через 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	1(1)	
	60 г/га	Огурец защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	-(-)	
	60 г/га	Розы защищен ного грунта	Трахеомикозное увядание	Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	-(-)	
	60 г/га	Салат-лату к листовой и кочанный защищен ного грунта	Ризоктониоз, белая гниль, серая гниль	Внесение под корень при поливе (в гидропонный раствор) с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 10000-40000 л/га	-(2)	-(-)	
	3 г/250 л субстрата	Салат-лату к листовой и кочанный защищен ного грунта	Ризоктониоз, белая гниль, серая гниль	Внесение в субстрат непосредственно перед посевом культуры.	-(1)	-(-)	
	60 г/га	Томат защищен ного грунта	Черная ножка, фузариозная гниль корней, фузариозное увядание	Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	-(-)	

Bacillus subtilis, штамм 26 Д + Bacillus subtilis, штамм 26 Д + Bacillus subtilis, штамм 26 Д

Фитоспорин-М, Ж, П, ПС (100×10 ⁶ живых клеток и спор/г + 1×10 ⁹ спор/Мл + 2×10 ⁹ живых клеток и спор/г) ООО «НВП «БАШИНКОМ» ОГРН: 1020202557121 III/III, ООО «НВП «БАШИНКОМ» ОГРН: 1020202557121 IV/III, ООО «НВП «БАШИНКОМ» ОГРН: 1020202557121 IV/III 016-02-2490-1 05.12.2019 04.12.2029	1 л/га	Пшеница озимая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы кущения и выход в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(1)	Активен
	2 г/5 л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Опрыскивание рассады через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)	
	3 мл/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	
	20 г/10 л воды (Л)	Огурец защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку 0,2%-й рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный – под корень с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)	
	10-15 мл/5 л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Опрыскивание растений через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)	
	0,6 г/ л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/100-150 растений	-(1)	-(-)	
	40-50 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку 0,4-0,5 % рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный – под корень с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)	
	0,3 г/1 л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м ²	-(1)	1(-)	
	6 л/га	Цветочные культуры открытого и защищен ного грунта	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 10000 л/га или 1 л/м ²	-(1)	-(-)	
	8-10 л/га	Огурец защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозноеувядание	Полив в лунку при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом в 3 недели Расход рабочей жидкости - 2000-3000 л/га	-(2)	-(-)	
	40-50 мл/10 л воды (Л)	Томат защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Полив в лунку 0,4-0,5% рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	-(1)	-(-)	
	2 г/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкания рядков – бутонизация, повторно – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)	
	1,5 г/л воды (Л)	Огурец защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в суспензии в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	

2 г/10 л воды (Л)	Цветочные растения открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)
1 л/т	Морковь	Гнили при хранении: белая, серая, черная, фомоз	Обработка корнеплодов перед закладкой на хранение с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 2-3 л/т	-(1)	-(-)
3 г/10 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)
2 г/6-8 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 6-8 л/100 м2	-(3)	1(-)
3 г/10 л воды (Л)	Цветочные растения открытого и защищенного грунта	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 10 л/10 растений	-(1)	-(-)
1,5 г/л воды (Л)	Капуста белокочанная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
0,2 г/л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(1)	1(-)
20 г/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Полив в лунку 0,2%-й рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	-(1)	-(-)
1 л/га	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазы кущения и выход в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(1)
0,4 г/л воды (Л)	Капуста белокочанная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
20-30 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корней рассады в суспензию препарата в течение 1-2 часов перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,2% рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт Расход рабочей жидкости - 150-200 мл/растение (полив)	-(1)	-(-)
0,3 г/1 л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 1 л/10 растений	-(1)	-(-)
20 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Гнили при хранении: монилиальная, серая, пенициллезная, фитофторозная, оливковая плесневидная	Опрыскивание плодоносящих деревьев за сутки или в день снятия плодов Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	1(-)

15 мл/5 л воды (Л)	Земляника	Серая гниль, белая пятнистость, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы: выдвижение цветоносов, начало цветения, начало созревания ягод, перед уборкой урожая Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(3-4)	1(-)
3 мл/кг	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
3 г/10 л воды (Л)	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации до цветения и после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(2)	1(-)
4 мл/л воды (Л)	Земляника	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корневой системы в 0,4 %-й рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)
1,5-2 л/га	Виноград	Оидиум, черная гниль, серая гниль, милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	1(1)
1 л/га	Томат защищенного грунта	Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(2-3)	1(-)
100 мл/л воды (Л)	Морковь	Гнили при хранении: белая гниль, серая гниль, черная сухая гниль, фомоз	Обработка корнеплодов перед закладкой на хранение с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
20 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Оидиум, черная гниль, серая гниль, милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(4)	1(-)
2 г/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)
40 мл/10 л воды	Земляника	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корневой системы в 0,4 % рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/1000 растений	-(1)	-(-)
40-50 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корней рассады в рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,4-0,5% рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт Расход рабочей жидкости - 150-200 мл/растение (полив)	-(1)	-(-)
0,2 г/л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)

0,6 л/га	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	1(1)
3 г/10 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 10 л/10 растений	-(1)	-(-)
0,5-1 л/т	Свекла сахарная	Кагатные гнили	Обработка корнеплодов перед закладкой на хранение в кагаты Расход рабочей жидкости - 3 л/т	-(1)	-(-)
5 г/10-15 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Альтерналиоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м ²	-(2-3)	1(-)
2 л/га	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, начало цветения, после цветения, завязь размером до 1,5 см, плод размером с «лещину» Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(5)	1(1)
8-10 л/га	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Полив в лунку при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 2000-3000 л/га	-(1)	-(-)
3 мл/л воды (Л)	Капуста белокочанная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
4-6 л/га	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1500-2000 л/га	-(2-3)	1(-)
5-6 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,05 % рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений (погружение)	-(1)	-(-)
0,4 г/л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
1,5-2 л/га	Земляника	Серая гниль, белая пятнистость, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы: выдвижение цветоносов, начало цветения, начало созревания ягод, перед уборкой урожая Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3-4)	1(1)

20-25 г/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое в фазах смыкания рядков - бутонизация, повторно – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)
10 мл/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое профилактическое, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)
1 л/га	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	1(1)
20-30 г/6-8 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 6-8 л/100 м ²	-(3)	1(-)
1 л/т	Пшеница яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
100 мл/л воды (Л)	Картофель	Гнили при хранении: ризоктониоз, фузариозная сухая гниль, мокрая бактериальная гниль, фомоз	Обработка клубней перед закладкой на хранение с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
0,3 г/л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 1 л/10 растений	-(1)	-(-)
0,6 мл/л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м ²	-(1)	1(-)
3 г/10 л воды (Л)	Роза открытого и защищенного грунта	Мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина	Опрыскивание растений в период вегетации: профилактическое до цветения и повторно через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(2)	1(-)
0,2 г/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
0,4 г/л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
5-6 г/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Полив в лунку 0,05-0,06% рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	-(1)	-(-)
200 г/1-2 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1-2 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)

2 л/га	Яблоня	Гнили при хранении: монилиальная, серая, пенициллезная, фитофторозная, оливковая плесневидная	Опрыскивание плодоносящих деревьев за сутки или в день снятия плодов Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(1)	1(1)
40-60 мл/15-20 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 15-20 л/100 м2	-(2-3)	1(-)
1,5 г/л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
6 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого и защищенного грунта	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 10 л/10 растений	-(1)	-(-)
5 г/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(2)	1(-)
0,8-1 л/т	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
3,0 мл/кг	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
1 л/т	Картофель	Гнили при хранении: сухая фузариозная, мокрая бактериальная, фомоз	Обработка клубней перед закладкой на хранение с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 2-3 л/т	-(1)	-(-)
1,5 г/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
20 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, начало цветения, после цветения, завязь размером до 1,5 см, плод размером с «лещину» Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(5)	1(-)
5-6 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корней рассады в суспензию препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,05 % рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт Расход рабочей жидкости - 150-200 мл/растение (полив)	-(1)	-(-)
3 мл/кг	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)

3,0 мл/кг	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
3 мл/л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
4 мл/л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Погружение корней рассады в рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/100-150 растений	-(1)	-(-)
100 мл/л воды (Л)	Яблоки	Гнили при хранении: монилиальная, серая, пенициллезная, фито фторозная, оливковая плесневидная	Обработка плодов перед закладкой на хранение с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
5 г/10 л воды (Л)	Огурец защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку 0,05% рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место, повторный – под корень с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)
20-30 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корней рассады в суспензию препарата в течение 1-2 часов перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,2% рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений (погружение)	-(1)	-(-)
6-8 г/5 л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Опрыскивание растений через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)
4 л/га	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазы смыкание рядков – бутонизация; последующее - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	-(1)
100 мл/1-2 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1-2 л/100 кг	-(1)	-(-)
0,6 мл/л воды (Л)	Комнатные цветочные растения	Корневые гнили	Полив почвы под корень больного растения Расход рабочей жидкости - 1 л/10 растений	-(1)	-(-)
6 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры открытого и защищен ного грунта	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(1)	1(-)
20-30 г/15-20 л воды (Л)	Огурец защищен ного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10-20 л/100 м ²	-(2-3)	1(-)
40-50 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазы смыкание рядков – бутонизация, последующее - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	1(-)

40-50 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Погружение корней рассады в рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень 0,4-0,5% рабочей жидкостью через 3 дня после высадки в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений (погружение)	-(1)	-(-)
3,0 мл/кг	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Замачивание семян перед посадкой в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
1,5-2 л/т	Пшеница озимая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, мучнистая роса	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
4,0 л/га	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(3)	1(1)
50 г/1-2 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1-2 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)
10 мл/10-15 л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание растений в период вегетации: первое -профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м2	-(2-3)	1(-)
40 мл/10 л воды	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Погружение корней рассады в рабочий раствор препарата на 1-2 часа перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 10 л/1000 растений	-(1)	-(-)
3 мл/л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, бактериальный рак (при слабом и умеренном развитии болезней)	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
2 г/15-20 л воды (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 15-20 л/100 м2	-(2)	1(-)
2 г/10-15 л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Альтернариоз, фитофтороз (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м2	-(2-3)	1(-)
40-50 мл/6-8 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое - профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 6-8 л/100 м2	-(3)	1(-)
1,5 г/л (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)

3 мл/л воды (Л)	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Замачивание семян перед посевом в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
2-3 г/л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Погружение корней рассады в суспензию препарата в течение 1-2 часов перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/100-150 растений	-(1)	-(-)
1 л/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	1(1)
1-1,5 л/га	Капуста белокочан ная	Черная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание	Опрыскивание растений через 7-10 дней после высадки в грунт и повторно через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	-(2)	1(1)

Bacillus subtilis, штамм 63-Z

<p>Баксис, Ж (10⁹ КОЕ/Мл) ООО «Инвиво» ОГРН: 1082323000495 III/III 242-01-1501-1 22.05.2017 21.05.2027</p>	1 л/т	Пшеница озимая, ячмень озимый	Гельминтоспориозна я корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистости	Предпосевная обработка семян за 3-12 дней до посева или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	3-5 л/га	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(2)	1(1)	
	3-5 л/га	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200 -400 л/га	-(1)	1(1)	
	2-3 л/га	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации для профилактики и/или при первых признаках заболевания Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1-2)	1(1)	
	4-7 л/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие опрыскивания – после цветения с интервалом 10-15 дней) Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(4)	1(1)	
	2-5 л/га	Лук	Шейковая гниль, пероноспороз	Обработка почвы перед посевом и/или через 15 дней после посева, повторная обработка – через 1-1,5 месяца Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)	
	3-5 л/га	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	1(1)	
	1 л/т	Подсолнеч ник	Серая гниль, семенная инфекция; белая гниль, прикорневая форма, альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1 л/т	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозные корневые стеблевые гнили, фузариоз и плесневение семян початков	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

20 мл/кг	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
3-5 л/га	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	1(1)
3 л/га	Лук	Шейковая гниль, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: 1-ое – по всходам, последующие с интервалом 10 дней Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(4)	1(1)
20 мл/кг	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
3-8 л/га	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 18-20 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2-4)	1(1)
1-1,5 л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, риносפורиоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)
1 л/т	Пшеница яровая, ячмень яровой	Гельминтоспоризм я корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистость листьев	Предпосевная обработка семян за 3-12 дней до посева или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
20 мл/кг	Огурец защищен ного грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
2 л/га	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)
3-5 л/га	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200 -400 л/га	-(-)	1(1)
1-1,5 л/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, риносפורиоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)
2 л/га	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)
3-5 л/га	Огурец защищен ного грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)
20 мл/кг	Огурец защищен ного грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
3 л/га	Лук	Шейковая гниль, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: 1-ое – по всходам, последующие с интервалом 10 дней Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(4)	1(1)

2-3 л/га	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации для профилактики и/или при первых признаках заболевания Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1-2)	1(1)
1-2 л/т	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
4-7 л/га	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие опрыскивания – после цветения с интервалом 10-15 дней) Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(4)	1(1)
3-5 л/га	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
4-8 л/га	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль, церкоспориоз	Опрыскивание лозы в фазу начала движения сока и набухания почек. Повторная обработка – в фазу 2-4 листьев, перед и после цветения Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(2)	1(1)
20 мл/кг	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
20 мл/кг	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, корневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
1 л/т	Пшеница яровая, ячмень яровой	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистость листьев	Предпосевная обработка семян за 3-12 дней до посева или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-2 л/т	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 л/т	Пшеница озимая, ячмень озимый	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, каменная головня; пыльная головня; пятнистости	Предпосевная обработка семян за 3-12 дней до посева или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
3-5 л/га	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Внесение в почву перед посевом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
4-8 л/га	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль, церкоспориоз	Опрыскивание лозы в фазу начала движения сока и набухания почек. Повторная обработка – в фазу 2-4 листьев, перед и после цветения Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(2)	1(1)
2-5 л/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая – через 2 недели после появления всходов и далее при необходимости через 14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	1(1)

3-8 л/га	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, корневые гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)
3-5 л/га	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили, угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)
3-8 л/га	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, корневые гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)
2-5 л/га	Лук	Шейковая гниль, пероноспороз	Обработка почвы перед посевом и/или через 15 дней после посева, повторная обработка – через 1-1,5 месяца Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
3-5 л/га	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, корневые и прикорневые гнили	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(2)	1(1)
3-8 л/га	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 18-20 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2-4)	1(1)
1 л/т	Соя	Аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-1,5 л/га	Пшеница озимая, ячмень озимый	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)
20 мл/кг	Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, бактериальный рак, корневые гнили	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
2-5 л/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая – через 2 недели после появления всходов и далее при необходимости через 14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	1(1)
1-1,5 л/га	Пшеница озимая, ячмень озимый	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в фазу начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	1(1)
20 мл/кг	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Предпосевное замачивание семян в 2% рабочем растворе в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)

Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР + Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР + Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР

Алирин-Б, СП, Ж, ТАБ (10 ⁹ КОЕ/мл + 10 ⁹ КОЕ/г + 10 ¹¹ КОЕ/г) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III, ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III, ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III,	10-20 таб./15 л (Л)	Томат защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз	Опрыскивание растений в фазы начало цветения – плодообразование с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м ²	-(3)	1(1)	Активен
	60-120 г/га	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, фитофтороз	Полив грунта под корень при появлении первых симптомов болезни, затем – с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 500-3000 л/га	-(3)	-(-)	
	3-6	Картофель	Фузариоз, альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 250 л/га	-(3)	1(1)	

60-150 г/га	Огурец защищен ного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 500-3000 л/га	-(2)	1(1)
2 таб./1 л (Л)	Цветочные растения открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(3)	1(1)
2-4	Ячмень яровой и озимый	Корневая, прикорневая гниль	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-10 таб./10 л (Л)	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание растений суспензией препарата в фазах начало цветения – плодообра-зование с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	1(1)
2	Соя	Корневая гниль, фузариозное увядание	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
3-5	Капуста белокочан ная	Черная ножка	Внесение в рассадную смесь или субстрат для посадки рассады Расход рабочей жидкости - 250 л/га	-(1)	-(-)
2-3	Лук	Шейковая гниль и гниль донца	Полив под корень Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(3)	1(1)
2-3	Соя	Пероноспороз	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	1(1)
2-6	Свекла столовая	Церкоспороз, корнеед	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(2-3)	1(1)
3	Арбуз	Альтернариоз,фузари оз	Полив лунок, полив под корень Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(1+3)	-(-)
1-2 таб./10 л (Л)	Томат открытого грунта	Корневая иприкорневаягниль,ф итофтороз,альтернар иоз	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян, перед высадкой рассады, затем через 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2	-(3)	-(-)
2	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль,альтернариоз, фитофтороз	Полив лунок при высадке рассады, полив под корень в период вегетации Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(1+3)	-(-)
1 таб./5 л (Л)	Рассада цветочных культур	Черная ножка, корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив грунта суспензией препарата перед посевом семян и пикировкой рассады с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/м2	-(2)	-(-)
3	Кукуруза	Стеблевая гниль	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(1)
120 г/га	Зеленые культуры (салат, укроп, петрушка, руккола?, кинза?)	Корневые гнили	Полив под корень суспензией препарата (внесение в гидропонный раствор) в период вегетации с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(6)	-(-)
1 таб./1 л (Л)	Комнатные цветочные растения	Корневая гниль,трахеомикозно еувядание	Полив грунта в горшках с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 0,1-1 л/1 горшок	-(3)	-(-)
60-120 г/га	Томат защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов болезни, затем – с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 500-3000 л/га	-(2)	1(1)

2-3	Зеленые культуры (салат, укроп, петрушка, руккола?, кинза?)	Корневая и прикорневая гниль	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(4-6)	1(1)
2-3	Кабачок, тыква	Мучнистая роса, альтернариоз, серая гниль	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	1(1)
3	Арбуз	Альтернариоз, фузариоз	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	1(1)
1-2 таб./10 л (Л)	Томат защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз	Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян, перед высадкой рассады и в рассадный период с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(3)	-(-)
1-2 таб./10 л (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
2-3	Морковь	Корневая гниль	Полив под корень Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(3)	-(-)
5-10 таб./10 л (Л)	Земляника садовая	Серая гниль	Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации, после цветения и в начале формирования ягод с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
2-4	Пшеница яровая и озимая	Септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период кущения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)
2-3	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	-(4)	1(1)
4-5	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание деревьев Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(4)	1(1)
4-6 таб./0,3 л (Л)	Картофель	Ризиктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 0,3 л/10 кг Расход рабочей жидкости - 0,3 л/10 кг	-(1)	-(-)
5-10 таб./10 л (Л)	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в фазы начала бутонизации, начала цветения, плодообразование с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
2-4	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период кущения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)
2-6	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(2-3)	1(1)
3	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(4)	1(1)
2-3	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(1)
3	Перец сладкий	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив лунок, полив под корень или через систему капельного полива Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(1+3)	-(-)
2 таб./1 л (Л)	Комнатные цветочные растения	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/1 м ²	-(3)	1(1)

1 таб./5 л (Л)	Цветочные растения открытого грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив грунта под корень в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/1 м ²	-(3)	-(-)
5-10 таб./10 л (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание вегетирующих растений в фазы бутонизации и после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м ² Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
3-6	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(4)	1(1)
4-5	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(4)	1(1)
1-2 таб./10 л (Л)	Огурец открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль	Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
60 г/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив грунта через 14-15 дней после посадки рассады на постоянное место, затем – с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(3)	-(-)
2 г/кг	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, фитофтороз	Замачивание семян с последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
3	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль, альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
2	Перец сладкий	Альтернариоз, серая гниль	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(5)	1(1)
5-10 таб./15 л (Л)	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание растений в фазы начало цветения – плодообразование с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 15 л/100 м ²	-(3)	1(1)
3-6	Картофель	Фузариоз, альтернариоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10-25 таб./10 м ²	Рассада цветочных культур	Черная ножка, корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив грунта суспензией препарата перед посевом семян и пикировкой рассады Расход рабочей жидкости - 50 л/10 м ²	-(2)	-(-)
2-4	Пшеница яровая и озимая	Корневая, прикорневая гниль	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР, Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР, Trichoderma harzianum, Штамм ВИЗР-18

Микозар, СП (5x10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - ПП/- 139-02-4477-1 22.03.2024 21.03.2034	200-300	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(6)	1(1)	Активен
	200-300	Роза защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Капельный полив под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем – с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(6)	-(-)	
	200-300	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив субстрата под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем – с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	-(5)	-(-)	

200-300	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(5)	1(1)
200-300	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(5)	1(1)
200-300	Томат защищенного грунта	Трахеомикозное увядание	Полив субстрата под корень после высадки рассады и при появлении первых симптомов болезни, затем – с интервалом 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	-(5)	-(-)

Bacillus subtilis, штамм BL01 + Bacillus subtilis, штамм BL01

Бисолбицид, Ж (10 ⁸ КОЕ/мл + 0,108 КОЕ/мл) ООО «Бисолби-Интер» (Санкт-Петербург) ОГРН: - Ш/Ш 174-02-1916-1 16.05.2018 15.05.2028	10 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Полив рассады под корень 0,1%-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 50-100 мл/растение	-(1)	1(-)	Активен
	2 мл/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)	
	2 мл/кг	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(1)	
	1 л/га	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Полив рассады под корень 0,1 %-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	1(1)	
	2-3 мл/4 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(3)	1(-)	
	2-3 л/га	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)	
	1 л/га	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Полив рассады под корень 0,1 %-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	1(1)	
	2 мл/л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)	
	2-3 мл/4 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²	-(3)	1(-)	

	2 мл/кг	Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(1)	
--	---------	------------------------------	--	---	------	------	--

Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215

<p>Бактофит, СК, СП (2×10⁹ спор/Мл+10000ЕА/мл) ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 III/III, ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 IV/III 034-02-3860-1 08.11.2022 034-02-3860-1/474 474, 034-02-2049-1/365 365 07.11.2032</p>	7-14 (Л)	Томат защищен-н ого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(6)	1(1)	Активен
	7,0-14,0	Томат защищен-н ого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	-(6)	1(1)	
	3,0-5,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3-5)	1(1)	
	3	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие - с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3-5)	1(1)	
	3	Ячмень яровой	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Предпосевная обработка семян за 1-5 суток Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	7,0-14,0	Огурец защищен-н ого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	-(6)	1(1)	
	2	Ячмень яровой	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	30 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3-5)	1(1)	
	3	Пшеница озимая и яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз, ржавчина бурая	Предпосевная обработка семян за 1-5 суток Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	3,0 кг/т	Пшеница озимая, яровая	Гельминтоспориозна я корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка семян с увлажнением Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	

2	Пшеница озимая и яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз, ржавчина бурая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
5,0 г/л (Л)	Цветочные культуры открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(3)	1(1)
30-50 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3-5)	1(1)
7-14 (Л)	Огурец защищен-ного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(6)	1(1)
5,0 кг/га	Цветочные культуры открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	1(1)

Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР + Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР + Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР

Гамаир, КС, СП (10^9 КОЕ/г + 10^11 КОЕ/г + 10^10 КОЕ/Мл) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - Ш/Ш, ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/Ш, ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - Ш/Ш 139-02-2349-1 15.08.2019 24.01.2033	2 таб./1 л (Л)	Цветочные растения открытого грунта	Септориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(3)	-(-)	Активен
	1-2 таб./10 л (Л)	Огурец открытого грунта	Корневая гниль	Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2	-(1)	-(-)	
	20 таб./100 м2	Цветочные культуры открытого грунта	Септориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	1(1)	
	5-10 таб./10 л (Л)	Капуста белокочанная	Сосудистый ислизистый бактериоз	Опрыскивание растений в фазу 4-5 настоящих листьев, затем с интервалом 15- 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	1(1)	
	1-2 таб./10 л (Л)	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз, альтернариоз	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2	-(1)	-(-)	
	5-10 таб./10 л (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания, затем - с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	1(1)	
	5 таб.10 м2	Горшечные цветочные культуры защищенного грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив грунта в горшках с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 25 л/10 м2	-(3)	-(-)	
	5-10 таб./15 л (Л)	Томат защищенного грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 15 л/100м2	-(3)	1(1)	
	1 таб./1 л (Л)	Комнатные цветочные растения	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив грунта в горшках с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 0,1- 1л/1 горшок	-(3)	-(-)	

5-10	Огурец защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль фузариозно-питиозной этиологии, трахеомикозное увядание фузариозно-вертициллезной этиологии, переноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 500 - 2000 л/га	-(6)	1(-)
5-10	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, серая гниль, белая гниль, некроз сердцевин стебля, бактериальный рак	Полив грунта перед посевом семян, перед высадкой рассады в грунт, полив под корень в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(6)	-(-)
1-2 таб./10 л (Л)	Томат защищенного грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
5-10	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, серая гниль, белая гниль, некроз сердцевин стебля, бактериальный рак	Опрыскивание растений Расход рабочей жидкости - 500- 2000 л/га	-(6)	1(-)
60-120 г/га	Томат защищенного грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	Опрыскивание растений в период вегетации: при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 500-3000 л/га	-(3)	1(1)
20 таб./100 м ²	Горшечные цветочные культуры защищенного грунта	Антракноз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(3)	1(1)
1-2 г/кг	Томат защищенного грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 час с последующим подсушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
60 г/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, белая и серая гнили, мучнистая роса	Полив грунта через 14-15 дней после высадки рассады, затем – с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 500-3000 л/га	-(3)	-(-)
5-10 таб./10 л (Л)	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазах розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(3)	1(1)
1-2 таб./10 л (Л)	Капуста белокочанная	Черная ножка	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
1-2 таб./10 л (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневая гниль, серая гниль	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
10 таб./10 м ²	Цветочные культуры открытого грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 50 л/10м ²	-(3)	-(-)
5-10 таб./15 л (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневая гниль, серая гниль	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 15 л/100м ²	-(2)	1(1)

	60-150 г/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, белая и серая гнили, мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации: при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 500-3000 л/га	-(2)	1(1)	
	5-10 таб./10 л (Л)	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(3)	1(1)	
	2 таб./1 л (Л)	Комнатные цветочные растения	Антракноз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/1 м ²	-(3)	1(1)	
	1 таб./5 л (Л)	Цветочные растения открытого грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/1 м ²	-(3)	1(1)	
	5-10	Огурец защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль фузариозно-питиозной этиологии, трахеомикозное увядание фузариозно-вертициллезной этиологии, переноспороз, мучнистая роса	Полив грунта перед посевом семян, перед высадкой рассады в грунт, полив под корень в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(6)	-(-)	

Bacillus subtilis, штамм В-2918 + *Bacillus amyloliquefaciens*, штамм ИМВВ-7100

Бактофорт, Ж (2,5×10 ⁹ КОЕ/Мл + 2,5×10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 III/III 283-02-2257-1 31.05.2019 30.05.2029	4-8	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	2-4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазах смыкания рядков - бутонизация, последующие - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	1(1)	
	1,5-2	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина (при слабом развитии болезней), септориоз	Опрыскивание в период фазы кущения-выход в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	1(1)	
	3-5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(5)	1(1)	

Bacillus thuringiensis B-82 + *Bacillus subtilis* B-76

Инсектобактерин, СП (10 ⁹ КОЕ/г + 10 ⁹ КОЕ/г) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 III/III 033-01(02)-3392-1 03.12.2021 02.12.2031	20 г/10 л	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(4)	1(1)	Активен
---	-----------	-----------	------------	---	------	------	---------

Lactobacillus plantarum B 1101

Лавибакт, Ж (10 ⁹ КОЕ/см ³) ООО «БИОМ-ПРО» ОГРН: 1075009002254 III/III 101-02-4351-1	5,0 л/т	Пшеница яровая	Базальный бактериоз	Опрыскивание в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	5,0 л/т	Картофель	Мягкая гниль	Обработка клубней перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

09.01.2024
08.01.2034

5,0 л/га	Огурец защищен- ого грунта	Мокрая бактериальная гниль, корневой бактериальный рак («корончатый галл»), патогенное разрастание корневой системы («бешенство корней»)	Внесение под корень одновременно с поливом (в том числе капельным) при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(1)	-(-)
5,0 л/т	Пшеница яровая	Базальный бактериоз	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5,0 л/т	Пшеница яровая	Базальный бактериоз	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5,0 л/га	Пшеница яровая	Базальный бактериоз	Опрыскивание в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1)	1(1)
5,0 л/га	Томат защищен- ого грунта	Мокрая бактериальная гниль, бактериальный рак, корневой бактериальный рак («корончатый галл»), патогенное разрастание корневой системы («бешенство корней»)	Внесение под корень одновременно с поливом (в том числе капельным) при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(1)	-(-)
5,0 л/т	Картофель	Мягкая гниль	Обработка клубней перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5,0 л/га	Огурец защищен- ого грунта	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(1)	1(1)
5,0 л/га	Огурец защищен-н ого грунта	Мокрая бактериальная гниль, корневой бактериальный рак («корончатый галл»), патогенное разрастание корневой системы («бешенство корней»)	Внесение под корень одновременно с поливом (в том числе капельным) при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(1)	-(-)
5,0 л/га	Огурец защищен-н ого грунта	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(1)	1(1)
5,0 л/га	Томат защищен-н ого грунта	Мокрая бактериальная гниль, бактериальный рак, корневой бактериальный рак («корончатый галл»), патогенное разрастание корневой системы («бешенство корней»)	Внесение под корень одновременно с поливом (в том числе капельным) при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(1)	-(-)

MethylobacteriumextorquensNVDBKMB-2879 D + BacillussubtilisBKПMB-2918 ИПМ-215 + ВалидамицинStreptomyceshygroscopicussubsp. «limone»

<p>Метабактерин, СП (10¹⁰ КОЕ/г + 10¹⁰ КОЕ/г + 0,5 г/кг) ООО «Фермлаб» ОГРН: 1117746291497 III/III 495-02-1941-1 31.05.2018 30.05.2028</p>	6-9 г/га	Ячмень яровой	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, альтернариоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу кущения- выход в трубку. С обязательной предпосевной обработкой семян. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	6-9 г/га	Пшеница яровая	Мучнистая роса, фузариоз листьев и стеблей, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу кущение- выход в трубку. Интервал между обработками 20 дней. С обязательной предпосевной обработкой семян. Расход рабочей жидкости - 300 л/га. -10 л/т	-(1)	1(1)	

	6-9 г/га	Пшеница яровая	Мучнистая роса, фузариоз листьев и стеблей, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу кущения-выход в трубку. Интервал между обработками 20 дней. С обязательной предпосевной обработкой семян. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	
	6-9 г/т	Ячмень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева. С последующим опрыскиваем по вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га. -10 л/т	-(1)	-(1)	
	6-9 г/т	Пшеница яровая	Фитофторозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз	Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева. С последующим опрыскиваем по вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. - 300 л/га	-(1)	-(1)	
	6-9 г/т	Ячмень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева. С последующим опрыскиванием по вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. - 300 л/га	-(1)	-(1)	
	6-9 г/т	Пшеница яровая	Фитофторозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз	Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева. С последующим опрыскиванием по вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. - 300 л/га	-(1)	-(1)	
	6-9 г/га	Ячмень яровой	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, альтернариоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазу кущения-выход в трубку. С обязательной предпосевной обработкой семян. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	

Pseudomonas asplenii, штамм 11 RW (ВКПМ В-13395)

Биокомпозит-Про, Ж (10 ⁹ КОЕ/Мл) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП 018-02-3837-1 25.10.2022 24.10.2032	5,0 - 10,0	Томат защищенного грунта	Бурая пятнистость, мучнистая роса, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	7(4)	1(1)	Активен
	1,0 - 3,0	Яблоня	Парша, монилиальная плодовая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации и перед сбором урожая. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	1(1)	
	100 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Бурая пятнистость, мучнистая роса, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	7(4)	1(1)	
	0,1	Томат защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль	Замачивание семян за 1 сутки до посева. Расход рабочей жидкости - 1,0-1,5 л/кг	-(1)	1(1)	
	30 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша, монилиальная плодовая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации и перед сбором урожая. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	7(4)	1(1)	
	30 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание растений в период вегетации и перед сбором урожая. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	7(4)	1(1)	
	1,0 - 3,0	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание растений в период вегетации и перед сбором урожая. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	1(1)	

Pseudomonas aureofaciens + *Bacillus amyloliquefaciens*

Респекта, Ж	1,0-2,0	Горох	Фузариозные корневые гнили, антракноз, аскохитоз	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	Активен
-------------	---------	-------	--	--	------	------	---------

(0,5 млрд/Мл + 5 млрд/Мл) ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 ПП/- 283-02-3206-1 08.07.2021 07.07.2031	1,0-2,0	Соя	Церкоспороз, пероноспороз, фузариозные корневые гнили, антракноз, аскохитоз	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,0-2,0	Нут	Фузариозные корневые гнили, антракноз, аскохитоз	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393 + Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393

Псевдобактерин-2, ПС, Ж (2×10 ⁹ КОЕ/Мл + 5×10 ¹¹ КОЕ/Мл) ФГБУН ИБФМ им.Г.К.Скрябина РАН ОГРН: - IV/III, ФГБУН ИБФМ им.Г.К.Скрябина РАН ОГРН: - IV/III 176-01-437-1 27.10.2014 26.10.2024	0,002	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания. Повторное опрыскивание через 20 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	-(-)	Не активен
	1	Пшеница, ячмень яровые и озимые, рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, фузариозная и гельминтоспориозная корневая гниль	Обработка семян за 1-2 дня до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,01	Огурец защищенного грунта	Бурая пятнистость, мучнистая роса, пероноспориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(2)	-(-)	
	0,01	Томат защищенного грунта	Бурая пятнистость, мучнистая роса, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(2)	-(-)	
	10	Огурец защищенного грунта	Бурая пятнистость, мучнистая роса, пероноспориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(2)	-(-)	
	1	Пшеница, ячмень яровые и озимые, рожь озимая	Ржавчина бурая, септоиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации (в фазу трубкования) при появлении признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	1	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания. Повторное опрыскивание через 20 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	-(-)	
	0,001	Пшеница, ячмень яровые и озимые, рожь озимая	Ржавчина бурая, септоиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации (в фазу трубкования) при появлении признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	0,1	Томат защищенного грунта	Фузариозные, ризоктониозные и питиозные корневые гнили	Замачивание семян за 1 сутки до посева Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
	0,004	Пшеница, ячмень яровые и озимые, рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, фузариозная и гельминтоспориозная корневая гниль	Обработка семян за 1-2 дня до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	10	Томат защищенного грунта	Бурая пятнистость, мучнистая роса, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(2)	-(-)	
	0,4	Томат защищенного грунта	Фузариозные, ризоктониозные и питиозные корневые гнили	Замачивание семян за 1 сутки до посева Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
	0,4 г/кг	Огурец защищенного грунта	Фузариозные, ризоктониозные и питиозные корневые гнили	Замачивание семян за 1 сутки до посева Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	

	0,1 г/кг	Огурец защищен ого грунта	Фузариозные, ризоктониозные и питиозные корневые гнили	Замачивание семян за 1 сутки до посева Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
Pseudomonas aureofaciens, штамм ВКМ В-2391Д							
Псевдобактерин-3, Ж (2×10^9 КОЕ/Мл) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 Ш/Ш 222-02-1426-1 29.03.2017 28.03.2027	0,1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	0,4	Картофель	Ризоктониоз (при слабом развитии болезни)	Обработка клубней за 1-2 суток до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, бурая ржавчина (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(1)	
	0,4	Картофель	Фитофтороз (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазу смыкания рядков, второе – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	1(1)	
	0,2	Ячмень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Обработка семян за 1-2 суток до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2	Пшеница яровая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян (при слабом развитии болезней)	Обработка семян за 1-2 суток до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Pseudomonas aureofaciens, штамм IMBB-7096 + Pseudomonas aureofaciens, штамм IMBB-7097							
Гуапсин плюс, Ж (10^11 КОЕ/Мл + 10^11 КОЕ/Мл) ООО «АГРОТЕХНОЛОГИИ» ОГРН: 1144632004582 Ш/Ш 039-02-2041-1 02.11.2018 01.11.2028	4,0-5,0	Пшеница яровая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах начало кущения, флаговый лист. Интервал между обработками 20 дней Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(2)	1(1)	Активен
	3,0-4,0	Пшеница яровая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 1-2 дня до посева или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10-20 л/га	-(1)	-(-)	
Pseudomonas fluorescens, штамм AP-33							
Ризоплан, Ж (1×10^9 КОЕ/Мл) ООО «БИОПЕСТИЦИДЫ» ОГРН: - Ш/Ш 249-02-297-1 31.03.2014 249-02-297-1/61 61 30.03.2024	4,0	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	Не активен
	0,5 -1,0	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	
	2,0	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2-3)	-(-)	
	1,0	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, макросп ориоз	Обработка клубней до или во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-1,0	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	

0,5-1,0	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая и темно-бурая пятнистости, плесневение семян	Протравливание семян в день посева или за 1-2 дня до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2,0	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	-(-)
0,5-1,0	Ячмень яровой	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
5,0	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)
4,0	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)
0,5-1,0	Пшеница яровая	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян в день посева или за 1-2 дня до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Pseudomonas fluorescens, штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2

Бинорам, Ж (2,5×10 ¹⁰ Кл/Мл) ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 III/- 347-02-2186-1 05.04.2019 04.04.2029	0,05-0,075	Пшеница яровая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян за 1-5 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,075	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней за 1-5 дней до высадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,075	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян за 1-5 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,05-0,075	Капуста белокочанная	Сосудистый и слизистый бактериозы	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней Расход рабочей жидкости - 300 - 400 л/га	-(1-2)	3(3)	
	7,5 мл/л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней за 1-5 дней до высадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	
	5-10	Капуста белокочанная	Сосудистый и слизистый бактериозы	Полив растений под корень при посадке на постоянное место Расход рабочей жидкости - 3000 - 4000 л/га	7(1)	3(3)	

Trichoderma Asperellum M18 штамм ВКПМ F-1395

Фитотрикс, КС (10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО «НПИ «БИОПРЕПАРАТЫ» ОГРН: 1081690038561 IV/III 1166-02-3926-1 28.12.2022 27.12.2032	1,0-1,2	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом за 1-2 суток Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	10 мл/кг	Огурец защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль, пероноспороз	Замачивание семян перед посевом за 1-2 суток Расход рабочей жидкости - 1,0 л/кг семян	-(1)	-(-)	
	4,0-5,0 л/га	Томат защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль, серая гниль, фитофтороз (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание через 2-3 недели после полива Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	7(1)	1(1)	
	0,2 % раствор рабочей жидкости	Огурец защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль, пероноспороз	Полив растений под корень через 2-3 дня после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 2000-3000 л/га	-(1)	-(-)	

2,0	Ячень яровой	Мучнистая роса (при слабом развитии болезни), тёмно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина, линейная (стеблевая) ржавчина, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость	Опрыскивание в фазу начало колошения, следующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(2)	-(1)
4,0-5,0 л/га	Огурец защищенн ого грунта	Фузариозная корневая гниль, пероноспороз	Опрыскивание через 2-3 недели после полива Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(1)	1(1)
0,2 % раствор рабочей жидкости	Томат защищенн ого грунта	Фузариозная корневая гниль, серая гниль, фитофтороз (при слабом развитии болезни)	Полив растений под корень через 2-3 дня после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 2000-3000 л/га	-(1)	-(-)
1,0-1,2	Пшеница яровая	Гельминтоспо-риозна я корневая гниль, фузариозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом за 1-2 суток Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/кг	Томат защищенн ого грунта	Фузариозная корневая гниль, серая гниль, фитофтороз (при слабом развитии болезни)	Замачивание семян перед посевом за 1-2 суток Расход рабочей жидкости - 1,0 л/кг семян	-(1)	-(-)
2,0	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в фазу начало колошения, следующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(2)	-(1)

Trichoderma asperellum, штамм OPF-19

Органика Ф, Ж (10 ⁸ КОЕ/Мл) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 Ш/Ш 173-02-2477-1 20.11.2019 19.11.2029	10 мл/1 л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Корневыегнили	Замачивание семян за 2-3 суток до посева в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,8	Горох	Аскохитоз,ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении единичных признаков болезней, второе - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	-(2)	1(1)	
	4,0	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазе смыкания рядков, второе - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	1(1)	
	10 мл/кг	Огурец защищенн ого грунта	Корневыегнили	Замачивание семян за 2-3 суток до посева в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
	0,2	Горох	Корневые гнили, аскохитоз	Обработка семян за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)	
	40 мл/15 л воды (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, второе - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 15 л/100м2	-(2)	1(1)	
	40 мл/6 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазе смыкания рядков, второе - с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(2)	1(1)	

4,0	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, второе - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	-(2)	1(1)
2,5	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней за 1-2 суток до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/кг	Томат защищенного грунта	Корневые гнили	Замачивание семян за 2-3 суток до посева в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг	-(1)	-(-)
0,2	Соя	Корневые гнили, аскохитоз	Обработка семян за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)
4,0	Томат защищенного грунта	Серая гниль, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, второе - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	-(2)	1(1)
250 мл/1 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней за 1-2 суток до посадки. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
0,8	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении единичных признаков болезней, второе - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
10 мл/1 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые гнили	Замачивание семян за 2-3 суток до посева в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
40 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Серая гниль, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, второе - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(2)	1(1)

Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР + Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР

Глиокладин, СП, ТАБ (10 ⁹ КОЕ/г + 10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III, ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III 139-02-2260-1 03.05.2019 26.05.2031	1 таб./лунку (Л)	Томат защищенного и открытого грунта	Корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная, фитофторозная)	Внесение в почву вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады	-(1)	-(-)	Активен
	1 таб./лунку (Л)	Огурец защищенного и открытого грунта	Корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение в почву вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады	-(1)	-(-)	
	60	Огурец и томат защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль	Внесение в субстрат перед высадкой рассады и 2-кратный полив под корень Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	-(3)	-(-)	
	1 таб./300 мл почвы	Рассада цветочных растений и комнатные цветочные растения	Корневая и прикорневая гнили (физариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение в почву вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады или пересадке растений	-(1)	-(-)	
	1 таб./лунку	Томат защищенного и открытого грунта	Корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная, фитофторозная)	Внесение в почву вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады	-(1)	-(-)	

1 таб./лунку	Огурец защищенного и открытого грунта	Корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение в почву вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады	-(1)	-(-)
1 таб./300 мл почвы (Л)	Рассада цветочных растений и комнатные цветочные растения	Корневая и прикорневая гнили (физариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение по почве вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады или пересадке растений	-(1)	-(-)
1 таб./300 мл почвы (Л)	Рассада цветочных растений и комнатные цветочные растения	Корневая и прикорневая гнили (физариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение в почву вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады или пересадке растений	-(1)	-(-)

Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D

Стернифаг, СП (10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III 139-02-3162-1 27.05.2021 26.05.2031	80 г/га	Свекла сахарная, свекла столовая	Корнеед	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	80 г/га	Лук, чеснок	Шейковая гниль и гниль донца	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Морковь	Корневая гниль, альтернариоз	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Зеленные культуры (укроп, петрушка, салат, кинза, руккола)	Корневая и прикорневая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Кабачок, тыква	Корневая и прикорневая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Соя	Аскохитоз, фузариозная корневая и стеблевая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, фузариозная гниль всходов, корневая гниль	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Соя	Аскохитоз, фузариозная корневая и стеблевая гниль	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Кукуруза	Прикорневая и стеблевая гниль	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	80 г/га	Виноград	Оидиум	Обработка приствольных кругов весной (ранневесенний период – до начала сокодвижения) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	

80 г/га	Яблоня	Парша	Обработка опавших листьев (позднеосенний период, 60 % опада листьев) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Свекла сахарная, свекла столовая	Корнеед	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Картофель	Ризоктониоз, альтернариоз	Опрыскивание почвы перед посадкой клубней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Картофель	Ризоктониоз, альтернариоз	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Капуста (белокочанная, цветная, брокколи)	Черная ножка	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Корневая гниль	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Виноград	Оидиум	Обработка опавших листьев (позднеосенний период, 60 % опада листьев) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, фузариозная гниль всходов, корневая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Лен масличный, лен - долгунец	Фузариоз, антракноз, аскохитоз	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Пшеница яровая, ячмень яровой	Корневая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Яблоня	Парша	Обработка приствольных кругов весной (ранневесенний период – до начала набухания почек) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Кукуруза	Прикорневая и стеблевая гниль	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 г/га	Лук, чеснок	Шейковая гниль и гниль донца	Опрыскивание почвы перед посевом семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

Trichoderma harzianum, штамм Г 30 ВИЗР

Трихоцин, СП (10 ¹⁰ КОЕ/г) ООО Управляющая компания «АБТ-групп» ОГРН: - IV/III	30 г/т	Кукуруза на зерно	Стеблевые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	60 г/га	Свекла столовая	Корнеед	Опрыскивание почвы перед посевом семян или при посеве семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	l(1)	

139-02-4583-1
23.05.2024
22.05.2034

60 г/ 500м2	Капуста белокочан ная, цветная, брокколи	Черная ножка	Полив почвы при высадке рассады Расход рабочей жидкости - 50 л/500м2	-(1)	l(1)
6 г/100 м2 (Л)	Рассада цветочных культур	Корневые гнили	Пролив почвы при высадке рассады Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	l(-)
20 г/т	Ячмень яровой	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
6 г/л (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив под корень через 3-7 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 100-150 мл под растение	-(1)	l(-)
50 г/га	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	l(1)
80 г/га	Свекла столовая	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	l(1)
30 г/ 500м2	Салат защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Пролив почвы при высадке рассады Расход рабочей жидкости - 50 л/500м2	-(1)	l(-)
80 г/га	Кукуруза на зерно	Стеблевые гнили	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	l(1)
6 г/л (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив под корень через 3-7 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 100-150 мл под растение	-(1)	l(-)
6 г/10 л (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив грунта за 1-3 дня до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(1)	l(-)
30-40 г/га	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	l(1)
60 г/га	Свекла сахарная	Корнеед	Опрыскивание почвы перед посевом семян или при посеве семян Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	l(1)
20 г/т	Картофель	Ризиктониоз, фитофтороз, альтернариоз	Предпосевная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
80 г/га	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	l(1)
50-80 г/га	Картофель	Ризиктониоз, фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	l(1)
50 г/га	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание почвы перед высевом семян или при посеве семян Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	l(1)
80-100 г/га	Яблоня	Монилиоз, парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	l(1)
20-40 г/га	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	l(1)
6 г/10 л (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив грунта за 1-3 дня до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(1)	l(-)

80 г/га	Цветочные культуры открытого грунта	Мучнистая роса	Полив почвы при высадке рассады. Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	1(1)	
80 г/га	Капуста белокочанная, цветная, брокколи	Черная ножка	Капельный полив Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(3)	1(1)	
20 г/т	Ячмень озимый	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
40 г/га	Капуста белокочанная, цветная, брокколи	Черная ножка	Опрыскивание почвы перед посевом Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	
40 г/га	Лук	Гниль донца	Опрыскивание почвы перед посадкой Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(1)	
30 г/500м2	Рассада цветочных культур	Корневые гнили	Пролив почвы при высадке рассады Расход рабочей жидкости - 50 л/500м2	-(1)	1(-)	
30-40 г/га	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	1(1)	
80-100 г/га	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	1(1)	
80 г/га	Подсолнечник	Серая и белая гнили корзинок	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	1(1)	
20-30 г/т	Соя	Фузариозные корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
30 г/т	Подсолнечник	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
80 г/га	Виноград	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1200-1500 л/га	-(5)	1(1)	

Trichoderma harzianum, штамм Т-22

Трианум Г, Г (1,5×10 ⁸ КОЕ/г) ООО «КОППЕРТ РУС» ОГРН: 1157746216297 IV/III 548-02-2735-1 07.07.2020 06.07.2030	15,0	Морковь открытого грунта	Ризиктониоз	Внесение в почву непосредственно перед посевом	-(1)	-(-)	Активен
---	------	--------------------------	-------------	--	------	------	---------

Trichoderma harzianum, штамм Т-22 + Trichoderma harzianum, штамм Т-22

Трианум П, ВДГ (1,5×10 ⁸ КОЕ/г + 1,5×10 ⁹ КОЕ/г) ООО «КОППЕРТ РУС» ОГРН: 1157746216297 IV/III 548-02-2776-1 20.08.2020 19.08.2030	15,0	Морковь открытого грунта	Ризиктониоз	Внесение в почву непосредственно перед посевом	-(1)	-(-)	Активен
	1,5 г/м2	Огурец (защищенный грунт)	Корневые и прикорневые гнили	Внесение с капельным поливом	-(2)	-(-)	

Trichoderma longibrachiatum

Трихоплант, СК (2×10 ⁹ КОЕ/см ³) ООО НПО «Биотехсоюз» ОГРН: 1067761727307 IV/III	1,5-2 л/га	Пшеница озимая	Корневые гнили (фузариозные, гелиминтоспориозные, церкоспореллезные), сетчатый гелиминтоспориоз	Опрыскивание в фазе кущения с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	1(1)	Активен
--	------------	----------------	---	--	------	------	---------

228-02-2403-1
19.09.2019
18.09.2029

1,5-2,0 л/га	Томат защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	-(-)
2-5 л/га	Ячмень озимый	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры или перед посевом с последующим опрыскиванием по вегетации и обязательной предпосевной обработкой семян Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	-(1)	1(1)
15-20 л/100-200 мл воды	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зоктониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян в течение 20-30 минут с последующими предпосадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 1 мл/г семян	-(1)	-(-)
1,5-2 л/га	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(3)	-(-)
0,25-0,50 л/100 л воды	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосадочная обработка корней рассады перед высадкой в грунт в течение 0,5-1,5 часов. Пролив земляного кома рассады в горшках/кассетах 0,15-0,25 л/куст или 10 л/40-60 штук	-(1)	-(-)
1,5-2 л/га	Ячмень озимый	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание в фазе кушения с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	1(1)
1,5-2 л/га	Ячмень озимый	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание в фазе кушения с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	1(1)
15-20 мл/10 л	Томат защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 мл/куст	-(2)	-(-)
15-20 мл/10 л	Томат защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 мл/куст	-(2)	-(-)
2-5 л/га	Ячмень озимый	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры или перед посевом с последующим опрыскиванием по вегетации и обязательной предпосевной обработкой семян Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	-(1)	1(1)
15-20 мл/100-200 мл воды	Томат защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зоктониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян в течение 20-30 минут с последующим просушиванием и с последующими предпосадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 1 мл/г семян	-(1)	-(-)

25-50 мл/10 л воды	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зотониозные), увядания	Предпосадочная обработка корней рассады перед высадкой в грунт в течение 0,5-1,5 часов. Пролив земляного кома рассады в горшках/кассетах 0,15-0,25 л/куст или 10 л/40-60 штук	-(1)	-(-)
0,15-0,30 л/кг	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризотониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян в течение 20-30 минут с последующим просушиванием и с последующими пред-посадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 1,5-2 л/кг	-(1)	-(-)
1,5-2 л/т	Пшеница озимая	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Предпосевная обработка семян с последующим опрыскиванием по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
25-50 мл /10 л воды	Томат защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зотониозные), увядания	Предпосадочная обработка корней рассады перед высадкой в грунт в течение 0,5-1,5 часов Расход рабочей жидкости - 0,25 л/10 штук	-(1)	-(-)
1,5-2 л/т	Пшеница озимая	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Предпосевная обработка семян с последующим опрыскиванием по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2 л/га	Пшеница озимая	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание в фазе кущения с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	1(1)
0,15-0,30 л/кг	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризотониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян в течение 20-30 минут с последующим просушиванием и с последующими пред-посадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 1,5-2 л/кг	-(1)	-(-)
15-20 мл/10 л	Огурец защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ри-зотониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 мл/куст	-(3)	-(-)
2-5 л/га	Пшеница озимая	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозны е, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры или перед посевом с последующим опрыскиванием по вегетации и обязательной предпосевной обработкой семян Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	-(1)	1(1)
0,25-0,50 л/100 л воды	Томат защищен ого грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризотониозные), увядания	Предпосадочная обработка корней рассады перед высадкой в грунт в течение 0,5-1,5 часов Расход рабочей жидкости - 0,25 л/10 штук	-(1)	-(-)

15-20 л/100-200 мл воды	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян в течение 20-30 минут с последующими предпосадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 1 мл/г семян	-(1)	-(-)
15-20 мл/10 л	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 мл/куст	-(3)	-(-)
0,25-0,50 л/100 л воды	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосадочная обработка корней рассады перед высадкой в грунт в течение 0,5-1,5 часов Расход рабочей жидкости - 0,25 л/10 штук	-(1)	-(-)
0,15-0,30 л/кг	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян с последующими предпосадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
25-50 мл /10 л воды	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосадочная обработка корней рассады перед высадкой в грунт в течение 0,5-1,5 часов Расход рабочей жидкости - 0,25 л/10 штук	-(1)	-(-)
1,5-2,0 л/га	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	-(-)
15-20 мл/100-200 мл воды	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян в течение 20-30 минут с последующим просушиванием и с последующими предпосадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 1 мл/г семян	-(1)	-(-)
1,5-2 л/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Полив растений под корень в период вегетации: первый при высадке рассады, далее с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(3)	-(-)
0,15-0,30 л/кг	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили (фузариозные, питиозные, ризоктониозные), увядания	Предпосевное замачивание семян с последующими предпосадочной обработкой корней и поливом растений под корень после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2 л/т	Ячмень озимый	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозные, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Предпосевная обработка семян с последующим опрыскиванием по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2 л/т	Ячмень озимый	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозные, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Предпосевная обработка семян с последующим опрыскиванием по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

	2-5 л/га	Пшеница озимая	Корневые гнили (фузариозные, гельминтоспориозные, церкоспореллезные), сетчатый гельминтоспориоз	Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей культуры или перед посевом с последующим опрыскиванием по вегетации и обязательной предпосевной обработкой семян Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	-(1)	1(1)	
--	----------	----------------	---	---	------	------	--

Trichoderma longibrachiatum F 2124 + Trichoderma harzianum F 2009 + Trichoderma viride F 2001

Тетрис, СП (3×10 ⁶ КОЕ/г + 3×10 ⁶ КОЕ/г + 4×10 ⁶ КОЕ/г) ООО «БИОМ-ПРО» ОГРН: 1075009002254 IV/III, ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 IV/III 101(008)-02-3940-1 10.01.2023 09.01.2023	3 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, аскохитоз	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100- 150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	Активен
	25 г/10 л воды (Л)	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Полив рассады в фазе 2-3-х настоящих листьев с расходом рабочей жидкости 0,3-0,5л/м ² , повторный полив в лунку при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	-(2)	-(-)	
	3 г/ л воды (Л)	Лук	Серая шейковая гниль	Полив растений за 10 дней до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1 л/м ²	-(1)	-(-)	
	0,15	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, бактериоз	Внесение под корень при поливе (в том числе. капельном) после высадки рассады, повторное внесение через 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	-(-)	
	0,05	Кукуруза	Корневые гнили, плесневение семян (при слабом развитии болезни)	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	25 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив растений под корень в фазе 3-5-ти настоящих листьев, повторный полив через 2 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)	
	25 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив рассады при посадке в лунку, повторный полив через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)	
	3 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	
	0,15	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, бактериоз	Внесение под корень при поливе (в том числе капельном) после высадки рассады, повторное внесение через 20-30 дней Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	-(2)	-(-)	
	0,05	Соя	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	25 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, аскохитоз	Полив растений под корень в фазе 2-4-х настоящих листьев, повторный полив-через 2 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)	
	6 г/100 м ²	Рассада цветочных культур	Корневые гнили, трахеомикозное увядание	Пролив грунта за 1-3 дня до высадки рассады, последующий полив через 3-7 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 2-3 л/м ²	-(2)	-(-)	

Trichoderma viride, штамм 471

<p>ТриходермаВериде 471, СП (1×10⁹ спор/г грибов) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 IV/III 008-02-1364-1 02.02.2017 01.02.2027</p>	30 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период бутонизация - плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1-2)	1(-)	Активен
	3 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)	
	30 г/5-10 л воды (Л)	Капуста	Сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз, альтернариоз	Опрыскивание после высадки на постоянное место при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(1)	1(-)	
	3 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(2)	1(-)	
	15 г/10 л воды	Томат защищенн ого грунта	Серая гниль	Опрыскивание в период бутонизация – плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	-(1-2)	1(-)	
	25-50 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив растений под корень в фазе 2-5 настоящих листьев, последующий – через 2 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/1 растение	-(2)	1(-)	
	15 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Аскохитоз	Опрыскивание в период начало цветения – плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	-(1-2)	1(-)	
	15 г/10 л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Серая гниль	Опрыскивание в период бутонизация - плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	-(1-2)	1(-)	
	3 г/10 л воды (Л)	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)	
	25-50 г/10 л воды (Л)	Капуста	Черная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Полив рассады под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев, повторный полив в лунку при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение (полив в лунку)	-(2)	1(-)	
	25-50 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, аскохитоз	Полив в лунку при посадке, последующий - под корень растения через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	1(-)	
	25-50 г/10 л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили трахеомикозное увядание,серая гниль	Полив 0,25%-й рабочей жидкостью в лунку при посадке, последующий - под корень растения через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	1(-)	
	3 г/10 л воды (Л)	Капуста	«Чёрнаяножка», сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)	
	30 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период бутонизация – плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1-2)	1(-)	
	30 г/5-10 л воды (Л)	Капуста	Сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз, альтернариоз	Опрыскивание после высадки на постоянное место при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(1)	1(-)	

25-50 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, аскохитоз	Полив в лунку при посадке, последующий – под корень растения через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	1(-)
25-50 г/10 л воды (Л)	Капуста	«Чёрная ножка», сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Полив рассады под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев, повторный полив в лунку при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение (полив в лунку)	-(2)	1(-)
3 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, аскохитоз	Предпосевное замачивание семян в течение 1 – 2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)
3 г/10 л воды	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, серая гниль	Предпосевное замачивание семян в течение 1 -2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1-2)	1(-)
15 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Аскохитоз	Опрыскивание в период начала цветения - плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м ²	-(1-2)	1(-)
25-50 г/10 л воды (Л)	Капуста	«Чёрная ножка», сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Полив рассады под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев, повторный полив в лунку при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 0,3-0,5 л/м ² (рассада)	-(2)	1(-)
25-50 г/10 л воды	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, серая гниль	Полив 0,25%-й рабочей жидкостью в лунку при посадке, последующий – под корень растения через 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	1(-)
25-50 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив растений под корень в фазе 2-5 настоящих листьев, последующий - через 2 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/1 растение	-(2)	1(-)
3 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, аскохитоз	Предпосевное замачивание семян в течение 1 - 2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)
25-50 г/10 л воды (Л)	Капуста	Чёрная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Полив рассады под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев, повторный полив в лунку при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 0,3-0,5 л/м ² (рассада)	-(2)	1(-)
25-50 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив растений под корень в фазе 2-4-х настоящих листьев, последующий - через 2 недели. Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	1(-)
3 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(2)	1(-)
25-50 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание	Полив растений под корень в фазе 2-4-х настоящих листьев, последующий – через 2 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	1(-)

3 г/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили трахеомикозное увядание, серая гниль	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1-2)	1(-)	
30 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период начала цветения – плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1-2)	1(-)	
30 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период начала цветения - плодоношение Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1-2)	1(-)	

Trichoderma veride, штамм М-10

Трихофит Плюс, Ж (5×10 ⁹ КОЕ/Мл) ООО «АГРОТЕХНОЛОГИИ» ОГРН: 1144632004582 III/III 039-02-2011-1 10.10.2018 09.10.2028	2-3 г/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах смыкания листьев в рядах, смыкание листьев в междурядьях. Интервал между обработками 20 дней. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(2)	1(1)	Активен
	2-3 г/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах смыкания листьев в рядах, смыкание листьев в междурядьях. Интервал между обработками 20 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(2)	1(1)	

Trichoderma viride F-2030 + Trichoderma harzianum F-2477

Биотриходерма, СП (10 ⁹ КОЕ/г + 10 ⁹ КОЕ/г) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 III/III 186-02-4410-1 06.02.2024 05.02.2034	10-20 г/10 л	Огурец защищенного грунта	Корневые гнили, мучнистая роса, пероноспороз, угловая пятнистость листьев, оливковая пятнистость	Пролив грунта за 2-3 дня до высадки рассады и полив рассады под корень через 3-7 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/растение	-(2)	-(-)	Активен
	10-20 г/10л	Розы открытого и защищенного грунта, гвоздика	Корневая гниль	Обработка корневой системы рассады или саженца обмакиванием в 1-2% суспензии	-(1)	-(-)	
	10-20 г/10л	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, фитофтороз, бурая пятнистость, мучнистая роса, пероноспороз, сухая пятнистость, белая пятнистость	Пролив грунта за 2-3 дня до высадки рассады и полив рассады под корень через 3-7 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/растение	-(2)	-(-)	
	1-2 г/100 мл воды(Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые гнили, мучнистая роса, пероноспороз, угловая пятнистость листьев, оливковая пятнистость	Замачивание семян в течение 2 часов в 1% суспензии	-(1)	-(-)	
	10-20 г/10л	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, фитофтороз, бурая пятнистость, мучнистая роса, пероноспороз, сухая пятнистость, белая пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации профилактически и/или при первых признаках заболевания Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100 м2	7(2)	1(1)	
	10-20 г/10 л	Огурец защищенного грунта	Корневые гнили, мучнистая роса, пероноспороз, угловая пятнистость листьев, оливковая пятнистость	Пролив грунта за 2-3 дня до высадки рассады и полив рассады под корень через 3-7 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	-(-)	
	1-2 г/100 мл воды	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, фитофтороз, бурая пятнистость, мучнистая роса, пероноспороз, сухая пятнистость, белая пятнистость	Замачивание семян в течение 2 часов в 1% суспензии	-(1)	-(-)	

10-20 г/10 л	Огурец защищенного грунта	Корневые гнили, мучнистая роса, пероноспороз, угловая пятнистость листьев, оливковая пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации профилактически и/или при первых признаках заболевания Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100 м2	7(2)	1(1)
10-20 г/10л	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, фитофтороз, бурая пятнистость, мучнистая роса, пероноспороз, сухая пятнистость, белая пятнистость	Пролив грунта за 2-3 дня до высадки рассады и полив рассады под корень через 3-7 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	-(-)
10-20 г/10л	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в фазе бутон и массового цветения Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100м2	7(2)	1(1)

Trichoderma viride, штамм 4097 + Bacillus subtilis

Споровобактерин, СП (10 ⁶ КОЕ/г + 10 ⁸ КОЕ/г) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 IV/III 033-02-447-1 31.10.2014 30.10.2024	20 г/ 100 м2 (Л)	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	-(-)	Не активен
	10 г/100 кг(Л)	Картофель	Макроспориоз, фитофтороз, ризоктониоз	Обработка клубней за 7 дней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)	
	10 г/кг (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые гнили, фузариозное увядание, мучнистая роса, угловатая пятнистость	Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(2)	-(-)	
	10 г/ 100 м2(Л)	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, черная ножка, фитофтороз, бурая пятнистость листьев	Полив под корень 0,1%-м рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	-(-)	
	10 г/кг (Л)	Капуста	Чёрнаяножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(1)	-(-)	
	20 г/ 100 м2 (Л)	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период бутонизации и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)	
	10 г/100 м2 (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые гнили, фузариозное увядание, мучнистая роса, угловатая пятнистость	Полив под корень 0,1%-м рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	-(-)	
	10 г/100 кг(Л)	Картофель	Макроспориоз, фитофтороз, ризоктониоз	Обработка клубней за 7 дней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)	
	20 г/ 100 м2 (Л)	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период бутонизации и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	-(-)	
	10 г/кг (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, черная ножка, фитофтороз, бурая пятнистость листьев	Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(1)	-(-)	
	10 г/ 100 м2 (Л)	Капуста	Чёрнаяножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	-(-)	

20 г/ 100 м2 (Л)	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(4)	-(-)
10 г/кг (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые гнили, фузариозное увядание, мучнистая роса, угловатая пятнистость	Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(2)	-(-)
10 г/кг (Л)	Капуста	Чёрная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(1)	-(-)
10 г/ 100 м2(Л)	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, черная ножка, фитофтороз, бурая пятнистость листьев	Полив под корень 0,1%-м рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)
10 г/100 м2 (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые гнили, фузариозное увядание, мучнистая роса, угловатая пятнистость	Полив под корень 0,1%-м рабочим раствором в фазу 3-4-х настоящих листьев. Повторная обработка при необходимости через 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)
20 г/дерево (Л)	Яблоня	Парша, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/дерево	-(2)	-(-)
20 г/дерево (Л)	Яблоня	Парша, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/дерево	-(2)	-(-)
10 г/кг (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые гнили, черная ножка, фитофтороз, бурая пятнистость листьев	Замачивание семян в 1 %- м растворе в течение 6 часов перед посевом Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/кг семян	-(1)	-(-)
10 г/ 100 м2 (Л)	Капуста	Чёрная ножка, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-м рабочим раствором при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)

Trichoderma virideF2001 + Bacillus subtilis B1018

Бинал, Ж (10 ⁶ КОЕ/см ³ + 10 ⁷ КОЕ/см ³) ООО «БИОМ-ПРО» ОГРН: 1075009002254 Ш/Ш 101-02-3361-1 01.11.2021 31.10.2031	5 л/т	Озимая пшеница	Корневые и прикорневые гнили, плесневение семян (при слабом развитии болезни)	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	Активен
	5 л/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Внесение под корень – любые системы полива (в т.ч. капельный полив): рекомендуется вносить в период плодоношения, регулярность 1 раз в 1 месяц Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	7(2)	1(1)	
	5 л/га	Свекла сахарная	Пероноспороз, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации. Первое - при появлении признаков болезней, второе – через 15 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	1(1)	
	5 л/га	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Внесение под корень – любые системы полива (в т.ч. капельный полив): рекомендуется вносить в период плодоношения, регулярность 1 раз в 1 месяц Расход рабочей жидкости - 600-2000 л/га	7(2)	1(1)	

Trichoderma longibrachiatum, штамм 9K + Trichoderma atroviride, штамм 10K + Bacillus subtilis, штамм 3/28 + Bacillus subtilis, штамм 7K + Bacillus

Фитоспорин-АС, Ж (10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁶ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл + 10 ⁸ КОЕ/Мл + 10 ⁵ КОЕ/Мл) ИП КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ОГРН: 3040272140000 IV/III 585-02-3649-1 22.04.2022 21.04.2032	3 л/га	Томат защищен ого грунта	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(4)	1(-)	Активен
	1 л/т	Картофель	Ризоктониоз, фитофто роз	Предпосадочная обработка клубней суспензией препарата с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	4 мл/кг семян (Л)	Огурец защи-щенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	
	3 мл/кг семян (Л)	Горох	Корневые гнили, пероноспороз, аскохитоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 1-5 суток с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)	
	40 мл/10 л воды (Л)	Огурец защи-щенн ого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	-(4)	1(-)	
	3 мл/1 кг семян	Томат защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, фитофтороз	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 1,0-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
	4 л/га	Огурец защищенн ого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(4)	1(-)	
	1,0 л/т	Пшеница яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминто-спориозна я корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка семян с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	4 мл/кг	Огурец защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в суспензии препарата в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 1,0-1,5 л/кг	-(1)	-(-)	
	4 л/га	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация; повторно – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(3)	1(1)	
	2 л/га	Картофель	Фитофтороз, альтерна риоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в фазы смыкание рядков - бутонизация; повторно - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	-(1)	
	4 мл/кг семян	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 1,0-1,5 л/кг семян	-(1)	-(-)	

60 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, фитофтороз	Полив в лунку рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	-(1)	-(-)
1,5 л/т	Пшеница озимая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, септориоз, мучнистая роса, плесневение семян	Предпосевная обработка семян с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
4 л/га	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в фазу 3-4 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 3000-5000 л/га	-(1)	-(-)
3 мл/кг семян (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, фитофтороз	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
60 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив в лунку рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 150-200 мл/растение	-(1)	-(-)
1,0 л/га	Пшеница озимая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, септориоз, мучнистая роса, плесневение семян	Опрыскивание в период вегетации в фазы кущение - выход в трубку Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	1(-)
30 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/50 м2	-(4)	1(-)
1,0 л/т	Горох	Корневые гнили, пероноспороз, аскохитоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 1-5 суток с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
40 мл/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в фазу 3-4 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(1)	-(-)
40 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз,альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазах смыкание рядков - бутонизация; повторно – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	1(-)
6 л/га	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом в 2 недели Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	-(-)
30 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз,бактериальное увядание	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое сразу после посадки, последующие – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	4(-)	1(-)
60 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Полив в лунку при высадке рассады на постоянное место, повторный - под корень с интервалом в 2 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(2)	-(-)

1,0 л/га	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы кущение - выход в трубку Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(1)
1,5 л/га	Горох	Фузариозное увядание	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(-)
3 мл/кг семян (Л)	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
3 мл/кг семян	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующей обработкой по вегетации Расход рабочей жидкости - 1,0-1,5 л/кг семян	-(1)	-(-)
3 л/га	Томат открытого грунта	Фитофтороз, бактериальное увядание	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое сразу после посадки, последующие – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(4)	1(1)
6 л/га	Томат открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив в лунку рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 3000-5000 л/га	-(1)	-(-)
15 мл/10 л воды (Л)	Горох	Фузариозное увядание	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(1)	1(-)
100 мл/2-3 л воды (Л)	Картофель	Ризиктониоз, фитофтороз	Предпосадочная обработка клубней суспензией препарата Расход рабочей жидкости - 2-3 л/100 кг	-(1)	-(-)
40 мл/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазах смыкания рядков- бутонизация; повторно – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	-(3)	1(-)
6 л/га	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание, фитофтороз	Полив в лунку рабочей жидкостью при высадке рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(1)	-(-)
1,5 л/га	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(1)
4 мл/кг семян (Л)	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, фузариозное увядание	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/100 г семян	-(1)	-(-)

Азоксистробин

Афродита 250, КС (250 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - III/III 528-02-3701-1 06.06.2022 05.06.2032	3,0	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Ризиктониоз, серебристая парша	Опрыскивание почвы при посадке клубней Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в системе с другими фунгицидами после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	3(2)	-(3)	

	0,8-1,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации в системе с другими фунгицидами: первое опрыскивание - профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	-(3)	
	0,8-1,0	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в системе с другими фунгицидами после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	3(2)	2(3)	
	0,4-0,6	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в системе с другими фунгицидами до цветения, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1500-2000 л/га	3(2)	2(3)	
	0,4-0,6	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в системе с другими фунгицидами до цветения, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	3(2)	-(3)	
Интрада, СК (250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-3078-1 30.03.2021 021-02-3078-1/444 444 29.03.2031	0,8-1,0	Рапс яровой	Склеротиниоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фаза вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	3(3)	Активен
	6-8 мл/10 л воды	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	35(2)	3(-)	
	0,6-0,8	Соя	Пероноспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении первых признаков болезней, второе – через 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	50(2)	3(3)	
	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, ржавчина, фомоз, белая гниль, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней, но не позднее фазы конца бутонизации – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(2)	3(3)	
	4-6 мл/15 л воды	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 15 л/100м2	7(2)	3(-)	
	0,6-0,8	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	35(2)	3(3)	
	0,8-1,0	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	7(2)	3(3)	
	0,8-1,0	Капуста белокочанная	Ложная мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	10(2)	3(3)	

4-6 мл/6 л воды	Томат открытого грунта	Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее - с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 6 л/100м ²	10(2)	3(-)
0,8-1,0	Рапс озимый	Склеротиниоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе розетки из 6-8 листьев и весной в фазе вытягивание стеблей – образование стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	3(3)
4-6 мл/8 л воды	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 8 л/100м ²	7(2)	3(-)
0,6-0,8	Нут	Пероноспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении первых признаков болезней, второе – через 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 100 - 300 л/га	28(2)	3(3)
10 мл/1 л воды	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша	Опрыскивание клубней и дна борозды при посадке Расход рабочей жидкости - 1 л/100м ²	60(1)	3(-)
0,4-0,6	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	7(2)	3(3)
0,8-1,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие - с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(3)	3(3)
6-8 мл/3 л воды	Картофель	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	28(3)	3(-)
8-10 мл/10 л воды	Томат защищенн ого грунта	Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее - с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	7(2)	3(-)
0,4-0,6	Огурец защищенн ого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(-)	3(3)
0,6-0,8	Горох	Пероноспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении первых признаков болезней, второе – через 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 100 - 300 л/га	28(2)	3(3)
8-10 мл/3 л воды	Капуста белокочан ная	Ложная мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	10(2)	3(-)
8-10 мл/3 л воды	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	15(3)	3(-)

	0,6-0,8	Картофель	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	28(3)	3(3)	
	0,6-0,8	Люцерна (семенные посевы)	Пероноспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении первых признаков болезней, второе – через 14-20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	50(2)	3(3)	
	1,0	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша	Опрыскивание клубней и дна борозды при посадке Расход рабочей жидкости - 70-120 л/га	- (1)	3(3)	
	0,4-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	10(2)	3(3)	
<p>Квадрис, СК (250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-4430-1 27.02.2017 26.02.2027</p>	0,4-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	3(2)	7(3)	Активен
	0,8-1,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(3)	7(3)	
	0,6-0,8	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	25(2)	7(3)	
	0,8-1,0	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(2)	2(-)	
	0,4	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	3(2)	7(3)	
	3,0	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша	Опрыскивание почвы при посадке клубней Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)	7(3)	
	0,4	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	3(2)	2(-)	
<p>Ромбус, КС, КС (250 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХІ» ОГРН: 1027700119710 П/П, Шанхай Е-Тонг Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/П 023(412)-02-1344-1 25.01.2017 023(412)-02-1344-1/305 305 24.01.2027</p>	3	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша	Опрыскивание почвы при посадке клубней Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,8-1	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(3)	-(3)	

Провизор, СК (250 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-02-2582-1 10.03.2020 09.03.2030	4-6 мл/15 л воды (Л)	Огурец защищен ого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до цветения, последующее после цветения – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 15 л/100м2	5(2)	3(-)	Активен
	6-8 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до цветения, последующее после цветения – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	60(2)	3(-)	
	8-10 мл/10 л воды (Л)	Томат защищен ого грунта	Фитофтороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое после цветения 1-2 кистей, последующее – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	10(2)	3(-)	

Азоксистробин + Боскалид

Эвклид, СК (250 г/л + 150 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-4541-1 03.05.2024 02.05.2034	0,6-0,8	Рапс озимый	Фомоз, склеротиниоз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,8	Горох	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Горох	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная и гельминтоспориозная стеблевая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	35(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Подсолнеч ник	Белая гниль, серая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одной из болезней или фазе начало бутонизации, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	-(3)	
	0,4-0,5	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	-(3)	

Азоксистробин + Дифеноконазол

Ронилан, КС (150 г/л + 125 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III	0,75-1,0	Подсолнеч ник	Альтернариоз, фомоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	70(2)	-(3)	Активен
	1,3	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(3)	-(3)	

178-02-3686-1 19.05.2022 18.05.2032	1,0	Лён масличный	Антракноз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Подсолнеч ник	Альтернариоз, фомоз, ржавчина, белая гниль, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	70(2)	-(3)	
	0,75 - 1,0	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	
	1,0	Свёкла сахарная	Фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	
	1,0	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(1)	-(3)	
	1,0-1,3	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(3)	-(3)	
	1,0	Подсолнеч ник	Белая гниль, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	70(2)	-(3)	
Амистар Топ, СК (200 г/л + 125 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-2676-1 26.05.2020 25.05.2030	0,8-1	Рис	Пирикулярноз	Опрыскивание в период вегетации. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 40 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1	Рис	Пирикулярноз	Опрыскивание в период вегетации. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 40 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Азоксистробин + Пидифлуметофен + Пропиконазол

Миравис Нео, СЭ (100 г/л + 75 г/л + 125 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-3557-1 22.03.2022 21.03.2032	0,5-1	Ячень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,5-1	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	

Азоксистробин + Пропиконазол

Балий, КМЭ (120 г/л + 180 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-02-2633-1 31.03.2020 021-02-2633-1/368 368 30.03.2030	0,6-0,8	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа-начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	7(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – в фазу выхода в трубку, вторая – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	7(3)	
	0,6-0,8	Ячень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа-начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	7(3)	

	0,8-1,0	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Виноград	Черная пятнистость, оидиум, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – в фазу выхода в соцветия, последующие через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(3)	7(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – по первым признакам одного из заболеваний, последующая через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	7(3)	

Азоксистробин + Пропиконазол + Ципроконазол

Амистар Трио, КЭ (100 г/л + 125 г/л + 30 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-02-2485-1 05.12.2019 04.12.2029	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза и черни колоса: в фазах конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	1,0	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз и чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза и черни колоса: в фазах конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1,0-1,5	Рис	Пирикуляртиоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(2)	-(3)	

Азоксистробин + Протиоконазол + Прохлораз + Ацетамиприд

Квартет, КС (39 г/л + 39 г/л + 100 г/л + 150 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш, ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш- 178-02-2654-1 21.04.2020 20.04.2030	1,0-1,5	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, (в т.ч. альтернариозная семенная инфекция)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-1,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, (в т.ч. альтернариозная семенная инфекция), сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1,0-1,5	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная корневая гниль, плесневение семян(в т.ч. альтернариозная семенная инфекция), фузариозная снежная плесень и тифулезная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	----------------	--	---	------	------	--

Азоксистробин + Протиоконазол + Тиаметоксам

Хайджек, КС (60 г/л + 60 г/л + 375 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 ПП/- 097-01(02)-3884-1 25.11.2022 24.11.2032	1,0	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,7-1,0	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-1,0	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, ризоктониозная прикорневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-1,0	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Хлебная жужелица, злаковые мухи, полосатая хлебная блошка, злаковые тли	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня)	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Азоксистробин + Протиоконазол + Флудиоксонил

Байсайд, ВСК (15 г/л + 40 г/л + 30 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/- 021-02-4279-0 01.12.2023 30.11.2026	1,0-1,5	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, септориоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

<p>Кустодия, КС (120 г/л + 200 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/П 156-02-1926-1 28.05.2018 156-02-1926-1/369 369 27.05.2028</p>	0,8-1	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, фомоз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний. Сроки ожидания при осеннем применении на озимых культурах не требуются Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14- 21 день. Сроки ожидания при осеннем применении на озимых культурах не требуются Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14- 21 день; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения. Сроки ожидания при осеннем применении на озимых культурах не требуются Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Кукуруза	Пузырчатая головня, гельминтоспориоз, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориоз-на я стеблевая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8-1	Подсолнеч ник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз,гельми нтоспориозные пятнистости листьев: сетчатая,темно-бурая	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14- 21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Соя	Аскохитоз, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, но не позднее фазы начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14- 21 день; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения. Сроки ожидания при осеннем применении на озимых культурах не требуются Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, но не позднее фазы начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	

Вершина, КС (22 г/л + 30 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 П/-, ООО «Франдеса» ОГРН: - П/- 590(297)-02-2508-1 30.12.2019 29.12.2029	1,0	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Азоксистробин + Тебуконазол + Тирам

Гераклион, КС (15 г/л + 25 г/л + 400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-3019-1 19.02.2021 18.02.2031	1,0-1,2	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, альтернариозная семенная инфекция	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,6-2,0	Подсолнеч ник	Ложная мучнистая роса, белая гниль, серая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, альтернариозная семенная инфекция	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, альтернариозная и бактериальная семенная инфекция	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, альтернариозная и бактериальная семенная инфекция	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая и полосатая пятнистости, плесневение семян, альтернариозная семенная инфекция	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2	Пшеница озимая	Снежная плесень	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Азоксистробин + Тебуконазол + Флудиоксонил

Максим Форте, КС (10 г/л + 15 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-4164-1 21.07.2023 20.07.2033	1,5-1,75	Ячмень озимый, яровой	Твердая (каменная) головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-1,75	Пшеница озимая, яровая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, септориоз	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1,5-1,75	Пшеница озимая	Церкоспореллезная гниль корневой шейки, снежная плесень	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	----------	----------------	---	---	------	------	--

Азоксистробин + Тебуконазол + Флутриафол

Сансэр Ультра, КС (90 г/л + 317 г/л + 93 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ ОГРН: - П/П 781-02-3660-1 27.04.2022 26.04.2032	0,3-0,4	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, пероноспороз, альтернариоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,25-0,3	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, пиренофороз (жёлтая пятнистость), септориоз листьев колоса	Опрыскивание в период вегетации; против церкоспореллёза – конец кушения – начало выхода в трубку; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,3	Пшеница озимая	Церкоспореллез, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации; против церкоспореллёза – конец кушения – начало выхода в трубку; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,25-0,3	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Азоксистробин + флуазинам

Вендетта, КС (150 г/л + 375 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/П 058-02-2782-1 25.08.2020 24.08.2030	0,7	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	5(3)	-(3)	
	0,3-0,4	Соя	Аскохитоз, пероноспороз, церкоспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: бутонизация – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(1-2)	-(3)	

Азоксистробин + Ципроконазол

Азорит, СК (200 г/л + 80 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/П 046-02-2680-1 28.11.2017 046-02-2680-1/323 27.11.2027	0,5-1,0	Кукуруза	Фузариозная стеблевая гниль, гелиминтоспориозная стеблевая гниль, гелиминтоспориозная пятнистость листьев, фузариоз початков	Опрыскивание в период вегетации. Первое – в фазу выхода метелки; 2-я обработка через 21 день в фазу начало развития зерен: зерна на стадии водяного пузыря Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-1,0	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

	0,75-1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль корзинок, ржавчина, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации. При появлении первых признаков одного из заболеваний, не позднее конца фазы бутонизация – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,0	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Начало бутонизации – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	51(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

Азоксистробин + эпоксиконазол

Зарница, КС (200 г/л + 187,5 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-02-2497-1 11.12.2019 10.12.2029	0,75-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, серая гниль, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	37(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	37(2)	-(3)	
Эпоксин, КС (200 г/л + 100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-02-4073-1 26.04.2023 25.04.2023	0,7-0,9	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Соя	Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, фомоз, церкоспороз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	
	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа – начало выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	
	0,8-1,0	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	
	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	
	0,7-0,9	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	-(3)	-(3)	

Асинуин, СК (240 г/л + 160 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-02-4793-1 29.01.2025 29.01.2035	0,6-0,7	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа – начало выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 200 л/га	49(2)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Кукуруза на зерно и масло	Гельминтоспориоз ные и фузариозные прикорневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий или выметывание метелок. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	56(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Подсолнеч ник на семена и масло	Фомопсис, фомоз, серая гниль, белая гниль, альтернариоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание – при появлении первых признаков болезни; последующее – через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	59(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	49(2)	-(3)	
	0,6-0,7	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200 л/га	49(2)	-(3)	
	0,3	Соя	Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, фомоз, церкоспороз, пероноспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200 л/га	33(2)	-(3)	
	0,6-0,7	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200 л/га	49(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200 л/га	49(2)	-(3)	

азоксистробина + Тебуконазол + Прохлораз

ТриЗаРа Супер, КЭ (83 г/л + 100 г/л + 267 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 II/III 050-02-4608-1 13.06.2024 12.06.2034	0,8-1,5	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, ломкость стеблей, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно-бурая), ринхоспориоз, фузариоз колоса, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1,5	Сахарная свекла	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

	0,8-1,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, ломкость стеблей, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
--	---------	-------------------------------	---	--	---------	------	--

Алюминия фосэтил

Эфатол, СП (800 г/кг) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 III/III 063-02-2164-1 25.03.2019 24.03.2029	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации в стадиях образования соцветия, опадение 70 % лепестков, формирование ягоды с интервалом 12-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	Активен
---	-----	----------	--------	---	-------	------	---------

Аметоктрадин + Диметоморф

Орвего, КС (300 г/л + 225 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-660-1 12.05.2015 014-02-660-1/195 195 11.05.2025	0,8-1	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	10(3)	7(3)	Активен
	0,8-1	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	10(4)	7(3)	
	0,8-1	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(3)	7(3)	
	0,8-1	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	10(3)	7(3)	
	0,8-1	Лук (на репку)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(3)	7(3)	
	0,8-1	Салат	Ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	10(3)	7(3)	

Ацибензолар-С-метил

Рессиви, КС (375 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-3719-1 23.06.2022 22.06.2032	1-1,2	Подсолнеч ник	Ложная мучнистая роса	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 20-25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	-------	------------------	--------------------------	---	------	-------	---------

Бензовиндифлупир

Элатус Плюс, КЭ (100 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-3688-1 19.05.2022 18.05.2032	0,5-0,75	Ячмень озимый, яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации по первым признакам появления болезни Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,75	Ячмень озимый, яровой	Тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание растений в период вегетации по первым признакам появления болезни Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,75	Пшеница озимая	Септориоз, пиренофороз	Опрыскивание растений в период вегетации по первым признакам появления болезни Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая	Опрыскивание растений в период вегетации по первым признакам появления болезни Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	30(1)	-(3)	

Бензойная кислота (в виде триэтаноламинной соли)

Кагатник, ВРК (300 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-02-3295-1 17.09.2021 16.09.2031	0,25-0,4	Картофель	Фузариоз, мокрая гниль, фомоз	Обработка клубней картофеля перед закладкой на хранение Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,8	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	2,0	Свекла сахарная	Кагатные гнили	Опрыскивание растений за 2-4 недели до уборки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,06	Свекла сахарная	Кагатные гнили	Обработка корнеплодов при закладке на хранение в кагаты Расход рабочей жидкости - 3 л/т	-(1)	-(3)	
	50-80 мл/1 л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	-(3)	
	25-40 мл/1 л воды (Л)	Картофель	Фузариоз, мокрая гниль, фомоз	Обработка клубней картофеля перед закладкой на хранение Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	-(3)	

Беномил

Беномил 500, СП (500 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-02-2478-1 20.11.2019 19.11.2029	2,0-3,0	Овёс	Пыльная головня, покрытая головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	4(10)	Активен
	2,0-3,0	Пшеница яровая	Пыльная головня, твёрдая головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	4(10)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная (для промышле нной переработ ки)	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20-40(1-3)	4(10)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	4(10)	
	0,3-0,6	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, церкоспореллёзная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, офиоболёзная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	4(10)	
	2,0-3,0	Ячмень озимый	Пыльная головня, каменная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	4(10)	

	2,0-3,0	Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	4(10)	
	2,0-3,0	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, фузариозная корневая гниль, стеблевая головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	4(10)	
	2,0-3,0	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	4(10)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, офиоболезная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	4(10)	
Беназол, СП (500 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-2386-1 01.10.2019 30.09.2029	0,5-0,6	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(4)	Активен
	0,3-0,6	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, церкоспореллез	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(4)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, церкоспореллез	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(4)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспореллез, фомоз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-3)	-(4)	
Бенорад, СП (500 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-02-3859-1 07.11.2022 06.11.2032	0,3 - 0,6	Пшеница озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,5 - 0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	
	1,0-1,5	Кукуруза	Прикорневые и стеблевые гнили, фузариоз початков	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(1)	-(4)	
	0,3 - 0,6	Рожь озимая	Церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, снежная плесень	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	
	1,0-1,5	Соя	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, септориоз, церкоспороз, бактериоз.	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(4)	
	1,0-1,5	Горох	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, бактериоз.	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(2)	-(4)	
	0,6 - 0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(3)	-(4)	
	1,0	Лен масличный	Пасмо, антракноз, фузариозное побурение	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	
	2,0	Рис	Пирикуляртиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метелок Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	48(1)	-(4)	

	0,5 - 0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	
	2,0 - 3,0	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, ложная (черная) головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевное протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(4)	
	2,0 - 3,0	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и церкоспореллезная корневые гнили, плесневение семян	Предпосевное протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(4)	
	1,0-1,5	Подсолнечник	Фомопсис, серая гниль, белая гниль, фомоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(2)	-(4)	
	2,0 - 3,0	Рожь озимая	Снежная плесень, фузариозная корневая гниль, стеблевая головня, плесневение семян	Предпосевное протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(4)	
	2,0 - 3,0	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевное протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(4)	
	0,5 - 1,0	Картофель (семенной)	Ризоктониоз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 2 л/т	-(1)	-(4)	
Фундазол, СП (500 г/кг) «Агро-Кеми Кфт.» ОГРН: - П/Ш 262-02-633-1 16.04.2015 15.04.2025	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1-2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	44(1-3)	-(3)	
	0,3-0,6	Рожь озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1-2)	-(3)	
Нор-Би, СП (500 г/кг) ПЕТЕРС & БУРГ Кфт. ОГРН: - П/Ш 017-02-637-1 16.04.2015 15.04.2025	0,5-0,6	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница и рожь озимые	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(4)	

Бикасафен + Тебуконазол

Зантара, КЭ (50 г/л + 166 г/л) Байер КрoпСайенс АГ ОГРН: - П/Ш 019-02-997-1 04.03.2016 03.03.2026	0,8-1	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней в фазах появления флагового листа-начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней в фазах появления флагового листа-начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	

Бикасафен + Тебуконазол + Протиоконазол

Скайвэй, КЭ (75 г/л + 100 г/л + 100 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-02-3830-1 21.10.2022 20.10.2032	0,8-1,0	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание растений в период вегетации. Первое профилактическое или при появлении первых признаков болезней в фазах «2-й узел образовался» - начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	1,0-1,2	Пшеница озимая, яровая	Фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации. В фазу: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. В фазу: появление флаг-листа – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	

Боскалид

Кантус, ВДГ (500 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - -/- 014-02-3670-1 29.04.2022 28.04.2032	1,0-1,2	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации, начиная с фазы ягода размером с горошину Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(1)	5(3)	Активен
--	---------	----------	-------------	--	-------	------	---------

Боскалид + Димоксистробин

Пиктор, КС (200 г/л + 200 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П 014-02-2870-1 02.11.2020 01.11.2030	0,5	Подсолнечник	Альтернариоз, серая гниль, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы бутонизация – развитие соцветий Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний в фазу конец бутонизации – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	30(1)	-(3)	

Боскалид + Крезоксим-метил

Крёз, КС (200 г/л + 100 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-02-2808-1 17.09.2020 16.09.2030	0,4-0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз, парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(2)	3(3)	Активен
	0,4-0,6	Виноград	Оидиум, милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазе начала цветения, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	15(3)	3(3)	
	0,5-0,7	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, сажистый грибок, пятнистость листьев, гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	20(3)	3(3)	

Боскалид + Пиракlostробин

Беллис, ВДГ (252 г/кг + 128 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П 014-02-4291-0 05.12.2023 04.12.2026	0,8	Яблоня, груша	Гнили плодов при хранении: монилиальная, пенициллезная, горькая (глеоспориозная), серая, кладоспориозная	Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов, но не позднее 10 дней до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	10(1-2)	7(3)	Активен
	0,8	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы сформировавшийся плод с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	10(3-4)	7(3)	

Сигнум, ВДГ (267 г/кг + 67 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-4529-0 25.04.2024 24.04.2027	0,2-0,3	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующие – при необходимости с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	14(1-2)	7(3)	Активен
	1-1,5	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее при необходимости с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	14(1-2)	7(3)	
	0,75-1	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее при необходимости с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	14(1-2)	7(3)	
	1-1,5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	14(2)	7(3)	
	1-1,2	Капуста белокочанная	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	7(3)	7(3)	
	1-1,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	14(2)	7(3)	

Гимексазол

Гимексазол, СП (700 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/- 018-02-801-1 15.10.2015 14.10.2025	6	Свекла сахарная	Корнеед всходов	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
---	---	-----------------	-----------------	---	------	------	---------

Гимексазол + Гимексазол

Тачигарен, Р, СП (440 г/л + 700 г/кг) Мицуи Кемикалс Агро, Инк. ОГРН: - II/-, Мицуи Кемикалс Агро, Инк. ОГРН: - II/- 853-02-4674-1 25.09.2024 24.09.2034	20,0	Свёкла сахарная	Корнеед, плесневение семян	Обработка семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 30 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	9,6	Сахарная свекла	Корнеед всходов, плесневение семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 40 л/т	-(1)	-(-)	
	32,0	Сахарная свекла	Корнеед всходов, плесневение семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 40 л/т	-(1)	-(-)	
	6,0	Свёкла сахарная	Корнеед, плесневение семян	Обработка семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	

Диметоморф + Зоксамид

Электис Д, КС (180 г/л + 180 г/л)	1,0	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(5)	3(3)	Активен
---	-----	-----------	------------	---	-------	------	---------

Гован Кроп Протекшен Лимитед ОГРН: - III/III 561-02-3651-1 25.04.2022 24.04.2032	1,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней) Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(3)	3(3)	
--	-----	----------	--------	---	-------	------	--

Диметоморф + Манкоцеб

Акробат МЦ, ВДГ (90 г/кг + 600 г/кг) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - II/III 015-02-2310-1 10.07.2019 09.07.2029	2	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	7(3)	Активен
Филдер, ВГ (90 г/кг + 600 г/кг) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - II/III 322-02-1418-1 17.03.2017 16.03.2027	2	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(3)	3(3)	Активен
	2	Лук (на репку)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	3(3)	
	2	Картофель	Фитофтороз,альтерна риоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(3)	3(3)	
Манкодим, СП (90 г/кг + 600 г/кг) «РОТАМ Лтд» ОГРН: - III/III 102-02-1548-1 20.09.2017 19.09.2027	2	Картофель	Фитофтороз,альтерна риоз	Опрыскивание растений в период вегетации (1-ое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(3)	7(3)	Активен
	2	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений в период вегетации (1-ое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	40(3)	7(3)	
Рapid Дуэт, СП (90 г/кг + 600 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 II/III, Агрия АД ОГРН: - II/III 184(026)-02-3945-1 12.01.2023 11.01.2033	2,0	Огурец (семенные посевы)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации (1-ое профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 600 - 800 л/га	- (5)	7(3)	Активен
	2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации (1-ое профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	7(3)	
Соланум, СП (90 г/кг + 600 г/кг) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 II/III 178-02-2671-1 12.05.2020 11.05.2030	2,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(3)	7(3)	Активен
	2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: Расход рабочей жидкости - 400 л/га	28(3)	7(3)	

Дитианон

Делор, ВГ (700 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 III/III 389-02-1526-1 19.07.2017 18.07.2027	0,5-0,7	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(6)	7(3)	Активен
	0,5-0,7	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(5)	7(3)	

Гренни, КС (350 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-2806-1 16.09.2020 018-02-2806-1/406 406 15.09.2030	1,0-1,4	Яблоня	Парша	Первая обработка – профилактическая в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(5)	3(3)	Активен
	1,0-1,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(6)	3(3)	
Делатон, ВГ (700 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-02-3855-1 03.11.2022 02.11.2032	0,5-0,7	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(6)	3(3)	Активен
	0,5-0,7	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(5)	3(3)	
Дифферент, СЭ (350 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/Ш 192-02-4512-1 10.04.2024 09.04.2034	0,9-1,4	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 8-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	14(5)	3(3)	Активен
	0,9-1,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 8-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	14(6)	3(3)	

Дитианон + Дитианон

Делан Про, КС, ВГ (700 г/кг + 125 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - Ш/Ш, БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - Ш/Ш 015-02-1649-1 12.12.2017 04.04.2029	0,5-0,7	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 8-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	14(5)	7(3)	Активен
	0,5-0,7	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 8-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	14(6)	7(3)	
	2,5-3	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание в период вегетации в фазы: первое в фазу «зеленый конус», последующие через 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	14(5)	7(3)	

Дифеноконазол

Скор, КЭ (250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-02-4371-0 23.01.2024 22.01.2027	2 мл/10 л воды (Л)	Роза	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2 (до 1 л на растение)	-(2)	3(-)	Активен
	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(3)	1(3)	
	0,3-0,5	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	1(3)	
	5 мл/10 л воды (Л)	Декоративные кустарники	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие– с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	3(-)	

2 мл/10 л воды (Л)	Персик, абрикос, слива	Кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	21(2)	3(-)
2 мл/10 л воды (Л)	Декоратив ные кустарник и	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	- (2)	3(-)
5 мл/10 л воды (Л)	Роза	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2 (до 1 л на растение)	- (4)	3(-)
2 мл/10 л воды (Л)	Цветочные растения	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	- (2)	3(-)
4 мл/10 л воды (Л)	Цветочные растения	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	- (2)	3(-)
0,3-0,4	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации первая обработка- весной в фазе бутонизация –цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(4)	1(3)
0,2	Персик, абрикос, слива, вишня, черешня	Кластероспориоз, курчавость листьев, кокко-микоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание- в фазе «зеленый конус», второе – после цветения Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	21(2)	1(3)
0,3-0,5	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	1(3)
3-3,5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	20(2)	3(-)
0,3-0,5	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее- с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	1(3)
2 мл/10 л воды (Л)	Вишня, черешня	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	21(2)	3(-)

	0,3-0,35	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	1(3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша,мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	20(3)	3(-)	
Дискор, КЭ (250 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-02-3369-1 16.11.2021 15.11.2031	0,3-0,35	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы: «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	7(3)	Активен
	3-3,5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы: «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней (в зависимости от возраста и сорта) Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	28(2)	7(3)	
	0,3-0,4	Виноград	Оидиум,чернаяпятнистость,краснуха,черная гниль	Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	27(4)	7(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Цветочные и декоративные однолетние и многолетние культуры, кроме луковичных культур	Серая гниль,мучнистая роса, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	7(3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша,мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней (в зависимости от возраста и сорта) Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	28(4)	7(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Декоративные деревья и кустарники	Пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	7(3)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша,мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	28(4)	7(3)	

	3-3,5 мл/10л воды (Л)	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы: «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	28(2)	7(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	10(2)	7(3)	
	0,3-0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз,фомоз,м учнистая роса,альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	7(3)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Оидиум,черная пятнистость,краснуха ,черная гниль	Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	27(4)	7(3)	
	0,3-0,4	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	7(3)	
	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша,мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(4)	7(3)	
Эпсилон, КЭ (250 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-02-3605-1 07.04.2022 06.04.2032	0,15-0,2	Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,3-0,35	Яблоня	Альтернариоз	Обработка в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	-(3)	
Раёк, КЭ (250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-2611-1 19.03.2020 18.03.2030	0,3-0,4	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	7(3)	Активен
	4 мл/5 л/воды (Л)	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	28(2)	3(-)	
	0,3-0,4	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	28(2)	7(3)	

	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зелёный конус», розовый бутон, последующие обработки – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(4)	7(3)	
	4 мл/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	28(2)	3(-)	
	1,5-2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(4)	3(-)	
	0,3-0,4	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	28(2)	7(3)	
Хранитель, КЭ (250 г/л) ООО «Евро-Семена» ОГРН: - Ш/Ш 164-02-454-1 24.11.2014 23.11.2024	4 мл/10 л воды (Л)	Роза	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2 (до 1 л на растение)	-(4)	3(-)	Не активен
	2 мл/10 л воды (Л)	Декоративные кустарники	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалов 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Декоративные кустарники	Пятнистости: черная, серая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалов 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалов 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	3(-)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалов 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	3(-)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Роза	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2 (до 1 л на растение)	-(2)	3(-)	
	3-3,5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	28(2)	3(-)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	28(4)	3(-)	

<p>Фарди, КЭ (250 г/л) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 III/III 389-02-1219-1 05.09.2016 389-02-1219-1/193 193 04.09.2026</p>	0,3-0,5	Картофель	Альтерналиоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	7(3)	Активен
	0,15-0,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	28(4)	7(3)	
	0,15-0,2	Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(4)	7(3)	
	0,3-0,4	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – весной в фазе бутонизации – цветение, вторая до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(4)	7(3)	
	0,3-0,35	Яблоня	Альтерналиоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазах: розовый бутон и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	28(2)	7(3)	
<p>Скорый, КЭ (250 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-3456-1 28.12.2021 27.12.2031</p>	2-5 мл/10 л воды (Л)	Гортензии	Септориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	3(-)	Активен
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/1 растение	-(4)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Гладиолус	Листовая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Георгины	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/1 растение	-(4)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта, гладиолус, гортензии, георгины	Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/1 растение	-(2)	3(-)	

	2 мл/10 л воды (Л)	Черешня, вишня	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	21(2)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Георгины	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Гладиолус	Листовая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/1 растение	-(4)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Гортензии	Септориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/1 растение	-(4)	3(-)	
	3,5 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	20(3)	3(-)	
	2-5 мл/10 л воды (Л)	Роза открытого грунта, гладиолус, гортензии, георгины	Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	3(-)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Персик, абрикос, слива	Кластероспориоз, курчавость	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	21(2)	3(-)	
Скорошанс, КЭ (250 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-614-1 30.03.2015 126-02-614-1/479 479 29.03.2025	0,3-0,4	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, крас-нуха, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	20(4)	3(-)	Не активен
	0,3-0,4	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(2)	7(3)	
	0,2	Вишня, черешня, слива, алыча, терн	Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	28(2)	3(-)	
	0,3-0,35	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазах: розовый бутон и опадения лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	28(2)	7(3)	
	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(4)	7(3)	

Ранголи-Курсор, КЭ (250 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-02-1406-1 10.03.2017 09.03.2027	0,15-0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(4)	7(-)	Активен
	3-3,5 мл/10 л воды (JI)	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	28(2)	7(-)	
	2 мл/10 л воды (JI)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву (в зависимости от возраста и сорта)	28(4)	7(-)	
	0,3-0,35	Яблоня	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазах: розовый бутон и опадения лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	28(2)	7(-)	
АгроКлимат, КЭ (250 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 II/III 197-02-4752-0 12.12.2024 11.12.2027	0,3-0,35	Яблоня, груша, айва	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадения лепестков с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	3(3)	Активен
	0,2	Персик, абрикос, слива, вишня, черешня	Кластероспориоз, курчавость листьев, кладоспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - в фазе «зеленый конус», второе - после цветения. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	3(3)	
	0,15-0,2	Яблоня, груша, айва	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(3)	3(3)	

Дифеноконазол + Азоксистробин

Аякс, КС (125 г/л + 200 г/л) Агрия АД ОГРН: - III/III, ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III 184(026)-02-3902-1 13.12.2022 12.12.2032	0,4	Соя	Антракноз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,7	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	50(2)	-(3)	
	0,7	Ячмень яровой, озимый	Септориоз,сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание (озимые обрабатывают весной) в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	50(2)	-(3)	
	0,7	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание (озимые обрабатывают весной) в период вегетации в фазы конец кущения – начало выход в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	50(2)	-(3)	
	0,7	Подсолнеч ник	Фомопсис, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(2)	-(3)	
	0,65	Рапс озимый	Фомоз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазе 5-6 листьев (осень); второе в фазу вытягивание стеблей (весна) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	

Амистар Голд, СК (125 г/л + 125 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-1854-1 05.04.2018 041-02-1854-1/294 294 04.04.2028	0,75-1,0	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Подсолнеч ник	Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, ржавчина, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	70(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, пероноспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении единичных признаков одной из болезней, но не позднее фазы бутонизации, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	50(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Свекла сахарная	Ризоктониозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазе 4-6 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,75-1,0	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при появлении единичных признаков болезни, но не позднее фазы бутонизации, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Подсолнеч ник	Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, ржавчина, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	70(2)	-(3)	
Тюмен, ТКС (167 г/л + 67 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/- 085-02-4199-1 12.09.2023 11.09.2023	0,3	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) и пыльная головня, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция), фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая и полосатая пятнистости, альтернариоз, ринхоспориоз, септориоз	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,3	Пшеница яровая и озимая	Твердая, пыльная и карликовая головня, плесневение семян, питиозная, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Дифеноконазол + Азоксистробин + Тебуконазол

Оплот Трио, ВСК (90 г/л + 40 г/л + 45 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 II/- 021-02-1801-1 10.03.2016 021-02-1801-1/397 09.03.2026	0,4-0,5	Рожь озимая	Стеблевая головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних стадиях развития)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

0,5-0,6	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, снежная плесень (при слабом развитии болезни)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Лен масличный , лен долгунец	Антракноз, крапчатость, фузариоз, пасмо, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Дифеноконазол + Изопиразам

Эмбрения Экстра, СК (40 г/л + 100 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/Ш 156-02-2301-1 03.07.2019 02.07.2029	1,2-1,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(3)	3(3)	Активен
--	---------	--------	--------------------------	--	-------	------	---------

Дифеноконазол + Имидаклоприд + Тебуконазол

Хет-Трик, СК (67 г/л + 333 г/л + 17 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/- 021-01(02)-2728-1 06.06.2020 05.06.2030	1,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, тли	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, тли	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1,0-1,5	Ячень озимый	Хлебные жужелица	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Дифеноконазол + Мандипропамид

Ревус Топ, КС, СК (250 г/л + 250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-503-1 26.01.2015 21.03.2032	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	3(3)	Активен
	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	3(3)	
	6 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	5(4)	3(-)	
	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(4)	3(3)	
	6 мл/5 л воды (Л)	Лук (репка)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	15(2)	3(-)	
	0,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(4)	3(3)	
	5-6 мл/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	5(4)	3(-)	
	0,6	Лук (репка)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(2)	3(3)	
Ревус Топ, КС (250 г/л + 250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	3(2)	-(3)	Активен

041-02-4805-0 11.02.2025 10.02.2028	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	3(2)	-(3)	
---	---------	------------------------------	-----------------------------	--	------	------	--

Дифеноконазол + Масло чайного дерева

Шриланк, КМЭ (150 г/л + 400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-02-4134-1 21.06.2023 20.06.2033	5,0-7,0 мл/3 л воды (Л)	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	12(2)	7(3)	Активен
	0,5-0,7	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, черная гниль, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	12(4)	7(3)	
	5,0-7,0 мл/3 л воды (Л)	Капуста белокочан ная	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	20(3)	7(3)	
	6,0 - мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 10-14 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1,0-5,0 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	21(3)	7(3)	
	5,0-7,0 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, черная гниль, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	12(4)	7(3)	
	0,6	Яблоня, груша	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(-)	7(3)	
	0,3 - 0,35	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(3)	7(3)	
	0,5-0,7	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	12(2)	7(3)	
	3,0 -3,5 мл/10 л вода (Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 10-14 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1,0-5,0 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	21(3)	7(3)	

	0,5-0,7	Капуста белокочанная	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 -400 л/га	20(3)	7(3)	
	5,0-7,0 мл/3 л воды (Л)	Томаты открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	21(2)	7(3)	
	0,5-0,7	Томаты открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое- профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200 -400 л/г	21(2)	7(3)	

Дифеноконазол + Мефеноксам

Дивиденд Экстрим, КС (92 г/л + 23 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-2541-1 21.02.2020 20.02.2030	0,6-0,8	Пшеница яровая	Пыльная головня, питиозная корневая гниль, септориоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница яровая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т. Ч. Альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница яровая	Твердая головня	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-0,75	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция; септориоз, мучнистая роса, ржавчина бурая (на ранних фазах развития)	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Дифеноконазол + Пидифлуметофен

Миравис Дуо, СК (125 г/л + 75 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/III 041-02-4551-0 02.05.2024 01.05.2027	0,5-1,0	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков заболевания, но не позднее фазы бутонизации, следующее через 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
--	---------	-----	---	---	-------	------	---------

Дифеноконазол + Пропиконазол

Риас, КЭ (150 г/л + 150 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-2078-1 29.01.2019 041-02-2078-1/350 350 28.01.2029	0,3	Свекла сахарная	Мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(1-2)	-(3)	Активен
	0,45-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	48(1-2)	-(3)	

Броадер, КЭ (150 г/л + 150 г/л) АО АгроБест Груп Тарым Илачлары Тохумджулук Ималат-Итхалат Ихраджат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети ОГРН: - П/Ш 158-02-4464-1 13.03.2024 20.03.2027	0,3	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одной из болезней, последующие при необходимости – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы выход в трубку – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы выход в трубку – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)	
Дуэлянт, КЭ (250 г/л + 250 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Ш, Агрия АД ОГРН: - П/Ш 184(026)-02-3944-1 12.01.2023 11.01.2033	0,3	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы выход в трубку – начало колошения (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	0,3	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы выход в трубку – начало колошения (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1-2)	-(3)	
	0,2	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одной из болезней, последующие – при необходимости – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	35(1-2)	-(3)	

Дифеноконазол + Протиоконазол

Стерлинг, ВСК (30 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/- 021-02-4365-1 16.01.2024 15.01.2034	1,0-1,5	Ячмень яровой, озимый	Твёрдая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян в том числе альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,5	Овес	Твердая (покрытая) головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Пшеница яровая, озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Оплот, ВСК (90 г/л + 45 г/л + 90 г/л + 45 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/-, АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/- 021-02-1739-1 03.02.2015 021-02-1739-1/396 15.12.2027	0,5-0,6	Лен масличный , лен долгунец	Антракноз, крапчатость, фузариоз, пасмо, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,45-0,6	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,6	Зерновые колосовые озимые и яровые (за исключени ем овса)	Твёрдая головня, стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса (на ранних фазах развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-0,6	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-0,6	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян	Протравливание семян перд посевом или заблаговременно (до года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина линейная (стеблевая), ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации в фазу колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса (на ранних фазах развития)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,6	Овес	Твердая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,6	Овёс	Твердая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-0,6	Рожь озимая	Снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

0,5-0,6	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Зерновые колосовые озимые и яровые (за исключением овса)	Каменная головня, ложная (черная) пыльная головня, сетчатая пятнистость, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Лен масличный, лен-долгунец	Антракноз, крапчатость, фузариоз, пасмо, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)
0,5-0,6	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)

Дифеноконазол + Тебуконазол + Пираклостробин

Мистерия, МЭ (40 г/л + 80 г/л + 80 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-2802-1 16.09.2020 018-02-2802-1/448 448 15.09.2030	1,0-1,25	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	21(1-2)	-(3)	Активен
	1,0-1,25	Кукуруза	Пузырчатая головня, гельминтоспориозная пятнистость, фузариозно-гельминтоспориозные стеблевые гнили, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	1,0-1,25	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1,0-1,25	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, фомоз, белая гниль (склеротиниоз)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	1,0-1,25	Соя	Аскохитоз, септориоз, церкоспороз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	

Дифеноконазол + Тиаметоксам + Флудиоксонил

Селест Топ, КС (25 г/л + 262,5 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-01(02)-4007-1 07.03.2023 06.03.2033	1,2-1,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	12,5-15	Рапс яровой	Корневые гнили, плесневение семян, альтернариоз	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15-20 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-2	Рис	Корневые гнили, пирикуляртиоз, плесневение семян	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1,2-1,5	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	-----------------------	--	---	------	------	--

Дифеноконазол + Тирам

<p>Тирада, СК (30 г/л + 400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ППП 021-02-2626-1 25.03.2020 24.03.2030</p>	1,5-2,0	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание (обработка) семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	7(3)	Активен
	1,5-2,0	Горох	Аскохитоз, плесневение семян, фузариозная корневая гниль, бактериоз (семенная инфекция)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	7(3)	
	1,5-2,5	Яблоня, груша	Парша, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	50(4)	7(3)	
	3,0-4,0	Картофель	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, второе – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	7(3)	
	2,0-3,0	Подсолнечник	Белая и серая гнили, плесневение семян, фузариозная корневая гниль, фомопсис	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	7(3)	
	2,0-3,0	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, второе – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	7(3)	
	1,5-2,5	Кукуруза на зерно	Пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	7(3)	
	1,5-2,0	Ячмень яровой и озимый	Твёрдая (каменная) и пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	7(3)	
	2,5-3,0	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, черная и серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – весной в фазе бутонизации–цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, последующие - с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	50(4)	7(3)	
	3,0-4,0	Морковь	Альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, второе – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	7(3)	
	1,5-2,0	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание (обработка) семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	7(3)	

	1,5-2,5	Яблоня, груша	Парша, гнили плодов при хранении (монилиальная, пенициллезная, горькая, плесневидная)	Опрыскивание в период созревания плодов Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	50(2)	7(3)	
	1,5-2,0	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян, церкоспороз, бактериоз (семенная инфекция)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	7(3)	
	1,5-2,0	Пшеница яровая и озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание (обработка) семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	7(3)	

Дифеноконазол + флуксапироксад

Серкадис Плюс, КС (50 г/л + 75 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - III/III 015-02-1468-1 19.04.2017 18.04.2027	0,8-1	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: появление соцветия – цветение-развитие плода, последующие через 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	Активен
---	-------	---------------	-----------------------	--	-------	------	---------

Дифеноконазол + Флутриафол

Винтаж, МЭ (65 г/л + 25 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-02-1135-1 28.06.2016 018-02-1135-1/262 262 27.06.2026	0,8-0,1	Горох (кроме овощного)	Аскохитоз, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	28(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетациипри появлении первых признаков болезни, не позднее фазы бутонизации, последующее при необходимости – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, антракноз, септориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, антракноз, септориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	40(1-2)	-(3)	

0,8-0,1	Горох (кроме овощного)	Аскохитоз, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)
0,8-0,1	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении единичных признаков болезни в фазу появления флагового листа; второе – начало выметывания метелок Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	40(2)	-(3)
0,8-0,1	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении единичных признаков болезни в фазу появления флагового листа; второе – начало выметывания метелок Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)
0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней; второе – при необходимости через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	40(1-2)	-(3)
0,8	Люпин	Антракноз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: 1-е – при появлении первых признаков одного из заболеваний, начиная с фазы вытягивания стеблей, 2-е – конец бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)

Дифеноконазол + Ципроконазол

ДВД Шанс, КС (30 г/л + 6,3 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/- 126-02-573-1 27.02.2015 26.02.2025	1	Пшеница яровая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
	0,75	Овес	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,5	Ячмень озимый	Пыльная головня, каменная головня, ложная (черная) пыльная головня, темно-бурая и сетчатая	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1	Ячмень яровой	Каменная головня, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1	Ячмень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1	Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1	Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,5	Ячмень озимый	пятнистости, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Атик, КС (30 г/л + 6,3 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/-, ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/- 010(038)-02-3624-1 13.04.2022 12.04.2032	1,0 л/т	Пшеница озимая	Пыльная и твердая головня, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0 л/т	Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, фузариозная снежная плесень, стеблевая головня, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75 л/т	Овес	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5 л/т	Ямень яровой	Пыльная и ложная (черная) пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0 л/т	Пшеница яровая	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0 л/т	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0 л/т	Ячмень озимый	Пыльная, каменная и ложная (черная) пыльная головня, темно-бурая и сетчатая пятнистости, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1,0 л/т	Ямень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0 л/т	Ямень яровой	Каменная головня, темно-бурая и сетчатая пятнистости, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1,0 л/т	Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Дивиденд Стар, КС (30 г/л + 6,3 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-3013-1 09.02.2021 08.02.2031	0,75-1	Овес	Гельминтоспориозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1	Овес	Твердая (покрытая) головня, пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1	Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, спорынья. Снежная плесень (в районах слабого и умеренного развития)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75 - 1	Ячмень яровой, озимый	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, полосатая пятнистость, сетчатая пятнистость, плесневение семян, мучнистая роса	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, ржавчина бурая (на ранних стадиях развития), септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Дифеноконазол + цифлufenамид

Цидели Топ, ДК (125 г/л + 15 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/III 041-02-1969-1 23.07.2018 041-02-1969-1/332 332 22.07.2028	0,75-1,0	Морковь	Мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Первое опрыскивание профилактическое, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	12(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(3)	-(3)	

дифеноконазол + Флудиоксонил + Ацетамиприд

Грифон, КС (25 г/л + 25 г/л + 100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/- 082-01(02)-3947-1 12.01.2023 11.01.2033	0,4	Картофель	Ризиктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Обработка клубней при посадке Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Пшеница озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Картофель	Ризиктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Пшеница яровая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тангер, КС (400 г/л) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 П/П 389-02-4483-1 29.03.2024 28.03.2034	1,7-2,0	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первые две обработки проводят профилактически до цветения: 1-ая обработка в фазу мышиное ухо - зеленая почка; 2-ая обработка - в фазу красная почка - розовый бутон; 3-я обработка - через 10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	46(3)	7(3)	Активен
	2,0	Слива	Кластеро-спориоз, коккоми-коз	Опрыскивание в период вегетации: 1-ая обработка в фазу первые настоящие листочки; 2-ая обработка в фазу белый бутон; 3-я обработка в фазу - рост плодов Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(3)	-(-)	

Додин + Додин

Силлит, КС (400 г/л + 400 г/л) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - П/П, Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - П/П 322-01-4719-1 27.04.2016 26.04.2026	2-2,25	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе розовый бутон, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	60(4)	-(3)	Активен
	2,25	Персик	Курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе зеленый конус, последующие – в фазе розовый бутон Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	75(2)	-(3)	
	2,25	Персик	Курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе зеленый конус, последующие – в фазе розовый бутон. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	75(2)	-(3)	
	2-2,25	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе розовый бутон, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	60(4)	-(3)	
	2	Вишня, слива	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе зеленый конус, последующие – в фазе розовый бутон. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	-(3)	
	2,0	Вишня, слива	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе зеленый конус, последующие – в фазе розовый бутон Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	-(3)	

Зоксамид + Мандипропамид

Пергадо Зокс, ВДГ (240 г/л + 250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-1970-1 23.07.2018 22.07.2028	0,4-0,6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	14(2)	3(3)	Активен
--	---------	----------	--------	--	-------	------	---------

Изопиразам + Дифеноконазол

Эмбрения, СК (100 г/л + 40 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-02-1447-1 07.04.2017 06.04.2027	1,2-1,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(3)	3(3)	Активен
--	---------	--------	-----------------------	--	-------	------	---------

Изопиразам + Ципродинил

Бонтима Форте, КЭ (62,5 г/л + 187,5 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 Ш/Ш 156-02-2327-1 24.07.2019 23.07.2029	1,5-2	Ячень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, полосатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	1,25-2	Ячень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1-2)	-(3)	
Бонтима, КЭ (62,5 г/л + 187,5 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-02-1448-1 07.04.2017 06.04.2027	1,5-2	Ячень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, полосатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	1,25-2	Ячень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1-2)	-(3)	

Изопротиолан

Фуджи 1, КЭ (416 г/л) Суми Агро Европа Лимитед ОГРН: - П/Ш 215-02-2536-1 28.02.2020 27.02.2030	1,0-1,5	Рис	Пирикулярриоз при умеренном развитии болезни	Опрыскивание растений в период вегетации: первое опрыскивание в фазы – формирование метелки – флаг-лист полностью развернулся; второе опрыскивание в фазы – влагалище флагового листа открыто – вышло 30% метелки. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой не ранее 21 дня после последней обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1-2)	-(-)	Активен
---	---------	-----	--	---	---------	------	---------

Имазалил

Волсепт Сид, ВРК (100 г/л) ООО «ВПО «ВОЛГОХИМНЕФТЬ» ОГРН: 1023405968178 П/- 374-02-3708-1 07.06.2022 06.06.2032	0,1-0,15	Семенной картофель	Возбудители болезней клубней: парши обыкновенной, парши серебристой, ризоктониоза (парши черной), фомоза (гангрены), фузариоза (сухой гнили)	Опрыскивание клубней семенного картофеля в потоке водным раствором при закладке на хранение или сортировке Расход рабочей жидкости - 2 л/т	-(1-2)	1(1)	Активен
--	----------	--------------------	--	---	--------	------	---------

Имазалил + Мефеноксам + Флудиоксонил

Депозит Суприм, МЭ (40 г/л + 15 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/- 018-02-3824-1 12.10.2022 018-02-3824-1/465 465 11.10.2032	1,0-1,2	Нут	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-1,2	Люпин	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	

25-40 мл/л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)
0,25-0,4	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,0-1,2	Подсолнеч ник	Фузариозная корневая гниль, серая гниль, белая гниль (прикорневая форма), ложная мучнистая роса, фомопсис, альтернариоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,0-1,2	Горох	Корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)
1,0-1,2	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная корневая и стеблевая гнили, плесневение початков, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Имазалил + Тебуконазол + Имидаклоприд

Туарег, СМЭ (34 г/л + 20 г/л + 280 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-01(02)-732-1 30.07.2015 29.07.2025	1-1,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,4	Ячмень яровой, озимый, в том числе пивоварен ный	Пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,4	Ячмень яровой, озимый, в том числе пивоварен ный	Твердая (каменная) головня	Протравливание семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,4	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция; мучнистая роса, бурая ржавчина (на ранних фазах развития)	Протравливание семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,4	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имазалил + Тебуконазол + Тиabendазол

Шансил Трио, КС (40 г/л + 60 г/л + 60 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/- 126-02-4003-1 06.03.2023 05.03.2033	0,4-0,5	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключени ем овса	Твердая головня, твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, сетчатая пятнистость, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	---	--	--	------	------	---------

Имазалил + Тебуконазол + Флутриафол

Грандсил Ультра, КС (20 г/л + 45 г/л + 75 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/- 082-02-3873-1 14.11.2022 13.11.2032	0,4-0,5	Ячмень яровой	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, твердая (покрытая) головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, септориоз (на ранних стадиях), плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имазалил + Тиabendазол + Тебуконазол

Анкер Трио, КС (40 г/л + 60 г/л + 60 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/- 070-02-3864-1 10.11.2022 09.11.2032	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, полосатая и темно-бурая пятнистости, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Клад, КС (60 г/л + 80 г/л + 60 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/- 178-02-2599-1 16.03.2020 15.03.2030	0,3-0,4	Ячмень озимый	Твердая (каменная) головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,6	Рапс яровой, озимый	Фузариозная корневая гниль, альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой	Твердая (каменная) головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, стеблевая головня, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, мучнистая роса и септориоз (на ранних фазах)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень озимый	Пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6	Подсолнечник	Серая гниль, белая гниль, альтернариоз, фузариоз, фомопсис, плесневение (семенная инфекция)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	

Имазалил + Флудиоксонил + Металаксил

Депозит, МЭ (40 г/л + 40 г/л + 30 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/- 018-02-1860-1 10.04.2018 018-02-1860-1/318 318 09.04.2028	1-1,2	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, церкоспороз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1-1,2	Нут	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,2	Горох	Корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	25-40 мл/л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1,0 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)	
	0,25-0,4	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имидаклоприд + Ипродион + Дифеноконазол

Идикум, СК (100 г/л + 133 г/л + 6,7 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/- 021-01(02)-2603-1 17.03.2020 16.03.2030	3 - 4,5	Картофель	Ризоктониоз, антракноз, фузариоз, колорадский жук, тли, проволочники	Обработка клубней и дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 50 - 150 л/га	-(1)	-(-)	Активен
--	---------	-----------	--	---	------	------	---------

Имидаклоприд + пенцикурон

Престиж, КС (140 г/л + 150 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/-, Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/- 019-02-2401-1 18.09.2019 17.09.2029	2,5-3,5	Пшеница озимая	Ризоктониозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,7-1	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней во время посадки Расход рабочей жидкости - 20-30 л/т	-(1)	-(-)	
	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	
	2,5-3,5	Ячмень озимый	Ризоктониозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 13 л/т	-(1)	-(-)	
	0,7-1	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имидаклоприд + Тебуконазол + Флудиоксонил

Флутеприд, ТС (400 г/л + 30 г/л + 50 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 II/-, ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 II/- 156-02-2138-1 05.04.2019 04.04.2029	0,8-1,2	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,2	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1,2	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1,2	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, снежная плесень, включая тифулезную снежную плесень, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имидаклоприд + Тиабендазол

Имикар, КС (280 г/л + 80 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/-, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - III/- 010(011)-01(02)-1573-1 05.09.2016 04.09.2026	0,6-0,7	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	-----------	------------------------------------	---	------	------	---------

Ипконазол

Люмифлекс, ТС (452 г/л) ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А. ОГРН: - III/- 869-02-4253-1 13.11.2023 12.11.2033	0,18	Кукуруза	Пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,06	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозные корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение семян и початков	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Ранкона 450, ТС (452 г/л) ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А. ОГРН: - III/- 869-02-4089-1 23.05.2023 22.05.2033	0,06	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	0,06	Подсолнеч ник	Фомопсис, серая гниль (семенная инфекция), фузариозная корневая гниль, белая глинь (прикорневая форма), плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	

Ипконазол + Тирам

Эклипс, ТС (10 г/л + 225 г/л) ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А. ОГРН: - III/- 869-02-4722-1 11.11.2024 10.11.2034	2	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, ринхоспориоз, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах. Расход рабочей жидкости - 10 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	2	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, септориоз, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (7-14 дней до посева) или на семенных заводах. Расход рабочей жидкости - 10 л/га	-(1)	-(-)	

Ипродион

Ровраль, СП (500 г/кг) ФМС Кемикал ОГРН: - III/- 051-02-1647-1 12.12.2017 11.12.2027	4	Подсолнеч ник	Белая и серая гнили всходов, фомопсис	Предпосевное протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	2(-)	Активен
	-	Подсолнеч ник	Белая и серая гнили всходов, фомопсис	Предпосевное протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	2(-)	

Йод

Фармайод, ГР (100 г/л) ООО НБЦ «Фармбиомед» ОГРН: - III/III 045-02-3696-1 25.05.2022 24.05.2032	3,0-5,0 л/га	Томат открытого грунта	Вирусные болезни	Капельный полив растений, первый через 7-10 дней после высадки рассады, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 5000 л/га	3(3)	-(3)	Активен
	2,4-4,0 л/га	Томат защищен-н ого грунта	Вирусные болезни	Капельный полив растений, первый через 7-10 дней после высадки рассады, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	3(3)	-(3)	
	1-10 мл/ 100 л	Виноград	Вирусные болезни	Замачивание черенков в 0,001-0,01%-ном рабочем растворе препарата на 24 ч. черенков Расход рабочей жидкости - 170 л/1000 шт	20(1)	-(3)	
	2,5-4,0 л/га	Картофель	Вирусные болезни	Капельный полив под корень в фазе всходов 10-15 см; последующие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 5000 л/га	20(3)	-(3)	
	2,0-3,0 л/га	Виноград	Вирусные болезни	Капельный полив под корень в фазы: до цветения, после цветения, ягода диаметром 0,5 см, в начале созревания Расход рабочей жидкости - 5000 л/га	20(4)	-(3)	
	5,0 л/га	Виноград	Вирусные болезни	Капельный полив под корень: после сбора урожая, весной – до начала вегетации Расход рабочей жидкости - 5000 л/га	20(2)	-(3)	
	2,0-3,2 л/га	Огурец защищен-н ого грунта	Обыкновенная мозаика, зеленая крапчатая мозаика	Капельный полив растений, первый через 7-10 дней после высадки рассады, последующие – интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	3(3)	-(3)	

	2,5-5,0 л/га	Яблоня	Вирусные болезни, бактериальный рак плодовых	Капельный полив под корень. Первый в фазу «начинающееся опадение листьев». Два последующих: в стадии «зеленый конус» и при диаметре плодов 10-20 мм Расход рабочей жидкости - 5000 л/га	20(3)	-(3)	
--	--------------	--------	--	--	-------	------	--

Каптан

<p>Камертон Ультра, СП (500 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 П/Ш 389-02-3076-1 30.03.2021 29.03.2031</p>	2,5-3	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации 0,25-0,3%-ным рабочем раствором. Нельзя применять в течении 15 дней до и 15 дней после обработки растений минеральными маслами и эмульсиями нефтяных масел Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га	40(4)	-(3)	Активен
	2,5-3	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации 0,25 %-ным рабочем раствором. Нельзя применять в течение 15 дней до и 15 дней после обработки растений минеральными маслами и эмульсиями нефтяных масел Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(4)	-(3)	
<p>Малвин, ВДГ (800 г/кг) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - П/Ш 201-02-4596-1 07.06.2024 06.06.2034</p>	1,5-2,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазу образование и набухание соцветия, последующие - с интервалом в 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(5)	7(3)	Активен
	1,8-2,5	Яблоня	Монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, опадение 70% лепестков, последующее - с интервалом в 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(2)	7(3)	
	1,8-2,5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус, опадение 70% лепестков, последующие - с интервалом в 8-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(3)	7(3)	
<p>Мерпан, СП (500 г/кг) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/Ш 156-02-2999-1 28.01.2021 27.01.2031</p>	2,5-3	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(4)	7(3)	Активен
<p>Каперанг, КС (500 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-4710-1 07.11.2024 06.11.2034</p>	2,5-3,0	Яблоня	Монилиоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы розовый бутон, следующее через 8-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	2,5-3,0	Яблоня	Парша	Опрыскивание растений в период вегетации, начиная с фазы зеленый конус, последующие с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	-(3)	

	2,5-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений в период вегетации первое опрыскивание –профилактическое в фазу образования и набухания соцветия, последующие – с интервалом 8-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(5)	-(3)	
--	---------	----------	--------	--	-------	------	--

Карбендазим

Аксиома, КС (500 г/л) ООО ЭЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/Ш 278-02-4115-1 05.11.2019 04.11.2029	0,5	Пшеница озимая, ячмень озимый	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
Армадекс, КС (500 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/Ш 082-02-4343-1 28.12.2023 27.12.2033	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Фузариозные и гельминтоспориозные корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(3)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
Казим, КС (500 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Ш 085-02-4129-1 19.06.2023 18.06.2033	0,5-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз, фузариозная снежная плесень	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница озимая	Корневые, прикорневые гнили и предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Кардон, КС (500 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/Ш, ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 П/Ш, ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/Ш 042(043,197)-02-2913-1 08.12.2020 07.12.2030	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(3)	-(3)	Активен
	1-1,5	Ячмень озимый и яровой	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
	1-1,5	Пшеница озимая и яровая	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
Казимир, КС (500 г/л)	0,6	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(3)	-(3)	Активен

ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 П/Ш 653-02-2911-1 07.12.2020 06.12.2030	0,5-0,6	Пшеница озимая, ячмень озимый	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая, ячмень озимый	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Комфорт, КС (500 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Ш 010-02-3047-1 05.03.2021 04.03.2031	1,0-1,5	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная, фузариозная корневые гнили, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(3)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница и ячмень, рожь яровые и озимые	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Рожь озимая и яровая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	1,5-2,0	Подсолнечник	Альтернириоз, белая гниль, серая гниль, фузариозная корневая гниль, фомопсис, фомоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница и ячмень, рожь яровые и озимые	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	
Дерозал, КС (500 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/Ш, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/Ш 004(549)-02-5004-1/ 10.01.2020 01.01.2024	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	Не активен
	1,0-1,5	Пшеница, ячмень озимые и яровые	Пыльная, твердая головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	60(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница, ячмень	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	
Феразим, КС (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-02-2956-1 24.12.2020 23.12.2030	0,5-0,6	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Корневые и прикорневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), церкоспореллезная гниль корневой шейки, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(3)	-(3)	

	0,3-0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Корневые и прикорневые гнили, (преимущественно фузариозной этиологии)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
Зимошанс, КС (500 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-02-4518-1 22.04.2024 21.04.2034	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	14(3)	-(3)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Мучнистая роса, гельминтоспорио	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
Зим 500, КС (500 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-467-1 15.12.2014 14.12.2024	1-1,5	Пшеница, ячмень озимые и яровые	Пыльная головня, твердая головня, корневые и прикорневые корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Не активен
	0,5-0,6	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(3)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая	Прикорневые и корневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
Колфуго Супер, КС (200 г/л) «Агро-Кеми Кфт.» ОГРН: - П/Ш 262-02-634-1 16.04.2015 15.04.2025	1,5-2	Рожь озимая	Снежная плесень, фузариоз колоса, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина бура	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	32(1-2)	-(3)	Активен
	1,5-2	Ячмень озимый и яровой	Корневые и прикорневые гнили, церкоспореллез, снежная плесень, каменная и пыльная головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	1,5-2	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	28(2)	-(3)	
	1,5-2	Пшеница озимая и яровая	Корневые гнили, церкоспореллез, фузариоз колоса, септориоз листьев и колоса, пиреноспориоз, мучнистая роса, ржавчина бурая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	32(1-2)	-(3)	
	1,5-2	Ячмень озимый и яровой	Корневые и прикорневые гнили, церкоспореллез, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	32(1-2)	-(3)	
	1,5-2	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

	1,5-2	Пшеница озимая и яровая	Корневые и прикорневые гнили, церкоспореллез, снежная плесень, твердая и пыльная головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
Кредо, СК (500 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-02-1740-1 09.07.2015 08.07.2025	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(3)	-(3)	Активен
	1-1,5	Пшеница озимая и яровая	Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян, снежная плесень, септориоз	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	1-1,5	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая и яровая	Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии), церкоспореллез, снежная плесень, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,3-0,6	Рожь озимая	Снежная плесень, фузариозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рожь озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	1-1,5	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница озимая и яровая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,3-0,6	Ячмень яровой, озимый	Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
Сарфун, СК (500 г/л) Ц ЦИЭХ Сажина Акционерное Общество ОГРН: - П/П 307-02-719-1 21.07.2015 20.07.2025	0,5-0,6	Пшеница, ячмень, рожь	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(3)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница, ячмень, рожь	Корневые, прикорневые гнили и предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

Карзибел, КС (500 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/Ш 277-02-1777-1 27.02.2018 26.02.2028	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(3)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Карбезим, КС (500 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Ш 097-02-2712-1 26.06.2020 25.06.2030	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(3)	-(3)	Активен
	0,6	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутионизация-начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	36(2)	-(3)	
	1,0-1,5	Люпин	Антракноз, аскохитоз, фузариоз, септориоз, серая гниль, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутионизация-начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Рожь озимая	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1-2)	-(3)	
	1,5	Люпин	Антракноз, аскохитоз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1-2)	-(3)	
	1,5	Рапс яровой и озимый	Корневые гнили фузариозно-питиозно й этиологии, альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница озимая	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
	0,3-0,6	Ячмень яровой и озимый	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рожь озимая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	

Карзитек, КС (500 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/Ш 070-02-3675-1 11.05.2022 10.05.2032	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Мучнистая роса, гельминтоспориз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	30(3)	-(3)	
Дерозал Евро, КС (500 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/Ш, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/Ш 004(549)-02-5004-1 10.01.2020 09.01.2030	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница, ячмень озимые и яровые	Пыльная, твердая головня, гельминтоспориозная , фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	60(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница, ячмень	Мучнистая роса, гельминтоспориз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,3-0,6	Пшеница, ячмень	Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	

Карбендазим + Азоксистробин

Азорро, КС (300 г/л + 100 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-1859-1 09.04.2018 018-02-1859-1/358 358 08.04.2028	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориз	Опрыскивание в период вегетации при первых признаках появления болезни Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Соя	Аскохитоз, пероноспороз, церкоспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, следующее – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, септориоз листьев, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации при первых признаках появления болезни Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-1,0	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, следующее – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации при первых признаках появления болезни Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Карбендазим + Тиаметоксам

Доктор Кроп, ТБ, КС (500 г/л + 10 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/-, ООО «Химагромакетинг» ОГРН: - П/Ш 064-02-2893-1 23.11.2020 22.11.2030	0,3-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, фузариозная корневая гниль, церкоспореллезная гниль корневой шейки, офиолезная корневая гниль, фузариозная снежная плесень	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(2)	-(3)	Активен
	0,5-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	

Карбендазим + Фитобактериомицин

Стрекар, КС (70 г/л + 25 г/л) ООО «Фармбиомедсервис» ОГРН: - II/III 112-02-2356-1 28.08.2019 27.08.2029	1,5-2,0	Сахарная свекла	Бактериальная пятнистость, бактериальная гниль, церкоспороз, мучнистая роса, фузариоз	Опрыскивание в фазе 8-10 листьев, последующие – через 20-25 суток Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(3)	-(3)	Активен
--	---------	--------------------	--	--	-------	------	---------

Карбендазим + Флутриафол

Новус-Ф, КС (250 г/л + 120 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 II/III 192-02-1015-1 09.03.2016 08.03.2026	0,6-0,8	Пшеница озимая, ячмень яровой и озимый	Ржавчина бурая, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, пиренофороз, карликовая ржавчина, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, церкоспореозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое –при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое –при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	

Карбоксин + Тирам

Здоровая земля, ВКС (198 г/л + 198 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-02-3505-1 02.03.2022 01.03.2032	2 мл/л воды(Л)	Рассада цветочных растений	Черная ножка	Дезинфекция почвы после высева семян методом полива. Расход рабочей жидкости - 1 /0,2	-(1)	1(-)	Активен
---	-------------------	----------------------------------	--------------	--	------	------	---------

Карбофуран

Хинуфур, КС (436 г/л) «Агро-Кеми Кфт.» ОГРН: - I/- 262-02-1385-1 06.03.2017 05.03.2027	9,6-12	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее чем за 6 месяцев до посева	-(1)	-(-)	Активен
	18-23	Свекла сахарная, кормовая	Проволочники, свекловичные блошки, долгоносики	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно (не ранее, чем за 6 месяцев до посева) для фракции 3,5-4,5 мм и дражированных семян	-(1)	-(-)	
	12-18	Свекла сахарная, кормовая	Проволочники, свекловичные блошки, долгоносики	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно (не ранее, чем за 6 месяцев до посева) для фракции 4,5-5,5 мм	-(1)	-(-)	

Касугамицин

Касумин 2Л, ВР (20 г/л) Хокко Кемикал Индастри Ко., Лтд ОГРН: - III/III 353-02-1032-1 14.03.2016 353-02-1032-1/268 268 13.03.2026	1,5-1,8	Капуста белокочан ная	Сосудистый и слизистый бактериоз	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	7(3)	1(1)	Активен
	1,25-1,5	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: выход флагового листа - начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	7(3)	1(1)	

	3,0-5,0	Яблоня	Бактериальный ожог	Опрыскивание растений в фазы: «розовый бутон»; начало цветения; конец цветения; плод размером орех лещины Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	90(4)	1(1)	
	1,5-1,8	Томат защищенного грунта	Чёрная бактериальная пятнистость, бактериальная крапчатость	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	7(3)	1(1)	
	1,5-1,8	Томат открытого грунта	Чёрная бактериальная пятнистость, бактериальная крапчатость	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	7(3)	1(1)	

Клотианидин + Тиabendазол + Тебуконазол

Нагайна, КС (390 г/л + 40 г/л + 30 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 ИП/- 178-01(02)-3957-1 20.01.2023 19.01.2023	1,0	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень и тифулёзная снежная плесень	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8 - 1,0	Ячмень озимый, яровой	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Клотианидин + флуоксастробин + Флуопиколоид

Модесто Плюс, КС (300 г/л + 90 г/л + 120 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - ИП/- 019-02-1151-1 11.07.2016 019-02-1151-1/335 335 10.07.2026	15-16,6	Рапс яровой, озимый	Корневые гнили (в т.ч. грибы родов питиум, фузариум), плесневение семян, альтернариоз)	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 26,6 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	12,6-16,8	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, серая гниль, белая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 25 л/т (включая расход препарата)	-(1)	-(-)	

Коллоидное серебро

Зерокс, ВКР (3000 мг/л) ООО «Нанобиотех» ОГРН: - ИП/ИП 257-02-2822-1 06.10.2020 05.10.2030	2-3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-9 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	14(4)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз, бактериальные гнили	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

Комплекс полиоксиснов

Полар 50, ВГ (500 г/кг) Гадот Агро Лтд. ОГРН: - ИП/ИП 170-02-3828-1 07.09.2016 06.09.2026	0,25	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	3(3)	1(-)	Активен
	0,25	Яблоня	Мучнистая роса, альтернариоз	Первое опрыскивание профилактическое – до появления признаков болезни. Последующие по первым признакам заболевания с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(3)	-(3)	

	0,25	Морковь (кроме раннеспел ых сортов пучковый товар)	Альтернариоз, мучнистая роса,	Первое опрыскивание профилактическое – до появления признаков болезни. Последующие по первым признакам заболевания с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200 -400 л/га	3(3)	-(3)	
	0,2-0,25	Огурец защищен ного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	3(3)	1(-)	
	0,25	Виноград	Оидиум, серая гниль	Первое опрыскивание профилактическое – до появления признаков болезни. Последующие по первым признакам заболевания с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800 -1000 л/га	3(3)	-(3)	

Крезоксим-метил

Крезаксин, ВДГ (500 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 III/III 389-02-3563-1 22.03.2022 21.03.2032	0,14-0,26	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, альтернариоз, монилиальная плодовая гниль, гнили плодов при хранении (монилиальная, пенициллёзная, горькая, серая, кладоспориозная)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	35(3)	7(3)	Активен
	0,15-0,2	Виноград	Оидиум, милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	12(3)	7(3)	
Строби, ВДГ (500 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-3566-1 23.03.2022 22.03.2032	0,2-0,26	Яблоня	Парша, мучнистая роса, сажистый грибок, «мухосед», альтернариоз, гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллёзная, горькая, плесневидная)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	30(3)	7(3)	Активен

Крезоксим-метил + Пропиконазол + Крезоксим-метил

Стробитек Мульти, ВДГ, КС (125 г/л + 150 г/л + 500 г/кг) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - III/III, ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - II/III 064-02-2894-1 23.11.2020 22.11.2030	0,15-0,2	Виноград	Оидиум, милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Препарат применяется в системе с другими фунгицидами, чередуя с препаратами иного механизма действия, отличного от стриблиуринов Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	20(3)	4(3)	Активен
	0,8-1,0	Подсолнеч ник	Альтернариоз, фомоз, серая и белая гнили, ржавчина	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы 6-8 листьев – развитие соцветий Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	39(2)	-(3)	
	0,6-1,0	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы начало выхода в трубку – конец колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

Макролидныйтилозиновый комплекс

Фитоплазмин, КС (200 г/л) ООО «Фармбиомедсервис» ОГРН: - III/III 112-02-382-1	3-4	Томат отрытого грунта	Столбур	Опрыскивание или полив под корень в начале лета цикладки Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	-(1)	1(1)	Не активен
	3-4	Томат отрытого грунта	Столбур	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	-(2)	1(1)	

27.06.2014 26.06.2024	3-4	Томат отрытого грунта	Столбур	Опрыскивание или полив под корень в начале лета цикадки Расход рабочей жидкости - 5000-10000 л/га	-(1)	1(1)	
	6-12	Томат защищенн ого грунта	Мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив под корень 0,2-0,3%-й концентрацией рабочей жидкости через 1-1,5 месяца после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 3-4 недели Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	-(2-3)	-(-)	
	3-4	Томат отрытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале цветения, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	-(3)	1(1)	
	6-12	Огурец защищенн ого грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание	Полив под корень 0,2-0,3%-й концентрацией рабочей жидкости через 1-1,5 месяца после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 3-4 недели Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	-(2-3)	-(-)	

Мандипропамид + Оксатиапипролин

Орондис Ультра, СК (250 г/л + 30 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-4517-0 22.04.2024 21.04.2027	0,67	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800 -1000 л/га	20(2)	3(3)	Активен
	0,5-0,6	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 - 600 л/га	10(3)	3(3)	
	0,4	Томаты защищенн ого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации; Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	20(3+6)	3(3)	
	0,4	Томаты открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 - 600 л/га	20(3)	3(3)	

Манкоцеб

Дитан М-45, СП (800 г/кг) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЬШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - II/III 009-02-2244-1 24.05.2019 23.05.2029	2,0-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	7(3)	Активен
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	20(3)	7(3)	
	1,2-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	20(3)	7(3)	
Дитан КА, СП (800 г/кг) ООО Кортева Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787	1,2-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	20(3)	-(3)	Активен

П/Ш 866-02-4578-1 21.05.2024 20.05.2034	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	20(3)	-(3)	
	2,0-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(6)	-(3)	
Индофил М-45, СП (800 г/кг) ИНДОФИЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД ОГРН: - П/Ш 159-02-2388-1 11.09.2019 10.09.2029	2,0-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	7(3)	Активен
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	21(3)	7(3)	
Манзат, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 П/Ш 148-02-2526-1 22.01.2020 21.01.2030	2,0-3,0	Виноград	Милдью, черная пятнистость, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	3(3)	Активен
	1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-600 л/га	20(3)	3(3)	
	1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-600 л/га	20(3)	3(3)	
Манкоцеб, СП (800 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Ш, Агрия АД ОГРН: - П/Ш 184(026)-02-2256-1 31.05.2019 30.05.2029	2,0-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	7(3)	Активен
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	21(4)	7(3)	
	1,2-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	21(4)	7(3)	
Манфил, СП (800 г/кг) ИНДОФИЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД ОГРН: -	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	21(3)	7(3)	Активен

П/Ш 159-02-1025-1 11.03.2016 10.03.2026	2-3	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	20(4)	7(3)	
Пеннкоцеб, СП (800 г/кг) ООО «ЮПЛЬ» ОГРН: 1157746848490 П/Ш 148-02-2376-1 09.09.2019 08.09.2029	2,0-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	7(3)	Активен
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(3)	7(3)	
	1,2-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие - с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	21(3)	7(3)	
Фортуна Глобал, ВДГ (750 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Ш, Агрия АД ОГРН: - П/Ш 184(026)-02-2992-1 22.01.2021 21.01.2031	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(3)	3(3)	Активен
	2-3	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	3(3)	
	1,2-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	14(3)	3(3)	

Манкоцеб + Диметоморф

Гимнаст, СП (600 г/кг + 90 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Ш 002-02-2925-1 14.12.2020 13.12.2030	2	Огурец (семенные посевы)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(5)	7(3)	Активен
	2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	7(3)	
	2	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	5(3)	7(3)	
Филдер 69, ВГ (600 г/кг + 90 г/кг) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - П/Ш 322-02-4717-1 17.03.2017 16.03.2027	2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(3)	3(3)	Активен
	2	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(3)	3(3)	
	2	Лук (на репку)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	3(3)	

Манкоцеб + Металаксил

Ацидан, СП (640 г/кг + 80 г/кг) ООО «ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Ш 063-02-2250-1 29.05.2019 28.05.2029	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее – с последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	Активен
Меташанс, СП (640 г/кг + 80 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-02-1195-1 15.08.2016 126-02-1195-1/269 269 14.08.2026	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	Активен
	2-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	20(3)	-(3)	
Рapid Микс, СП (640 г/кг + 80 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Ш, Агрия АД ОГРН: - П/Ш 184(026)-02-3928-1 29.12.2022 28.12.2032	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	12(3)	-(3)	Активен
	2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	12(3)	-(3)	
	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	-(3)	
Виконт, СП (640 г/кг + 80 г/кг) ООО «АФД» ОГРН: - П/Ш, ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Ш 086(085)-02-1348-1 26.01.2017 25.01.2027	2-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(3)	-(3)	Активен

Манкоцеб + Мефеноксам

Фортуна Экстра, ВДГ (640 г/кг + 40 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/Ш, Агрия АД ОГРН: - П/Ш 184(026)-02-2843-1 10.11.2020 09.11.2030	2,5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	5(3)	3(3)	Активен
	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	14(3)	3(3)	
	2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	10(3)	3(3)	

	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	3(3)	
	2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	10(3)	3(3)	

Манкоцеб + цимоксанил

Ордан МЦ, СП (640 г/кг + 80 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-02-4272-1 01.12.2023 30.11.2033	2,0-2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-500 л/га	10(3)	7(3)	Активен
	2,0-2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	7(3)	
	2,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(3)	7(3)	
	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	28(3)	7(3)	
	2,0-2,5	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	12(3)	7(3)	

Масло чайного дерева

Тиацин Био БАУ, МЭ (2,4 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 IV/Ш 021-02-4445-1 06.03.2024 05.03.2034	700 мл/10-30 растений	Цветочные и декоративные растения, в том числе луковичные	Мучнистая роса	Опрыскивание с помощью куркового опрыскивателя в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	-(3)	1(-)	Активен
	700 мл/25 м2	Земляника	Серая гниль, антракноз	Опрыскивание с помощью куркового опрыскивателя в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	-(3)	1(-)	
	700 мл/10-30 растений	Комнатные растения	Мучнистая роса	Опрыскивание с помощью куркового опрыскивателя в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	-(3)	1(-)	
	700 мл/10-30 растений	Огурец защищенного грунта	Аскохитоз, мучнистая роса, серая гниль	Опрыскивание с помощью куркового опрыскивателя в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	-(3)	1(-)	

	700 мл/4-8 кустов	Смородина	Мучнистая роса	Опрыскивание с помощью куркового опрыскивателя в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	-(3)	1(-)	
	700 мл/10-30 растений	Томат защищенного грунта	Серая гниль, альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание с помощью куркового опрыскивателя в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	-(3)	1(-)	
Тиацин Био, МЭ (240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 IV/III 021-02-4671-1 23.09.2024 22.09.2034	15 мл/3 л воды	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)	Активен
	20 мл/10 л воды	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	-(-)	
	50 мл/1 л воды	Картофель	Фузариоз, фитофтороз, парша обыкновенная	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 1 л/100м2	-(1)	-(-)	
	15 мл/10 л воды	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	-(-)	
	1,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(3)	-(-)	
	5,0	Картофель	Фузариоз, фитофтороз, парша обыкновенная	Обработка клубней и дна борозды при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 70-120 л/га	-(1)	-(-)	
	20 мл/10 л воды	Виноград	Милдью, серая гниль, оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	-(4)	-(-)	
	2,0	Виноград	Милдью, серая гниль, оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(4)	-(-)	
	2,0	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(3)	-(-)	
	1,5	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)	

Меди гидроксид

Чемп ДП, ВДГ (576 г/кг) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - III/III 024-02-2838-1 13.10.2020 12.10.2030	2,5-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	20(4)	3(1)	Активен
	2,0-2,5	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(4)	3(1)	
Косайд Супер, ВДГ (350 г/л) КОСАЙД ЛЛС ОГРН: - II/III 504-02-1985-1 17.09.2018 16.09.2028	2	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(4)	3(3)	Активен
	2,0-3,0	Виноград	Милдью, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	20(4)	3(3)	
	1,5-2,0	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(4)	3(3)	
	2,5-3,0	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(4)	3(3)	
	1,5-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(4)	3(3)	

Меди гидроксид + Меди гидроксид

Блю Шилд 10, КС, ВДГ (184 г/л + 308 г/кг) Гадот Агро Лтд. ОГРН: - II/III, Гадот Агро Лтд. ОГРН: - III/III 873-02-4131-1 21.06.2023 20.06.2033	1,0-2,0	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	5(4)	-(3)	Активен
	1,0-2,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 1200 л/га	5(4)	-(3)	
	2,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 1200 л/га	3(4)	3(3)	
	1,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое до смыкания ботвы в рядах, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	3(4)	3(3)	

	1,0-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое до смыкания ботвы в рядах, последующие с интервалом 7-9 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(4)	-(3)	
	2,0	Виноград	Милдью, оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	3(4)	3(3)	
	1,0-2,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-9 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(4)	-(3)	

Меди гидроокись

<p>Купидон Голд, СП (770 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 П/П 389-02-2067-1 01.02.2019 31.01.2029</p>	1,5-1,75	Виноград	Милдью	Первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	-(3)	Активен
	1,5-1,75	Яблоня	Парша монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус», розовый бутон, последующие опрыскивания – после цветения с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	-(3)	
<p>Метеор, СП (770 г/кг) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/П 063-02-2088-1 01.02.2019 31.01.2029</p>	3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: перед цветением, после цветения, рост ягод, не позднее 30 дней до сбора урожая с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(4)	3(1)	Активен

Меди оксихлорид + оксадиксил

<p>Хлорошанс, СП (670 г/кг + 130 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-02-628-1 13.04.2015 12.04.2025</p>	1,5-2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка до смыкания рядков или при высоте растений 15-20 см, вторая – в период бутонизации, последующая – в зависимости от развития болезни и погодных условий Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	10(3)	3(3)	Активен
	15-20 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка при появлении первых признаков заболевания, последующие с интервалом 7-10 дней в зависимости от развития болезни Расход рабочей жидкости - 800 л/га	5(3)	3(3)	
	15-20 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – при появлении первых пятен в фазе образования-разрыхления соцветий и обособление бутонов (за 10 дней до цветения), вторая – позднее цветение, третья – формирование ягод, четвертая – ягода размером с горошину Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	3(3)	

	15-20 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка при появлении первых признаков заболевания или профилактическая, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	14(3)	3(3)	
--	-----------------------	------------------------	--------------------------	--	-------	------	--

Меди сульфат

<p>Мастеркоп, КС (259 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/II 156-02-4522-1 03.05.2024 02.05.2034</p>	2,5-3,5	Яблоня	Парша, монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	5(3)	3(3)	Активен
	1,5-2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие через 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	3(3)	
	1,5-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие через 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	3(3)	
	1,5-2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие через 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(3)	3(3)	
	2,0-3,0	Виноград	Милдью, серая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	5(3)	3(3)	
	3,5	Яблоня	Бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	5(3)	3(3)	

Меди сульфат + кальция гидроксид

<p>Бордоская смесь-Ф, ВРП (960 г/кг + 900 г/кг) ООО «ФАСКО +» ОГРН: 1025006178614 III/III 149-02-4542-1 03.05.2024 02.05.2034</p>	100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксид а/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 10-20 л/100 м2	25(6)	3(-)	Активен
	400 г сульфата меди +400 г извести/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Ранневесеннее «голубое» опрыскивание до распускания почек Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м2	-(1)	3(-)	
	100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксид а/10 л воды (Л)	Смородин а	Антракноз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором (1-я и 2-я обработки до цветения, 3-я обработка после сбора урожая) Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(3)	3(-)	
	100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксид а/10 л воды (Л)	Слива, вишня, черешня	Клястероспориоз	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 15-25 л/100 м2	25(4)	3(-)	

	100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксид а/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором (последняя обработка не позднее фазы цветения) Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	25(4)	3(-)	
	100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксид а/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	15(4)	3(-)	
Бордоская смесь Экстра, ВРП (960 г/кг + 900 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/П 046-02-4275-1 30.11.2023 29.11.2023	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксид а / 10 л воды	Земляника	Септориоз	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 8 -10 л/100 м2	-(2)	3(-)	Активен
	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксид а / 10 л воды	Малина	Септориоз	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 8 -10 л/100 м2	-(2)	3(-)	
	300 - 400г меди сульфата + 400 г кальция гидроксид а /10 л воды	Яблоня	Парша, бурая пятнистость, монилиоз	Ранневесеннее «голубое» опрыскивание до распускания почек Расход рабочей жидкости - 10 - 20 л/100 м2	-(1)	3(-)	
	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксид а / 10 л воды	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 1%-ным рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	25(4)	3(-)	
	300 - 400г меди сульфата + 400 г кальция гидроксид а /10 л воды	Вишня	Коккомикоз, курчавость листьев, класстероспориоз, монилиоз	Ранневесеннее «голубое» опрыскивание до распускания почек Расход рабочей жидкости - 10 - 20 л/100 м2	-(1)	3(-)	
	300 - 400г меди сульфата + 400 г кальция гидроксид а /10 л воды	Виноград	Милдью	Ранневесеннее «голубое» опрыскивание до распускания почек Расход рабочей жидкости - 10 - 15 л/100м2	-(1)	3(-)	
	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксид а / 10 л воды	Роза открытого грунта	Ржавчина, пятнистости (черная, бурая, пурпурная), септориоз	Опрыскивание в период вегетации 1%-ным рабочим раствором Расход рабочей жидкости - 10 - 15 л/100 м2	-(2)	3(-)	

Меди сульфат трехосновный

Купроксат, КС (345 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - ПП/П 024-02-1301-1 12.12.2016 11.12.2026	5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(-)	-(-)	Активен
	5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	3(1)	
	5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(3)	3(1)	

	4,5-5	Косточковые культуры (персик, абрикос)	Кластероспориоз, курчавость листьев, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазе распускания плодовых почек, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	-(-)	
	5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	30(3)	-(-)	
	5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	-(-)	
Бордоская жидкость, ВСК (172 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП 021-02-3994-1 02.03.2023 01.03.2033	250 мл/10 л воды (Л)	Смородина черная, крыжовник	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса» (в зависимости от возраста и типа формирования куста) Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	60(1)	1(-)	Активен
	100 мл/10 л воды (Л)	Слива, вишня, черешня, абрикос, алыча	Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз	Опрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие – с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 2 - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	28(3)	1(-)	
	100 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие – с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 2 - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	38(3)	1(-)	
	250 мл/10 л воды (Л)	Слива, вишня, черешня, абрикос, алыча	Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса» Расход рабочей жидкости - от 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)	1(-)	
	250 мл/10 л воды (Л)	Слива	«Кармашки» слив	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса» Расход рабочей жидкости - от 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)	1(-)	
	100 мл/10 л воды (Л)	Крыжовник	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	Опрыскивание по вегетации: первое - после цветения; последующие – с интервалом 7 дней (в зависимости от возраста и типа формирования куста) Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	20(3)	1(-)	
	100 мл/10 л воды (Л)	Смородина черная	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	Опрыскивание по вегетации: первое - после цветения; последующие – с интервалом 7 дней (в зависимости от возраста и типа формирования куста) Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	28(3)	1(-)	
	100 мл/10 л воды (Л)	Слива	«Кармашки» слив	Опрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие – с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 2 - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	28(3)	1(-)	
	250 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса» Расход рабочей жидкости - от 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)	1(-)	

<p>Индиго, КС (345 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-02-2300-1 01.07.2019 018-02-2300-1/441 441 30.06.2029</p>	50 мл/4-6 л воды (Л)	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	7(3)	3(3)	Активен
	4,0-5,0	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(3)	3(3)	
	4,0-6,0	Виноград	Серая гниль, чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации – первое при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	3(3)	
	4,0-5,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(3)	3(3)	
	50 мл/4 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	21(3)	3(3)	
	40-60 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Серая гниль, чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации – при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(4)	3(3)	
	3,0-5,0	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации – первое в фазу «зелёный конус», последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(4)	3(3)	
	4,0-6,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	3(3)	
	50 мл/6-8 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 6-8 л/100 м2	7(3)	3(3)	
	50 мл/4 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	20(3)	3(3)	
	30-50 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации – первое в фазу «зелёный конус», последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дереву	15(4)	3(3)	

	4,0-5,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(3)	3(3)	
	40-60 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации – первое профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(4)	3(3)	
	40-50 мл/10 л воды (Л)	Персик, вишня, слива, черешня	Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации – при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дереву	7(4)	3(3)	
	4,0-5,0	Персик, вишня, слива, черешня	Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации – первое при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	3(3)	
	4,0-5,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	7(3)	3(3)	
Кумир, СК (345 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-1744-1 03.02.2015 02.02.2025	5	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(3)	7(3)	Не активен
	5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(3)	7(3)	
	5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (перед цветением), последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(4)	7(3)	
	5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	30(3)	7(3)	
Чистосад, КС (345 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-3797-1 06.10.2022 05.10.2032	5,0	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(3)	3(3)	Активен
	4,5-5,0	Косточковые культуры (персик, абрикос)	Клястеро-спориоз, курчавость листьев, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое в фазе распускания плодовых почек, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	3(3)	
	5,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	30(3)	3(3)	

	5,0-6,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)	3(3)	
--	---------	----------	--------	--	-------	------	--

Меди хлорокись

<p>Хом, СП (861 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-02-2380-1 30.03.2018 046-02-2380-1/290 29.03.2028</p>	2,4-3,2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	28(5)	3(1)	Активен
	40 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 6,0-8,0 л/100 м2	43(6)	-(3)	
	40 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 6-8 л/100 м2	28(5)	3(1)	
	40 г/10 л воды (Л)	Томат защищенн ого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	5(4)	3(1)	
	40 г/10 л воды (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/10 м2	2(3)	3(1)	
	3,6	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	43(6)	3(1)	

Меди хлорокись + Манкоцеб + цимоксанил

<p>Рapid Голд Плюс, СП (290 г/кг + 120 г/кг + 40 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 II/II, Агрия АД ОГРН: - II/II 184(026)-02-3880-1 23.11.2022 22.11.2032</p>	2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(4)	7(4)	Активен
	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	28(4)	7(4)	
	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	7(4)	

Меди хлорокись + цимоксанил

<p>Купролюкс, СП (689,5 г/кг + 42 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 III/III 012-02-3844-1 29.11.2022 28.11.2032</p>	25-30 г /10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	5(3)	3(-)	Активен
	25-30 г/5 л (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2	21(4)	3(-)	
	50 г/10 л (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2	4(2)	3(-)	

	25-30 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	28(3-4)	3(-)	
	50 г /10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м²	20(3)	3(-)	

Медь оксихлорид + Мефеноксам

Ридомил Голд Р, ВДГ (142 г/кг + 20 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-02-2980-1 18.01.2021 17.01.2031	4-5	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	5(2)	-(3)	Активен
	4-5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через – 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(2)	-(3)	
	4-5	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через – 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	5(2)	-(3)	
	4-5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(2)	-(3)	
	4-5	Лук	Пероноспороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	15(3)	-(3)	
	4-5	Виноград	Милдью, антракноз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(3)	-(3)	
	4-5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие - с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	14(3)	-(3)	

Металаксил + Имазалил + Тебуконазол

Бенефис, МЭ (40 г/л + 50 г/л + 30 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-4385-1 26.01.2024 25.01.2034	0,6-0,8	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Ризоктониозная корневая гниль, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних фазах развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,6-0,8	Ячмень яровой, в том числе пивоваренный	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	---	---	---	------	------	--

Металаксил + Манкоцеб

Метаксил, СП (80 г/кг + 640 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-02-4273-1 29.11.2023 28.11.2033	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	7(3)	Активен
	2-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	7(3)	
	2,5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(3)	7(3)	
	2,5	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	20(3)	7(3)	
	2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	10(3)	7(3)	
Метамил МЦ, ВДГ (80 г/кг + 640 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-4263-1 23.11.2023 22.11.2033	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(3)	-(3)	Активен
	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(4)	-(3)	

Металаксил + Протиоконазол

Редиго М, КС (20 г/л + 100 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/- 019-02-2068-1 29.01.2019 019-02-2068-1/451 451 28.01.2029	0,9-1,0	Кукуруза	Пыльная головня, пузырчатая головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0	Соя	Аскохитоз, фузариозное увядание	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1,0	Соя	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,8-1,0	Кукуруза	Корневые гнили, стеблевые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Метирам							
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/Ш 014-02-1648-1 12.12.2017 11.12.2027	1,5-2,5	Яблоня, груша	Парша, ржавчина, белая пятнистость груши (септориоз)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус, розовый бутон, конец цветения, плод размером с грецкий орех. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	60(4)	-(3)	Активен
	1,5-2,5	Виноград	Милдью, антракноз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: видимое образование соцветия, позднее цветение, формирование плода, ягода размером с горошину Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	60(4)	-(3)	
	1,5-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (смыкание рядков); второе – бутонизация, третье – конец цветения, четвертое – рост ягод и клубней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	20(4)	-(3)	
Полидок, ВДГ (700 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-02-4189-1 06.09.2023 05.09.2033	1,5-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (смыкание рядков); второе – бутонизация, третье – конец цветения, четвертое – рост ягод и клубней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	20(4)	-(3)	Активен
	1,5-2,5	Яблоня, груша	Парша, ржавчина, белая пятнистость груши (септориоз)	Опрыскивание в период вегетации: первое – зеленый конус, второе – розовый бутон, третье – конец цветения, четвертое – плод размером с грецкий орех Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	60(4)	-(3)	
Метирам + Пиракlostробин							
Кабрио Топ, ВДГ (550 г/кг + 50 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/Ш 014-02-2609-1 18.03.2020 17.03.2030	1,5-2,0	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	60(2)	7(4)	Активен
Метконазол							
Карамба, КЭ (60 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - П/Ш 015-02-3434-1 20.12.2021 19.12.2031	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 4-6 листьев и весной профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Метконазол + Дифеноконазол							
Тебумет, КС (50 г/л + 100 г/л) ЗАО «ФМРус»	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание посевов в период вегетации в фазу конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1097746208207 П/П, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/П 050(360)-02-4375-1 24.01.2024 23.01.2034	0,8-1,0	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующая через 10-14 дней (фаза вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	-(3)	
---	---------	----------------------------	---------------------	--	-------	------	--

Метконазол + Пираклостробин

Карамба Дуо, К, КЭ (80 г/л + 130 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П, «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П 014-07-1595-1 07.11.2017 06.11.2027	0,75-1	Рапс яровой	Фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Рапс озимый	Фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазе 5-6 листьев (осень); второе в фазу вытягивания стеблей (весна). Расход рабочей жидкости - 300 л/га	56(2)	-(3)	

Метконазол + эпоксиконазол

Осирис, КЭ (27,5 г/л + 37,5 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - П/П 015-02-4178-0 14.08.2023 13.08.2026	1-2	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	2	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазе конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1-2	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, кардиковая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

Метрафенон

Вивандо, КС (500 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П 014-02-658-1 30.04.2015 29.04.2025	0,2-0,25	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(1-3)	7(3)	Активен
Флексити, КС (300 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П 014-02-610-1 26.03.2015 25.03.2025	0,1-0,3	Пшеница яровая, озимая, ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Не активен

Мефеноксам

Апрон Голд, ВЭ (350 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-2975-1 13.01.2021 12.01.2023	0,5-1	Капуста белокочан ная	Черная ножка (питиоз)	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2	Свекла сахарная	Пероноспороз	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,5	Морковь	Корневая гниль (питиоз)	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	

12.01.2031	3	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса (пероноспороз)	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)
	1-1,5	Лук-чернушка	Корневая гниль (питиоз)	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
	0,5	Свекла сахарная	Корнеед всходов (питиоз)	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)

Мефеноксам + Азоксистробин

Юниформ, СЭ (124 г/л + 322 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-499-1 30.12.2014 041-02-499-1/113 113 02.02.2035	1-1,5	Арбуз	Увядание, корневая и прикорневая гнили (фузариозные, ризоктониозные, питиозные)	Внесение под корень при капельном поливе: первое – в фазе 3-5 настоящих листьев, следующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 5000-10000 л/га	5(2)	2(2)	Активен
	0,7-0,9	Томат открытого грунта	Фитофторозная корневая гниль, питиозная корневая гниль	Полив под корень: первый полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев с расходом рабочей жидкости 30-50 мл/растение; второй – в фазе начало бутонизации после высадки рассады на постоянное место с расходом рабочей жидкости – 100-150 мл/растение Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	40(2)	2(-)	
	1,3-1,5	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фитофтороз	Опрыскивание почвы при посадке клубней. Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)	2(2)	
	1,3-1,5	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фитофтороз	Опрыскивание почвы при посадке картофеля Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)	-(-)	
	0,7-0,9	Томат открытого грунта	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль	Полив под корень: второй полив - в фазе начало бутонизации после высадки рассады на постоянное место Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	40(2)	2(2)	
	1,0-1,5	Арбуз	Увядание, корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение под корень при капельном поливе: первое – в фазе 3-5 настоящих листьев, следующее – через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 5000-10000 л/га	5(2)	2(2)	
	0,7-0,9	Томат открытого грунта	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль	Полив под корень: первый полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 30-50 мл/растение	40(2)	2(2)	

Мефеноксам + Манкоцеб

Манифест, ВДГ (40 г/кг + 640 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-02-3818-1 07.10.2022 06.10.2032	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	14(3)	-(3)	Активен
	2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации. Первое- профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	15(3)	-(3)	
	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Первое- профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	15(3)	-(3)	
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (40 г/кг + 640 г/кг)	2,5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800 л/га	5(3)	7(3)	Активен

ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-02-1769-1 26.02.2018 25.02.2028	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	14(3)	7(3)	
	2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	15(3)	7(3)	
	2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	10(4)	7(3)	
	2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(4)	7(3)	

Мефеноксам + Флудиоксонил

Мессер, МЭ (210 г/л + 25 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-3491-1 09.02.2022 08.02.2032	5,0	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса (пероноспороз), фомопсис, белая гниль (склеротиниоз, прикорневая форма), фузариозная корневая гниль, альтернариоз, плесневение семян, серая гниль (семенная инфекция)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	-----	--------------	---	--	------	------	---------

Мефеноксам + Флудиоксонил + седаксан

Вайбранс Экстра, КС (15 г/л + 22,5 г/л + 15 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-2643-1 06.04.2020 05.04.2030	9-11	Свёкла сахарная	Корнеед всходов (комплекс грибов родов питиум, ризоктония, фузариум, фомо)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 13-20 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	------	-----------------	--	--	------	------	---------

Мефеноксам + Флудиоксонил + Тиabendазол

Максим Адванс, КС (20 г/л + 25, г/л + 150 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-2628-1 26.03.2020 014-02-2628-1/394 394 25.03.2030	1-1,25	Нут	Фузариозная и питиозная корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-1,25	Соя	Фузариозная и питиозная корневые гнили, аскохитоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	

Мефеноксам + флудиоксонил + Тиаметоксам

Круйзер Рапс, КС (32,3 г/л + 8 г/л + 280 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-01(02)-2548-1 28.02.2020 27.02.2030	15,0	Рапс	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 20-25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	15,0	Рапс	Черная ножка, корневые гнили (грибы родов питиум, ризоктония, фузариум), плесневение семян, альтернариоз, фомоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 20-25 л/т	-(1)	-(-)	

Оксатиапипролин

Люмисена, ТС (200 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - П/- 029-02-2826-1 08.10.2020 07.10.2030	1,75	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	------	--------------	-----------------------	--	------	------	---------

Пленарис, КС (200 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-4283-0 04.12.2023 03.12.2026	1,2-1,6	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 20-25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
Люмисена КА, ТС (200 г/л) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/- 866-02-4757-0 23.12.2024 22.12.2027	1,75	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса (пероноспороз)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен

Оксатиапипролин + Фамоксадон

Зорвек Энкантия КА, СЭ (30 г/кг + 300 г/кг) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-02-4692-0 09.10.2024 08.10.2027	0,5-0,65	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	4(3)	3(3)	Активен
	0,5-0,65	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	8(4)	3(3)	
	0,5-0,65	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	15(3)	3(3)	
	0,65-0,8	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	3(3)	
Зорвек Энкантия, СЭ (30 г/л + 300 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-02-2859-1 28.10.2020 27.10.2030	0,5-0,65	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	15(3)	3(3)	Активен
	0,5-0,65	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	8(4)	3(3)	
	0,5-0,65	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	4(3)	3(3)	

	0,65-0,8	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	3(3)	
--	----------	----------	--------	--	-------	------	--

Пенконазол

Топаз, КЭ (100 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-3023-1 17.02.2021 16.02.2031	0,3-0,4	Яблоня	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	7(3)	Активен
	0,3-0,4	Вишня (маточник и)	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(2)	7(3)	
	0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(4)	7(3)	
	0,3-0,5	Земляника	Мучнистая роса	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	14(2)	7(3)	
	0,2-0,4	Смородин а	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	14(4)	7(3)	
	0,125-0,15	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	7(2)	7(3)	
	0,3-0,6	Малина (питомник и)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(2)	7(3)	
	0,4	Персик	Мучнистая роса, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)	7(3)	
	0,3-0,4	Смородин а (маточник и, питомники)	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(4)	7(3)	
	0,25-0,375	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	1(3)	7(3)	

Пенконазол + Сера

Серпень, КС (42 г/л + 800 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-02-3238-1 21.07.2021 20.07.2031	5 мл/5 л воды (Л)	Земляника садовая	Мучнистая роса	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	10(2)	3(-)	Активен
	5 мл/5 л воды (Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: 1 – профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	14(3)	3(-)	
	5 мл/5 л воды (Л)	Смородин а черная	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1 – при первых признаках заболевания, 2 – после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	10(2)	3(-)	
	5 мл/5 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1 – в фазу цветения – роста плодов, 2 – с интервалом 10-14 дней после первого Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	14(2)	3(-)	

	5 мл/5 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: 1 – в фазу бутонизации, последующие с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	3(-)	
--	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------	------	--

Пентиопирад

Аффет, КС (200 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-02-3172-1 03.06.2021 02.06.2031	1-1,25	Подсолнеч ник	Фомоз, альтернариоз, ржавчина, септориоз, белая и серая гнили, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	48(1)	3(3)	Активен
	1-1,25	Соя	Аскохитоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(1)	3(3)	
	1-1,25	Томат открытого грунта	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	13(2)	3(3)	
	1-1,25	Пшеница озимая и яровая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1)	3(3)	
	1-1,25	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1)	3(3)	
	1-1,25	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	41(1)	3(3)	
	1-1,25	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	52(2)	3(3)	
Фонтелис, КС (200 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - II/III 029-02-1076-1 18.04.2016 17.04.2026	1,125	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	27(2)	3(3)	Активен
	0,5-0,75	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1500 л/га	27(3)	3(3)	

пенфлуфен + Клотиаиндин

Эместо Квантум, КС (66,5 г/л + 207 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/- 019-01(02)-670-1 25.05.2015 24.05.2025	0,3-0,35	Картофель	Ризоктониоз, парша серебристая, парша обыкновенная	Обработка клубней до или вовремя посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/га	-(1)	-(-)	Активен
--	----------	-----------	--	---	------	------	---------

пенцикурон + Имидаклоприд

Батор, КС (150 г/л + 140 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - III/- 871-01(02)-4225-1 20.10.2023 19.10.2033	0,7-1	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	-------	-----------	------------------------------------	---	------	------	---------

Клубнещит, КС (150 г/л + 140 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/- 008-01-591-1 11.03.2015 10.03.2025	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	60(1)	-(-)	Не активен
Покровитель, КС (150 г/л + 140 г/л) ИП Тарасов Юрий Дмитриевич ОГРН: 3147746070014 III/- 231-01-1115-1 03.06.2016 02.06.2026	70-100 мл/л воды (Л)	Картофель	Ризоктониоз, парша обыкновенная	Обработка клубней до посадки. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	Активен

Пидифлуметофен

Миравис, СК (200 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/III 041-02-3556-1 22.03.2022 21.03.2032	0,25 -0,35	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	3(3)	Активен
	0,25 -0,5	Персик	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	5(2)	3(3)	
	0,7-1	Арбуз	Мучнистая роса, антракноз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	5(2)	3(3)	
	0,3-0,5	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(2)	3(3)	
	0,35-0,7	Персик	Курчавость листьев, клатероспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	5(2)	3(3)	
	0,3-0,4	Томат открытого грунта	Альтернариоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	5(2)	3(3)	

Пикоксистробин

Экселент, КС (250 г/л) ООО «ПРИОРИТЕТ ПЛЮС» ОГРН: 1152312010762 III/III 661-02-2958-1 24.12.2020 661-02-2958-1/419 419 23.12.2030	0,5-0,8	Люпин, горох	Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	39(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса – конец колошения- начало цветения. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)	

0,4-0,5	Люпин	Серая гниль, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)
0,4-0,5	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)
0,5	Ячмень яровой и озимый	Темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)
0,4-0,5	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, серая гниль	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 5-6 л/т	-(1)	-(3)
0,75	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе начала выметывания метелок. Сбор воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,5	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)
0,5-0,8	Соя	Альтернариоз, фитофтороз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,5	Подсолнечник	Белая гниль и серая гниль корзинок, сухая ризопусная гниль корзинок, септориоз листьев, фомоз, фомопсис, ржавчина, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 -400 л/га	50(1)	-(3)
0,5	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	44(1)	-(3)

Пикоксистробин + Протиокназол

<p>Ланцея, КМЭ (100 г/л + 125 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-02-4538-1 03.05.2024 02.05.2034</p>	0,8-1,2	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе появления флаг-листа - начало выметывания метелки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,8 -1,0	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, септориоз колоса, пиренофороз, мучнистая роса, желтая ржавчина, церкоспореллезная гниль корневой шейки	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 14 – 21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

0,8-1,2	Подсолнечник	Белая гниль или склеротиниоз, ржавчина, серая гниль, альтернариоз, фомоз, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации, первое - при появлении первых признаков болезни, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	-(3)
0,8-1,2	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориоз, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий или выметывание метёлок Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(1)	-(3)
0,8-1,2	Горох	Аскохитоз, ржавчина, антракноз	Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)
0,8-1,2	Люпин	Антракноз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)
1,6	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: в фазе конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)
0,8-1,2	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)
0,8-1,0	Ячмень озимый, яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)
0,8-1,2	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, белая гниль или склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(1)	-(3)
0,8-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса, белая гниль или склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 6 - 8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	40(2)	-(3)
0,8-1,2	Чечевица	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)

	0,8-1,2	Соя	Альтернариоз, пероноспороз, септориоз, аскохитоз, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации, первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
--	---------	-----	---	--	-------	------	--

Пикоксистробин + Ципроконазол

Аканто Плюс, КС (200 г/л + 80 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-02-2721-1 02.07.2020 01.07.2030	0,5-0,6	Подсолнечник	Белая гниль корзинок, серая гниль корзинок, сухая ризопусная гниль корзинок, септориоз листьев, альтернариоз, фомоз, фомопсис, ржавчина, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 6-8 листьев или при высоте растений 60-80 см – бутонизация Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	28(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой	Склеротиниоз, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков болезни или начало образования стручков Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс озимый	Склеротиниоз, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: осенью – 5-6 листьев, весной – вытягивание стеблей Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная стеблевая гниль, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации: видимое образование междоузлий – выбрасывание метелки-цветение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	41(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Соя	Пероноспороз, церкоспороз, септориоз, аскохитоз, антракноз, фузариозное увядание, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: бутонизации – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,7	Рис	Пирикуляртиоз	Опрыскивание в период вегетации: появление флаг-листа начало выметывания метелки. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 300 л/га	55(1)	-(3)	

	0,6	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5-0,6	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина желтая, ржавчина карликовая, септориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,7	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации: появление флаг-листа начало выметывания метелки. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	55(1)	-(3)	
	0,6-0,7	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: бутонизация Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	39(1)	-(3)	

Пиракlostробин

Оптим, КЭ (200 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-3496-1 11.02.2022 10.02.2032	0,5	Соя	Аскохитоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,5-1	Подсолнечник	Белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней при 1-кратном применении; при 2-кратном: первое – при появлении первых признаков одной из болезней, второе – через 14-21 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	59(1-2)	-(3)	
	0,5	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	39(1)	-(3)	
Дэлит Про, КС (200 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/- 014-02-874-1 01.12.2015 30.11.2025	0,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, корневые и прикорневые гнили фузариозной этиологии, пыльная головня соцветий, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,5	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Пирафикс, КЭ (250 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424	0,4	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактическое при появлении первых признаков болезни. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен

III/III 070-02-3399-1 07.12.2021 06.12.2031	0,4	Соя	Аскохитоз, пероноспороз, септориоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактическое при появлении первых признаков болезни. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Подсолнечник	Белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни: первое – при появлении первых признаков болезни, второе – через 14-21 день. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1-2)	-(3)	

Пираклостробин + Боскалид

Пиктор Актив, КС (250 г/кг + 150 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-3123-1 21.04.2021 20.04.2031	0,6-0,8	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	70(1)	-(3)	Активен
	0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, ржавчина, фомопсис, септориоз, белая и серая гнили, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазе конец бутонизации – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	70(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Кукуруза	Пузырчатая головня, стеблевые гнили	Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, ржавчина, фомопсис, септориоз, белая и серая гнили, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней: первое в фазе начало бутонизации, последующие с интервалов 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	

Пираклостробин + Карбендазим

Феразим Грин, КС (100 г/л + 300 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 II/III 178-02-2857-1 27.10.2020 26.10.2030	1,0	Ячмень озимый	Церкоспореллезная гниль корневой шейки, ризоктониозная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

	0,8-1,0	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	1,0	Пшеница озимая	Церкоспореллезная гниль корневой шейки, ризоктониозная прикорневая гниль, фузариозная снежная плесень	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

Пиракlostробин + Протиокназол + Тебуконазол

Эйс, ККР (80 г/л + 40 г/л + 160 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-3811-1 05.10.2022 04.10.2032	1,0	Пшеница озимая	Гибеллинозная гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,6-1,0	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, пиренофороз, жёлтая ржавчина, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-1,0	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина, тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Пиракlostробин + Тебуконазол

Оскар, КЭ (125 г/л + 125 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/Ш 192-02-3551-1 21.03.2022 20.03.2032	1	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,8	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,8-1	Кукуруза на зерно и масло	Прикорневые стеблевые гнили, пузырчатая головня, гельминтоспориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней, в фазах видимого образования междоузлий или выметания початковых нитей Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	51(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно-бурая), ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начала колошения (озимые обрабатывают весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

	1-1,2	Подсолнечник на семена и масло	Белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней при 1-кратном применении; при 2-кратном применении: первое - при появлении первых признаков одной из болезней, второе – через 14-21 день. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	54(1-2)	-(3)	
	0,8	Соя	Аскохитоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие через 10-14 дней (вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	-(3)	

Пираклостробин + тритиконозол

Иншур Перформ, КС (40 г/л + 80 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - Ш/- 014-02-2556-1 25.03.2020 24.03.2030	0,4-0,6	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная, фузариозная, ризиктониозная и офиолезная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(3)	

Пираклостробин + Флудиоксонил

Пуаро, КС (40 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/- 018-02-4689-1 08.10.2024 07.10.2034	1,0-1,25	Горох	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, аскохитоз (при умеренном развитии болезни)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 4-8 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,25	Нут	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 4-8 л/т	-(1)	-(3)	
	0,25-0,4	Картофель	Ризиктониоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	1,0-1,25	Соя	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 4-8 л/т	-(1)	-(3)	

Пираклостробин + флуksапироксад + эпoxиконазол

Цериакс Плюс, КЭ (66,6 г/л + 41,6 г/л + 41,6 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/Ш 014-02-2100-1 07.02.2019 014-02-2100-1/374 374 06.02.2029	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая и стеблевая, рихоспориоз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Овёс	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Люпин	Антракноз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам заболевания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя	Септориоз, пероноспороз, церкоспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Соя	Септориоз, пероноспороз, церкоспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний, последующее – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(2)	-(3)	
	0,4-0,5	Тритикале озимая	Септориоз, ржавчина бурая, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации по первым признакам одного из заболеваний, последующее – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	

Пиракlostробин + эпоксиконазол + Боскалид

Кристалл, КС (100 г/л + 160 г/л + 90 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930	0,4-0,5	Подсолнеч ник	Альтернариоз, белая и серая гнили, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое, в фазы бутонизации и начала цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	20(3)	-(3)	Активен
--	---------	------------------	---	---	-------	------	---------

III/III 010-02-2867-1 02.11.2020 010-02-2867-1/454 454 01.11.2030	0,3-0,4	Рапс яровой	Альтернариоз, белая и серая гнили, мучнистая роса, пероноспороз, фузариозное увядание	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие с интервалом 10-14 дней, а также профилактически Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	20(3)	-(3)	
	0,4-0,5	Кукуруза	Прикорневые и стеблевые гнили, пузырчатая головня, гельминтоспориоз, нигроспориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(3)	-(3)	
	0,6-0,8	Сахарная свекла	Мучнистая и ложно мучнистая роса, церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Первое профилактическое и при появлении первых признаков болезней, второе через 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	30(2)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней или профилактически Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней или профилактически Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Соя	Аскохитоз, мучнистая и ложно мучнистая роса, ржавчина, оливковая пятнистость, белая и серая гнили	Опрыскивание в период вегетации. Первое профилактическое и при появлении первых признаков болезней, второе через 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	30(2)	-(3)	

Пириметанил

Пириметан, КС (400 г/л) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 III/III 389-02-3573-1 28.03.2022 27.03.2032	0,75-1,2	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус», розовый бутон, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(3)	7(3)	Активен
	1,8-2,4	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы: смыкание ягод в гроздях, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	21(2)	7(3)	

Пириметанил + Пириметанил

Пирус, КС (400 г/л + 400 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III, Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - III/III 322-02-4714-1	0,75-1,25	Яблоня, груша	Парша, монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», второе в фазу «розовый бутон», последующие с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	7(3)	Активен
	2,0-2,5	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(2)	7(3)	

07.05.2024
06.05.2034

0,75-1,25	Яблоня, груша	Парша, монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», второе в фазу «розовый бутон», последующие с интервалом 7 – 10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	7(3)
2,3-3,0	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	- (4)	7(-)
2,0 – 2,25	Земляника садовая	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу начало цветения, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	3(3)	7(3)
2,0 - 2,25	Земляника садовая	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу начало цветения, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	3(3)	7(3)
1,75 - 2,0	Томаты защищенного грунта	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	3(2)	7(-)
2,3-3,0	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га	- (4)	7(-)
2,0-2,5	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	21(2)	7(3)
1,75 - 2,0	Томаты защищенного грунта	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	3(2)	7(-)

Пириметанил + Флудиоксонил

Помарикс, КС (336 г/л + 133 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - П/Ш 586-02-4217-1 06.10.2023 05.10.2033	1,4-1,6	Яблоня	Гнили при хранении: парша, монилиоз, пенициллезная гниль, серая гниль, черный рак плодовых культур, горькая и глеоспоровая горькая гнили	Опрыскивание в период вегетации: первое за 10-14 дней до сбора плодов, второе за 3-5 дней до сбора плодов, третье за сутки или в день сбора плодов. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(3)	3(3)	Активен
	1,4-1,6	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 500 л/га	12(2)	3(3)	
	1,4-1,6	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	3(3)	3(3)	
	1,4-1,8	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу начала смыкания ягод в грозди, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	12(3)	3(3)	

Пириметанил + Флуопирам

Луна Транквилити, КС (375 г/л + 125 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-02-574-1 02.03.2015 01.03.2025	0,6-0,8	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	3(3)	Не активен
	0,8-1,2	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500 л/га	21(4)	3(3)	
	0,8-1,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	21(3)	3(3)	
	0,8-1	Томат защищенного грунта	Серая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(4)	2(-)	
	0,8-1	Томат открытого грунта	Серая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(4)	3(3)	
	0,8-1,2	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	21(4)	3(3)	

Поли-бета-гидроксимасляная кислота + калий фосфорнокислый + карбамид + магний сернокислый + калий азотнокислый

Альбит, ТПС (6,2 г/кг + 91,1 г/кг + 181,5 г/кг + 29,8 г/кг + 91,2 г/кг) ООО «НПФ «Альбит» ОГРН: - IV/III, ООО «НПФ «Альбит» ОГРН: - IV/III 081-07-866-1 26.11.2015 22.12.2030	0,05-0,07	Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость, бактериоз	Предпосевная обработка семян с добавлением NaKMц (0,2 кг/т) Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	10 мл/л воды(Л)	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз (при слабом развитии болезней)	Предпосадочная обработка клубней на 100 кг клубней Расход рабочей жидкости - 1 л на 100 кг клубней	-(1)	-(-)	
	0,05	Лен - долгунец	Антракноз, пасмо	Опрыскивание в период вегетации в фазу «елочки» Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	
	0,04	Ячмень яровой	Пятнистости: сетчатая и темно-бурая (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации в фазах: кущение – выход в трубку и колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	3 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Оидиум (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: перед цветением, в начале формирования ягод (ягода размером с крупинку), смыкание ягод в грозди, окрашивание ягод Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(4)	-(-)	
	0,04-0,06	Капуста белокочанная	Сосудистый бактериоз	Опрыскивание в фазе 3-5 настоящих листьев, последующие с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2-3)	-(-)	
	1 мл/кг семян	Капуста белокочанная	Сосудистый бактериоз	Предпосевное замачивание семян в 0,1%-й суспензии препарата в течение 3 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг семян	-(1)	-(-)	
	0,05	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазах смыкания рядков – бутонизация, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)	

1 мл/10 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Сосудистый бактериоз	Опрыскивание в фазе 3-5 настоящих листьев, последующие с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(2-3)	-(-)
0,25	Виноград	Оидиум (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в системе с другими фунгицидами в фазы: перед цветением, в начале формирования ягод (ягода размером с крупинку), смыкание ягод в грозди, окрашивание ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)
1 мл/1 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Сосудистый бактериоз	Предпосевное замачивание семян в течение 3 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
0,04	Пшеница озимая, яровая	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,1	Свекла сахарная	Корнед всходов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
0,1	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз (при слабом развитии болезней)	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды(Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазе смыкания рядков – бутонизация, последующее – через 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(2)	-(-)
0,04	Ячмень яровой	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,04	Пшеница озимая, яровая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, септориоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазе: кущение – выход в трубку и колошение – цветение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

Полидиметилдиаллиламмония хлорид

Силар, ВР (250 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 Ш/Ш 008-02-3711-1 08.06.2022 07.06.2032	20 мл/л воды (Л)	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу «видны соцветия» (51-53), последующие – с интервалом 7-10 дней после предыдущей обработки Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	12(3)	1(-)	Активен
	20 мл/л воды (Л)	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации в фазу 4-5 настоящих листьев; второе и третье – через 10 -14 дней после предыдущей обработки Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	12(3)	1(-)	
	20 мл/л воды (Л)	Яблоня	Парша	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	12(3)	1(-)	
	20 мл/л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в фазе: начало цветения – плодообразования с интервалом 10 – 14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	12(3)	1(-)	
	20 мл/л воды (Л)	Смородина черная, крыжовник	Мучнистая роса, антракноз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 – 20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	12(3)	1(-)	

	20 мл/л воды (Л)	Вишня	Кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 – 20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	12(3)	1(-)	
	20 мл/л воды (Л)	Слива	Монилиоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 – 20 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	12(3)	1(-)	
	20 мл/л воды (Л)	Огурец открытого и защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в фазе бутонизации и после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	12(3)	1(-)	
	20 мл/л воды (Л)	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое- в фазу бутонизации, последующие с интервалом 7-12 дней после предыдущей обработки Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100 м2	12(3)	1(-)	

прогексадион кальция + мепикват-хлорид + Пиракlostробин

Архитект, СЭ, С (25 г/л + 150 г/л + 100 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III, «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-07-3176-1 07.06.2021 06.06.2031	1,5	Подсолнечник	Альтернариоз, фомопсис, фомоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе 6-8 листьев Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	70(1)	-(3)	Активен
---	-----	--------------	--	--	-------	------	---------

Проквиназид

Талиус, КЭ (200 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - II/III 029-02-319-1 13.04.2015 12.04.2025	0,15-0,25	Пшеница озимая, ячмень озимый	Мучнистая роса	Профилактическое опрыскивание в период вегетации осенью или весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,25	Пшеница яровая. Ячмень яровой	Мучнистая роса	Профилактическое опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	

Пропамокарб гидрохлорид + Фенамидон

Консенто, КС (375 г/л + 75 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/- 019-02-656-1 30.04.2015 29.04.2025	1,75-2	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	Активен
	1,75-2	Лук (на репку)	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(4)	3(3)	
	20 мл/5 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(-)	
	20 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(-)	

	20 мл/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(-)	
	1,75-2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	
	20 мл/5 л воды (Л)	Лук (на репку)	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(-)	
	1,75-2	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	
Консенто Топ, КС (375 г/л + 75 г/л) Гован Кроп Протекшен Лимитед ОГРН: - Ш/Ш 561-02-4379-1 24.01.2024 23.01.2034	20 мл/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(3)	Активен
	1,75-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезней, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	
	20 мл/5 л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(3)	
	20 мл/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезней, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(3)	
	1,75-2,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	
	20 мл/5 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(4)	3(3)	
	1,75-2,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	

	1,75-2,0	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	3(3)	
--	----------	------------------------------	-----------------------------	---	-------	------	--

Пропамокарб гидрохлорид + цимоксанил

Процессор, КС (400 г/л + 50 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-02-4154-1 12.07.2023 11.07.2023	2,0-2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	3(3)	3(3)	Активен
	2,0-2,5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	8(3)	3(3)	
	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 7 – 10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	28(3)	3(3)	

Проппиконазол

Пеон, КЭ (250 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 II/III 085-02-4141-1 29.06.2023 28.06.2023	0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5	Рапс озимый, яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующее при необходимости с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1-2)	-(3)	
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	39(1-2)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	39(1-2)	-(3)	
	0,5	Рожь озимая	Ржавчина стеблевая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	39(1-2)	-(3)	
Титан, КЭ (250 г/л) Левей Маркетинг Актиенгезелльшафт ОГРН: - III/III, ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III 184(040)-02-1504-1 22.05.2017 21.05.2027	0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

	0,5	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, желтая, стеблевая (линейная), ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
Тилт, КЭ (250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-912-1 22.12.2015 21.12.2025	0,5	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующее при необходимости с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септириоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Рожь озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
Бульдог, КЭ (250 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-02-4345-1 26.12.2023 25.12.2033	0,5	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5	Рожь озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующее при необходимости с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
Атлант, КЭ (250 г/л) ООО «АНИП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 III/III, ООО «Агрохим XXI» ОГРН: 5067746338150 III/III 023(197)-02-2468-1 13.11.2019 12.11.2029	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, темно-бурая пятнистость, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

	0,5	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Овёс	Мучнистая роса, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее при необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
Прогноз, КЭ (250 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-02-3850-1 01.11.2022 31.10.2032	0,5	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	3(3)	Активен
	10 мл/10 л воды (Л)	Смородина черная	Мучнистая роса, ржавчина столбчатая, ржавчина бокальчатая, антракноз, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 0,5 л-1,0 л на куст	27(2)	3(3)	
	0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	47(1-2)	3(3)	
	0,5	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	47(1-2)	3(3)	
	0,5	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	47(1-2)	3(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1,5 л на 10 м2	21(2)	3(3)	
Пропи Плюс, КЭ (250 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-02-3133-1 26.05.2021 25.05.2031	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, мучнистая роса, церкоспореллез	Опрыскивание посевов в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание посевов в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Ячмень озимый и яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая (линейная), ринхоспориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Кобальт, КМЭ (400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-02-3748-1 08.07.2022 07.07.2032	0,3-0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,25-0,35	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,25-0,35	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
Тимус, КЭ (250 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-02-2424-1 10.10.2019 09.10.2029	0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Овес	Мучнистая роса, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Ячмень озимый и яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
Чистофлор, КЭ (250 г/л) ООО «Евро-Семена» ОГРН: - П/П 164-02-453-1 24.11.2014 23.11.2024	7-10 мл/10 л воды (Л)	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1,5 л/10 м2	20(2)	3(-)	Не активен
	7-10 мл/10 л воды	Малина	Пурпуровая пятнистость, антракноз, септориоз листьев, ржавчина листьев	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 0,8-1 л/10 м2	20(2)	3(-)	
	7-10 мл/10 л воды	Смородина черная, крыжовник	Мучнистая роса, ржавчина столбчатая, ржавчина бокальчатая, антракноз, септориоз (белая пятнистость листьев)	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	20(2)	3(-)	
Титул 390, ККР (390 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим»	0,26	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1025006519427
 III/III
 018-02-1864-1
 10.04.2018
 09.04.2028

0,26	Рожь озимая	Ржавчина бурая, септориоз, ринхо-спориоз, мучнистая роса,оливковая плесень	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)
0,26	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации (кроме фузариоза колоса) в фазах флаговый лист – начало колошения; против фузариоза колоса:: конец колошения – начало цветения (против фузариоза) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)
0,26-0,32	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – осенью в фазе развития розетки из 6-8 листьев, второе – при появлении первых признаков болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)
0,26-0,32	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней в фазе вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе растений Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)
0,26	Рожь озимая	Ржавчина бурая, септориоз, ринхо-спориоз, мучнистая роса,оливковая плесень	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1)	-(3)
0,26	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации (кроме фузариоза колоса) в фазах флаговый лист – начало колошения; против фузариоза колоса:: конец колошения – начало цветения (против фузариоза) Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)
0,26	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее - при необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)
0,26	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее - при необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)
0,15-0,25	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазе видимого образования соцветия, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(4-6)	-(3)
0,26	Ячень яровой, озимый	Сетчатая спятнистость, мучнистая роса, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)

Элатус Эйс, КЭ (250 г/л + 40 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-3445-1 24.12.2021 23.12.2031	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	

Пропиконазол + Дифеноконазол

Чистоцвет БАУ, КЭ, ВР (0,7 г/л + 250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III, АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-4326-1 20.12.2023 19.12.2033	700 мл/7-28 растений (Л)	Цветочные растения открытого грунта	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации готовым рабочим раствором из флакона с курковым распылителем	-(1)	3(-)	Активен
	700 мл/7-14 растений (Л)	Розы	Черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации готовым рабочим раствором из флакона с курковым распылителем с интервалом 14 дней	-(2)	3(-)	
	4 мл/3 л воды (Л)	Цветочные растения	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	3(-)	
	4 мл/3 л воды (Л)	Цветочные растения	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(4)	3(-)	
	4 мл/10 л воды (Л)	Декоратив ные кустарник и	Пятнистости	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	-(4)	3(-)	
	700 мл /1-7 кустов (Л)	Декоратив ные кустарник и	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации готовым рабочим раствором из флакона с курковым распылителем	-(1)	3(-)	
	2 мл/10 л воды (Л)	Декоратив ные кустарник и	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	-(2)	3(-)	
	2 мл/3 л воды (Л)	Цветочные растения	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	3(-)	

Пропиконазол + Пидифлуметофен

Миравис Эйс, СЭ (125 г/л + 150 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-4009-1 09.03.2023 08.03.2033	0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (желтая пятнистость), чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза и черни колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5-1	Ячмень яровой и озимый	Карликовая ржавчина, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса в фазы конец колошения –начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза и черни колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	40(1)	-(3)	

	0,75-1	Ячмень яровой и озимый	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	40(1)	-(3)	
--	--------	------------------------	-----------------	--	-------	------	--

Пропиконазол + Пропиконазол + Тебуконазол

Профи Форте, КЭ, КМЭ (300 г/л + 250 г/л + 200 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 Ш/Ш, ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 Ш/Ш, ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 Ш/Ш 097-02-3484-1 21.01.2022 20.01.2032	0,5	Ячмень озимый и яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая (линейная), ринхоспориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	7-10 мл/10 л воды (Л)	Малина	Пурпуровая пятнистость, антракноз, септориоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 0,8-1,0 л/10 м2	20(2)	3(-)	
	0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	7-10 мл/10 л воды (Л)	Крыжовник	Мучнистая роса, ржавчины столбчатая и бокальчатая, антракноз, септориоз (белая пятнистость листьев)	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л на куст	20(2)	3(-)	
	7-10 мл/10 л воды (Л)	Земляника	Серая гниль, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1,5 л/10 м2	20(2)	3(-)	
	0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(2)	-(3)	
	0,4-0,6	Соя	Аскохитоз, альтернариоз, церкоспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – в фазу бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,4-0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, альтернариоз, ржавчина, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одной из болезней в фазе начала бутонизации, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	38(2)	-(3)	
	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(2)	-(3)	
	0,5	Овес	Мучнистая роса, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – осенью в фазе 6-8 листьев, второе – весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	

0,5	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
0,4-0,6	Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
7-10 мл/10 л воды (Л)	Смородин а черная	Мучнистая роса, ржавчина столбчатая, антракноз, септориоз (белая пятнистость листьев)	Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л на куст	20(2)	3(-)	
0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Пропиконазол + Тебуконазол

<p>Титул Дуо, ККР (200 г/л + 200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-02-2499-1 11.12.2019 10.12.2029</p>	0,4-0,5	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, сухая ризопусная гниль корзинки, фомоз, фомопсис, септориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец бутонизации – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,25-0,32	Пшеница яровая, озимая	Септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,3-0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,32	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,25	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,25	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,25	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	

	0,25-0,32	Ячмень яровой, озимый	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,32-0,4	Горох	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Рапс озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев осенью и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	

Пропиконазол + Тебуконазол + Пропиконазол

Пропишанс Универсал, КМЭ, КЭ (250 г/л + 200 г/л + 300 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 Ш/Ш, ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-02-2187-1 05.04.2019 126-02-2187-1/464 464 02.03.2033	0,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	42(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	50(2)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	42(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	

Пропиконазол + Тебуконазол + Тебуконазол

Колосаль, КМЭ, КЭ (300 г/л + 200 г/л + 250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш, АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-02-2590-1 13.03.2020 021-02-3017-1/422 422 10.02.2031	1,0	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе) Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(1)	6(3)	Активен
	0,4-0,6	Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)	
	0,4-0,6	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	7(3)	
	0,4-0,6	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазе начала бутонизации, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)	

0,75-1,0	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,3-0,4	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	38(1)	7(3)
0,5 - 0,75	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов – флаговый лист; против оливковой плесени – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,5	Пшеница озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,3-0,4	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая и ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	7(3)
0,5	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,2-0,3	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, ягода размером с горошину Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3-4)	7(3)
0,75-1,0	Ячмень озимый	Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов – выдвигание колоса; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,3-0,4	Ячмень озимый, яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	7(3)
0,3-0,4	Лен - долгунец	Антракноз, пасмо, фузариоз	Опрыскивание посевов при появлении первых признаков болезни начиная от фазы «елочки» до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(2)	7(3)
0,3-0,4	Лен масличный	Антракноз, пасмо, фузариоз	Опрыскивание посевов при появлении первых признаков болезни начиная от фазы «елочки» до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(2)	-(3)
0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	7(3)

0,4-0,6	Люцерна (семенные посевы)	Антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	7(3)
0,4-0,6	Люпин белый и узколистн ый (на зерно)	Антракноз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	7(3)
0,5-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)
1,0	Пшеница озимая	Септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации в фазах: видимое образование соцветия, позднее цветение, ягода размером с горошину, начало появления твердых зеленых ягод Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	50(4)	6(3)
1,0	Пшеница яровая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,75-1,0	Пшеница озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,4-0,6	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	7(3)
1,0	Ячмень озимый	Полосатая пятнистость, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов – выдвижение колоса; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
0,75 - 1,0	Рожь озимая	Ринхоспориоз, оливковая плесень	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов – флаговый лист; против оливковой плесени – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)
1,0	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе розетки из 6-8 листьев и весной в фазах вытягивание стеблей – образование стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(2)	6(3)

	0,75-1,0	Ячмень яровой	Ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхо-спориоз, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов – выдвигание колоса; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	6(3)	
	0,75	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метёлки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	6(3)	
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	7(3)	

Пропиконазол + фенпропидин

Тилт Турбо, КЭ (125 г/л + 450 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-2669-1 28.04.2020 27.04.2030	0,8-1,0	Ячмень озимый	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	50(1)	-(3)	

Пропиконазол + Ципроконазол

Фильтерр, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 П/П, ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/П 192(424)-02-2496-1 11.12.2019 10.12.2029	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминто-спориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-495-1 29.12.2014 26.11.2034	0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев, септориоз колоса, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

0,4-0,5	Пшеница озимая	Церкоспореллезная гниль корневой шейки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое -при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, ринхоспориоз,	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Тритикале озимая	Пиренофороз, септориоз, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Тритикале озимая	Пиренофороз, септориоз, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз листьев на колосе, пиренофороз, церкоспореллез, фузариоз (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз листьев на колосе, пиренофороз, церкоспореллез, фузариоз (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев, септориоз колоса, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)
0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 15-20 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1-2)	-(3)
0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)

	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
<p>Виртуоз, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-02-1201-1 17.09.2016 16.09.2026</p>	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
<p>Золтан, КЭ (250 г/л + 80 г/л) Рейнбоу Агросайенс КфТ. ОГРН: - III/III 607-02-3742-1 31.08.2021 30.08.2031</p>	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(1)	-(3)	Активен
<p>Профи Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-02-2759-1 15.07.2020 14.07.2030</p>	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	45(1-2)	-(3)	

	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Ранголи-Ципрос, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-02-1329-1 17.01.2017 16.01.2027	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое- при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-15 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Ячмень озимый, яровой	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, полосатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучниста роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая, яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
Тузол, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 II/III 070-02-3890-1 29.11.2022 28.11.2032	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации. (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	45(1-2)	-(3)	
Маэстро, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «АГРОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОГРН: 1144632004582 III/- 278-02-494-1 26.12.2014 25.12.2024	0,4-0,5	Пшеница озимая	Ржавчина (бурая, желтая, стеблевая), септориоз, пиренофороз, мучнистая роса, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	Не активен
Анемон, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен

297-02-664-1 19.05.2015 297-02-664-1/427 427 18.05.2025	0,4-0,5	Ячмень яровой	Темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина (бурая, стеблевая, желтая), септориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Ржавчина (бурая, желтая, стеблевая), септориоз, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Калибел, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 Ш/Ш 277-02-1347-1 26.01.2017 25.01.2027	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозны е пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карли-ковая, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Фунгисил, КЭ (250 г/л + 80 г/л) ООО ЭЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 Ш/Ш 278-02-4108-1 29.01.2019 28.01.2029	0,4-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	Активен
Альто Турбо, КЭ (250 г/л + 160 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-02-4414-0 15.02.2024 14.02.2027	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса ржавчина бурая, ржавчина желтая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	35(2)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса ржавчина бурая, ржавчина желтая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	
	0,3-0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	35(2)	-(3)	

	0,3-0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	35(2)	-(3)	
	0,5-0,7	Сахарная свекла	Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(2)	-(3)	

пропиконазола + Пиракlostробин + флуксапироксад

Приаксор Макс, КЭ (125 г/л + 200 г/л + 30 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - П/Ш 015-02-4487-0 29.03.2024 28.03.2027	0,5 - 0,75	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5 - 0,75	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5 - 0,75	Рожь озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5 - 0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, пиренофороз, септориоз, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5 - 0,75	Овёс	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	

пропиконазола + пираклостробина

Хауберк, КМЭ (180 г/л + 120 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 Ш/Ш 002-02-4406-1 06.02.2024 05.02.2034	0,8-1,0	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, антракноз, альтернариоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации – начало цветения, второе опрыскивание через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	49(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – в фазу выхода в трубку, вторая – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – при появлении первых признаков одного из заболеваний – в фазы конец кущения - начало выхода в трубку; вторая при необходимости – в фазы появление флагового листа - начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Подсолнечник	Фомопсис, фомоз, серая гниль, белая гниль, альтернариоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации, первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	39(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	35(2)	-(3)	

Пропинеб

Антракол, ВДГ (700 г/кг) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/Ш 019-02-2981-1 21.01.2021 20.01.2031	1,75-2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	3(3)	Активен
	1,75-2	Виноград	Милдью, черная пятнистость (фомопсис), черная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	50(2)	3(3)	
	1,75-2	Лук (на репку, кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	3(3)	
	1,9-2,25	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	50(3)	3(3)	
	1,75-2	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	3(3)	

протиоконазала + пенфлуфен

Эместо Сильвер, КС (18 г/л + 100 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - Ш/- 019-02-2024-1 25.10.2018 24.10.2028	0,2 -0,4	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней до или во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 - 20 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Картофель	Парша обыкновенная, парша серебристая	Обработка клубней до или во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 - 20 л/т	-(1)	-(3)	

Протиоконазол

Протендо, КЭ (300 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - П/Ш 586-02-4733-0 26.11.2024 25.11.2027	0,65	Зерновые колосовые озимые, яровые, за исключени ем овса	Септориоз листьев и колоса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, гельминтоспориоз, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начала колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,33-0,60	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1-2)	-(3)	

Протиоконазол + Азоксистробин

МиксФил, КС (120 г/л + 150 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 Ш/-, ООО «АНПП «Агрохим-ХХ1» ОГРН: 1027700119710 Ш/- 197(023)-02-3182-1 16.06.2021 15.06.2031	0,2-0,3	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Ячмень яровой	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, ложная пыльная головня, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

	0,2-0,3	Пшеница озимая и яровая	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	-------------------------	--	--	------	------	--

Протиокназол + Азоксистробин + Дифеноконазол

Протазокс, КС (125 г/л + 200 г/л + 60 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-02-3481-1 21.01.2022 20.01.2032	0,75-1	Соя	Аскохитоз, церкоспороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации; следующее – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,75-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец кушения – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: выход в трубку – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	40(2)	-(3)	
	1	Соя	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации; следующее – через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	
	0,8-1	Подсолнечник	Фомопсис, фомоз, серая гниль, белая гниль, альтернариоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков одного из заболеваний; 2-е опрыскивание – через 14-21 день, но не позднее фазы бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: выход в трубку – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец кушения – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Церкоспореллезная гниль корневой шейки (церкоспореллез), ризоктониозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы: кушение (весна) – конец кушения – начало выхода в трубку (весна) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница озимая	Церкоспореллезная гниль корневой шейки (церкоспореллез), ризоктониозная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы: кушение (весна) – конец кушения – начало выхода в трубку (весна) Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

	0,75-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, ржавчина жёлтая, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начала колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75-1	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: 1-е при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее – с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)	

Протиоконазол + Дифеноконазол

<p>Маганик, КЭ (175 г/л + 125 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/П 156-02-4473-1 20.03.2024 19.03.2034</p>	0,6-0,8	Свёкла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14-21 день; против фузариоза колоса в фазы конец колошения - начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, ринхоспориоз, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая и жёлтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (жёлтая пятнистость)	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – по необходимости с интервалом 14-21 день; против фузариоза колоса в фазы конец колошения - начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	

Протиоконазол + пираклостробина

<p>Синтрон, КЭ (120 г/л + 90 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-02-3852-1 02.11.2022 01.11.2032</p>	0,8-1,25	Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, жёлтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	1,0-1,25	Пшеница озимая	Церкоспореллезная прикорневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,8-1,25	Ячмень яровой и озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	

Протиоконазол + пираклостробина + Тебуконазол

Протега Макс, МЭ (75 г/л + 25 г/л + 25 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-3008-1 09.02.2021 08.02.2031	0,8-1,0	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая и полосатая пятнистость плесневение семян, альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Твердая и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян, альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Пшеница озимая	Снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Протиоконазол + Спиросамин

Инпут, КЭ (160 г/л + 300 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/III 019-02-1218-1 05.09.2016 04.09.2026	0,8-1	Пшеница озимая	Септориоз, пиренофороз, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	21(1-2)	-(3)	Активен
	1	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	21(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	21(1-2)	-(3)	

Протиоконазол + Тебуконазол

Крестраж, КЭ (80 г/л + 160 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/III 178-02-3365-1 16.11.2021 15.11.2031	0,7-1,0	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев, и колоса, пиренофороз (желтая пятнистость)	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев, и колоса, пиренофороз (желтая пятнистость)	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,7-1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса в фазы конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,7-1,0	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,7-1,0	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	35(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

Прозаро Квантум, КЭ (80 г/л + 160 г/л) Байер КропСайенс АГ ОГРН: - П/Ш 019-02-880-1 10.12.2015 09.12.2025	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы развернулись 9 или более листьев – начало удлинения стебля и конец бутонизации – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(2)	-(3)	Активен
	0,75-1 (осень) 0,9-1 (весна)	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе развернулись 6-8 листьев;весной в фазы начало вытягивания стеблей и конец бутонизации (или при появлении первых признаков одного из заболеваний) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(3)	-(3)	
	0,6-0,7	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы 2-го междоузлия – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	
Редиго Про, КС (150 г/л + 20 г/л) Байер КропСайенс АГ ОГРН: - Ш/- 019-02-1152-1 11.07.2016 019-02-1152-1/450 450 10.07.2026	0,45-0,55	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,45-0,55	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,45-0,55	Лен масличный , лен - долгунец	Антракноз, крапчатость, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,45-0,55	Тритикале озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,45-0,55	Просо	Головня метелок	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,45-0,55	Овес	Покрытая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,45-0,55	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,55	Нут	Антракноз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,45-0,55	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,45-0,55	Рожь озимая	Стеблевая головня, снежная плесень, фузариозная корневая гниль, бурая ржавчина, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Фея, КЭ (125 г/л + 125 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-02-3579-1 31.03.2022 30.03.2032	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг – листа – начала колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	1	Кукуруза	Плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	27(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие через 10-14 дней (вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно – бурая), ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг – листа – начала колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно – бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг – листа – начала колошения; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Протиоконазол + Трифлуксистробин

Деларо, КС (175 г/л + 150 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-02-2880-1 17.11.2020 16.11.2030	0,5-1,0	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,5-1,0	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,5-1,0	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	20(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,5-1,0	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание растений в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 200 л/га	20(1-2)	-(3)	

0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)
0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	30(1)	-(3)
0,5-1,0	Соя	Церкоспороз, септориоз, антракноз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(2)	-(3)
0,5-1,0	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)
0,75-1,0	Свекла сахарная и столовая	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезни, последующее – через 21 день или при появлении новых симптомов одной из болезни Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)

Протиоконазол + Флуопирам

Пропульс, СЭ (125 г/л + 125 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - Ш/Ш 019-02-1543-1 29.08.2017 019-02-1543-1/445 445 28.08.2027	0,8-1	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, начиная с фазы буттизации Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	21(1)	-(3)	
	0,8-1	Соя	Аскохитоз, антракноз, церкоспороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Кукуруза	Листовые пятнистости (гельминтоспориоз, фузариоз), пузырчатая головня	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание – при появлении первых признаков одной из болезней или профилактически; последующее – с интервалом 18-21 день или при появлении новых симптомов одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(2)	-(3)	

	0,8-1,0	Кукуруза	Листовые пятнистости (гельминтоспориоз, фузариоз), пузырчатая головня	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	21(1)	-(3)	
Флуназол, СЭ (125 г/л + 125 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 И/И 197-02-4748-0 09.12.2024 08.12.2027	0,8-1,0	Кукуруза	Гельминтоспориозная пятнистость листьев, пузырчатая головня	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, начиная с фазы бутонизации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Зерновые колосовые озимые и яровые (за исключением овса)	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, карликовая ржавчина, септориоз колоса, септориоз листьев, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы конца кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	

Прохлораз + Крезоксим-метил + Тебуконазол

Рабона, СЭ (250 г/л + 50 г/л + 50 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - И/- 062-02-3026-1 03.03.2021 02.03.2031	0,4-0,6	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	----------------	---	--	------	--------	---------

Прохлораз + Пираклостробин + Тебуконазол + Ацетамиприд

Поларис Кватро, СМЭ (100 г/л + 15 г/л + 20 г/л + 150 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 И/- 018-01(02)-3768-1 22.07.2022 018-01(02)-3768-1/443 443 21.07.2032	1,2-1,5	Пшеница озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, церкоспореллезная гниль корневой шейки, снежная плесень, мучнистая роса, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,5	Ячмень озимый	Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники, злаковые тли, цикадки	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т семян	-(1)	-(-)	

	1,2-1,5	Пшеница яровая	Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Ячмень яровой	Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Прохлораз + Пропиконазол

Бампер Супер, КЭ (400 г/л + 90 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 И/И 156-02-3256-1 05.08.2021 04.08.2031	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	1,0-1,25	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	1,2-1,5	Свекла сахарная	Мучнистая роса церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одной из болезней, второе– при необходимости с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(1-2)	-(3)	
	1,0-1,25	Пшеница яровая и озимая	Септориоз листьев и колоса, пиренофроз (желтая пятнистость)	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Прохлораз + Тебуконазол

Замир, ЭМВ (267 г/л + 133 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 И/И 156-02-4321-1 15.12.2023 14.12.2033	0,8-1,2	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, бурая и желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофроз	Опрыскивание в период вегетации в фазах выхода в трубку – начало колошения (озимые обрабатываются весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	1,2	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах конец колошения-начало цветения (весенняя обработка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, полосатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации (весенняя обработка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	

Прохлораз + тритиконазол

Кинто Дуо, КС (60 г/л + 20 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - П/Ш 015-02-2337-1 25.07.2019 24.07.2029	2-2,5	Пшеница озимая	Фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, твердая головня, пыльная головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2,5	Ячмень озимый, яровой (пивоваренный)	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, твердая (каменная) головня, пыльная головня, плесневение семян, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Рожь озимая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, твердая (каменная) головня, пыльная головня, плесневение семян, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5	Пшеница озимая	Фузариозная, тифулезная снежная плесень, спорынья	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Ячмень озимый	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, твердая (каменная) головня, пыльная головня, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5	Рожь озимая	Фузариозная и тифулезная снежная плесень, спорынья	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Пшеница яровая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, твердая головня, пыльная головня, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

седаксан

Вайбранс, КС (500 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-2539-1 21.02.2020 20.02.2030	1,2-1,5	Кукуруза	Пузырчатая головня	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,15-0,25	Кукуруза	Корневые гнили (в том числе ризоктониозная), плесневение семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

седаксан + Мефеноксам + Флудиоксонил

Вайбранс Голд, КС (50 г/л + 37,5 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-3357-1 01.11.2021 31.10.2031	1-1,2	Соя, нут	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	-------	----------	--	---	------	------	---------

седаксан + Тиаметоксам + Флудиоксонил

Вайбранс Топ, КС (25 г/л + 262,5 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01(02)-3080-1 08.04.2021 07.04.2031	0,4-0,7	Картофель	Ризоктониоз, парша серебристая, фузариоз	Обработка клубней до посадки Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	-----------	--	--	------	------	---------

седаксана + Тебуконазол + Флудиоксонил + Тиаметоксам + флудиоксонала + седаксан + тебуконазола

Вайбранс Интеграл, КС (25 г/л + 10 г/л + 25 г/л + 175 г/л + 25 г/л + 25 г/л + 10 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/- 041-02-1753-1 12.02.2018 11.02.2028	1,75-2	Пшеница озимая, ячмень яровой	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-2	Пшеница озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция)	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-2	Ячмень яровой	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Сера

Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-01(02)-3834-1 21.10.2022 20.10.2032	20-30 г на 5-10 л воды (Л)	Смородин а черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	1(1-3)	4(3)	Активен
	30-80 г на 10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(1-6)	4(3)	
	2-3	Крыжовни к	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	1(1-6)	4(3)	
	4 -6	Виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	1(6)	4(3)	
	2-3	Роза открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-600 л/га	1(2-4)	4(3)	
	2-3	Томат защищенн ого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	1(1-5)	4(-)	
	2-3	Смородин а черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	1(1-3)	4(3)	
	2-3	Роза защищенн ого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	1(2-4)	4(-)	
	5-8	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(4-6)	4(3)	
	2-3	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	1(1-5)	4(3)	
	2-3	Томат открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	1(1-5)	4(3)	
	3-8	Яблоня, груша	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(1-6)	4(3)	

	2-3	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	1(1-5)	4(-)	
	2-3	Кабачки	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	1(1-3)	4(3)	
	30-50 г на 10 л воды (Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	1(4-6)	4(3)	
	20-30 г на 5-10 л воды (Л)	Крыжовник	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	1(1-6)	4(3)	
	20-30 г на 5-10 л воды (Л)	Роза открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	1(2-4)	4(3)	
Климат, серная дым (750 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 II/- 046-01(02)-2039-1 18.02.2019 17.02.2029	300 г/10 м3(Л)	Пустые погреба, расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где находятся домашние животные и птица	Возбудители болезней, бактериальные инфекции	Фумигация сернистым ангидридом не позднее, чем за 5 дней до закладки продукции на хранение. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	Активен
	300 г/20 м3(Л)	Пустые парники, теплицы (при условии их герметизации), расположенные вне жилых домов и не примыкающих к ним, вдали от помещений, где	Возбудители болезней, бактериальные инфекции	Фумигация сернистым ангидридом перед высадкой рассады. Дезгазация до 10 дней. Время экспозиции – 24-36 часов. По окончании фумигации – полное проветривание помещения в течение 48 часов до полного исчезновения специфического запаха сернистого ангидрида.	-(1)	-(-)	
Серя 400, КС (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-01(02)-3725-1 05.07.2022 04.07.2032	6,0-10,0	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(6)	3(3)	Активен
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	-(6)	3(3)	
	8,0-12,0	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(6)	3(3)	

	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(6)	3(3)	
	6,0-16,0	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации (при высоком инфекционном фоне): первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Паутинные клещи	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(6)	3(3)	
	100 мл/10 л воды(Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней (в зависимости от возраста дерева и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста дерева и объема кроны)	-(6)	3(3)	
	10,0-16,0	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(6)	3(3)	
Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-1779-1 27.02.2018 26.02.2028	4-8	Яблоня	Мучнистая роса, парша, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения, последующие с интервалом 10-14 дней, снижая концентрацию, начиная со второй обработки, на 1/3 Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(6)	-(-)	Активен
	6-8	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении признаков болезни, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(3)	3(1)	
Виташанс, ВДГ (800 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-2245-1 28.05.2019 126-02-2245-1/484 484 27.05.2029	2,0-3,0	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	1(3)	3(3)	Активен
	6-8	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – после цветения, последующие с интервалом 10-14 дней, снижая концентрацию, начиная со второй обработки на 1/3. Нельзя применять препарат в течение 15 дней до и 15 дней после обработки растений минеральными маслами и эмульсиями нефтяных масел Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(3)	3(3)	
	3,0-8,0	Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	1(3)	3(3)	

Микротиол, ВДГ (800 г/кг) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-02-854-1 06.02.2015 05.02.2025	3-8	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении единичных признаков болезней, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	1(3-6)	-(3)	Не активен
	5-8	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации при появлении единичных признаков болезней, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	1(4-6)	-(3)	
	2-3	Томат защищенн ого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: при появлении единичных признаков болезней, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	1(4-6)	1(-)	
Флосул, СК (800 г/л) Сульфур Милс Лимитед ОГРН: - III/III 852-02-4446-1 06.03.2024 852-02-4446-1/490 11.01.2033	5,0-8,0	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 500-800 л/га	1 (4-6)	3(3)	Активен
	3,0-8,0	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание вегетирующих растений при появлении единичных признаков болезней, последующие – с интервалом в 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	1(3-6)	3(3)	

Спироксамин + Протиоконазол + Тебуконазол

Солигор, КЭ (224 г/л + 53 г/л + 148 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-02-4277-0 30.11.2023 29.11.2026	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения-начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Рожь озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспорниоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения-начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, пиренофороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8-1,2	Свёкла сахарная	Мучнистая роса. церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – при появлении первых признаков одной из болезней, следующее – через 10-21 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	21(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень озимый, ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспорниоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы начало выхода в трубку-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в фазы появление флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

0,6-0,8	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспорниоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы начало выхода в трубку-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)
0,4-0,6	Ячмень озимый, ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспорниоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения -начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)
0,8	Пшеница яровая, пшеница озимая	Фузариоз колоса, чернь колоса, септориоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазу начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)
0,8	Пшеница озимая	Фузариоз колоса, чернь колоса, септориоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазу начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)
0,6-0,8	Рожь озимая	Бурая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)
0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа-начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)
0,4-0,6	Пшеница яровая, пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, , пиренофороз септориоз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кушения -начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)
0,6-0,8	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)
0,6-0,8	Пшеница яровая, пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, , пиренофороз септориоз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазу появления флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)
0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, пиренофороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)

Тебуконазол

<p>Раксон, КС (60 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-02-2176-1 02.04.2019 178-02-2176-1/457 457 01.04.2029</p>	0,4-0,5	Овёс	Пыльная головня, твёрдая (покрытая) головня, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Просо	Головня метелок	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Лен масличный	Крапчатость, антракноз	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Твёрдая (каменная) головня	Обработка семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Стингер, КС (60 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/- 004-02-5023-1 03.04.2017 02.04.2027	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 3-5 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Пшеница яровая	Твердая головня	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость, бактериоз	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Твердая головня	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, пыльная ложная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Пыльная головня, фузариозные и гельминто-спориозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница яровая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой	Каменная головня	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
АлтСил, КС (60 г/л) ООО «Резерв» ОГРН: 1082224012738 П/- 130-02-3286-1 06.09.2021 05.09.2031	0,4	Ячмень яровой	Каменная головня	Протравливание семян заблаговременно или за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян заблаговременно или за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4-0,5	Ячмень яровой	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание семян заблаговременно или за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Сфинкс, КС (60 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/-, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 П/- 023(197)-02-2495-1 10.12.2019 09.12.2029	0,4-0,5	Рожь озимая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, стеблевая головня	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Просо	Головня метелок (обыкновенная), плесневение семян	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Овес	Пыльная головня, твердая (покрытая) головня, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, полосатая и сетчатая пятнистости, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян за 7-14 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Бункер, ВСК (60 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/- 021-02-1689-1 27.09.2017 26.09.2027	0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, плесневение семян, гельминтоспориозная и фузариозные корневые гнили, септориоз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,5	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4-0,5	Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 5-8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Плесневение семян, септориоз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Овес	Пыльная головня, покрытая (твердая) головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
Глайдер, КС (500 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - П/П 062-02-3356-1 28.10.2021 27.10.2031	0,25-0,5	Пшеница	Ржавчина (бурая, стеблевая, желтая), септориоз листьев и колоса, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
Гранберг, КЭ (250 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-02-3554-1 21.03.2022 20.03.2032	0,75-1	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,75-1	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Рожь озимая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Овес	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	40(1)	-(3)	
Грандсил, КС (60 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/- 082-02-2684-1 01.06.2020 31.05.2030	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая (твердая) головня, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная, ложная (черная) пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Рожь озимая	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 5-8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Тебу 60, МЭ (60 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-1832-1 14.03.2018 13.03.2028	0,5	Пшеница яровая и озимая	Снежная плесень	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 3-5 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Рожь озимая, Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Рожь озимая, Лен - долгунец	Снежная плесень	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

<p>Фоликур, КЭ (250 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/Ш 019-02-1306-1 15.12.2016 14.12.2026</p>	1	Овес	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	1	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, карликовая, мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая и полосатая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее с интервалом 14-16 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1	Рожь	Ржавчина бурая, мучнистая роса, ринхоспориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
<p>Тебузан, ТКС (60 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/- 063-02-2238-1 18.06.2019 17.06.2029</p>	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян за 1-12 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян за 1-12 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян за 1-12 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня	Протравливание семян за 1-12 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян за 1-12 дней до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
<p>Тебуконазол, КС (60 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/- 097-02-2970-1 11.01.2021 10.01.2031</p>	0,4	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,5	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Универсал, КС (500 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/П 063-02-3665-1 28.04.2022 27.04.2032	0,25-0,5	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, септориоз листьев	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Соя	Антракноз, ржавчина	Опрыскивание растений в период бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1-2)	-(3)	
Раназол Ультра, КС (120 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/- 085-02-3839-1 26.10.2022 25.10.2032	0,2-0,25	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,2-0,25	Рожь озимая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,25	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,25	Овес яровой	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Редут, КС (60 г/л) ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 П/- 043(042)-02-2267-1 10.06.2019 09.06.2029	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Рапс яровой, озимый (технический)	Корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Лён-долгунец	Антракноз, крапчатость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 3-5 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая (твердая) головня, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная, ложная (черная) пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Шансил Ультра, КС (120 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/- 126-02-4536-1 25.04.2024 126-02-4536-1/492 492 24.04.2034	0,25	Просо	Головня метелок, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,2-0,25	Овес яровой	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,25	Лен масличный	Антракноз, крапчатость	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 5-6 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,25	Рожь озимая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,25	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,25	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, снежная плесень	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Тебузол, ВЭ (250 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 П/П 148-02-855-1 04.03.2015 03.03.2025	1	Овес	Мучнистая роса, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	Не активен
	1	Рожь озимая	Бурая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	1	Ячмень яровой и озимый	Стеблевая и карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	

	0,5	Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
Икарус, ВКЭ (250 г/л) «РОТАМ ЛТД» ОГРН: - П/Ш 102-02-1243-1 04.10.2016 03.10.2026	1	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая и ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации. Против фузариоза колоса колошение начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,75	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазе выметывания метёлки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина жёлтая	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14-16 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-1	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание растений в период бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Террасил, КС (60 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 П/- 424-02-1421-1 21.03.2017 20.03.2027	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминто-спориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, пыльная ложная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Доспех, КС (60 г/л)	0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен

ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/- 010-02-2162-1 25.03.2019 24.03.2029	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,25	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень, септориоз, плесневение семян, включая альтернариозную семенную инфекцию	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Фезан 250, КЭ (250 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - П/III 528-02-3432-1 17.12.2021 16.12.2031	0,5 - 1,0	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,75 - 1,0	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Рожь озимая, овес	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5 - 1,0	Ячмень озимый	Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, полосатая и сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75 - 1	Рожь озимая, овес	Оливковая плесень, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75 - 1	Ячмень яровой	Ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазе появления флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75 - 1,0	Ячмень озимый	Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, полосатая и сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Фразол Классик, КС (60 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - П/- 297-02-2277-1 17.06.2019 16.06.2029	0,5	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Пыльная, ложная (черная) пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая, пшеница озимая	Пыльная головня, гельминтоспориозны е и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,5	Рожь озимая, овес	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Овес Рапс озимый и яровой технический	Красно-бурая пятнистость	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Рожь озимая, овес	Пыльная головня, покрытая(твердая) головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 5-8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Овес Рапс озимый и яровой технический	Корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Лён-долгунец	Антракноз, крапчатность	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Пшеница яровая, пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Шансил, КЭ (250 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-02-4014-1 10.03.2023 126-02-4014-1/494 494 09.03.2033	1,0	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее с интервалом 14-16 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	Активен
	0,75-1	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазе появления флаг-листа и (или) в фазы появления флаг-листа и начала колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,75-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
Ракил Ультра, КС (120 г/л)	0,2-0,25	Просо	Головня метелок	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен

Байер КрокСайенс АГ
ОГРН: -
П/-
019-02-2063-1
04.03.2019
03.03.2029

0,25	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, пыльная головня, пыльная ложная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, включая альтернариозную семенную инфекцию	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,25	Просо	Головня метелок	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,2-0,25	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, пыльная головня, пыльная ложная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, включая альтернариозную семенную инфекцию	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,25	Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,2-0,25	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян, включая альтернариозную семенную инфекцию	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,2-0,25	Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,25	Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5 – 0,1	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, жёлтая пятнистость (пиренофороз)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 3-5 л/т	-(1)	-(-)
0,25	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян, включая альтернариозную семенную инфекцию	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,25	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, жёлтая пятнистость (пиренофороз)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 3-5 л/т	-(1)	-(-)
0,5 – 0,1	Лен - долгунец	Антракноз, крапчатость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Тебуконазол + Азоксистробин

<p>Тебаз Про, СК (250 г/л + 200 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 П/П 148-02-2105-1 18.02.2019 17.02.2029</p>	0,75-1,0	Пшеница озимая и яровая	Септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа-начала колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1-2)	-(3)	Активен
	0,5- 1,0	Пшеница озимая и яровая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа-начала колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1,0	Ячмень озимый	Темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: появления флаг-листа-выдвижения колоса; второй узел обрабатывается и появление верхнего флаг листа-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя	Церкоспороз, аскохитоз, антракноз, переноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации – образование плодов, второе опрыскивание через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: в фазы появления флаг-листа-выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы-начало цветения-полное цветение Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	
	0,75-1,0	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: появления флаг-листа-выдвижения колоса; второй узел обрабатывается и появление верхнего флаг листа-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1,0	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое- при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(2)	-(3)	
<p>Азоксит, КС (160 г/л + 200 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-02-4056-1 04.04.2023 03.04.2033</p>	0,5-1,0	Ячмень яровой	Темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: в фазы появления флаг-листа-выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	Активен
	1,0	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период колошения – начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Соя	Пероноспороз, белая гниль, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, фомопсис, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 14-21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	

	0,8-1,0	Ячмень яровой	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, белая гниль, септориоз, фомоз, фомопсис, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	
Брандер, КС (160 г/л + 200 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-02-3669-1 29.04.2022 28.04.2032	0,8-1,0	Подсолнечник	Белая гниль, септориоз, фомоз, фомопсис, альтернариоз, ржавчина, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Первое в фазу 6-8 листьев, второе: в конце фазы бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазу колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Соя	Пероноспороз, септориоз, аскохитоз, церкоспороз, антракноз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Первое-при появлении первых признаков болезни, но не позднее фазы бутонизации, второе-с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом -14-21 день Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Тебуконазол + Азоксистробин + Азоксистробин + Тебуконазол

Альтруист, КЭ, СК (100 г/л + 60 г/л + 60 г/л + 100 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - П/П 010-02-2741-1 13.08.2020 12.08.2030	1,5-2	Пшеница озимая и яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса и чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Опрыскиватели серийно-выпускаемые штанговые Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день. Опрыскиватели серийно-выпускаемые штанговые Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1,5-2	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, фузариозная пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, второе – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

	1,5-2	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Опрыскиватели серийно-выпускаемые штанговые Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	1,5-2	Пшеница озимая и яровая	Фузариоз и чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Тебуконазол + Азоксистробин + Ципроконазол

Триакив, КС (120 г/л + 100 г/л + 40 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-02-891-1 15.12.2015 002-02-891-1/221 221 14.12.2025	1	Рапс яровой	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фаза вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	1	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе розетки из 6-8 листьев и весной в фазе вытягивания стеблей – образование стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, сетчатая пятнистость, темно- бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз и чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза и черни колоса в фазу конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,25-0,3	Кукуруза	Пузырчатая и пыльная головня соцветий, корневые и стеблевые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, твердая головня фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних стадиях развития)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,8-1	Рис	Пирикуляртиоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов заболеваний (конец кущения – начала выхода в трубку); второе – выход флагового листа – начала цветения. За 20 дней до сбора урожая прекращается пополнение воды в чехах. Сброс воды из чехов – перед уборкой не планируется. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза и черни колоса в фазу конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,2-0,3	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

Тебуконазол + Дифеноконазол

Догода, КЭ (125 г/л + 125 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 П/Ш 590-02-4190-1 14.09.2023 13.09.2023	0,8-1,0	Рапс озимый	Фомоз, альтернариоз, склеротиниоз	Первое опрыскивание осенью в фазу 4-5 листьев культуры и второе – весной в фазу стеблевания до начала бутонизации) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Подсолнечник	Альтернариоз, серая гниль, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Магнелло, КЭ (100 г/л + 250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-02-1668-1 25.12.2017 041-02-1668-1/434 434 24.12.2027	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина линейная (стеблевая), ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации в фазу колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Ячмень яровой	Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, ринхоспориоз, ржавчина карликовая, фузариоз колос	Опрыскивание растений в период вегетации в фазу колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз (желтая пятнистость), фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	

Тебуконазол + Имазалил

Скарлет, МЭ (60 г/л + 100 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-3007-1 09.02.2021 08.02.2031	0,4	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень (в районах умеренно-депрессивного развития болезни)	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Овес	Твёрдая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,4	Подсолнечник	Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), серая гниль (семенная инфекция), фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

	0,3-0,4	Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, бурая ржавчина, мучнистая роса, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Кукуруза на зерно	Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозные корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение семян и початков	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,4	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 5-6 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Рапс яровой и озимый	Корневые гнили, пероноспороз, плесневение семян, альтернариоз	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Тебалин, ТКС (60 г/л + 100 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/- 046-02-4350-0 09.01.2024 08.01.2027	0,3-0,4	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,3-0,4	Горох	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень (в районах умеренного развития болезни)	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 4-8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,4	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Тебузил, ТКС (60 г/л + 100 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/- 085-02-4327-1 20.12.2023 19.12.2033	0,4	Рапс яровой и озимый	Пероноспороз, альтернариоз, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Имазалил + мефеноксама

Бенефис Суприм, МЭ (30 г/л + 50 г/л + 20 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-3813-1 05.10.2022 04.10.2032	0,6-0,8	Пшеница яровая, озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних фазах развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Ризиктониозная корневая гниль, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,8	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой, в том числе пивоварен ный	Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Имазалил + Тиabendазол

Стингер Трио, КС (60 г/л + 60 г/л + 80 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/-,	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---------	-------------------------------	---	---	------	------	---------

ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 И/ 004(549)-02-5014-1 17.12.2020 16.12.2030	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, полосатая и темно-бурая пятнистости	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	------------------	---	---	------	------	--

Тебуконазол + Имидаклоприд + Тиabendазол + Имазалил

Доспех Квадра, КС (30 г/л + 300 г/л + 30 г/л + 20 г/л) ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - И/ ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 И/ ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 И/ ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - И/ 010(011)-02-1951-1 19.06.2018 09.07.2028	0,8-1	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1	Ячмень озимый и яровой	Твёрдая (каменная) и пыльная головня, ложная (чёрная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Пшеница озимая и яровая	Твердая и пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса (на ранних стадиях развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Крезоксим-метил

Боливар Форте, КС (240 г/л + 125 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - И/И 062-02-3376-1 18.11.2021 17.11.2031	0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание растений в период вегетации, первая обработка – в фазу выход в трубку – флаг-лист Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание растений в период вегетации в фазу колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	

Тебуконазол + Пропиконазол

Гранберг Про, КЭ (200 г/л + 300 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 И/И 082-02-3846-1 27.10.2022 26.10.2032	0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	3(3)	Активен
	0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	3(3)	
	0,2-0,3	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, ягода размером с горошину Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3-4)	3(3)	

	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	3(3)	
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	3(3)	
	0,4-0,6	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	3(3)	
	0,5-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетацииосенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(1)	3(3)	
Комиссар, КЭ (200 г/л + 300 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Ш 085-02-2863-1 02.11.2020 01.11.2030	0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	-(3)	
	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Проназол Про, КЭ (200 г/л + 300 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРАЙШН» ОГРН: 1112310006104 П/Ш 653-02-4162-1 20.07.2023 19.07.2033	0,3-0,4	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Ячмень озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	-(3)	
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	-(3)	

Тебуконазол + Пропиконазол + эпоксиконазол

Триада, ККР (140 г/л + 140 г/л + 72 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-02-4460-1 14.03.2024 13.03.2034	0,5-0,6	Ячмень яровой, в том числе пивоваренный	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,6	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в фазу конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	

Тебуконазол + Протиоконазол

Прозаро, КЭ (125 г/л + 125 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/Ш 019-02-2441-1 25.10.2019 019-02-2441-1/359 359 24.10.2029	0,8-1,0	Горох на зерно	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало кущения; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,8-1,0	Люпин	Бурая пятнистость, антракноз	При появлении первых признаков заболевания, но не позднее фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Кукуруза	Корневые и прикорневые гнили фузариозные и гельминтоспориозные	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало кущения; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	1,0	Кукуруза	Плесневение початков, пузырчатая головня	Опрыскивание в период вегетации: профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Соя	Аскохитоз, антракноз, септориоз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало кущения; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,8-1,0	Нут	Аскохитоз	При появлении первых признаков заболевания, но не позднее фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Рапс яровой, озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – через 10-14 дней (вытягивание стеблей-начало образования стручков в нижнем ярусе) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой, озимый	Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно-бурая), ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	

Витазол Экстра, ВДГ (300 г/л + 300 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/П 699-02-3865-1 10.11.2022 09.11.2032	0,3-0,4	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса – конец колошения –начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,25-0,3	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, риносפורиоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,25-0,3	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (жёлтая пятнистость)	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса – конец колошения –начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1-2)	-(3)	
Ламадор, КС (150 г/л + 250 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/- 019-02-2016-1 10.10.2018 09.10.2028	0,15-0,2	Овес	Пыльная, покрытая головня, гельминтоспо-риозна я и фузариозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,2	Пшеница яровая, озимая	Твердая и пыльная головня, фузариозная, гельминтоспорозная и ризоктониозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Рожь озимая	Стеблевая головня, тифулез, гельминтоспо-риозна я и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, каменная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспорозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

Тебуконазол + Прохлораз + Имазалил

Поларис, МЭ (15 г/л + 100 г/л + 25 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-02-4082-1 22.05.2023 21.05.2033	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспорозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних фазах развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,5	Пшеница озимая	Снежная плесень, ризоктониозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,5	Ячмень яровой, в том числе пивоварен ный	Пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспорозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1,0-1,2	Ячмень яровой, в том числе пивоваренный	Каменная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	---	------------------	--	------	------	--

Тебуконазол + Спироксамин + Триадименол

<p>Фалькон, КЭ (167 г/л + 250 г/л + 43 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-02-1456-1 12.04.2017 11.04.2027</p>	0,6	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина бурая, полосатая, сетчатая и темно-бурая пятнистости листьев, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса, ломкость стеблей(церкоспореллез)	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза колоса: конец колошения, начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	10(3)	Активен
	0,6	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса, ломкость стеблей (церкоспореллез)	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза колоса: конец колошения, начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	10(3)	
	0,6	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ринхоспориоз, гельминтоспориоз, септориоз, фузариоз колоса, ломкость стеблей(церкоспореллез)	Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза колоса: конец колошения, начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	10(3)	
	0,5-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазе начало смыкания рядков, последующие – с интервалом 14-16 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	21(2)	10(3)	
	0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, зеленая ягода Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(4)	10(3)	

Тебуконазол + Тирам

<p>Тир, ТПС (25 г/л + 400 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 II/- 050-02-2833-1 09.10.2020 08.10.2030</p>	1,2	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2	Рожь озимая	Снежная плесень (при слабом и умеренном развитии болезни)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,2	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Триадименол

Фразол, КС (60 г/л + 60 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - П/- 297-02-2996-1 27.01.2021 26.01.2031	0,4-0,5	Ячень яровой	Каменная головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, септориоз, мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Флудиоксонил + Азоксистробин

Проксима, КС (15 г/л + 25 г/л + 10 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/- 046-02-3111-1 15.04.2021 14.04.2031	1,75	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень (в зонах умеренного развития болезни)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-1,75	Ячень озимый, яровой	Каменная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, сетчатая пятнистость (на ранних фазах развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-1,75	Пшеница озимая, яровая	Твердая головня пшеницы, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, септориоз (на ранних фазах развития)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Флузол, КС (15 г/л + 25 г/л + 10 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/- 070-02-4792-1 29.01.2025 28.01.2035	1,5-1,75	Пшеница яровая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-1,75	Пшеница озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-1,75	Ячень озимый и яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Флудиоксонил + Протиоконазол

Баритон Супер, КС (10 г/л + 37,5 г/л + 50 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/- 019-02-2140-1 04.03.2019 03.03.2029	0,8-1	Пшеница яровая, озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Флудиоксонил + Флутриафол + Пиракlostробин - протиоконазол + Флудиоксонил + Флудиоксонил + Тебуконазол + Пиракlostро

Протект Форте, ВСК, СЭ, КС (10 г/л + 37,5 г/л + 40 г/л + 10 г/л + 10 г/л + 48 г/л + 37,5 г/л + 55 г/л + 48 г/л + 55 г/л + 25 г/л + 55 г/л + 37,5 г/л + 30 г/л + 48 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 П/-, ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 П/П, ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 П/- 178-02-1387-1 06.03.2017 178-02-1365-1/233 233, 178-02-1387-1/232 232 23.04.2034	1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, снежная плесень, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,1-1,25	Пшеница яровая, озимая	Плесневение семян (включая альтернарию)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,1-1,25	Ячмень яровой, озимый	Плесневение семян (включая альтернарию)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,25	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, септориоз, плесневение семян, тифулез, ложная пыльная головня, снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1,0	Ячмень озимый, яровой	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Предпосевная обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Пшеница яровая	Пыльная головня	Предпосевная обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1,0	Пшеница озимая, яровая	Твёрдая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Предпосевная обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

1,5-2	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян (семенная инфекция)Ч	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 7-8 л/т	-(1)	-(-)
0,4	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз, серебристая парша	Обработка клубней до и вовремя посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5	Подсолнеч ник	Фомопсис, ложная мучнистая роса, белая гниль, серая гниль, сухая ризопусная гниль, фузариозная гниль, альтернариоз (семенная инфекция)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)
0,2	Картофель	Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, мокрая гниль, серебристая парша, антракноз	Обработка клубней перед закладкой на хранение Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-1,25	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, темнобурая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,0	Пшеница озимая	Пыльная головня, фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки	Предпосевная обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Тебуконазол + Флуопирам + Протиоконазол

Ламадор Про, КС (60 г/л + 20 г/л + 100 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/- 019-02-4278-0 30.11.2023 29.11.2026	0,5	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, гельминтоспориозная корневая гниль и фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тебуконазол + Флутриафол

Фараон Супер, КС, КЭ (250 г/л + 250 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/П, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 П/П, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 П/П 197-02-3316-1 24.09.2021 197-02-3316-1/466 466 23.09.2031	0,5	Подсолнеч ник	Альтернариоз, ржавчина, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	52(2)	-(3)	Активен
	0,5-1,0	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, темно-бурая пятнистость, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	1,0	Рожь озимая	Ржавчина бурая, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	3(3)	

	1,0	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 300 л/га	42(2)	3(3)	
	0,75	Соя	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	1,0	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, ринхоспориоз, пиренофороз, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,5	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	1,0	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе развития розетки из 4-6 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 300 л/га	42(2)	3(3)	
	1,0	Овёс	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	3(3)	
	0,3	Горох	Аскохитоз, антракноз, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении единичных признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 200 л/га	30(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, полосатая, сетчатая и красно-бурая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвигание колоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
Страйк Форте, КС (225 г/л + 75 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-02-1339-1 25.01.2017 178-02-1339-1/296 296 24.01.2027	0,5-0,75	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1-2)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Соя	Переноспороз, церкоспороз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Рапс яровой и озимый	Склеротиниоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижней ярусе Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,2	Горох (на зерно)	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации, второе – при необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1-2)	-(3)	

	0,5-0,75	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, альтернариоз, фомопсис, ржавчина, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе – с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(2)	-(3)	
	1,1	Пшеница озимая	Болезни колоса (фузариоз, септориоз, чернь)	Опрыскивание в период вегетации в фазы колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75	Пшеница яровая и озимая	Септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1-2)	-(3)	
	0,65-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Террасил Форте, КС (80 г/л + 80 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 П/- 424-02-3588-1 06.04.2022 05.04.2032	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, мучнистая роса, септориоз (на ранних стадиях), плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, темно-бурая и полосатая пятнистости, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян заблаговременно или перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Тебуконазол + Ципроконазол + Пропиконазол							
Титул Трио, ККР (160 г/л + 80 г/л + 80 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-02-2811-1 21.09.2020 20.09.2030	0,4-0,6	Кукуруза	Прикорневые и стеблевые гнили гельминтоспориозной и фузариозной этиологии, гельминтоспориозная пятнистость листьев, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	Активен

	0,4-0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев осенью и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец бутонизации – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,6	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазу: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	28(1-2)	-(3)	

тетраконазол

Эминент, МЭ (125 г/л) Изагро С.П.А. ОГРН: - Ш/Ш 140-02-2389-1 11.09.2019 10.09.2029	0,6-0,8	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации в фазы выход в трубку – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая	Септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы выход в трубку – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(2)	-(3)	
Домарк, МЭ (125 г/л) Изагро С.П.А. ОГРН: -	0,3-0,4	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 1-я – в фазе розовый бутон, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	7(3)	Активен

III/III 140-02-2553-1 03.03.2020 02.03.2030	0,25-0,32	Виноград	Черная пятнистость, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец цветения; ягода размером с горошину, грозди свисают; начало спелости ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	7(3)
	0,25-0,32	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации в фазы: образование соцветий; конец цветения; ягода размером с горошину, грозди свисают Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	7(3)

тетраконазол + Дифеноконазол

Геката, КМЭ (60 г/л + 120 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-3255-1 05.08.2021 04.08.2031	0,5-0,7	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка-весной в фазе бутонизация –цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(4)	7(3)	Активен
	4-7 мл/ 10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1 - 5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(3)	3(-)	
	0,4-0,7	Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	60(3)	7(3)	
	1,0	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(1)	7(3)	
	1,0	Пшеница яровая и озимая	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(1-2)	7(3)	
	0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(2)	7(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(2)	7(3)	
	6 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, горькая, серая плесневидная, фомозная), оливковая плесень, фузариозная гниль	Опрыскивание в период созревания плодов Расход рабочей жидкости - 1 - 5 л/дереву (в зависимости от возраста и объема кроны)	40(2)	3(-)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(1)	7(3)	
	5-7 мл/ 10 л воды (Л)	Виноград	Оидиум, черная пятнистость, черная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1,0 л/куст	30(4)	3(-)	

	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	40(1-2)	7(3)	
	0,6	Яблоня	Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, горькая, серая плесневидная, фомозная), оливковая плесень, фузариозная гниль	Опрыскивание в период созревания плодов Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	40(2)	7(3)	

тетраконазол + Проквиназид

Талендо Экстра, КЭ (80 г/л + 160 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - П/III 029-02-1036-1 14.03.2016 13.03.2026	0,3-0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(4)	3(3)	Активен
Талендо Экстра КА, КА (80 г/л + 160 г/л) ООО Кортева Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 П/III 866-02-4721-0 11.11.2024 10.11.2027	0,3-0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание вегетирующих растений с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(4)	3(3)	Активен

Тиabendазол

Вист, шашки насы (400 г/кг) ООО «ФУМИГАНТ-ПЛЮС» ОГРН: - III/- 295-02-639-1 16.04.2015 15.04.2025	0,01-0,05	Картофель (семенной)	Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль	Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках – 0,3 м; насыпью – 0,5 м в хранилищах без вентиляции	-(1)	1(1)	Активен
	0,005-0,01	Картофель (продоволь- ственный)	Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль	Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках – 0,3 м; насыпью – 0,5 м в хранилищах без вентиляции	7(1)	1(1)	
	5 г/25 м3 (Л)	Картофель (семенной) , картофель (продоволь- ственный) в погребах или подвалах, расположе- нных под нежилыми помещени- ями	Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль	Фумигация после загрузки на хранение	7(1)	1(1)	
	0,01-0,05	Картофель (семенной)	Ризоктониоз	Фумигация картофеля перед посадкой	-(1)	1(1)	
	150-200 г/ 1000 м3	Помещени- е под картофель	Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль	Фумигация после загрузки на хранение	-(1)	1(1)	

Тиabendазол + Имазалил + Тебуконазол

Тритон, КС (60 г/л + 40 г/л + 60 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 II/- 085-02-3727-1 06.07.2022 05.07.2032	0,4-0,5	Рожь озимая	Спорынья, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, тифулез, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, полосатая и темно-бурая пятнистости, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Доспех 3, КС (60 г/л + 40 г/л + 60 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 ИП/ 010-02-3002-1 04.02.2021 03.02.2031	0,4-0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семя, септориоз, мучнистая роса (на ранних фазах)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая и темно-бурая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиабендазол + Имазалил + Флутриафол

Балинт, КС (25 г/л + 15 г/л + 37,5 г/л) ПЕТЕРС & БУРГ Кфт. ОГРН: - ИП/ 017-02-716-1 21.07.2015 20.07.2025	1,2	Ячмень яровой	Пыльная и твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1-1,2	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,2	Пшеница яровая, озимая	Пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, мучнистая роса (на слабом инфекционном фоне), плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Винцит Форте, КС (25 г/л + 15 г/л + 37,5 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - ИП/ 058-02-817-1 14.02.2025 14.02.2035	1-1,2	Пшеница озимая	Пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень, септориоз, ржавчина бурая, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,1-1,25	Ячмень яровой и озимый	Каменная (твердая) и пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Овес	Покрытая (твердая) и пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

1,25	Рапс озимый и яровой	Корневые гнили фузариозно-питиозной этиологии, альтернариоз, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)	
0,9-1,1	Рожь озимая	Стеблевая головня, корневые гнили, церкоспореллез, мучнистая роса, спорынья, плесневение семян. Снежная плесень (в районах умеренного развития болезни)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)	
1-1,2	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, ржавчина, мучнистая роса, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиабендазол + Мефеноксам + Флудиоксанил + Азоксистробин

Максим Кватро, КС (300 г/л + 30 г/л + 37,5 г/л + 15 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-02-872-1 27.11.2015 26.11.2025	1	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная корневая и прикорневая гнили, плесневение семян	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	---	----------	---	--	------	------	---------

Тиабендазол + Тебуконазол

Виал ТрасТ, ВСК (80 г/л + 60 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/- 021-02-2908-1 03.12.2020 02.12.2030	0,3-0,4	Овес	Покрывчатая головня, пыльная головня, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,3-0,4	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, ржавчина бурая, септориоз (на ранних стадиях)	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, черная (ложная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Рожь озимая	Фузариозная и тифулезная снежная плесень	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Ячмень озимый	Каменная головня, пыльная головня, черная (ложная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,3-0,4	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Ларимар, ТКС (80 г/л + 60 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/- 278-02-4109-1 23.12.2014 22.12.2024	0,3-0,4	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
---	---------	-------------------	--	--	------	------	------------

Тиabendазол + Тебуконазол + Имазалил

Фаворит Трио, КС (60 г/л + 60 г/л + 40 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/- 097-02-838-1 14.02.2025 14.02.2035	0,4-0,5	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Рожь озимая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, тифулезная снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, полосатая и темно-бурая пятнистости, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиabendазол + тритиконозол

ХимАгроМаркетинг Тиaben Т, ТКС (80 г/л + 80 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/- 063-02-3101-1 09.04.2021 08.04.2031	0,4-0,5	Ячмень яровой	Каменная (твердая) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная и фузариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная и фузариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиabendазол + Флутриафол

Ансамбль, КС (25 г/л + 25 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/- 010-02-2190-1 05.04.2019 04.04.2029	2	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-2,0	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, мучнистая роса, карликовая ржавчина	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса, септориоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиабендазол + циперметрин							
Бомбер, ДШ (300 г/кг + 130 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-01(02)-2836-1 13.10.2020 12.10.2030	5 г/20 м3 (Л)	Пустые погребов, подвалы, расположенные вне жилых зданий	Вредные членистоногие, возбудители болезней	Фумигация пустых помещений перед закладкой продукции на хранение. Экспозиция – 3 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей после полного проветривания в течение 48 часов	-(1)	2(2)	Активен

Тиаметоксам + Дифеноконазол + Мефеноксам

ДивидендСуприм, КС (92,3 г/л + 36,92 г/л + 3,08 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-496-1 30.12.2014 29.12.2024	2-2,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, септориоз, мучнистая роса (на ранних стадиях развития)	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
	2,5	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня, питиозная корневая гниль	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиаметоксам + Дифеноконазол + Флудиоксанил

Триптих, КС (320 г/л + 30 г/л + 30 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/-, Агрия АД ОГРН: - III/- 184(026)-01(02)-4157-1 13.07.2023 12.07.2033	1,0	Ячмень озимый и яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,33	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Обработка клубней Расход рабочей жидкости - 25 л/т клубней (при посадке)	-(1)	-(-)	
	10,0	Рапс яровой	Корневые гнили, плесневение семян, альтернариоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 15 - 20 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Пшеница озимая и яровая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиаметоксам + Мефеноксам + флудиоксанил + Тиабендазол + седаксан

Вайбранс Круйзер Макс, КС (92,3 г/л + 11,5 г/л + 7,7 г/л + 46,2 г/л + 15,4 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-01-4239-1 27.10.2023 26.10.2033	2,5 - 3,5	Соя	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль и ризоктониозная корневая гниль, фузариозная семенная инфекция, аскохитоз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян с увлажнением Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т семян	-(1)	-(3)	Активен
	2,5 - 3,5	Соя	Проволочники	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т семян	-(1)	-(3)	

Тиаметоксам + трифеназол

Квестор, КС (300 г/л + 50 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/- 192-02-687-1 22.06.2015 21.06.2025	1	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, септориоз, церкоспореллезная корневая гниль, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	---	----------------	--	--	------	------	---------

	0,8-1	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, септориоз	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня ячменя, каменная головня ячменя, гельминтоспориозная корневая и фузариозная корневая гнили, септориоз, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Тиаметоксам + Флудиоксонил + Дифеноконазол

Шансометокс Трио, КС (262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/- 126-02-1943-1 10.07.2018 09.07.2028	1,2-1,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,4	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	1,2-1,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

Тиаметоксам + флудиоксонил + Мефеноксам

Темифлю, КС (280 г/л + 8 г/л + 32,3 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/- 010-01(02)-3400-1 07.12.2021 06.12.2031	15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	15	Рапс яровой и озимый	Черная ножка, корневые гнили (грибы родов питиум, ризоктония, фузариум), плесневение семян, альтернариоз, фомоз	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 25 л/т	-(1)	-(-)	

Тиофанат - метил + Тиофанат - метил

Топсин-М, СП, КС (700 г/кг + 500 г/л) Ниппон Сода Ко., Лтд ОГРН: - II/II, Ниппон Сода Ко., Лтд ОГРН: - II/III 094-01-469-1 15.12.2014 20.11.2027	1	Ячмень яровой	Темно-бурая и сетчатая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней (в случае слабого развития болезней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	43(2)	-(3)	Активен
	0,9-1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	43(2)	-(3)	
	1	Пшеница яровая и озимая	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней (в случае слабого развития болезни). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	43(2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(3)	-(3)	

	1,2	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазе конец колошения (при прогнозе слабого развития болезни) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	43(1)	-(3)	
	1-1,2	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,8-1,2	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	28(2)	-(3)	
	0,9-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	43(2)	-(3)	

Тиофанат - метил + флутриафол + антидот клокви́нтосет-мексил + Клодинафоп-пропаргил

Феникс Дуо, КС, КЭ (310 г/л + 187 г/л + 20 г/л + 80 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III, ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - II/III 062-02-1838-1 22.03.2018 17.04.2032	0,6	Пшеница озимая	Септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая и стеблевая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	52(1)	-(3)	

Тирам

ТМТД-плюс, КС (400 г/л) ЗАО «Агрозащита» ОГРН: 1020203223006 III/- 095-02-3450-1 27.12.2021 26.12.2031	3,5	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 7-14 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	3,5	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариоз, аскохитоз (семенная инфекция), плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 7-14 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	4,5	Нут	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 7-14 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	
	4,5	Люпин	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, антракноз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян за 7-14 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)	
Грануфло, ВДГ (800 г/кг) Таминко БВБА ОГРН: - III/III 284-02-3267-1 04.02.2015 03.02.2025	2-3	Персик, слива, вишня	Монилиоз, курчавость листьев, кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	40(3)	-(3)	Не активен
	2-3	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое в конце фенофазы «зеленый конус» («мышинное ухо»), последующие – с интервалом 7-14 дней, последнее – не позднее 35 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	35(4)	-(3)	

Митар, ВДГ (800 г/кг) ООО «АГРОПРОГРЕСС КЭМИКАЛС» ОГРН: 1157847140296 III/III 389-02-3564-1 22.03.2022 21.03.2032	2-3	Слива	Кластероспориоз, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, второе – после цветения, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	40(3)	7(3)	Активен
	2-3	Яблоня	Парша, монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «мышинное ушко», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	40(4)	7(3)	
Тирам, ВСК (400 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/- 126-02-3698-1 31.05.2022 30.05.2032	4,0	Кукуруза	Плесневение семян, фузариоз, бактериоз, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	4,0-5,0	Подсолнечник	Белая и серая гнили, плесневение семян, пероноспороз	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)	
	6,0-8,0	Соя, люпин, нут, чечевица	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)	
	6,0-8,0	Горох	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)	
	3,0-4,0	Пшеница яровая и озимая	Плесневение семян, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная гнили	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)	
Катрекс, КС (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-02-4724-1 11.11.2024 10.11.2034	4,0-6,0	Вишня, слива	Монилиальная плодовая гниль, монилиальный ожог, кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(3)	3(3)	Активен
	4,0-6,0	Яблоня	Парша, монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	3(3)	
	4,0-6,0	Персик	Монилиальная плодовая гниль, монилиальный ожог, курчавость листьев, кластероспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(3)	3(3)	
	8,0-12,0	Сахарная свекла	Корнеед, бактериоз, плесневение семян, церкоспороз и фомоз при раннем проявлении болезни	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 18-22 л/т	-(1)	3(3)	

Тирам + Карбоксин

Витарос, ВСК (198 г/л + 198 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-02-1690-1 27.09.2017 26.09.2027	2,5-3	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, плесневение семян, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	3	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 -12 л/т	-(1)	-(-)	
	3	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 -12 л/т	-(1)	-(-)	

	3	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5-3	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 -12 л/т	-(1)	-(-)	

Тирам + Пиракlostробин + тритикоказол

Тридим, КС (250 г/л + 40 г/л + 80 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-02-3265-1 16.08.2021 15.08.2031	0,4-0,5	Рожь озимая и яровая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, пыльная головня, сетчатая и темно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная, фузариозная, ризоктониозная и офиоболезная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рожь озимая и яровая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Овес яровой и озимый	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина стеблевая и карликовая, сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая и желтая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5-0,6	Овес яровой и озимый	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость, септориоз, мучнистая роса, ржавчина стеблевая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	40(1-2)	-(3)	

Тирам + Тебуконазол

Виталон, КС (400 г/л + 14 г/л) ЗАО «Химсервис» ОГРН: 1020203088740	1,5	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	-----	-----------------------	------------------	--	------	------	---------

П/-, ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/-, 087(082)-02-2419-1 08.10.2019 07.10.2029	2,0	Рожь озимая	Снежная плесень, стеблевая головня	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	2,0	Пшеница озимая	Снежная плесень, церкоспореллезная прикорневая гниль	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	2,0	Кукуруза	Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозная стеблевая и корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,5-2,0	Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,5-2,0	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, фузариоз, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)
	2,0	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,5-2,0	Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,5-2,0	Пшеница яровая, озимая	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, септориоз, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	1,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня	Обработка семян непосредственно перед посевом (7-14 дней) или за 2-7 месяцев до посева Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Тирам + Тирам

ТМТД, ТПС, ВСК (400 г/л + 400 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/-, АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/-, 050-02-2818-1 28.09.2020 27.09.2030	3-5	Лен - долгунец	Антракноз, фузариоз, полиспоров, аскохитоз, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 5-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2,5-3,0	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание (обработка) семян перед посевом (7-14 дней) или заблаговременно (2-7 месяцев) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	6-8	Соя, люпин, нут	Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	4-5	Подсолнечник	Белая и серая гнили, пероноспороз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

4,0	Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, бактериоз	Протравливание семян перед посевом (2-15 дней) или заблаговременно (2-7 месяцев) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
3-4	Пшеница яровая и озимая	Плесневение семян, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
6-8	Горох, люцерна	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, антракноз, бактериоз, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
3-4	Рожь озимая	Стеблевая головня, плесневение семян, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
4	Кукуруза	Плесневение семян, фузариоз, бактериоз, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
4-5	Картофель	Фитофтороз, ризоктониоз, обыкновенная парша, мокрая бактериальная гниль, сухая фузариозная гниль	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)
8-12	Свекла сахарная, столовая, кормовая	Корнеед всходов, фомоз, пероноспороз, церко-спороз, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)

Триадимефон

Байзафон, СП (250 г/кг) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 III/III 063-02-2251-1 29.05.2019 28.05.2029	0,15-0,3	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующие с интервалом 10–15 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(6)	7(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая	Опрыскивание в период вегетации в стадиях развития флаг-лист и начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	7(3)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	7(3)	
	1	Пшеница яровая и озимая	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации в стадиях развития флаг-лист и начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	38(1-2)	7(3)	
Привент, СП (250 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-02-2298-1 01.07.2019 30.06.2029	1,0	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина желтая, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	20(1-2)	7(3)(3-)	Активен
	0,5	Кукуруза (семенные посевы)	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая и корневая гнили, фузариоз початков, плесневение початков	Опрыскивание семенных посевов в фазе выбрасывания нитей Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1)	7(3)(3-)	
	0,15-0,2	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации до цветения, после цветения, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(6)	7(3)(3-)	

	0,2-0,6	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	5(2)	7(3)(3-)	
	0,06-0,12	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(4)	7(3)(3-)	
	1,0-2,5	Томат защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(2)	7(3)(3-)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	20(1-2)	7(3)(3-)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в стадии 2-х узлов или раскрытие последнего влагалищного листа. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(1)	7(3)(3-)	

Триадимефон + Тебуконазол

Авиаль, КЭ (100 г/л + 125 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-02-3575-1 29.03.2022 28.03.2032	0,7-1	Ячмень яровой, озимый	Ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Пшеница яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвижение колоса – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Пшеница яровая	Септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвижение колоса – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Пшеница озимая	Септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвижение колоса – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1,25	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1	Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазах 2-х узлов выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

триитконазол

Премис Двести, КС (200 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - П/- 015-02-844-1 30.10.2015 29.10.2025	0,19-0,25	Ячмень яровой и озимый	Пыльная и твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,19	Овес	Пыльная и твердая (покрытая) головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,19-0,25	Рожь озимая	Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, бурая ржавчина, мучнистая роса	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,19-0,25	Овес	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, септориоз	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,15	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,25	Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая головня, пыльная головня, корневые и стеблевые гнили (в том числе фузариозные), плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,15-0,2	Пшеница озимая	Гельминтоспориозная, фузариозная и офиолезная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Алиос, КС (300 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - П/- 015-02-723-1 29.07.2015 28.07.2025	2,35-2,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, пыльная головня соцветий, корневые и прикорневые гнили фузариозной этиологии, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до одного года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен

триитконазол + Имазалил + Прохлораз

Турин, КЭ (56 г/л + 66 г/л + 132 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/-, ООО «АГРОДИМ» ОГРН: 1136449005351 П/- 042(275)-02-452-1 21.11.2014 20.11.2024	0,28-0,35	Рожь озимая	Стеблевая головня, снежная плесень, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
	0,32-0,35	Ячмень озимый, ячмень яровой	Пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,28-0,32	Ячмень яровой	Каменная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,28-0,32	Ячмень озимый	Твердая (каменная) головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

триитконазол + Прохлораз

Хайп, КС (20 г/л + 60 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/- 178-02-3197-1 02.07.2021 01.07.2031	2,0-2,5	Овес	Твёрдая (покрытая) головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2,0-2,5	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,0-2,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,2-2,5	Овес	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень, спорынья	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

триитконазол + Прохлораз + Азоксистробин

Терция, СК (20 г/л + 60 г/л + 10 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/- 021-02-1802-1 10.11.2016 09.11.2026	2,5	Пшеница озимая	Снежная плесень в условиях эпифитотийного развития болезни	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	2-2,5	Рожь озимая	Снежная плесень в условиях умеренного развития болезни, стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, спорынья	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Ячмень яровой, озимый	Твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5	Ячмень озимый	Снежная плесень в условиях эпифитотийного развития болезни	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Пшеница озимая	Снежная плесень в условиях умеренного развития болезни	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Ячмень озимый	Снежная плесень в условиях умеренного развития болезни	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2,5	Рожь озимая	Снежная плесень в условиях эпифитотийного развития болезни	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2-2,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль,гельминтоспор иозная корневая гниль, плесневение семян, спорынья	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Трифлуксистробин

Зато, ВДГ (500 г/кг) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-02-852-1 09.11.2015 08.11.2025	0,15	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	21(2)	7(3)	Активен
	0,15	Яблоня, груша	Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, аспергиллезная, горькая, плесневая)	Опрыскивание в период вегетации за 28 и 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	14(1-2)	7(3)	
	0,14	Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения: при диаметре плодов 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плодов более 4 см – 12-14 дней. До и после обработки данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробируринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух Расход рабочей жидкости -	14(2)	7(3)	
	0,14	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз, альтернариоз, черная (сажистая) пятнистость, филлостиктоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения: при диаметре плодов 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плодов более 4 см – 12-14 дней. До и после обработки данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробируринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух Расход рабочей жидкости -	14(2)	7(3)	
Знаток, ВДГ (500 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-3568-1 25.03.2022 24.03.2032	0,14	Груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения: при диаметре плодов 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плодов более 4 см - 12-14 дней. До и после обработки данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробируринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух Расход рабочей жидкости -	20(2)	-(3)	Активен
	0,15	Яблоня, груша	Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, аспергиллезная, горькая, плесневидная)	Опрыскивание в период вегетации за 28 и 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(1-2)	-(3)	
	0,15	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(2)	-(3)	

	0,14	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз, альтернариоз, черная (сажистая) пятнистость, филлостиктоз	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения: при диаметре плодов 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плодов более 4 см - 12-14 дней. До и после обработки данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробилуринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух Расход рабочей жидкости -	20(2)	-(3)	
--	------	--------	--	--	-------	------	--

Трифлуксистробин + Ципроконазол

Сфера макс, КС (375 г/л + 160 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-02-819-1 23.10.2015 019-02-819-1/252 252 22.10.2025	0,3	Свекла столовая	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезни, последующие – через 21 день или при появлении новых симптомов одной из болезни Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	7(2)	-(3)	Активен
	0,3	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезни, последующие – через 21 день или при появлении новых симптомов одной из болезни Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	21(2)	-(3)	

Фамоксадон + цимоксанил

Санитар, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-3620-1 13.04.2022 12.04.2032	6 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	14(4)	3(-)	Активен
	4 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	30(3)	3(-)	
	6 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	15(4)	3(-)	
	12 г/10 л воды (Л)	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 8 – 12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(3)	3(-)	
Тонус, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-02-3212-1 13.07.2021 12.07.2031	0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(2)	-(3)	Активен
	0,4	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(3)	-(3)	

	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале смыкания рядков; второе – в период бутонизации; третье – в конце цветения; четвертое – рост ягод и клубней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	15(4)	-(3)	
	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	14(4)	-(3)	
Улис, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-02-2619-1 23.03.2020 22.03.2030	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения, рост ягод и клубней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(4)	7(3)	Активен
	0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, фомоз, альтернариоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(2)	7(3)	
	0,4	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, фомоз, альтернариоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(3)	7(3)	
	0,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	
	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	14(4)	7(3)	
Танос КА, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО Кортева Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-02-4725-0 26.11.2024 25.11.2027	0,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое (до цветения), последующие с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(3)	7(3)	Активен
	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	14(4)	7(3)	
	4 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание растений в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м²	30(3)	7(-)	
	12 г/10 л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое (до цветения), последующие с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м²	21(3)	7(-)	

0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание растений в период вегетации первое профилактическое (4-6 настоящих листьев), бутонизация. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(2)	7(3)	
6 г/10 л воды (Л)	Томат (открытый грунт)	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	14(4)	7(-)	
0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения, рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	15(4)	7(3)	
0,5-0,6	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с и интервалом 8 -12 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(3)	7(3)	
0,4	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание растений в период вегетации первое профилактическое (4-6 настоящих листьев), бутонизация, начало цветения. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(3)	7(3)	
6 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения, рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	15(4)	7(-)	

Фенгексамид

Тельдор, ВДГ (500 г/кг) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-02-3024-1 19.02.2021 18.02.2031	0,8-1,2	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы роста и созревания ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	-(3)	Активен
---	---------	----------	-------------	---	-------	------	---------

фенпропидин + Прохлораз + Тебуконазол

Кантик, КЭ (150 г/л + 200 г/л + 100 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-02-3771-1 29.07.2022 28.07.2032	0,8-1,0	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации; обработка против церкоспореллёза осенью или рано весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	1,0	Церкоспореллёз	Мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: против церкоспореллёза – рано весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	1,0	Пшеница озимая	Церкоспореллёз	Опрыскивание в период вегетации; обработка против церкоспореллёза осенью или рано весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	

	0,8-1,0	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая и стеблевая ржавчина, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: против церкоспореллёза – рано весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Овёс	Красно-бурая пятнистость, стеблевая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	

Фитобактериомицин

<p>Фитолавин, ВРК (32 г/л+120000ЕА/мл) ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 ПП/П 831-02-3795-1 14.09.2022 13.09.2032</p>	20 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1-2)	2(1)	Активен
	20 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневая гниль, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевин стебля	Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие- после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней (постоянное место) Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение (постоянное место)	-(2)	-(1)	
	2,0	Огурец защищенного грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(1)	-(1)	
	20 мл/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	2(1)	
	2,0	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	-(2)	2(1)	
	1,5-2,0	Пшеница озимая, ячмень озимый	Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, базальный бактериоз, чёрный бактериоз	Опрыскивание в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	2(1)	
	20 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное и бактериальное увядание	Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие- после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней (рассада) Расход рабочей жидкости - 30-50 мл/растение (рассада)	-(2)	-(1)	
	6,0-8,0	Томат защищенного грунта	Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевин стебля	Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	-(2)	-(1)	
	2,0-3,0	Томат защищенного грунта	Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевин стебля	Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(1)	-(1)	
	20 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации в фазы: обособление бутонов, цветение, формирование плодов диаметром до 2,0 см, плодов диаметром до 4,0-5,0 см Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	-(4)	2(1)	

1,0-2,0	Яблоня	Бактериальный ожог	Опрыскивание в период вегетации в фазы: обособление бутонов, цветение, формирование завязи, плодов диаметром до 2,0 см, плодов диаметром до 4,0-5,0 см Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(5)	2(1)	
20 мл/10 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневая гниль, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля	Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие - после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 30-50 мл/растение (рассада)	-(2)	-(-)	
1,5-2,0	Пшеница озимая, ячмень озимый	Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, базальный бактериоз, чёрный бактериоз	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
2,0	Огурец защищенного грунта	Угловатая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	-(1)	2(1)	
20 мл/10 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное и бактериальное увядание	Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие - после высадки растений на постоянное место с интервалом 15 дней (постоянное место) Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение (постоянное место)	-(2)	-(-)	
2,0	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Полив под корень или опрыскивание в фазе 2-4 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	-(-)	
8,0	Томат открытого грунта	Бактериальная вершинная гниль, чёрная бактериальная пятнистость	Полив в период вегетации с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	-(2)	-(-)	
6,0-8,0	Огурец защищенного грунта	Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание	Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 4000 л/га	-(2)	-(-)	

флуазинам

Ширма, КС (500 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-02-1433-1 30.03.2017 018-02-1433-1/227 227 29.03.2027	5-7 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое в фазу «зеленый конус» или «розовый бутон», последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	30(3)	3(-)	Активен
	0,5-0,75	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое в фазу «зеленый конус» или «розовый бутон», последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	28(3)	-(3)	
	5-7 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(3)	3(-)	

	0,5-0,75	Виноград	Милдью, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	-(3)	
	3-4 мл/4 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	7(4)	3(-)	
	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	-(3)	
Ширлан, СК (500 г/л) ИСК Биосайенсис Юроп Н.В. ОГРН: - II/III 041-02-1705-1 31.01.2018 30.01.2028	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	7(4)	-(4)	Активен
Батлер, КС (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-02-3836-1 25.10.2022 24.10.2032	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу смыкания рядков, последующие – с интервалом 7–10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	3(4)	-(3)	Активен
Прегард, КС (500 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-02-4041-1 20.03.2023 19.03.2033	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в фазу смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(4)	-(3)	Активен
флуазинам + Азоксистробин							
Фланобин, КС (250 г/л + 200 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III 590-02-4192-1 08.09.2023 07.09.2033	0,5-0,75	Виноград	Оидиум, милдью, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1000 - 1500 л/га	29(3)	-(3)	Активен
	0,75	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	30(3)	-(3)	
флуазинам + Диметоморф							
Банджо Форте, КС (200 г/л + 200 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-02-2422-1	0,8-1,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	4(4)	-(3)	Активен

09.10.2019 08.10.2029	0,8-1,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	12(4)	-(3)	
Инсайд, СК (200 г/л + 200 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-3198-1 05.07.2021 04.07.2031	1,2	Виноград	Чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цветения, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	Активен
	0,8-1,0	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(4)	7(3)	
	9-12 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цветения, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	30(3)	3(3)	
	10 мл/ 3 л воды (Л)	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(3)	3(3)	
	0,9-1,2	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цветения, последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	7(3)	
	0,8-1,0	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(3)	7(3)	
	8-10 мл/ 3 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе смыкания рядков, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	20(4)	3(3)	

Флудиоксонил

Максим 480, КС (480 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-1018-1 09.03.2016 041-02-1018-1/220 220 08.03.2026	1-1,5	Капуста белокочанная	Черная ножка, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1-1,5	Лук-чернушка	Корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	1-1,5	Морковь	Корневые гнили, фузариозная и альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян Расход рабочей жидкости - 5-10 л/т	-(1)	-(-)	
Клеймор, СК (200 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-3060-1 18.03.2021	15-25 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Серая гниль, аспергиллезная гниль ягод	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод(в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст	20(3)	3(-)	Активен

021-02-3060-1/440 440 17.03.2031	1,5-2,5	Виноград	Серая гниль, аспергиллезная гниль ягод	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	7(3)	
	1	Яблоня	Парша, гнили плодов при хранении: монилиальная, горькая, пенициллезная, серая, оливковая плесневидная	Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов (за 21 и 10 дней до уборки урожая) Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	12(2)	7(3)	
	1,0-1,2	Лук (кроме лука на перо)	Шейковая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	7(3)	7(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша, гнили плодов при хранении: монилиальная, горькая, пенициллезная, серая, оливковая плесневидная	Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов (за 21 и 10 дней до уборки урожая) Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	12(2)	3(-)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша, гнили плодов при хранении: монилиальная, горькая, пенициллезная, серая, оливковая плесневидная	Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов (за 21 и 10 дней до уборки урожая) (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	12(2)	3(-)	
	15-25 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Серая гниль, аспергиллезная гниль ягод	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	20(3)	3(-)	
	10-12 мл/3л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Шейковая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	7(3)	3(-)	
Максим, КС (25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-4335-0 25.12.2023 24.12.2026	5,0-10,0	Свекла сахарная	Корнеед всходов (грибы родов фомы, ризиктония, фузариум), плесневение се-мян	Дражирование семян перед посевом	-(1)	-(-)	Активен
	0,4	Картофель семенной	Ризиктониоз, серебристая парша	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	5,0	Подсолнечник	Фомопсис, белая гниль, серая гниль, альтернариоз, плесневение семян,сухая ризопусная и сухая фузариозная гнили (семенная инфекция).	Протравливание се-мян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)	
	40 мл/1л воды (Л)	Картофель семенной	Ризиктониоз, серебристая парша	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг клубней	-(1)	-(-)	
Максим Дачник, КС (25 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода»	2 мл/300-500 мл воды	Горох на зерно	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, серая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 300 - 500 мл / 1 кг семян	-(1)	3(-)	Активен

ОГРН: 1037700040564 III/III 012-02-4653-1 09.08.2024 08.08.2034	2 мл/ 1 л воды	Чеснок яровой и озимый (посадочн ый материал)	Шейковая гниль, гниль донца, плесневение	Обработка перед посадкой и закладкой на хранение путем погружения в 0,2%-ю суспензию препарата с экспозицией 30 мин и последующим просуши-ванием Расход рабочей жидкости - 1 л/1 кг луковиц	-(1)	3(-)	
	2 мл/100 мл воды	Картофель семенной	Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, серебристая парша	Опрыскивание клубней перед закладкой на хранение и последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 100 мл/ 10 кг	-(1)	3(-)	
	2 мл/ 1 л воды	Цветочные культуры (посадочн ый материал)	Гельминтоспориоз, фузариоз, пенициллез, ризиктониоз, серая гниль	Обработка посадочного материала перед посадкой и закладкой на хранение путем погружения в 0,2%-й рабочий раствор экспозицией 30 мин и последующим просуши-ванием посадочного материала Расход рабочей жидкости - 1 л мл/1 кг посадочного материала	-(1)	3(-)	
	4 мл/100 мл воды	Картофель семенной	Ризиктониоз, фузариоз	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 кг	-(1)	3(-)	
	2 мл/ 1 л воды	Лук всех генераций	Шейковая гниль, гниль донца, плесневение	Обработка посадочного материала путем погружения в 0,2%-ю суспензию препарата с экспозицией 30 мин и последующим просуши-ванием Расход рабочей жидкости - 1 л/1 кг луковиц	40(1)	3(-)	
Геокс, ВДГ (500 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/-, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-498-1 30.12.2014 02.12.2034	0,4	Яблоня	Гнили при хранении: парша, монилиальная, кладоспориозная, пенициллезная, горькая, серая, альтернариозная, фузариозная, «мухосед»	Опрыскивание в период вегетации перед сбором плодов. Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	10(2)	7(3)	Активен
Синклер, СК (75 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-02-2593-1 13.03.2020 021-02-2593-1/376 376 12.03.2030	0,6	Чечевица	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 -10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	20 мл/ 1 л воды (Л)	Картофель	Ризиктониоз, фузариоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	
	0,6	Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,3	Картофель	Гнили при хранении: фузариозная гниль, фомозная гниль, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль	Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,6	Подсолнеч ник	Серая гниль, белая гниль, сухая ризопусная гниль, сухая фузариозная гниль, альтернариоз, фомопсис	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	1 мл/1 л воды (Л)	Клубнелук овичные цветочные культуры	Альтернариоз, фузариозная гниль луковиц, пенициллёзная гниль луковиц	Обработка посадочного материала путём погружения в 0,1 % рабочий раствор с экспозицией 30 минут и последующим просушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)	

0,4-0,6	Горох на зерно	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)
0,6	Люпин	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, антракноз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 -10 л/т	-(1)	-(-)
0,6	Горох на зерно	Фузариозное увядание, аскохитоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)
0,6	Нут	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)
1,3-1,6	Рапс яровой и озимый	Фузариозная корневая гниль, плесневение семян, альтернариоз, фомоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,6	Пшеница яровая, озимая	Плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,6	Пшеница озимая	Снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,4-0,6	Пшеница яровая, озимая	Твёрдая головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,6	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
20 мл/ 1 л воды (Л)	Картофель	Гнили при хранении: фузариозная, фомозная, мокрая бактериальная гниль, альтернариозная гниль	Обработка клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение с последующим подсушиванием Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
6,0-6,5	Лук чернушка	Шейковая гниль, фузариозная гниль донца, черная плесневидная гниль, белая гниль донца, пенициллезная гниль, плесневекние семян	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)
0,2-0,3	Картофель	Ризиктониоз, фузариоз	Обработка клубней до и во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2	Соя	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян (семенная инфекция)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, снежная плесень, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 8-10 л/т	-(1)	-(-)
0,4	Картофель	Ризиктониоз, фузариоз, серебристая парша	Обработка клубней до и вовремя посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

	5	Подсолнечник	Фомопсис, ложная мучнистая роса, белая гниль, серая гниль, сухая ризопусная гниль, фузариозная гниль, альтернариоз (семенная инфекция)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2	Картофель	Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, мокрая гниль, серебристая парша, антракноз	Обработка клубней перед закладкой на хранение Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Факир, КС (250 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/- 050-02-4750-0 09.12.2024 08.12.2027	0,12-0,18	Пшеница яровая и озимая	Снежная плесень, твердая головня, гельминтоспориозная гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,48	Подсолнечник на семена и масло	Фомопсис, ложная мучнистая роса, серая гниль, сухая гниль, сухая ризопусная гниль, фузариозная гниль, альтернариоз	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	0,12-0,18	Горох на зерно	Фузариозная гниль, афаномицетная гниль, питиозная гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, серая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)	
	0,18	Соя	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, аскохитоз, церкоспориз, фузариоз семян, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 8 л/т	-(1)	-(-)	

Флудиоксонил + Азоксистробин

Багрец, КС (50 г/л + 21 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/-, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/- 590(297)-02-2658-1 22.04.2020 21.04.2030	0,5-0,6	Кукуруза	Фузариозная корневая и стеблевая гниль, угольная стеблевая гниль	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, септориоз	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Флудиоксонил + Дифеноконазол

Максим Плюс, КС (25 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-3992-1 01.03.2023 28.02.2033	1,2-1,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, снежная плесень	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,5	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Фенозол, КС (25 г/л + 25 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/- 070-02-4756-1	1,2 -1,5	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен

16.12.2024 15.12.2034	1,2 -1,5	Пшеница озимая и яровая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--------------------------	----------	-------------------------	--	--	------	------	--

Флудиоксонил + Мефеноксам

Максим Голд, КС (25 г/л + 10 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-2077-1 29.01.2019 28.01.2029	1,25-1,5	Соя	Корневые гнили (в том числе питиозные), аскохитоз, церкоспороз, плесневение семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 4-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1	Кукуруза (на зерно)	Корневые (в том числе питиоз) и стеблевые гнили, плесневение семян, пузырчатая головня, пыльная головня	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	

Флудиоксонил + Тебуконазол + седаксан

Вайбранс Трио, КС (25 г/л + 10 г/л + 25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/- 041-02-2674-1 18.05.2020 17.05.2030	1,5-2,0	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная корневая гниль, плесневение семян, фузариозная снежная плесень, тифулезная снежная плесень	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-2,0	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Флудиоксонил + Тиаметоксам + Тебуконазол

Селест Макс, КС (25 г/л + 125 г/л + 15 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/- 041-01(02)-842-1 30.10.2015 29.10.2025	2	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-1,75	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2	Пшеница яровая, озимая	Пыльная головня	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-1,75	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Флудиоксонил + тритиконозол

Магнат Тотал, КС (25 г/л + 50 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/- 192-02-631-1 13.04.2015 12.04.2025	0,9-1	Ячмень яровой	Пыльная головня, ложная пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-0,9	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян,	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,9-1	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	0,8-0,9	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	---------	-------------------------------	--	---	------	------	--

Флудиоксонил + флуксапироксад + тритиконозол

Кинто Плюс, КС (33,3 г/л + 33,3 г/л + 33,3 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - ПП/- 015-02-2659-1 23.04.2020 22.04.2030	1,2-1,3	Пшеница яровая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,3	Рожь озимая	Корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,3	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, фузариозная снежная плесень и тифулезная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,3	Ячмень яровой	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,3	Тритикале озимая	Корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,3	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,2-1,3	Ячмень озимый	Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Флудиоксонил + Ципродинил

Инсигния, МД (140 г/л + 150 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/ПП 018-02-4187-1 31.08.2023 30.08.2033	0,8-1,0	Яблоня	Гнили при хранении: мониальная плодовая гниль, серая гниль, сизая плесневидная гниль (сизая плесень), пенициллезная гниль, кладоспориозная гниль, горькая гниль	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы начала зрелости плодов Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	10(2)	3(3)	Активен
	10 мл/10 л воды	Яблоня	Гнили при хранении: мониальная плодовая гниль, серая гниль, сизая плесневидная гниль (сизая плесень), пенициллезная гниль, кладоспориозная гниль, горькая гниль	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы начала зрелости плодов Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву	10(2)	3(3)	
	10 мл/10 л воды	Яблоня	Гнили при хранении: мониальная плодовая гниль, серая гниль, сизая плесневидная гниль (сизая плесень), пенициллезная гниль, кладоспориозная гниль, горькая гниль	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы начала зрелости плодов Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	10(2)	3(3)	

Флудиоксонил + Ципроконазол

Максим Экстрим, КС (18,7 г/л + 6,25 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/- 041-02-1338-1 25.01.2017 24.01.2027	2	Пшеница яровая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,75-2	Пшеница озимая	Пыльная головня, тифулезная снежная плесень	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,75	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,75	Овес	Покрытая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,75-2	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, тифулезная снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-1,75	Пшеница яровая	Твердая головня, фузариозная и гельминто-спориозна я корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5-1,75	Пшеница озимая	Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, ризоктониозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	2	Ячмень яровой и озимый	Пыльная, ложнаяпыльная головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

флудиоксонил + Мефеноксам

Фарватер, КС (25 г/л + 10 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 Ш/- 010-02-4417-1 15.02.2024 14.02.2034	1,25-1,5	Соя	Фузариозная, питиозная и ризоктониозная корневые гнили, аскохитоз, серая гниль, церкоспороз, фузариозное увядание, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0-2,0	Горох на зерно	Афаномицетная, фузариозная, питиозная и ризоктониозная корневые гнили, аскохитоз, фузариозное увядание, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	

флуксапироксад

Серкадис, КС (300 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - Ш/Ш 014-02-1508-1 24.05.2017 014-02-1508-1/249 249	0,15-0,2	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое в период начало образование соцветий-начало цветения, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	60(3)	7(3)	Активен
---	----------	----------	--------	--	-------	------	---------

23.05.2027	0,2-0,25	Картофель	Ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	60(1)	7(3)	
	0,7-0,83	Картофель	Ризоктониоз	Опрыскивание дна борозды перед посадкой Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)	7(3)	
Систива, КС (333 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/- 014-02-562-1 19.02.2015 014-02-562-1/112 112 18.02.2025	0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
	0,5-1	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5	Рожь озимая	Стеблевая головня, фузариозная корневая гниль, тифулезная снежная плесень	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

флуксапироксад + Пираклостробин

Приаксор, КЭ (75 г/л + 150 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-1635-1 07.12.2017 06.12.2027	0,5-1	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,5-1	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
Дэлит Макс, КС (250 г/л + 250 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/- 014-02-4434-1 27.02.2017 26.02.2027	0,3-0,5	Соя	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, плесневение семян, фузариозное увядание, аскохитоз, церкоспороз и септориоз (при раннем проявлении заболевания и умеренном развитии)	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 6-8 л/т	-(1)	-(-)	Активен

флуксапироксад + эпоксиконазол

Адексар, КЭ (62,5 г/л + 62,5 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-661-1 12.05.2015 11.05.2025	0,7-1,4	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах: появление флаг-листа и выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,4	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазах: появление флаг-листа и начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

флуоксастробин + Протиоконазол

Баритон, КС (37,5 г/л + 37,5 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/-	1,25-1,5	Ячмень озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	----------	---------------	--	--	------	------	---------

019-02-998-1 04.03.2016 03.03.2026	1,25-1,5	Пшеница озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,25-1,5	Ячмень яровой	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,25-1,5	Пшеница яровая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Фанданго, КЭ (100 г/л + 100 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-02-1542-1 29.08.2017 28.08.2027	1-1,25	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие-с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	14(4)	-(3)	Активен

флуоксастробин + Тебуконазол

Эвито Т, КС (180 г/л + 250 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - П/П, АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - П/П 201-02-4312-1 12.12.2023 201-02-2475-1/453 453 11.12.2033	0,5-1,0	Соя	Аскохитоз, септориоз, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, но не позднее фаз конец бутонизации – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,3	Подсолнечник	Серая гниль, белая гниль, альтернариоз, септориоз, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, начиная с конца фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,7-1,3	Подсолнечник	Серая гниль, белая гниль, альтернариоз, септориоз, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, начиная с конца фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 - 400 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	1,0	Пшеница яровая, озимая	Пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Рожь озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	

	0,7-1,0	Пшеница яровая, озимая	Септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Рапс яровой, озимый	Альтерналиоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Ячмень яровой, озимый	Темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя	Аскохитоз, септориоз, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, но не позднее фаз конец бутонизации - начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 - 400 л/га	50(1)	-(3)	

флуоксастробин + Тебуконазол + Клотиаидин + Протиоконазол

<p>Сценик Комби, КС (37,5 г/л + 5 г/л + 250 г/л + 37,5 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/- 019-01(02)-3932-1 09.01.2023 08.01.2033</p>	1,25-1,5	Ячмень яровой, озимый	Твёрдая (каменная) головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Пшеница яровая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,25-1,5	Пшеница яровая	Твёрдая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, септориоз (на ранних фазах)	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,25-1,5	Пшеница озимая	Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень, септориоз (на ранних фазах)	Протравливание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Флуопиколид + Пропамокарб гидрохлорид

<p>Пикокарб, СК (62,5 г/л + 625 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-02-3680-1 13.05.2022 12.05.2032</p>	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	7(4)	-(3)	Активен
--	---------	-----------	------------	--	------	------	---------

Флуопиколид + пропамокарб-гидрохлорид

<p>Инфинито, КС (62,5 г/л + 625 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III</p>	1,4-1,6	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней, Расход рабочей жидкости - 400 л/га	7(3)	7(3)	Активен
--	---------	-------------------------	--------------	---	------	------	---------

019-02-2311-1 15.07.2019 14.07.2029	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней, Расход рабочей жидкости - 400 л/га	7(2-4)	7(3)	
	1,6	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней, Расход рабочей жидкости - 400 л/га	7(3)	7(3)	

Флуопирам

Веранго, КС (400 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-02(05)-4372-1 30.01.2024 29.01.2034	0,6+0,6	Картофель	Альтернариоз	Первая обработка - обработка почвы при посадке клубней. Вторая обработка – внесение при поливе при высоте растений 20-30 см. Расход рабочей жидкости - 60-100 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,6+0,6	Картофель	Альтернариоз	Первая обработка - обработка почвы при посадке клубней. Вторая обработка – внесение при поливе при высоте растений 20-30 см. Расход рабочей жидкости - 10 000-20 000 л/га	60(2)	-(3)	

Флуопирам + Тебуконазол

Луна Экспириенс, КС (200 г/л + 200 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-02-2037-1 02.11.2018 019-02-2037-1/338 338 01.11.2028	0,75-1	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни. Последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	10(2)	3(3)	Активен
	0,75-1	Морковь	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	5(2)	3(3)	
	0,3-1	Арбуз	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое-при появлении заболевания, последующее – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(2)	3(3)	
	0,75-1	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни (в зависимости от прогноза развития и погодных условий), последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(2)	3(3)	
	1-1,2	Лук (на репку)	Гнили при хранении: гниль луковицы фузариозная, черная аспергиллезная гниль	Опрыскивание в период вегетации за 3-4 недели до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 300 л/га	15(1)	3(3)	
	0,75-1	Капуста белокочанная	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(2)	3(3)	

Флутриафол

Кэнсел, КС (250 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-02-1031-1 14.03.2016 13.03.2026	0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее в случае необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая и бурая, пятнистости сетчатая и темно-бурая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист-колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
Минхати, КС (250 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-02-3769-1 22.07.2022 197-02-3769-1/461 461 21.07.2032	0,5	Полба	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Рожь яровая, озимая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,1-0,15	Яблоня, груша, айва	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы «зеленый конус», «розовый бутон», после цветения (опадение 75% лепестков), по мелким плодам с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(4)	3(-)	
	0,5	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5	Тритикале яровая, озимая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,125	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения с последующим интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-800 л/га	30(4)	3(-)	
Флутривит, КС (250 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-02-5030-1 05.11.2019 04.11.2029	0,5	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазу – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начала колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
Флуафол, КС (250 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-02-4289-1 04.12.2023 03.12.2033	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
Флуплант, КС (250 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-02-3916-1	0,25	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие в случае необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	7(3)	Активен

20.12.2022 19.12.2032	0,125	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации в фазы: до цветения, после цветения, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	50(4)	7(3)	
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание посевов в период вегетации в фазы флаговый лист – колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	7(3)	
	0,5	Ячень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации в фазы флаговый лист – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	7(3)	
	0,1-0,15	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазах: зеленый конус, розовый бутон, после цветения (опадение 75 % лепестков), мелкие плоды с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1200 л/га	60(4)	7(3)	
Фитолекарь, КС (250 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - III/III 064-02-626-1 07.04.2015 06.04.2025	0,5	Пшеница озимая и яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактическое до появления первых признаков болезней, последующие – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	0,5	Ячень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость,	Опрыскивание в период вегетации профилактическое до появления первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
Форис, КС (250 г/л) Рейнбоу Кропсайенсиз Кфт. ОГРН: - III/III 606-02-3743-1 01.09.2015 31.08.2025	0,5	Ячень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ржавчина бурая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница озимая и яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаговый лист-колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее в случае необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
Аванс, ВДГ (800 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-02-1114-1 06.05.2016 05.05.2026	0,08	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие в случае необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	28(1-2)	-(3)	Активен
	0,15-0,2	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	

	0,2	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
Компакт, КС (250 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 П/П 446-02-1525-1 19.07.2017 18.07.2027	0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ржавчина бурая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флагового листа-колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие в случае необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
Флутриобел, КС (250 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/П 277-02-1776-1 27.02.2018 26.02.2028	0,5	Пшеница озимая и яровая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа-колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,25	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие в случае необходимости с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,5	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ржавчина бурая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы флаговый лист-выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	
Импакт 500, КС (500 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/П, «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/П 058-02-817-1/ 02.06.2015 058-01-674-1/118 118 01.06.2025	0,25	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пирено-фороз, фузариоз колоса (на слабом инфекционном фоне)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,12	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,25	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пирено-фороз, фузариоз колоса (на слабом инфекционном фоне)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,12	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	30(1-2)	-(3)	

0,25	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
0,12	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
0,25	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)	
0,25	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пирено-фороз, фузариоз колоса (на слабом инфекционном фоне)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
0,25	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз, пирено-фороз, фузариоз колоса (на слабом инфекционном фоне)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
0,25	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
0,25	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	40(1-2)	-(3)	

Флутриафол + Азоксистробин

Консул, КС (125 г/л + 125 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/П 058-02-480-1 18.12.2014 17.12.2024	1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	Не активен
	1	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 14-21 день, против фузариоза колоса – колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 14-21 день, против фузариоза колоса – колошение – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	

Флутриафол + Дифеноконазол

Медея, МЭ (30 г/л + 50 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-02-4498-1 01.04.2024 31.03.2034	1,0	Хвойные породы деревьев (питомники)	Снежное шютте	Опрыскивание поздно осенью перед установлением снежного покрова Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,0	Хвойные породы деревьев (питомники)	Обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	-(3)	

10 мл/10 л воды (Л)	Хвойные породы деревьев	Снежное шютте	Опрыскивание поздно осенью перед установлением снежного покрова Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста дерева и объема кроны)	-(1)	3(-)
0,8-1,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса, филлостиктоз, плодовая гниль; гнили плодов при хранении: монилиальная, пенициллезная, горькая	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(4)	-(3)
10 мл/10 л воды (Л)	Хвойные породы деревьев	Снежное шютте	Опрыскивание поздно осенью перед установлением снежного покрова Расход рабочей жидкости - 2 л/100 м ²	-(1)	3(-)
10 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Парша, мучнистая роса, филлостиктоз, плодовая гниль; гнили плодов при хранении: монилиальная, пенициллезная, горькая	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ² или 2-5 л/дерево	28(4)	3(-)
10 мл/10 л воды (Л)	Хвойные породы деревьев	Обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста дерева и объема кроны)	-(3)	3(-)
10 мл/10 л воды (Л)	Хвойные породы деревьев	Обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 2 л/100 м ²	-(3)	3(-)
0,8-1,2	Виноград	Оидиум, серая гниль, черная гниль, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(4)	-(3)
10 мл/10 л воды (Л)	Хвойные породы деревьев	Обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 3 недели Расход рабочей жидкости - 2 л/100 м ²	-(3)	3(-)
10 мл/10 л воды (Л)	Виноград	Оидиум, серая гниль, черная гниль, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	28(4)	3(-)

Флутриафол + Пропиконазол + Дифеноконазол

Капелла, МЭ (60 г/л + 120 г/л + 30 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-02-1103-1 04.05.2016 018-02-1103-1/476 476 03.05.2026	0,9-1	Ячень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Виноград	Оидиум, серая гниль, чёрная пятнистость, чёрная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	3(3)	
	0,9-1	Пшеница яровая и озимая	Церкоспореллезная прикорневая гниль при слабом развитии болезни	Опрыскивание в период вегетации в фазы выхода в трубку – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

	1	Пшеница озимая	Фузариоз колоса, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы выхода в трубку – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы выхода в трубку – начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	

Флутриафол + Тебуконазол

Импакт Супер, КС (75 г/л + 225 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/Ш 058-02-4179-1 14.08.2023 13.08.2033	0,9	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – начало колошения, против черни и фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,7-0,9	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,7-0,9	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина и желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (желтая пятнистость), чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флагового листа – начало колошения, против черни и фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,7-0,9	Рапс озимый, яровой	Альтернариоз, фомоз, белая гниль (склеротиниоз)	Опрыскивание озимого рапса осенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазах: вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе; ярового рапса – при появлении первых признаков одной из болезней в фазах: вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,75-0,9	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении единичных признаков болезни в фазу появления флагового листа; второе – начало выметывания метелок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(2)	-(3)	

Флутриафол + Тиabendазол

Виннер, КС (25 г/л + 25 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/- 178-02-2189-1 05.04.2019 04.04.2029	2	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,5	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

2,0	Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,5-2,0	Просо	Головня метелок, фузариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2	Подсолнеч ник (семена и масло)	Белая гниль (прикорневая форма), серая гниль (семенная инфекция), фомопсис, плесневение семян, фузариозная прикорневая гниль	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

фосэтил + Пропамокарб

Превикур Энерджи, ВК (310 г/л + 530 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - Ш/Ш 019-02-3930-1 09.01.2023 08.01.2023	3,0 л/га	Томат защищен ного грунта	Фитофтороз	Полив (капельный) растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	1(4)	1(3)	Активен
	2,5-3,0 л/га	Арбуз	Прикорневые гнили, пероноспороз	Опрыскивание в период всходов, последующее – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	3(2)	1(3)	
	2,5-3,0 л/га	Томат открытого грунта	Корневые и прикорне-вые гнили, фитофтороз	Полив (капельный) под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующий полив – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1700-2000 л/га	10(2)	1(3)	
	3,0 л/га	Огурец защищен ного грунта	Пероноспороз	Полив (капельный) растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 2000 л/га	1(4)	1(3)	
	3,0 мл/2 л воды (Л)	Огурец защищен-н ого грунта	Корневые и прикорневые гнили, пероноспороз	Полив почвы (субстрата) сразу после посева семян или полив рассады под корень через 14 дней после посева семян 0,15%-й рабочей жидкостью Расход рабочей жидкости - 2 л/м2	1(1)	1(3)	
	3,0 мл/2 л воды (Л)	Томат защищен ного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фитофтороз	Полив почвы (субстрата) сразу после посева семян или полив рассады под корень через 14 дней после посева семян 0,15%-й рабочей жидкостью Расход рабочей жидкости - 2 л/м2	1(1)	1(3)	
	2,5-3,0 мл/м2	Капуста белокочан ная (рассадное отделение)	Чёрная ножка	Полив грунта до или сразу после посева семян 0,15%-й рабочей жидкостью, последующий полив рассады – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1,7-2,0 л/м2	45(2)	1(3)	

3,0 мл/м2	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив субстрата перед или после посева семян 0,15%-й рабочей жидкостью Расход рабочей жидкости - 2 л/м2	1(1)	1(3)
2,5-3,0 л/га	Огурец открытого грунта	Корневые и прикорневые гнили, пероноспороз	Полив (капельный) под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующий полив – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1700-2000 л/га	3(2)	1(3)
3,0 мл/м2	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив рассады под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 14 дней после посева семян Расход рабочей жидкости - 2 л/м2	1(1)	1(3)
3,0 мл/м2	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив рассады под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 14 дней после посева семян Расход рабочей жидкости - 2 л/м2	1(1)	1(3)
3,0 мл/м2	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив субстрата перед или после посева семян 0,15%-й рабочей жидкостью Расход рабочей жидкости - 2 л/м2	1(1)	1(3)
30 мл/20 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, пероноспороз	Полив растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 20 л/100м2	1(5)	1(3)
30 мл/20 л воды (Л)	Томат защищенного грунта	Корневые и прикорневые гнили, фитофтороз	Полив растений под корень 0,15%-й рабочей жидкостью через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место, последующие поливы – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 20 л/100м2	1(5)	1(3)

Хлорокись меди

Абига-Пик, ВС (400 г/л) ООО «Сельхозхимия» ОГРН: 1066164204930 III/III 407-02-1316-1 26.12.2016 25.12.2026	40-50 г/10 л воды (Л)	Декоративные и цветочные культуры	Ржавчина, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации- 10л/100 м2	-(2)	3(3)	Активен
	2,8-4,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	20(3)	3(3)	
	2,4-9,6	Тополь, осина	Цитоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	3(3)	
	40 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации- 10л/100 м2	30(6)	3(3)	
	40-50 г/10 л воды (Л)	Слива, персик, абрикос, вишня, черешня	Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость	Опрыскивание в период вегетации- 10л/100 м2	30(4)	3(3)	
	50 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(5)	3(3)	
	7,8	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(6)	3(3)	
	2,9	Подорожник большой	Ржавчина белая, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	3(3)	

2,4	Наперстянка шерстистая, мята перечная	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	3(3)	
3	Лук всех генераций	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	20(3)	3(3)	
3	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, антракноз, бактериоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(3)	3(3)	
3,2-4,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(4)	3(3)	
4,8-9,6	Слива, персик, абрикос, вишня, черешня	Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	3(3)	
50 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	20(4)	3(3)	
50 г/10 л воды (Л)	Яблоня, груша, айва	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации- 10л/100 м ²	30(4)	3(3)	
2,4-9,6	Лиственные и хвойные	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	3(3)	
50 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, антракноз, бактериоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м ²	20(3)	3(3)	
2,8	Лен - долгунец	Антракноз, фузариоз	Опрыскивание по всходам в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	3(3)	
2,9-3,8	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(5)	3(3)	
50 г/10 л воды (Л)	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	20(3)	3(3)	
3	Лапчатка белая	Ржавчина	Опрыскивание 2-кратно на 1-м и 2-м году вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(3)	
3,6	Паслен дольчатый	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	3(3)	
50 г/10 л воды (Л)	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации- 10л/100 м ²	20(3)	3(3)	
2,4-4,4	Лаванда	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 500 л/га	20(3)	3(3)	
4,8-9,6	Яблоня, груша, айва	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	30(4)	3(3)	
Куприкол, КОЛР (200 г/л) ФГУП АО «КНИТИ-ВТ» ОГРН: - III/III	5	Яблоня	Парша (при умеренном развитии болезни) Опрыскивание в период вегетации в фазы зеленый конус, розовый бутон, конец цветения с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 800- 1000 л/га	30(3)	-(3)	Активен

056-02-1952-1 26.06.2018 25.06.2028	5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации в фенофазы: видимое образование соцветия, начало цветения, позднее цветение, ягода с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000- 1500 л/га	40(4)	-(3)
	5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: вытягивание стеблей; смыкание рядков; бутонизация – начало цветения с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 400- 600 л/га	40(3)	-(3)

Хлорокись меди + цимоксанил

Курзат Р КА, СП (689,5 г/кг + 42 г/кг) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 Ш/Ш 866-02-4726-0 26.11.2024 25.11.2027	2,5-3,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	5(3)	6(3)	Активен
	25-30 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	5(3)	3(-)	
	50-60 г/10 л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м²	21(3-4)	3(-)	
	2,5-3,0	Огурец защищённого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	3(3)	6(3)	
	2,0-2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	4(2)	6(3)	
	2,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	6(3)	
	50 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м²	4(2)	3(-)	
	2,5-3,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(3-4)	6(3)	

	50 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м²	20(3)	3(-)	
	25-30 г/10 л воды (Л)	Виноград	Мильдью	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м²	28(3-4)	3(-)	
	2,5-3,0	Виноград	Мильдью	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(3-4)	6(3)	

хлороталонил

Талант, СК (500 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-02-1800-1 19.04.2017 18.04.2027	2,5	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	3	Лук (семенник и)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(3)	-(3)	
	2,5	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	
	2,2-3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	-(3)	
	3	Томат (семенные посевы)	Фитофтороз, бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (при благоприятных условиях для развития болезней), последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	-(3)	
Браво, КС (500 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-02-2616-1 20.03.2020 19.03.2030	3,0	Томат (семенные посевы)	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое (при благоприятных условиях для развития болезней), последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	-(3)	Активен
	2,2-3,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	-(3)	

	3,0	Лук (семенник и)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(3)	-(3)	
	2,5	Ячмень яровой, озимый	Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость при слабом и умеренном развитии болезней	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	2,5	Пшеница яровая, озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, при слабом и среднем уровне развития болезней	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(2)	-(3)	
Банко, КС (500 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - П/П 201-02-1687-1 23.01.2018 22.01.2028	2-2,5	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина стеблевая, ржавчина бурая, ржавчина желтая (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	2,5	Пшеница яровая, озимая	Септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(1-2)	-(3)	
	2,5	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, ржавчина стеблевая (при слабом и умеренном развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	40(1-2)	-(3)	
Грэмми, КС (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-02-3685-1 18.05.2022 17.05.2032	2,2-3,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактическое, последующие через 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	-(3)	Активен
Пугил 500, КС (500 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - П/П 528-02-3802-1 23.09.2022 22.09.2032	2,5	Пшеница озимая и яровая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориоз при слабом и умеренном развитии болезней	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	Активен
	2,2-3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	-(3)	
	2,5	Ячмень яровой и озимый	Стеблевая ржавчина, карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость при слабом и умеренном развитии болезней	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	

	3	Томаты (семенные посевы)	Бурая пятнистость, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (при благоприятных условиях для развития болезней), последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	-(3)	
--	---	--------------------------------	----------------------------------	--	------	------	--

хлороталонил + Азоксистробин

Персео, КС (233 г/л + 68 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - П/Ш 528-02-4086-1 22.05.2023 21.05.2033	3,0	Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	3,0	Пшеница озимая и яровая	Стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, бурая ржавчина, мучнистая роса, фузариоз колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	

хлороталонил + цимоксанил

Миксанил, КС (375 г/л + 50 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - П/Ш 528-02-2114-1 21.02.2019 20.02.2029	2,0-2,2	Лук (семенные посевы)	Пероноспороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое (или при появлении первых признаков заболевания), последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	-(3)	-(3)	Активен
	1,8-2,2	Томат открытого грунта (семенные посевы)	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое (или при появлении первых признаков заболевания), последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	-(3)	-(3)	
	1,8-2,2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое (или при появлении первых признаков заболевания), последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-600 л/га	20(3)	-(3)	

Циазофамид

Ранман Топ, КС (160 г/л) ИСК Биосаенсис Юроп Н.В. ОГРН: - П/Ш 066-01-868-1 26.11.2015 25.11.2025	0,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	7(3)	-(3)	Активен
	0,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	7(3)	-(3)	
Либертадор, СК (160 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-02-3404-1	0,4-0,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	3(3)	3(3)	Активен

08.12.2021 07.12.2031	0,4-0,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	10(3)	3(3)	
Шпага, КС (160 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-02-3831-1 21.10.2022 20.10.2032	0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	7(3)	3(3)	Активен
	0,5	Виноград	Милдью, антракноз, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	7(3)	3(3)	
Хронос, КС (160 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-02-4400-1 01.02.2024 31.01.2034	0,5	Виноград	Милдью, антракноз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	7(3)	-(1)	Активен
	0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	7(3)	-(1)	

Циазофамид + Фосфит натрия

Милдикат, КС (25 г/л + 250 г/л) ИСК Биосаенсис Юроп Н.В. ОГРН: - III/III 066-02-3553-1 21.03.2022 20.03.2032	2-4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое (до цветения), последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(3)	3(3)	Активен
---	-----	----------	--------	---	-------	------	---------

цимоксанил

Витена 450, ВДГ (450 г/кг) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - III/III 528-02-3704-1 06.06.2022 05.06.2032	0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое- профилактическое, последующие – с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(6)	-(3)	Активен
	0,4	Лук-репка	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие – с интервалом 5-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	7(6)	-(3)	

цимоксанил + Мандипропамид

Кариал Флекс, ВДГ (180 г/кг + 250 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-3027-1 24.02.2021 23.02.2031	0,4-0,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(4)	-()	Активен
	0,4-0,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	15(4)	-(3)	

цимоксанил + Манкоцеб

<p>Рapid Голд, СП (80 г/кг + 640 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-02-3030-1 25.02.2021 24.02.2031</p>	1,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(2)	7(3)	Активен
	1,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(2)	7(3)	
	1,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(2)	7(3)	
<p>Моксимэйт, СП (80 г/кг + 640 г/кг) ИНДОФИЛ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД ОГРН: - П/П 159-02-1026-1 11.03.2016 10.03.2026</p>	1,5	Картофель	Фитофтороз,альтерна риоз	Опрыскивание в период вегетации: первое- профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	28(3)	7(3)	Активен
	1,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое –профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(4)	7(3)	
<p>Фортуна Голд, ВДГ (40 г/кг + 400 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-02-3050-1 16.03.2021 15.03.2031</p>	2,5-3,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	7(3)	3(3)	Активен
	2,5-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(3)	3(3)	
	2,5-3,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(3)	3(3)	
	2,5-3,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га	15(3)	3(3)	
	2,5-3,0	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	10(3)	3(3)	
<p>Наутиль, ВДГ (50 г/кг + 680 г/кг) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 П/П 148-02-3379-1 18.11.2021 17.11.2031</p>	1,8-2,0	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	21(2)	3(3)	Активен
	1,8-2,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(2)	3(3)	

	1,8-2,0	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(2)	3(3)	
	1,8-2,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	30(2)	3(3)	

цимоксанил + Меди хлорокись

Ордан, СП (42 г/кг + 689 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-02-2610-1 19.03.2020 18.03.2030	2,5-3,0	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	5(3)	7(3)	Активен
	25 г/8 л воды (Л)	Томат защищен ого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	3(3)	1(-)	
	25 г/5 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(3)	7(-)	
	2,5-3,0	Томат защищен ого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	3(3)	
	2,5-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(3)	7(3)	
	2,0-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядах или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	7(3)	
	2,5-3,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	5(3)	7(3)	

	2,5-3,0	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее 2 суток после инфицирования растений, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	3(3)	3(3)	
	25 г/5 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(3)	7(-)	
	2,0	Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	20(3)	7(3)	
	25 г/8 л воды (Л)	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	3(3)	1(-)	
	25 г/5 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое до смыкания ботвы в рядах или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(3)	7(-)	

цимоксанил + Фамоксадон

<p>Фамокс, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-02-2528-1 31.01.2020 30.01.2030</p>	0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	14(4)	3(3)	Активен
	0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(2)	3(3)	
	0,4	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазах: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(3)	3(3)	
	6 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	14(4)	3(3)	

	0,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(3)	3(3)	
	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в начале смыкания рядков; второе – в период бутонизации; третье – в конце цветения; четвертое – рост ягод и клубней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	15(4)	3(3)	
	6 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(4)	3(3)	
	12 г/10 л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(3)	3(3)	
Таношанс, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-2511-1 06.02.2020 05.02.2030	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, второе – бутонизация, третье – в конце цветения, четвертое – рост ягод и клубней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	15(4)	3(3)	Активен
	0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(2)	3(3)	
	0,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	30(3)	3(3)	
	0,4	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	50(3)	3(3)	
Целитель, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО «МосАгро» ОГРН: 1057747879342 III/III 175-02-1534-1 28.07.2017 27.07.2027	6 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, второе – бутонизация, третье – в конце цветения, четвертое – рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(4)	3(-)	Активен
	12 г/10 л воды(Л)	Лук-репка	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(3)	3(-)	
	6 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание: в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	14(4)	3(-)	

Профит Голд, ВДГ (250 г/кг + 250 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 ПП/П 012-02-2111-1 06.02.2019 05.02.2029	4 г/10 л воды(Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	30(3)	7(-)	Активен
	12 г/10 л(Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(3)	7(-)	
	6 г/10 л воды(Л)	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернаиз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом – 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	14(4)	7(-)	
	6 г/10 л воды(Л)	Картофель	Фитофтороз, альтернаиз	Опрыскивание в период вегетации: первое – до смыкания рядков, последующие с интервалом – 8-12 дней Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	15(4)	7(-)	

цимоксанил + Хлорокись меди

Курзат Р, СП (42 г/кг + 689,5 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - ПП/П 029-02-2069-1 08.02.2019 07.02.2029	25-30 г/10 л воды (Л)	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	5(3)	3(-)	Активен
	50 г/10 л воды (Л)	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(3)	3(-)	
	2,5-3,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	28(3-4)	6(3)	
	2,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)	6(3)	
	50-60 г/10 л воды (Л)	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(3-4)	3(-)	
	2-2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	4(2)	6(3)	
	2,5-3,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(3-4)	6(3)	

	50 г/10 л воды (Л)	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	4(2)	3(-)	
	25-30 г/10 л воды (Л)	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	28(3-4)	3(-)	
	2,5-3,0	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га	3(3)	1(-)	
	2,5-3,0	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	5(3)	6(3)	

цимоксанила + Меди гидроксид

Копфорс Экстра, ВДГ (60 г/кг + 461 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 Ш/Ш, Агрия АД ОГРН: - Ш/Ш 184(026)-02-4155-1 12.07.2023 11.07.2023	1,5 - 2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 10 – 12 дней Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	3(2)	3(3)	Активен
	1,5 - 2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 10 – 12 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	5(2)	3(3)	
	1,5 - 2,5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 10 – 12 дней Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	7(4)	3(3)	
	1,5 - 2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 10 – 12 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	14(3)	3(3)	
	1,5 - 2,5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое при появлении первых признаков заболеваний, последующие с интервалом 10 – 12 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	8(3)	3(3)	

Цинеб + Меди хлорокись

Цихом, СП (150 г/кг + 370 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 Ш/Ш,	6,0-8,0	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание в период вегетации в фазы: зелёный конус, обособление бутонов, последующие – с интервалом 10-12 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(5)	3(3)	Активен
--	---------	---------------	-------	--	-------	------	---------

Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-02-2444-1 31.10.2019 30.10.2029	2,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее - с интервалом 7-12 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	20(5)	3(3)	
	4,0-6,0	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(5)	3(3)	

Ципродинил

Плантенол Нео, ВДГ (500 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-02-4358-1 12.01.2024 11.01.2034	0,5	Вишня, черешня, слива	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое– при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	5(2)	7(3)	Активен
	0,3-0,5	Вишня, черешня, слива	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое- до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	5(2)	7(3)	
	3-5 г/ 10 л воды (Л)	Вишня, черешня, слива	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое- до цветения, последующее –с интервалом 7-10 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	5(2)	7(3)	
	5 г/ 10 л воды (Л)	Вишня, черешня, слива	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое– при появлении первых признаков заболевания, второе –за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	5(2)	7(3)	
	3 г/ 10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(2)	7(3)	
	0,3	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	60(2)	7(3)	
Приам, КЭ (250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-02-3071-1 25.03.2021 24.03.2031	1,8-2,1	Виноград	Серая гниль, черная аспергиллезная гниль ягод	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация – начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	19(3)	7(3)	Активен
	0,6-1,1	Слива, вишня, черешня	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	7(3)	
	0,6-1,1	Слива, вишня, черешня	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	7(3)	

	0,6-1,1	Персик	Кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	7(3)	
	0,6	Яблоня, груша	Парша, монилиальная плодовая гниль, мучнистая роса (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	59(2)	7(3)	
	1,1	Персик	Монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе- за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	7(3)	
	1,1	Слива, вишня, черешня	Монилиальная плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(2)	7(3)	
Хорист, ВДГ (750 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-3273-1 25.08.2021 24.08.2031	0,2	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	39(2)	3(3)	Активен
	0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(2)	3(3)	
	0,2-0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(2)	3(3)	
	0,6-0,7	Виноград	Серая гниль, белая гниль, комплекс гнилей ягод: оливковая, плесневидная, черная аспергиллезная, водянистая ризопусная	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация – начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(3)	3(3)	
	0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	10(2)	3(3)	
Хортон, КС (250 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-02-3302-1 17.09.2021 16.09.2031	0,35	Плодовые косточковые (слива, персик, абрикос, вишня, черешня)	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(2)	7(3)	Активен
	0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(2)	7(3)	

Хорус, ВДГ (750 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271	10 мл/10 л воды (Л)	Плодовые косточков ые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(2)	3(-)	Активен
	2 г/10 л воды (Л)	Груша, яблоня	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	28(2)	7(3)	
	10 мл/10 л воды (Л)	Плодовые косточков ые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(2)	3(-)	
	6-10 мл/10 л воды (Л)	Плодовые косточков ые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(2)	3(-)	
	0,35	Плодовые косточков ые (слива, персик, абрикос, вишня, черешня)	Монилиальная плодовая гниль, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	7(3)	
	3,5 г/10 л воды (Л)	Плодовые косточков ые (слива, персик, абрикос, вишня, черешня)	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(2)	7(3)	
	3,5 г/10 л воды (Л)	Плодовые косточков ые (слива, персик, абрикос, вишня, черешня)	Монилиальная плодовая гниль, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(2)	7(3)	
	6 мл/10 л воды (Л)	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	28(2)	3(-)	
	3,5 г/10 л воды (Л)	Плодовые косточков ые (слива, персик, абрикос, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое - до цветения, последующее - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	15(2)	7(3)	
	0,2-0,35	Плодовые косточков ые (слива, персик, абрикос, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, последующее - с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	7(3)	
	0,2	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(2)	7(3)	

III/III 041-02-4412-0 15.02.2024 14.02.2027	0,6-0,7	Виноград	Серая гниль, комплекс гнилей ягод	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация - начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(3)	7(3)	
Флокс, ВДГ (750 г/кг) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-02-4113-1 30.03.2017 29.03.2027	0,6-0,7	Виноград	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация – начало цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	19(3)	-(3)	Активен
	0,2	Яблоня, груша	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	40(2)	-(3)	
Кантор, ККР (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-02-2219-1 06.05.2019 05.05.2029	1,7-2,6	Виноград	Серая гниль, черная гниль, комплекс гнилей ягод: плесневидная оливковая, ризопусная, аспергиллезная	Опрыскивание в период вегетации: 1-е в фазу бутонизации – начало цветения, 2-е перед смыканием ягод в грозди, 3-е в фазу начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	10(3)	3(3)	Активен
	0,75-1,3	Слива, вишня, черешня	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, последующее с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	3(3)	
	0,75-1,3	Слива, вишня, черешня	Монилиальная гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, второе - за 14 дней до уборки урожая Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	3(3)	
	0,75-1,3	Слива, вишня, черешня	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(2)	3(3)	
	0,65-0,75	Яблоня, груша	Парша, монилиоз, альтернариоз, мучнистая роса, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации 2-кратно: 1-е в фазу «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	28(2)	3(3)	
АгроШлем, ВДГ (750 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-02-4740-1 28.11.2024 27.11.2034	0,2	Яблоня, груша, айва	Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	25(2)	3(3)	Активен
	0,2-0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Монилиальный ожог	Опрыскивание в период вегетации: первое - до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(2)	3(3)	
	0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(2)	3(3)	

	0,35	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Кластероспориоз, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(2)	3(3)	
--	------	---	-----------------------------	--	-------	------	--

Ципродинил + Флудиоксонил

Свитч, ВДГ (375 г/кг + 250 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 ПП/П 041-02-2642-1 06.04.2020 05.04.2030	0,8-1,0	Виноград	Серая гниль, белая гниль, комплекс гнилей ягод (плесневидная пенициллезная, аспергиллезная, ризопусная)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: конец цветения, перед смыканием ягод в грозди, начало окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	14(3)	3(3)	Активен
	0,75-1,0	Земляника садовая	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – в фазе начало цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 200-500 л/га	14(3)	3(3)	
	0,8-1,0	Томат защищенного грунта	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га	3(3)	3(3)	

Ципроконазол

Алькор, КС (400 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 ПП/П 002-02-2427-1 15.10.2019 14.10.2029	0,2	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса (при умеренном развитии)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,2	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,15	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса (при интенсивном развитии)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(2)	-(3)	
	0,15-0,2	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,2	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
Рекрут, КС (400 г/л) ООО «Сибгροхим» ОГРН: 1025402493555 ПП/П, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 ПП/П 043(042)-02-3086-1 01.04.2021 31.03.2031	0,2	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса (при умеренном развитии)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	-(3)	Активен
	0,1	Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, стеблевая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,15-0,2	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	

0,15-0,2	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1)	-(3)	
0,15	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса (при интенсивном развитии)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(2)	-(3)	
0,2	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(-)	-(3)	

Ципроконазол + Азоксистробин

Амистар Экстра, СК (200 г/л + 80 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-02-2076-1 29.01.2019 28.01.2029	0,8-1	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	77(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз, склеротийоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	56(1)	-(3)	
	0,5-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	70(2)	-(3)	
	0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина, фузариозная пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1	Рожь озимая	Бурая, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, оливковая плесень	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – при необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения-начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)	
	0,5-1	Кукуруза	Фузариозно-гельминтоспориозные прикорневые и стеблевые гнили, северный гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Триактив Экстра, КС (80 г/л + 200 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 Ш/Ш 097-02-2182-1	0,5-1	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(2)	-(3)	Активен

02.04.2019
01.04.2029

0,5-1	Люпин	Септориоз, ржавчина, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу стеблевания, второе – в фазу бутонизация – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	-(2)	-(3)
0,5-1	Кукуруза	Прикорневые и стеблевые фузариозные гнили, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
0,5-1	Соя	Антракноз, церкоспороз, ржавчина, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)
0,5-1	Рожь озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(2)	-(3)
0,5-1	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
0,5-1	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(2)	-(3)
0,8-1	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, фомоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)
0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(2)	-(3)
0,5-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	48(2)	-(3)
0,5-1	Сахарная свекла	Альтернариоз, фомоз, церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)
0,5-1	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина, фузариозная пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	48(2)	-(3)
0,5-1,0	Кукуруза (на зерно и масло)	Гельминтоспориоз, фузариоз початков	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)
0,75-1	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)
0,5-0,75	Соя	Аскохитоз, альтернариоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)

Стробишанс Про,
СК
(80 г/л + 200 г/л)
ООО «Шанс»
ОГРН: 1093668046812
П/Ш
126-02-2047-1
14.02.2025
14.02.2035

Активен

	0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	48(2)	-(3)	
	0,75-1,0	Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, фомоз, белая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	48(2)	-(3)	
	0,5-1	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, оливковая плесень	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – по необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	48(2)	-(3)	

Ципроконазол + Ацетамиприд + Флудиоксонил

Кинг Комби, КС (8,3 г/л + 100 г/л + 34 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/- 178-02-2613-1 19.03.2020 178-02-2613-1/383 383 18.03.2030	1,2-1,5	Ячмень озимый и яровой	Твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,2-1,5	Пшеница озимая и яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, в т.ч. альтернариозная семенная инфекция, септориоз, мучнистая роса (на ранних фазах)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,4	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, фузариоз	Обработка клубней до и во время посадки Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Пшеница озимая и яровая	Пыльная головня	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,3-1,5	Пшеница озимая	Снежная плесень	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Ципроконазол + Дифеноконазол

Алькасар, КС (6,3 г/л + 30 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 Ш/- 002-02-3585-1 04.04.2022 03.04.2032	0,75-1	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1-1,5	Ячмень яровой и озимый	Твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

	1	Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, септориоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Даймонд Супер, КС (6,3 г/л + 30 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/- 192-02-3854-1 02.11.2022 01.11.2032	0,75	Овес	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	1,0	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Ячмень яровой	Каменная головня, сетчатая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,5	Ячмень яровой	Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1,0	Ячмень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5	Ячмень озимый	Пыльная и каменная головня, ложная (черная) пыльная головня, темно-бурая и сетчатая пятнистости, гельминтоспориозная и фузариозная и корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,75-1,0	Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Овес	Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1,0	Пшеница яровая	Пыльная головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
Ципресс, КЭ (150 г/л + 250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-4478-0 28.03.2024 27.03.2027	0,3-0,6	Подсолнечник	Ржавчина, септориоз, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)	Активен

Ципроконазол + Пентиопирад

Абруста, КС (60 г/л + 150 г/л) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-02-1475-1 24.04.2017 23.04.2027	1-1,3	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, пиренофороз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезней, последующие с интервалом 14-28 дней Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	21(1-2)	-(3)	Активен
	1-1,3	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезней, последующие с интервалом 14-28 дней Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	21(1-2)	-(3)	
	1-1,3	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одной из болезней Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	21(1)	-(3)	

Ципроконазол + Пикоксистробин

Аканто Плюс КА, КС (г/л + 200 г/л) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-02-4773-0 10.01.2025 09.01.2028	0,5-0,6	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная стеблевая гниль, плесневение початков, гельминтоспориоз на листьях	Опрыскивание в период вегетации: видимое образование междоузлий - выбрасывание метелки – цветение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	41(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Рапс озимый	Склеротиниоз (белая гниль), альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: осенью 5-6 листьев, весной вытягивание стеблей. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,5-0,6	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой	Склеротиниоз (белая гниль), альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков болезни или начало образования стручков. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,7	Горох	Аскохитоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: бутонизация. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	39(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Подсолнеч ник	Белая гниль корзинок, серая гниль корзинок, сухая ризопусная гниль корзинок, септориоз листьев, альтернариоз, фомоз, фомосис, ржавчина, ложная мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: 6-8 листьев или при высоте растений 60-80 см – бутонизация. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	40(1-2)	-(3)	

0,6	Пшеница яровая, озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,5-0,6	Соя	Пероноспороз, церкоспороз, септориоз, аскохитоз, антракноз, фузариозное увядание, альтернариоз, фузариоз листьев	Опрыскивание в период вегетации: бутонизация – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)
0,5-0,6	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, желтая ржавчина, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)
0,5-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	28(2)	-(3)
0,7	Рис	Пирикуляртиоз	Опрыскивание в период вегетации: появление флаг-листа начало выметывания метелки. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	55(1)	-(3)
0,5-0,6	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)
0,7	Рис	Пирикуляртиоз	Опрыскивание в период вегетации: появление флаг-листа начало выметывания метелки. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 300 л/га	55(1)	-(3)

Ципроконазол + Пропиконазол

Аваксс, КЭ (80 г/л + 250 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-02-672-1 02.06.2015 082-02-672-1/462 462 01.06.2025	0,4-0,5	Овес	Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гельминтоспориозны е пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Горох	Аскохитоз, ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	45(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Альпари, КЭ (80 г/л + 250 г/л) ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 Ш/Ш, ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 Ш/Ш 549(347)-02-4262-1 23.11.2023 22.11.2033	0,4-0,5	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Мучнистая роса, ржавчина (бурая, стеблевая, желтая, карликовая), септориоз листьев и колоса, пиренофороз, ринхоспориоз, гелиминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
Цимус Прогресс, КЭ (80 г/л + 250 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 Ш/Ш 010-02-3371-1 16.11.2021 15.11.2031	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Ячмень яровой и озимый	Гелиминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Горох	Ржавчина, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
Пропишанс Супер, КЭ (80 г/л + 250 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 Ш/Ш 126-02-4544-1 03.05.2024 02.05.2034	0,4-0,5	Овес яровой	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	

	0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(1-2)	-(3)	
	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	
Атлант Супер, КЭ (80 г/л + 250 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 П/П 023-02-1368-1 16.02.2017 15.02.2027	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз, пиренофороз, фузариоз (частичное действие)	Опрыскивание посевов в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

Ципроконазол + Пропиконазол + Бензовиндифлупир

Элатус Риа, КЭ (66,67 г/л + 208,33 г/л + 83,33 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-02-2075-1 29.01.2019 28.01.2029	0,4-0,6	Ячмень яровой	Тёмно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, тёмно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	40(1)	-(3)	

Ципроконазол + Протиоконазол

Прицел, КЭ (80 г/л + 125 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 П/П, ООО «АП Протекшен» ОГРН: 1077203028528 П/П 038(954)-03-4739-1 27.11.2024 26.11.2034	0,4-0,7	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, полосатая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	Активен
	0,4-0,7	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	

Ципроконазол + Протиоконазол + Тебуконазол + Пропиконазол

Альтазол, КЭ (80 г/л + 250 г/л + 200 г/л + 300 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/П, ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости - 300 л/га	39(1-2)	-(3)	Активен
	0,4	Пшеница озимая, яровая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

П/Ш 046-02-4728-0 26.11.2024 23.04.2033	0,4-0,6	Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	-(3)	
	0,4-0,5	Зерновые колосовые озимые, яровые, за исключением овса	Ржавчина бурая, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина и карликовая; мучнистая роса, септориоз листьев и колоса; пиренофороз, тесно-бурая, сетчатая и полосатая пятнистость; ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. (Озимые обрабатываются весной). Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)	
	0,3-0,4	Ячмень озимый, яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,5-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина и желтая ржавчина, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,4-0,6	Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2-3 недели Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	14(2)	-(3)	

Ципроконазол + Тебуконазол

Фарго, КС (80 г/л + 250 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-02-2987-1 22.01.2021 21.01.2031	0,4-0,5	Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	30(2)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	30(2)	-(3)	

Ципроконазол + Тебуконазол + Азоксистробин

ТриАгро, КС (40 г/л + 120 г/л + 100 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 П/Ш 023-02-1428-1 29.03.2017 023-02-1428-1/460 460 28.03.2027	0,2-0,3	Ячмень яровой и озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня, каменная головня, гелиминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	

0,5 л/га	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, ржавчина, серая гниль, септориоз, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	-(3)	
0,8-1	Пшеницаяровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза и черни колоса в фазу конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
1,0	Пшеницаяровая и озимая	Фузариоз и чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации; против фузариоза и черни колоса в фазу конец колошения – начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
0,5 л/т	Соя	Аскохитоз, фузариозная корневая гниль, церкоспороз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
0,2-0,3	Кукуруза	Пузырчатая и пыльная головня соцветий, корневые и стеблевые гнили, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
0,2-0,3	Пшеницаяровая и озимая	Пыльная головня, твердая головня фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних стадиях развития)	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Ципроконазол + Тиabendазол + Прохлораз + Ципроконазол + Прохлораз + Тиabendазол

<p>Виал Трио, ВСК (5 г/л + 30 г/л + 120 г/л + 5 г/л + 120 г/л + 30 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/-, АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/- 021-02-1702-1 27.02.2015 15.12.2027</p>	0,8 - 1,25	Зерновые колосовые озимые и яровые (за исключением овса)	Твердая головня, твердая (каменная) головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень, мучнистая роса	Обработка семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8 - 1,25	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, мучнистая роса	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,8 - 1,25	Пшеницаяровая, озимая	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень, мучнистая роса	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года) Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Ципроконазол + эпоксиконазол

<p>Ракурс, СК (160 г/л + 240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш</p>	4 мл/5 л воды	Декоративные деревья и кустарники и хвойных пород	Снежное и обыкновенное шютте, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от размера растений) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/ дерево или куст (в зависимости от размера растений)	-(2)	3(-)	Активен
---	---------------	---	--	---	------	------	---------

021-02-4515-0
11.04.2024
10.04.2027

0,2-0,3	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,2	Соя	Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	56(2)	-(3)
0,4-0,5	Горох	Аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)
0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа - выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа - начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения - начало цветения Расход рабочей жидкости - 50 л/га	37(2)	-(3)
0,3-0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(2)	-(3)
0,2-0,3	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
4 мл/5 л воды	Декоратив ные деревья и кустарник и лиственны х пород	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от размера растений) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дереву или куст (в зависимости от размера растений)	-(2)	3(-)
0,3-0,4	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появление флагового листа - выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 50 л/га	37(2)	-(3)
4 мл/5 л воды	Цветочные и декоративн ые однолетни е и многолетн ие, в том числе цветочные луковичны е	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации (в зависимости от размера растений) Расход рабочей жидкости - 1-5 л/ 100 м2 (в зависимости от размера растений)	-(2)	3(-)

	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа - начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения - начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)	
--	---------	-------------------------	--	---	-------	------	--

цифлуфенамид + Дифеноконазол

Динали, ДК (30 г/л + 60 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-02-1294-1 12.12.2016 11.12.2026	0,5-0,7	Виноград	Оидиум, чёрная гниль	Опрыскивание в период вегетации в фазы: бутонизация-цветение, до смыкания ягод в грозди и с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	15(3)	7(3)	Активен
--	---------	----------	----------------------	--	-------	------	---------

Эмаектин бензоат + Эмаектин бензоат + Люфенурон

Проклэйм Фит, ВРГ, ВДГ (50 г/л + 50 г/кг + 400 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/L, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/L 041-02-3036-1 02.03.2021 26.10.2033	0,16	Томат защищенного грунта	Южноамериканская томатная моль, совки	Опрыскивание растений в период массовой яйцекладки Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	7(2)	1(-)	Активен
	0,16	Томат открытого грунта	Хлопковая совка	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	5(2)	3(3)	
	0,15-0,2	Яблоня	Яблонная плодожорка, минирующие моли	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га	30(3)	3(3)	
	0,14	Виноград	Гроздевая листовёртка	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 400-800 л/га	7(2)	3(3)	
	0,15-0,2	Персик	Восточная плодожорка	Опрыскивание растений в период массовой яйцекладки Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	30(3)	3(3)	

эпоксиконазол

Рекс С, КС (125 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-789-1 05.10.2015 04.10.2025	0,6-0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, комплекс пятнистостей листьев и колоса (септориоз, гельминтоспориозы, ринхоспориоз), оливковая плесень	Опрыскивание в период вегетации в зависимости от времени появления первых признаков одного из заболеваний или заблаговременно (профилактическое опрыскивание) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, комплекс пятнистостей листьев и колоса (септориоз, пиренофороз, темно-бурый гельминтоспориоз), оливковая плесень	Опрыскивание в период вегетации в зависимости от времени появления первых признаков одного из заболеваний или заблаговременно (профилактическое опрыскивание) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	

эпоксиконазол + Азоксистробин

Спирит, СК (160 г/л + 240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-02-4486-0 29.03.2024 28.03.2027	0,4-0,5	Нут	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков болезни, второе через 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации, 1-е опрыскивание – профилактическое; последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(3)	-(3)	

0,5-0,8	Подсолнечник	Фомопсис, фомоз, серая гниль, белая гниль, альтернариоз, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации, 1-е опрыскивание - при появлении первых признаков болезни; следующая через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	56(2)	-(3)
0,6 - 0,7	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа - начало колошения; против фузариоза колоса: конец колошения - начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,8	Лук (кроме лука на перо)	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации, 1-е опрыскивание – профилактическое; последующие с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	20(3)	-(3)
0,4-0,6	Кукуруза	Гельминтоспориозные и фузариозные стеблевые (включая прикорневые) гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков	Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий или вымётывание метёлок Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	51(1)	-(3)
0,6 - 0,7	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа - начало выдвижения колоса Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,6 - 0,7	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,5- 0,6	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,5 - 0,6	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	37(2)	-(3)
0,3	Соя	Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, церкоспороз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	56(2)	-(3)
0,5-0,7	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое или при проявлении первых признаков одного из заболеваний, второе через 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(2)	-(3)

эпоксиконазол + Дифеноконазол + Крезоксим-метил

Терапевт Про, КС (125 г/л + 80 г/л + 125 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-02-1134-1 27.06.2016 26.06.2026	0,5-0,7	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая и темно-бурая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа – выдвижение колоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, ржавчина, серая гниль, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации в фазы бутонизация-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

	0,5-0,7	Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флагового листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)	
	0,7-0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, ржавчина, серая гниль, фомоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев и бутонизация-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	
	0,7-0,9	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	28(2)	-(3)	

эпоксиконазол + Крезоксим-метил

Идеал, КС (250 г/л + 250 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-02-3329-1 06.10.2021 05.10.2031	0,2 - 0,4	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 л/га	41(2)	-(3)	Активен
	0,2 - 0,4	Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 л/га	41(2)	-(3)	

эпоксиконазол + Крезоксим-метил + Тебуконазол

Венто, КС (116 г/л + 125 г/л + 140 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-02-2631-1 26.03.2020 25.03.2030	0,6-0,8	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	
	0,8	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы образования 2-3-го узла – выдвигание колоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа – начало колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,8	Ячмень озимый	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазы конец колошения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,7-0,8	Подсолнечник	Фомопсис, фомоз, серая гниль, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

эпоксиконазол + Пиракlostробин

Абакус Ультра, СЭ (62,5 г/л + 62,5 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-3672-1 29.04.2022 28.04.2032	1-1,5	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
	1,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	-(3)	
	1,25-1,75	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(2)	-(3)	
	1,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	-(3)	
	1,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1)	-(3)	
Абакус Прайм, СЭ (62,5 г/л + 85 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-2929-1 17.12.2020 014-02-2929-1/379 379 16.12.2030	0,9-1,4	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, ржавчина желтая	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,9-1,4	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая	Опрыскивание растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
	0,8-1,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 300 л/га	20(1-2)	-(3)	

эпоксиконазол + Фенпропиморф

Рекс Плюс, СЭ (84 г/л + 250 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III, «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-02-3657-1 27.04.2022 26.04.2032	0,6-1	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее –с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)	Активен
	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	29(1)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний Расход рабочей жидкости - 300 л/га	29(1)	-(3)	

эпоксиконазол + Ципроконазол

<p>Флинт, ВСК (120 г/л + 80 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-02-1932-1 31.05.2018 30.05.2028</p>	0,7-0,8	Ячмень яровой и озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспориоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(2)	-(3)	
	0,7-0,8	Пшеница яровая и озимая	Пиренофороз, септор иоз листьев и колоса	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)	-(3)	
	0,7-0,8	Подсолнеч ник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомопсис, фомоз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя	Альтернариоз, аскохитоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(2)	-(3)	

Эфирные масла тимьяна и перечной мяты

<p>Нопас, ВЭ (300 г/л) ООО «КОППЕРТ РУС» ОГРН: 1157746216297 III/- 548-02-2737-1 27.08.2020 26.08.2030</p>	1,0	Томат защищенн ого грунта	Корневые и прикорневые гнили	Полив растений в фазе всходов и через 21 день после первой обработки Расход рабочей жидкости - 250 л/га	-(2)	-(-)	Активен
--	-----	---------------------------------	---------------------------------	---	------	--------	---------

Гербицид

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применени я препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатыв аемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизиро ванных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

2,4-Д (2-этилгексилловый эфир и диметилалкиламинная соль)

<p>Октапон-супер, КЭ (470 г/л) ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» ОГРН: - II/II, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 II/II 068(116)-03-655-1 30.03.2015 29.03.2025</p>	0,5-0,6	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	Не активен
	1,5-2	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	

2,4-Д (2-этилгексилловый эфир)

<p>Зерномакс, КЭ (500 г/л) АО Фирма «Август»</p>	0,8	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	55(1)	-(3)	Активен
--	-----	-------------------	--	--	-------	------	---------

ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-2166-1 27.03.2019 26.03.2029	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	55(1)	-(3)	
Октапон экстра, КЭ (500 г/л) ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» ОГРН: - П/Ш, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 П/Ш 068(116)-03-605-1 23.03.2015 22.03.2025	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Тимофеевк а луговая, райграс высокий, овсяница луговая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га	60(1)	-(3)	
Рапира, КЭ (564 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/Ш 082-03-3604-1 14.04.2022 13.04.2032	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Эксифир, КЭ (564 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Л 085-03-3499-1 02.03.2022 29.02.2032	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	57(1)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	57(1)	-(3)	

2,4-Д (2-этилгексилловый эфир) + дикамба (диметилалкиламинная соль)

Чисталан-супер, КЭ (500 г/л + 100 г/л) ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» ОГРН: - П/Ш, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 П/Ш 068(116)-03-692-1 02.07.2015 01.07.2025	0,45-0,65	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев однолетних и розетки листьев (5-10 см) многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,45-0,65	Пшеница озимая и яровая, ячмень, рожь	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)	

2,4-Д (2-этилгексилловый эфир) + флорасулам

Тимспрей, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/III 699-03-4318-1 15.12.2023 14.12.2023	0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	3(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2.4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	3(3)	

2,4-Д (2-этилгексилловый эфир) + хлорсульфурон (диэтилэтаноламинная соль)

Октиген, КЭ (419,75 г/л + 5,25 г/л) ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» ОГРН: - П/III, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 П/III 068(116)-03-659-1 12.05.2015 11.05.2025	0,6-0,9	Пшеница яровая и озимая, ячмень	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (при условии посева на следующий год зерновых культур) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--	--	---	-------	------	---------

2,4-Д (диметиламинная соль)

Аминопелик, ВР (600 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/III 156-03-1748-1 05.02.2018 04.02.2028	1,3	Мятлик луговой в год посева (без покрова)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в фазе 1-2 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,3-2	Райграс высокий, овсяница луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,6	Овсяница луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в год сбора семян в фазе кущения до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Ежа сборная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в начале кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1-1,3	Клевер ползучий	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в год посева культуры после появления 1-го тройчатого листа Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1-1,6	Кукуруза	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,3	Кострец безостый, лихохвост луговой	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,3	Овсяница луговая (под покровом ячменя)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в год посева культуры в фазе 2-3 листьев овсяницы и кущения ячменя Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Клещевин а	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

	1-1,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь озимая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	1-1,3	Тимофеевка луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Аминка, ВР (600 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Ш 002-03-2086-1 31.01.2019 30.01.2029	1-1,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Обработку озимых проводить весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,6	Кукуруза	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Диамисоль, ВР (600 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/Ш 050-03-4423-1 16.02.2024 15.02.2034	1,0-1,3	Гречиха	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дикамин-Д, ВР (600 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - П/Ш 607-03-3738-1 06.07.2020 05.07.2030	1,0-1,6	Кукуруза на зерно	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-5-ти листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,6	Пшеница озимая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д (малолетучие эфиры C7-C9)

Айкон, КЭ (550 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-1073-1 12.04.2016 11.04.2026	2	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,9	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150 -200 л/га	58(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(3)	
Топтун, КЭ (550 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 П/Ш 038-03-2110-1 06.02.2019 05.02.2029	2,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	
	2,0	Пары	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их массового появления Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	

	0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	
	0,6-0,7	Овес	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	
	0,6-0,9	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	
	0,6-0,8	Тимофеевк а луговая, райграсс высокий, овсяница луговая	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листа культуры до начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	
	0,6-0,9	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150 -200 л/га	60(1)	-(4)	
Эффект, КЭ (550 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/Ш 046-03-4668-0 20.09.2024 19.09.2027	0,6-0,7	Овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Кукуруза на зерно и масло	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница озимая, рожь озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Тимофеевк а луговая, райграсс высокий, овсяница луговая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
Аминка ЭФ, КЭ (550 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/Ш 002-03-2087-1 31.01.2019 30.01.2029	0,6-0,9	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,6-0,9	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	

	2	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	
	0,6-0,7	Овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	
	0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	
	2	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	
Левират, КЭ (550 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Ш 010-03-3582-1 01.04.2022 31.03.2032	0,6-0,8	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(3)	Активен
Эфирам, КЭ (550 г/л) ООО «Резерв» ОГРН: 1082224012738 П/Ш 130-03-2991-1 22.01.2021 21.01.2031	2	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(4)	Активен
	0,6-0,9	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(4)	
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	
	0,6-0,9	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	58(1)	-(4)	

2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9) + флорасулам

Дива, КС (550 г/л + 7,4 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/Ш 046-03-2358-1 24.12.2015 23.12.2025	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Аминка ФЛЮ, КЭ (550 г/л + 7,4 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

П/Ш 097-03-899-1 16.12.2015 097-03-899-1/228 228 15.12.2025	0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир)

2,4-Дактив, КЭ (564 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Ш 063-03-2788-1 09.09.2020 08.09.2030	0,8-1,0	Пшеница яровая, ячмень озимый	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(1)	-(3)	Активен
	0,6-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(1)	-(3)	
Шанс 24, КЭ (564 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-03-3534-1 18.03.2022 17.03.2032	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дротик, ККР (400 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-03-4466-1 19.03.2024 18.03.2034	0,5-0,65	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений при низкой степени засоренности Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-0,9	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,65-0,9	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений при низкой степени засоренности Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский и др.) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Эндимион, КЭ (564 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/Ш 050-03-4561-1 07.05.2024 06.05.2034	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Эстет, КЭ (600 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/Ш 024-03-2488-1 10.02.2020 09.02.2030	0,7-0,9	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,9	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + пиклорам + флорасулам

Балерина Форте, СЭ (300 г/л + 37,5 г/л + 10 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-2701-1 08.06.2020 07.06.2030	0,5-0,75	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период кущение – выход в трубку (1-2 междоузлия) культуры. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Кукуруза (в том числе на силос и на масло)	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам

Балерина, СЭ (410 г/л + 7,4 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-4447-1 11.03.2024 10.03.2034	0,3-0,5	Овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (виды ромашки, горца), и некоторые многолетние двудольные (осот, бодяк)	Опрыскивание посевов в период кущения – выход в трубку (1-2 междоузлия) культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	53(1)	-(4)	Активен
	0,3-0,5	Просо	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(4)	
	0,3-0,5	Сорго	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(4)	
	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	53(1)	-(4)	

	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	53(1)	-(4)	
	0,3-0,5	Кукуруза (в том числе на силос и масло)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(4)	
Прима КА, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 П/П 866-03-4614-1 14.06.2024 13.06.2034	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов кукурузы в фазе 3-5 листьев и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов кукурузы в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
Примадонна, СЭ (200 г/л + 3,7 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-4660-0 30.08.2024 29.08.2027	0,6 - 0,9	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,9	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,6 - 0,9	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,75 - 0,9	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Пальмира, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 П/П 653-03-2903-1 02.12.2020 01.12.2030	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница и ячмень озимые, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница и ячмень озимые, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Примадонна Супер, ККР (200 г/л + 5 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-4610-1 13.06.2024 12.06.2034	0,4-0,75	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,75	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, тритикале озимая, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, тритикале озимая, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,6-0,75	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Пришанс, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-03-677-1 08.06.2015 07.06.2025	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
Ламбада, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-3016-1 11.02.2021 10.02.2031	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + флуороксибир + флорасулам

Пришанс Супер, СЭ (285 г/л + 30,5 г/л + 11,5 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-03-4658-1 30.08.2024 29.08.2034	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения (выюнок)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения (выюнок)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д + дикамба (2-этилгексильные эфиры)

Элант-Премиум, КЭ (420 г/л + 60 г/л) ООО «Сибагрохим» ОГРН: 1025402493555 П/Ш, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/Ш 043(042)-03-2266-1 10.06.2019 09.06.2029	0,7-0,8	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,8-0,9	Кукуруза (зерно, масло)	Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
	0,7-0,9	Пшеница озимая	Однолетние и двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	

2,4-Д + дикамба (диметиламинные соли)

Биолан Супер, ВР (447 г/л + 156 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-2050-1 12.11.2018 11.11.2028	00,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1,15	Кукуруза, в том числе на силос и масло	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница, ячмень, тритикале, рожь озимые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Диакем, ВР (344 г/л + 120 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Ш 097-03-2962-1 25.12.2020 24.12.2030	0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь озимая и яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень яровой и озимый, овес яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Всполох, ВР (344 г/л + 120 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Ш 010-03-3486-1 21.01.2022 20.01.2032	0,5-0,7	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Дикопур Топ, ВР (344 г/л + 120 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/Ш 024-03-2584-1 10.03.2020 09.03.2030	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень яровой, просо, овес	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	4(4)	Активен
	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	4(4)	
	0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	4(4)	

2,4-Д кислота (2-этилгексилвый эфир)

Элант, КЭ (564 г/л) ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 П/Ш, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/Ш 043(042)-03-3069-1 23.03.2021 22.03.2031	0,8-1,2	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Зерновые колосовые озимые (за исключени е овса)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Зерновые колосовые яровые (за исключени ем овса)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Просо	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д кислота (диметиламинная соль)

Кадет, ВР (344 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Ш 085-03-3650-1 25.04.2022 24.04.2032	0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осоты, бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--------------------------------------	--	--	-------	------	---------

2,4-Д кислота (сложный 2-этилгексилвый эфир) + флорасулам

Мидас, СЭ (410 г/л + 15 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Ш 010-03-3469-1 13.01.2022 12.01.2032	0,3-0,5	Кукуруза, в том числе на силос и масло	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	58(1)	-(3)	

	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	58(1)	-(3)	
--	---------	---	---	---	-------	------	--

2,4-Д кислота (сложный 2-этилгексильный эфир) + хлорсульфурона

Фемида, МД (320 г/л + 4,2 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-03-3943-1 12.01.2023 11.01.2033	0,7 - 0,9	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной или осенью в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7 - 0,8	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д кислота + клопиралид (2-этилгексильные эфиры)

Клопэфир, КЭ (410 г/л + 40 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/П, ООО «Сибгрожим» ОГРН: 1025402493555 П/П 043(042)-03-3075-1 30.03.2021 29.03.2031	0,6-0,8	Зерновые колосовые озимые и яровые (за исключением овса)	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	Активен
	0,7-0,9	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д кислоты

Дедало Элит, МЭ (300 г/л) РЕД СУРКОС С.А. ОГРН: - П/П 825-03-3832-1 21.10.2022 20.10.2032	0,7-0,9	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,1-1,3	Кукуруза (на зерно)	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир)

Октимет Д, КЭ, КЭ (564 г/л) ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 П/П 347-03-4823-1 18.03.2025 17.03.2035	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га Расход рабочей жидкости - 150-200	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кушения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га Расход рабочей жидкости - 150-200	57(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га Расход рабочей жидкости - 150-200	57(1)	-(3)	
Дискатор 600, КЭ (600 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ ОГРН: - П/П 781-03-4362-1 15.01.2024 14.01.2034	0,5-0,7	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен

2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + флорасулам

<p>Люгер, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) Рейнбоу Кропсайенсиз Кфг. ОГРН: - П/Ш 606-03-3746-1 17.09.2015 16.09.2025</p>	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
<p>Бихард, СЭ (326 г/л + 8,5 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - П/Ш 062-03-2766-1 29.07.2020 28.07.2030</p>	0,3-0,5	Пшеница яровая, пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
<p>Дисулам, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/Ш 278-03-4104-1 14.03.2016 13.03.2026</p>	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Кирасир, СЭ (410 г/л + 7,4 г/л) ООО Праймагро ОГРН: 1195081032596 П/П, ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 П/П 854(682)-03-4627-0 02.07.2024 01.07.2027</p>	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые опрыскиваются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Сорго	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы развития сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Просо	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Арбалет, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-924-1 24.12.2015 23.12.2025</p>	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в т.ч устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Арабеск, СЭ (410 г/л + 7,4 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-03-3474-1 17.01.2022 16.01.2032	0,3-0,5	Сорго	Однолетние сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Просо	Однолетние сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза, в том числе на зерно и масло	Однолетние сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	58(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	58(1)	-(3)	
Флорастар, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) Альбау Юроп Сарл ОГРН: - П/П 329-03-791-1 05.10.2015 04.10.2025	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Ассолота, МК (300 г/л + 5,35 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп»	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-2167-1 27.03.2019 26.03.2029	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Подмарин, КЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - П/Ш 064-03-2874-1 10.11.2020 09.11.2030	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	Активен
Флорин, СЭ (550 г/л + 7,4 г/л) ООО «КЛЕВЕР ГРУПП» ОГРН: 1172801001350 П/Ш 570-03-3431-1 16.12.2021 15.12.2031	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
ЭтилФло, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) ООО РЕГСЕРВИС ОГРН: 1160280059818 П/Ш 803-03-3606-1 07.04.2022 06.04.2032	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	-(3)	

	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	---------	----------	---	--	-------	------	--

2,4-Д кислоты (малолетучие эфиры C7-C9) + флорасулам

<p>Флоракс, КС (550 г/л + 7,4 г/л) ООО АС-Агро ОГРН: 1040204593934 П/П, ООО НПП Институт синергетических препаратов и микроудобрений ОГРН: 1150280015302 П/П, ООО Евроагрокемикалс ОГРН: - П/П 941 (942, 943)-03-4651-1 26.07.2024 25.07.2034</p>	0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого или если погодные условия не позволили провести обработку раньше срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	51(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	51(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза на силос или зеленую массу	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

Азимсульфурон

<p>Сегмент, ВДГ (500 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 П/П 489-03-1902-1 03.05.2018 02.05.2028</p>	0,025-0,03	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа просьянки и 4-6 листьев клубнекамыш). Препарат применять в сочетании с 200 мл/га Тренд-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). После обработки незатопленных чеков их затопление проводят через 5-6 дней, а уровень воды поддерживают без изменения в течение 4-5 дней. При обработке затопленных чеков	60(1)	-(30)	Активен
	0,025-0,03	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа просьянки и 4-6 листьев клубнекамыш). Препарат применять в сочетании с 200 мл/га Тренд-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). После обработки незатопленных чеков их затопление проводят через 5-6 дней, а уровень воды поддерживают без изменения в течение 4-5 дней. При обработке затопленных чеков	60(1)	-(30)	

Аклонифен

<p>Бандур, КС (600 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-03-3199-1 06.07.2021 05.07.2031</p>	3-4	Подсолнечник, горох, сорго, лук, морковь, кориандр, картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----	---	--	---	-------	------	---------

Бравура, КС (600 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4661-1 05.09.2024 04.09.2034	2,0-2,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4-х настоящих листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--------------	--	---	-------	------	---------

Амикарбазон + Мезотрион + никосульфурон + Аминопиралид

Аврора, МД (80 г/л + 100 г/л + 60 г/л + 5 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 III/III 050(360)-03-4455-1 12.03.2024 11.03.2034	0,5-1,0	Кукуруза на зерно	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних видов) Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	-------------------	--	--	-------	------	---------

Аминопиралид + флорасулам) + 2,4-Д кислота(сложный 2-этилгексильный эфир)

Фортиссимо, МД (10 г/л + 5 г/л + 200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-03-4280-1 04.12.2023 03.12.2033	0,4 - 0,7	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно). Озимые обрабатывают весной. При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	46(1)	-(3)	Активен
	0,5 - 0,7	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и многолетние двудольные сорные растения, включая подмаренник цепкий, падалицу подсолнечника, виды осота, бодяка	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно). Озимые обрабатывают весной. При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	46(1)	-(3)	

антидот клоквинтосет-мексил + Клодинафоп-пропаргил

Допинг, КЭ (20 г/л + 80 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-3031-1 25.02.2021 24.02.2031	0,4-0,5	Пшеница яровая	Щетинники	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,3	Пшеница яровая и озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
	0,5	Пшеница яровая	Просовидные	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	

антидот клоквинтосет-мексил + Клодинафоп-пропаргил + феноксапроп-П-этил

Тигран Экстра, КЭ (34 г/л + 45 г/л + 90 г/л) ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 III/III 360-03-3925-1 28.12.2022 27.12.2032	0,3-0,4	Пшеница яровая	Щетинник, виды	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	60(1)	-(3)	

антидот клоквинтосет-мексил + Пиноксаден

Аксакал, КЭ (11,25 г/л + 45 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-3100-1 09.04.2021 08.04.2031	0,7-1,3	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов по вегетирующим однолетним злаковым сорным растениям (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов по вегетирующим однолетним злаковым сорным растениям (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Аксиал 50, КЭ (12,5 г/л + 50 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-2074-1 29.01.2019 28.01.2029	0,6 - 1,2	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Видлер, КЭ (12,5 г/л + 50 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-4356-0 11.01.2024 10.01.2027	0,6-1,2	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (не зависимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
Граф, КЭ (37,5 г/л + 150 г/л) ООО «Тотус» ОГРН: 1104632010933 II/III 181-03-4332-0	0,25-0,35	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, просо куриное, просо сорнополевое, метлица полевая, виды щетинника и лисохвоста)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

22.12.2023 21.12.2026	0,25-0,4	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, просо куриное, просо сорнополевое, метлица полевая, виды щетинника и лисохвоста)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Пиноквинто, КЭ (12,5 г/л + 50 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-3976-1 02.02.2023 01.02.2023	0,6-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазу 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Стингрей, КЭ (12,5 г/л + 50 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4513-1 10.04.2024 09.04.2024	0,6-1,2	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-1,2	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Теспан, КЭ (125,5 г/л + 50 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-4029-1 15.03.2023 14.03.2023	0,6-1,2	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 25-30 л/га	48(1)	-(3)	Активен
	0,6-1,2	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	

антидот клоквинтосет-мексил + феноксапроп-П-этил

Тайгер 100, КЭ (27 г/л + 100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-1069-1 11.04.2016 10.04.2026	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица, щетинники, просовидные)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Авантикс Экстра, ЭМВ (34,5 г/л + 69 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 038(010)-03-2940-1 17.12.2020 16.12.2030	0,8-1	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фокстрот, ВЭ (34,5 г/л + 69 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-03-2786-1 28.08.2020 27.08.2030	0,8-1,0	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный или куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Овсяген Экспресс, КЭ (35 г/л + 140 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2964-1 30.12.2020 29.12.2030	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4	Пшеница яровая	Виды щетинника	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4	Пшеница яровая	Виды щетинника	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

	0,3	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам весной, в ранние фазы их развития – 2-3 листа, (независимо от фазы развития культуры) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития – 2-3 листа, (независимо от фазы развития культуры) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Ибис 100, КЭ (27 г/л + 100 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 III/III, Агротекс ДМСС ОГРН: - III/III 023(395)-03-1256-1 26.10.2016 25.10.2026	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица щетинники, просовидные)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

Ибис, ЭМВ (34,5 г/л + 69 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 III/III 023(395)-03-1255-1 26.10.2016 25.10.2026	0,8-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Оцелот, КЭ (27 г/л + 100 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-4531-1 25.04.2024 24.04.2034	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинники, куриное просо)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинники, куриное просо)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

Оцелот Плюс, КЭ (34,5 г/л + 69 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-613-1 30.03.2015 29.03.2025	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
Поллукс, ЭМВ (34,5 г/л + 69 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 III/III, ООО «Праймагро» ОГРН: - III/III 682(854)-03-4632-1 08.07.2024 07.07.2034	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития(2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Формуляр, КЭ (50 г/л + 100 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050(360)-03-4063-1 18.04.2023 17.04.2033	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскиваие посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, метлица, просовидные)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (в фазе кущения культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максисальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, метлица, просовидные)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фзы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
антидот клоквинтосет-мексил + флукарбазон + феноксапроп-П-этил							
Авантикс Турбо, МД (34 г/л + 17,5 г/л + 100 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560	0,4-0,7	Пшеница яровая, озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (в фазу 1-3 листьев, начало кущения, независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

III/III 192-03-3010-1 09.02.2021 08.02.2031	0,4-0,6	Ячмень яровой, озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (в фазу 1-3 листьев, начало кущения, независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
--	---------	-----------------------------	--	--	-------	------	--

антидот мефенпир-диэтил + тиенкарбазон-метил

Велосити, МД (60 г/л + 10 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-1639-1 07.12.2017 06.12.2027	0,75-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица, виды щетинника) и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. В год применения в случае пересева культуры весной можно высевать только кукурузу, осенью – озимые зерновые культуры. При норме применения тиенкарбазон-метила $\leq 7,5$ г/га на следующий год после применения можно высевать любые сельскохозяйственные культуры без ограничений При	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-1	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, просо сорное, виды щетинника) и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. В год применения в случае пересева культуры весной можно высевать только кукурузу, осенью – озимые зерновые культуры. При норме применения тиенкарбазон-метила $\leq 7,5$ г/га на следующий год после применения можно высевать любые сельскохозяйственные культуры без ограничений При	60(1)	-(3)	

антидот мефенпир-диэтил + феноксапроп-П-этил

Дракон Супер 7,5, КЭ (75 г/л + 69 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-3513-1 04.03.2022 03.03.2032	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, овсюг)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	49(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, овсюг)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	49(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница яровая	Щетинник зеленый	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	49(1)	-(3)	
Лама, КЭ (75 г/л + 69 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-03-3494-1 10.02.2022 09.02.2032	0,8-1,0	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150 - 250 л/га	49(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорные растения	Опрыскивание по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150 - 250 л/га	49(1)	-(3)	

	0,6	Пшеница яровая, ячмень яровой	Щетинник зелёный	Опрыскивание по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150 - 250 л/га	49(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорные растения	Опрыскивание по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150 - 250 л/га	49(1)	-(3)	
Полгар, КЭ (27 г/л + 100 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - III/III 871-03-4224-1 19.10.2023 18.10.2033	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать стойкость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Талака 100, КЭ (27 г/л + 100 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III 297(042)-03-1586-1 07.11.2017 06.11.2027	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев до конца кущения сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овес	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Пума Супер 100, КЭ (27 г/л + 100 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - Ш/Ш 019-03-904-1 16.12.2015 019-03-904-1/139 139 15.12.2025	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица, мятлик, куриное просо, виды щетинника) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица, мятлик, куриное просо, виды щетинника) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	

	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
Топтун 100, КЭ (27 г/л + 100 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 038-03-450-1 17.11.2014 25.11.2034	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды ще тинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы внесения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

антидот мефенпир-диэтил + феноксапроп-П-этил + Клодинафоп-пропаргил

АРГО, МЭ (30 г/л + 80 г/л + 24 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-03-785-1 29.09.2015 28.09.2025	0,7-1	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (в том числе виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Однолетние злаковые сорные растения (в том числе виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	60(1)	-(3)	Активен
---	-------	-------------------------------	---	--	-------	------	---------

антидот мефенпир-диэтил + феноксапроп-П-этил + тиенкарбазон-метил

Велосити Супер, КЭ (30 г/л + 80 г/л + 7,5 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-3115-1 19.04.2021 18.04.2031	0,75-1,0	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева посевов, обработанных гербицидом Велосити Супер, КЭ (80 г/л феноксапроп-П-этила+7,5 г/л тиенкарбазон-метила+30 г/л антидота мефенпир-диэтила) можно высевать зерновые колосовые культуры и кукурузу Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Пшеница яровая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 3 листьев до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева посевов, обработанных гербицидом Велосити Супер, КЭ (80 г/л феноксапроп-П-этила+7,5 г/л тиенкарбазон-метила+30 г/л антидота мефенпир-диэтила) можно высевать зерновые культуры и кукурузу Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

антидот мефенпир-диэтила + Дифлюфеникан + йодосульфуронметил-натрия

Форкаст, МД (30 г/л + 150 г/л + 8 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4655-0 26.08.2024 25.08.2027	0,7-1,2	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,2	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих	-(1)	-(3)	

антидот ципросульфамид + Изоксафлютол + тиенкарбазон-метил

Аденго, КС (150 г/л + 225 г/л + 90 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-03-1022-1 11.03.2016 10.03.2026	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	В условиях достаточного увлажнения почвы при посеве чувствительных культур обязательна глубокая вспашка. На почвах с pH 7,5 и выше ограничение срока высева указанных чувствительных культур увеличивается до двух лет после применения препарата Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	----------	--	---	-------	------	---------

	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до всходов или в фазе 2-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения можно высевать только кукурузу. Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года нельзя высевать чувствительные культуры: свеклу (сахарную, столовую, кормовую), рапс, подсолнечник, гречиху, бобовые и овощные культуры, если сумма осадков за период от применения	60(1)	-(3)	
--	---------	----------	--	---	-------	------	--

Ацифлуорфен

Танто, ККР (320 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-2281-1 18.06.2019 17.06.2029	0,75-1,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Ацифект, ВК (250 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/П, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/П 050(360)-03-2966-1 30.12.2020 29.12.2030	1-1,8	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Ацифлуорфен + Бентазон

Блиц, ВРК (160 г/л + 320 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-03-3572-1 28.03.2022 27.03.2032	1-1,7	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев). Для зоны Дальнего Востока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дибазон, ВРК (160 г/л + 320 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-03-3580-1 01.04.2022 31.03.2032	1-1,7	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культур в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Для зоны Дальнего Востока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культур в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Зазофен, ВР (80 г/л + 360 г/л) ООО ВОЯЖ АГРОКЕМИКАЛ ОГРН: 1172536044559 П/П 677-03-3093-1 07.04.2021 06.04.2031	1-1,5	Соя	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Бенсульфурон-метил

Оризан, МСК (60 г/л) ООО «БИОКЕФАРМ РУС» ОГРН: 1097746641981 III/III, ООО «КОНЦЕРН ХИМПРОМ» ОГРН: 1082308002700 III/III 254(551)-03-2234-1 22.05.2019 21.05.2029	1,0-1,2	Рис	Однолетние злаковые (просовидные): ежовник куриный, ежовник рисовидный и осоковые: клубнекамыш компактный, клубнекамыш приморский и болотные широколистные: монохория, пастуха, стрелолист	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 листьев до конца кущения риса; в ранние фазы развития сорняков: 2-4 листьев у однолетних злаковых и 5-7 листьев у осоковых с добавлением 1 л/га Органо-минерального удобрения Сиамино Про Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	60(1)	-(-)	Активен
---	---------	-----	--	---	-------	------	---------

Бентазон

Корсар, ВРК (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2586-1 12.03.2020 11.03.2030	2,5-3,0	Мята перечная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание плантаций в фазе 4-6 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2,0	Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-2,5	Копеечник альпийский 1-го года вегетации	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание плантаций в фазе 2-4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,0-4,0	Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Райграс однолетний	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,5-3,0	Копеечник альпийский (переходящие плантации)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание плантаций в период начала отрастания культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-4,0	Рис	Осоковые, в т.ч. клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные сорняки (частуха, монохория, стрелолист, сусак)	Опрыскивание посевов, начиная с 2-х листьев культуры, в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Для достаточной смачиваемости сорняков перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0-2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняют водой до 10-12 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-2,0	Люцерна (старовозрастные семенные посевы)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Горох (кроме сахарных сортов)	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	2,0	Люцерна 1-го года вегетации	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание семенных посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,0-4,0	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Клевер полевой, ползучий и гибридный (семенные посевы)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,0-2,5	Маклея сердцевидная (начиная со второго года вегетации)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание плантаций в период начала отрастания культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,0-4,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Клевер полевой 2-го года вегетации	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Бентобел, ВР (480 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/П 277-03-2091-1 01.02.2019 31.01.2029	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе елочки культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2-4	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых культур) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2	Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых культур) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
АгроБазон, ВР (480 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры в ранние фазы роста сорных растений (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен

III/III 197-03-3347-1 25.10.2021 24.10.2031	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Бентазолин, ВР (480 г/л) ООО АГРОХИМСТРОЙ ОГРН: 1172801013538 III/III 647-03-2892-1 23.11.2020 22.11.2030	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный, сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Бентилон, ВР (480 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3877-1 16.11.2022 15.11.2032	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0 -3,0	Нут	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листа культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Горох (кроме овощного)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой, овес яровой	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2	Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе елочки культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Бентограм, ВР (480 г/л) ООО «Амурагрохим» ОГРН: 1022800507080 III/III 036-03-2734-1 06.07.2020 05.07.2030	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Бунт, ВР (480 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-03-2498-1 11.12.2019 10.12.2029	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,0	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гарнизон, ВР (480 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-2408-1 20.09.2019 19.09.2029	2	Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувстви-тельность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе елочки культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Нут	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листа культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Бентасил, ВР (480 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 III/III 050(360)-03-1060-1 07.04.2016 06.04.2026	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры в ранние фазы роста сорняков 93-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2	Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница, ячмень, овес, яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Базагран, ВР (480 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-03-2416-1 07.10.2019 06.10.2029	2,0-3,0	Горох (кроме овощного)	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(14)	Активен
	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный, сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(14)	
Бонус, ВР (480 г/л) ООО «КЛЕВЕР ГРУПП» ОГРН: 1172801001350 III/III 570-03-2392-1 12.09.2019 11.09.2029	1,5-3,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,0	Горох на зерно	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Изобен, ВР (480 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-2720-1 30.06.2020 29.06.2030	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Горох на зерно (кроме овощного)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и ранние фазы роста (3-5 листьев) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Наношанс, ВР (480 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-2504-1 12.12.2019 11.12.2029	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА кислоте, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Горох (кроме овощного)	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА кислоте, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный, сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Ранголи-Базорон, ВР (480 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1423-1 28.03.2017 27.03.2027</p>	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Сикурс, ВР (480 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО СЗР МАСТЕР ОГРН: 1216100024678 III/III 042(099)-03-4130-1 27.04.2017 26.04.2027</p>	2-4	Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2	Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе елочки культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Нут	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листа культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Барон, ВР (480 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-03-1529-1 26.07.2017 25.07.2027</p>	1,5-3	Нут	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листа культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2	Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	3-4	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Бенито, ККР (300 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3051-1 18.03.2021 17.03.2031	2-3	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-3	Горох (кроме овощного)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Горох (кроме овощного)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Бизон, ВК (480 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2208-1 26.04.2019 178-03-2208-1/377 377 25.04.2029	2-3	Горох	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Тигрис, ВР (480 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-3625-1 13.04.2022 12.04.2032	2	Пшеница, ячмень яровые с подсевом люцерны	Однолетние двудольные сорняки, в том числе. Устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе. Устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пшеница, ячмень яровые с подсевом клевера	Однолетние двудольные сорняки, в том числе. Устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	2-4	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4 –Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1–го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Табезон, ВР (480 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-4227-1 23.10.2023 22.10.2033	1,5 - 3,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,0	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Бентекс, ВР (480 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4117-1 18.04.2022 17.04.2032	1,5 - 3,0	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (1-3 листа) двудольных сорных растений и 1-3 тройчатых листьев сои Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Бентазон + Ацифлуорфен

Галакси Топ, ВРК (320 г/л + 160 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - II/II, ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 II/II 014(148)-03-3663-1 28.04.2022 27.04.2032	1-1,7	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Для зоны Дальнего Востока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Рэйнзон Плюс, ВРК (320 г/л + 160 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-3866-1 10.11.2022 09.11.2032	1,5 - 2,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Бентазон + Имазамокс

Корум, ВРК (480 г/л + 22,4 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - III/III 224-03-1120-1 20.05.2016 224-03-1120-1/265 265 19.05.2026	1,2-1,4	Горох	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 листьев) и 1-3 листьев гороха в смеси с ПАВ ДАШ, при соотношении компонентов 2:1 (0,6-0,7 л/га). Соблюдать ограничения по севообороту. Безопасный интервал между применением препарата и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свёклы составляет – 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	Активен
---	---------	-------	---	---	-------	------	---------

	1,5-2	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 листа) и 1-3 тройчатых листа сои в смеси с ПАВ ДАШ, при соотношении компонентов 2:1 (0,75-1 л/га). Соблюдать ограничения по севообороту. Безопасный интервал между применением гербицида и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	-------	-----	---	---	-------	------	--

Бентазон + кломазон

Эвентус, МЭ (480 г/л + 50 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/П 156-03-3346-1 25.10.2021 24.10.2031	1,5-2,5	Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	-----	--	--	-------	------	---------

Бентазон + тифенсульфурон-метил

Бизон Эдванс, КЭ (350 г/л + 2 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-03-2860-1 29.10.2020 28.10.2030	1,5-2,5	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (1-3 листа) двудольных сорняков и 1-3 тройчатых листьев сои Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-----	---	--	-------	------	---------

Бентазон + фомесафен

Когорта, ВГР (330 г/л + 150 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-2837-1 13.10.2020 12.10.2030	1,0-2,0	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков и 1-4 настоящих листьев у культуры (в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Формазон, ВГР (350 г/л + 150 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-4777-0 20.01.2025 19.01.2028	1,0-2,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (1-3 листа) двудольных сорных растений и 1-4 тройчатых листьев сои Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	66(1)	-(3)	Активен

биоактиватор + Имизетапир

Евро-Ланг, ВРК (100 г/л + 100 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-4128-1 19.06.2023 18.06.2033	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к препарату Евро-Ланг, ВРК (100 г/лимизета пир+100 г/л биоактиватор NN-21))	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: при необходимости пересева при условии глубокой обработки почвы рекомендуется высевать сою, горох, арахис, конские бобы. На обработанных гербицидом участках через 4 месяца можно высевать пшеницу озимую, через 11 месяцев – кукурузу, пшеницу яровую, овес, рожь озимую, ячмень озимый и яровой: спустя	60(1)	-(3)	Активен
--	-------	--	---	--	-------	------	---------

Биспирибак натрия

Номини, СК (400 г/л) Кумиан Кемикал Индастри Ко., Лтд. ОГРН: - П/П 133-03-843-1 30.10.2015 29.10.2025	0,075-0,09	Рис	Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков и 5-6 листьев у клубнекамыша в баковой смеси с 0,075-0,09 л/га А-100 Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	-(-)	Активен
	0,075-0,09	Рис	Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков и 5-6 листьев у клубнекамыша в баковой смеси с 0,075-0,09 л/га А-100 Расход рабочей жидкости - 100 л/га	60(1)	-(-)	

бромоксинил (смесь эфиров октаноата и гептаноата) + тербутилазин

Зеагран 350, СЭ (100 г/л + 250 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/П 024-03-1581-1 30.10.2017 29.10.2027	1,5-2	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-------	----------	--	--	-------	------	---------

Галоксифоп-П-метил

Зеллек-супер, КЭ (104 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЬШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - П/П 009-03-2243-1 24.05.2019 23.05.2029	0,5-0,75	Посевы и посадки сосны и ели в питомниках	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в период активного роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1-2)	-(3)	Активен
	1,0	Лен – долгунец	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте льна не менее 12 см (12-18 см) в период активного роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0	Рапс яровой и озимый	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте 10-15 см пырея ползучего, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Свекла сахарная и кормовая	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание в фазе 2-3 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Посевы и посадки сосны и ели в питомниках	Многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в период активного роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1-2)	-(3)	
	0,5	Лен – долгунец	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя.	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Злак Супер, КЭ (104 г/л) ООО «КЛЕВЕР ГРУПП»	1,0	Подсолнечник, соя	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1172801001350 III/III 570-03-3308-1 22.09.2021 21.09.2031	0,5	Подсолнечник, соя	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Интерн, КЭ (104 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - III/III 871-03-4075-1 26.04.2023 25.04.2033	1,0 л/га	Свёкла сахарная и кормовая, рапс яровой	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5 л/га	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, рапс яровой	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гаурай, КЭ (108 г/л) ООО ВОЯЖ АГРОКЕМИКАЛ ОГРН: 1172536044559 III/III 677-03-3062-1 18.03.2021 17.03.2031	1	Соя	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Соя	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Галактион, КЭ (104 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-3009-1 09.02.2021 08.02.2031	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га (независимо от фазы развития культуры)	60(1)	-(3)	Активен
	1,0	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га (независимо от фазы развития культуры)	60(1)	-(3)	
Галлон, КЭ (104 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 III/III 050(360)-03-1064-1 07.04.2016 06.04.2026	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, рапс яровой, соя	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Галокситин, КЭ (104 г/л) ООО АГРОХИМСТРОЙ ОГРН: 1172801013538 III/III 647-03-2852-1 03.11.2020 02.11.2030	0,5	Соя	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Галоп М, КЭ (104 г/л) ООО «АГРОТЕХИНВЕСТ» ОГРН: 1112801009727 III/III 402-03-3800-1 20.09.2022 19.09.2032	0,5	Соя	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное и сорное)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Злакосупер, КЭ (104 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2876-1 10.11.2020 09.11.2030	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнеч ник, соя, рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0	Свекла сахарная и кормовая, рапс яровой и озимый, подсолнеч ник	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов, при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Орион, КЭ (104 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-4357-0 11.01.2024 10.01.2027	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнеч ник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Ранголи Галситил, КЭ (104 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1342-1 25.01.2017 24.01.2027	1	Свекла сахарная и кормовая, подсолнеч ник, рапс яровой	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнеч ник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Галмет, КЭ (104 г/л) ООО ХИМСНАБ ОГРН: 1072312011617 II/III 913-03-4472-1 31.05.2017 30.05.2027	1	Свекла кормовая	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная, подсолнеч ник, рапс	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Свекла кормовая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5	Свекла сахарная, подсолнеч ник, рапс	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Лен - долгунец	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай, свинорой)	Опрыскивание посевов при высоте льна 12-18 см в период активного роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Ореол, КЭ (104 г/л) ООО ЭЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4102-1 05.11.2019 04.11.2029	0,5	Подсолнеч ник	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Подсолнеч ник	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Рапс яровой	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Канон, КЭ (104 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-1515-1 14.06.2017 13.06.2027</p>	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, рапс яровой	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Сокол, КЭ (104 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-2657-1 22.04.2020 21.04.2030</p>	1,0	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Слика, КЭ (108 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 III/III 682-03-4638-0 22.07.2024 21.07.2027</p>	0,5	Рапс озимый и яровой, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0	Рапс озимый и яровой, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>ФлангАгро, КЭ (104 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 010(197)-03-2994-1 26.01.2021 25.01.2031</p>	1,0	Свекла сахарная, подсолнечник, рапс яровой	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Свекла кормовая	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0	Свекла кормовая	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Соната Супер, КЭ (104 г/л) ООО «Амурагрохим» ОГРН: 1022800507080 III/III 036-03-3380-1 18.11.2021 17.11.2031</p>	0,5	Соя	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Галошанс, КЭ (104 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 II/III 126-03-4038-1 21.03.2023 126-03-4038-1/482 482</p>	1,0	Свекла сахарная, кормовая, подсолнечник, рапс	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Свекла сахарная, кормовая, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сонопольное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

20.03.2033	1,0	Соя	Многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Хайфоп, КЭ (540 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-4771-0 10.01.2025 09.01.2028	0,1	Свекла сахарная, подсолнечник, картофель, соя, рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорно-полевое) сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения), независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2	Свекла сахарная, подсолнечник, картофель, соя, рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения), независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Галоксифоп-П-метил + Клетодим

Квикстеп, МКЭ (80 г/л + 130 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4011-1 14.03.2023 13.03.2033	0,4	Свекла столовая (кроме пучкового товара), морковь (кроме пучкового товара), лук (кроме лука на перо), капуста белокочанная (кроме раннеспел	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8	Картофель, подсолнечник	Многолетние (пырей ползучий) злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4	Картофель, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8	Лен-долгунец, лен масличный (на технические цели)	Многолетние (пырей ползучий) злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев у сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8	Гречиха (семенные посевы), люпин, люцерна	Многолетние (пырей ползучий) злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	

0,8	Свекла столовая (кроме пучкового товара), морковь (кроме пучкового товара), лук (кроме лука на перо), капуста белокочанная (кроме раннеспел	Многолетние (пырей ползучий) злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)
0,4	Гречиха (семенные посевы), люпин, люцерна	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)
0,4	Лен-долгунец, лен масличный (на технические цели)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листа однолетних сорных растений (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)
0,8	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, соя	Многолетние (пырей ползучий) злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)

Глифосат кислоты (аммонийная соль)

<p>ГлиБест, ВР (360 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-03-4016-0 10.03.2023 09.03.2026</p>	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (в том числе вьюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый и корнеотпрысковые) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур	Злостные многолетние (в том числе вьюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый и корнеотпрысковые) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(7)	

	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(7)	
Глифот Супер, ВДГ (687 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/П, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/П 197(549)-03-4127-0 19.06.2023 18.06.2026	3-3,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	1,5-3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. В сезон обработки запрещается сбор ягод и грибов на обработанных территориях Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1-2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	3-4	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник) листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. В сезон обработки запрещается сбор ягод и грибов на обработанных территориях Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1-2	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	3-3,5	Пары	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	2-3	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2-3	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

Глифосат кислоты (изопропиламинная соль)

<p>Тотал, ВР , ВР (360 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-03-4826-0 19.03.2025 18.03.2028</p>	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	Активен
	4,0-8,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) корнеотпрысковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) корнеотпрысковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	

	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	3,0 - 6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
<p>Актуаль, ВР (480 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III 010(038)-03-4072-0 24.04.2023 23.04.2026</p>	2,25-4,5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	1,5-6	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	4,5-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Не допускается сбор грибов и ягод в сезон проведения обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,5-6	Поля, предназначенные под посевы различных яровых культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Аргумент, ВР (360 г/л) Рейнбоу Агросайенс КфЛ. ОГРН: - П/П 607-03-4064-0 18.04.2023 17.04.2026	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	Активен
	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Злаковые многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свинорой пальчатый и другие корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
	3,0-6,0	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
	6,0-8,0	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
	6,0-8,0	Пары	Злаковые многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свинорой и корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	

	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растений	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
	6,0-8,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(-)	
Амбир, ВР (360 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 П/П 682-03-4242-0 27.10.2023 26.10.2026	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	Активен
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений весной или летом в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	4-6	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	6-8	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной) сорные растения	Опрыскивание сорных растений весной или летом в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	3-6	Земли сельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений весной или летом в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	6-8	Поля, предназначенные под посев различных культур	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	

<p>ГлиБест Гранд, ВДГ (687 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Ш 097-03-3950-0 12.01.2023 11.01.2026</p>	1,0-2,0	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	2,0-3,0	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0-3,5	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур	Злостные многолетние (свиной пальчатый, выюнок полевой, бодяк полевой) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0-3,5	Пары	Злостные многолетние (свиной пальчатый, выюнок полевой, бодяк полевой) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,0-2,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Глифор, ВР (360 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/Ш 082-03-4361-0 15.01.2024 14.01.2027</p>	0,5-0,6	Люцерна	Повиликатонкостебельная	Наземное опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	3,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

4,0-8,0	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
3,0	Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)

	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-5,0	Поля под посевы (посадки) свеклы сахарной, кукурузы	Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе. Пырей	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева (посадки) культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Глифот, ВР (360 г/л) ООО «АНИП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 П/П, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 П/П 023(197)-03-3959-0 20.01.2023 19.01.2026	3-4	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	3	Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-3	Поля, предназначенные под посев подсолнечника и сои	Однолетние и двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6-8	Пары	Злостные многолетние сорняки (свинорой, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4-6	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

2-4	Поля, предназначенные под посевы различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
6-8	Поля, предназначенные под посевы различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Злостные многолетние сорняки (свиной, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
2-5	Поля, предназначенные под посев сахарной свеклы, кукурузы	Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4-6	Поля, предназначенные под посевы различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
2-3	Поля, предназначенные под посадку картофеля	Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2-5 дней до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)

<p>Глифошанс, ВР (360 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-03-4068-0 24.04.2023 23.04.2026</p>	6-8	Поля, предназначенные под посев зерновых, овощных, картофеля, технических, (в том числе льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных	Многолетние двудольные сорные растения (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрыс-ковые)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	2-4	Поля, предназначенные под посев зерновых, овощных, картофеля, технических, (в том числе льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4-6	Поля, предназначенные под посев зерновых, овощных, картофеля, технических, (в том числе льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	6-8	Пары	Многолетние двудольные сорные растения (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрыс-ковые)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4-6	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные)	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Кайман, ВР (360 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/П 050-03-3815-0 05.10.2022 04.10.2025</p>	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

Кайман Форте, ВДГ (687 г/кг) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 II/III,	4-6	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	3-4	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6-8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные , бахчевые, а также семенные	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрысковые) сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6-8	Пары	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные , бахчевые, а также семенные	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0-3,5	Пары	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрысковые) сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/Ш 050(360)-03-3915-0 20.12.2022 19.12.2025	2,0-3,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,0-2,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0-3,5	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Злаковые многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрысковые) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-3,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,5-3,0	Земли сельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,0-2,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Рузмин, ВР (360 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424	2,0-5,0	Поля под посевы (посадки) свеклы сахарной, кукурузы	Однолетние и многолетние сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева (посадки) культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/г	-(1)	7(7)	Активен

2,0-4,0	Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, картофеля, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых, цветочных	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние сорняки (свиной, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
6,0-8,0	Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, картофеля, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых, цветочных	Злостные многолетние сорные растения (свиной, выюнок полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
2,0-3,0	Поля под посевы (посадки) сои, подсолнечника, капуста	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2-5 дней до посева (посадки) культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
3,0	Поля под посевы (посадки) льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
3,0 - 4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-6,0	Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, картофеля, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых, цветочных	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)

	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4,0-8,0	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4,0-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	0,5-0,6	Люцерна	Повилика тонкостебельная	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Рауль, ВР (360 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-3949-0 12.01.2023 11.01.2026</p>	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, картофеля, технических, масличных, бахчевых, цветочных (семенные посевы) и	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Наземное опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Наземное опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние сорные растения (свиной, выюнок полевой, бодяк полевой)	Наземное опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, картофеля, технических, масличных, бахчевых, цветочных (семенные посевы) и	Злостные многолетние сорные растения (свиной, выюнок полевой, бодяк полевой)	Наземное опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

	2,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Наземное опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, овощных культур, картофеля, технических, масличных, бахчевых, цветочных (семенные посевы) и	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Наземное опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Тотал, ВР (360 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-3623-0 13.04.2022 12.04.2025</p>	4,0-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной) корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-8,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
3,0 - 6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовенные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) корнеотпрысковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)

Спрут, ВР (360 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-3920-0 27.12.2022 26.12.2025	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	6,0 - 8,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в том числе лен), масличных, бабчевых, цветочных декоратив	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый и корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6,0 - 8,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6,0 - 8,0	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый и корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0 - 4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0 - 4,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в том числе лен), масличных, бабчевых, цветочных декоратив	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0	Поля, предназначенные под посев льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

	4,0 - 6,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоратив	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4,0 - 6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0 - 6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4,0 - 8,0	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Факел, ВР (360 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРКЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Ш 063-03-3816-0 05.10.2022 04.10.2025</p>	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

<p>Ранголи-Глифосат 480, ВР (480 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 П/Ш 134-03-4088-0 23.05.2023 22.05.2026</p>	1,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,5-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Гелиос, ВР (360 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/Ш 278-03-4116-0 18.04.2022 17.04.2025</p>	6-8	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый) корнеотпрысковые сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	6-8	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в том числе льна), масличных, бабчевых, цветочных	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый) корнеотпрысковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4-6	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в том числе льна), масличных, бабчевых, цветочных	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

	2-4	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в том числе льна), масличных, бахчевых, цветочных	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Гелиос Экстра, ВР (540 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/Ш 278-03-4118-0 18.04.2022 17.04.2025	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, зернобобовые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, зернобобовые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Граунд, ВР (360 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 П/Ш 046-03-4299-0 11.12.2023 10.12.2026	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен

	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной и корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также	Злостные многолетние (выюнок полевой, бодяк полевой, свиной и корнеотпрысковые сорные растения)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Стриж, ВДГ (687 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/Ш 012-03-776-1 11.09.2015 10.09.2025	45 г/10 л воды(Л)	Плодовые, цитрусовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом при условии защиты культуры Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	7(-)	Активен
Раундап, Гель (7,2 г/л) Фирма Монсанто Европа С.А. ОГРН: - Ш/Ш 090-03-1299-1 12.12.2016 11.12.2026	0,3 мл (1 нажатие аппликатора)/300 см2 (ориентировочно: площадь: 10х30 см, или 5х60 см, или 15х20 см)(Л)	Плодовые; виноградники; картофель; поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйственных и цветочных культур; участки, не	Однолетние и двухлетние злаковые и двудольные сорные растения	Нанесение аппликатором на листья вегетирующих сорных растений весной или летом (без соприкосновения с почвой). Препарат готов к применению без приготовления рабочей жидкости	-(1)	7(-)	Активен

<p>САНТИ, ВР (360 г/л) ООО «ТПК «РОСТИ» ОГРН: 1062312034223 П/П 286-03-551-1 12.02.2015 11.02.2025</p>	50 мл/3 л воды(Л)	Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)	Не активен
<p>Зеро, ВР (360 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-03-3537-0 18.03.2022 17.03.2025</p>	6-8	Пары	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой)сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Не активен
	3-6	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона, линии электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением устойчивых вейника, тростника и других), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетние	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	6-8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетние	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой)сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

	4-6	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетние	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Напалм-480, ВР (480 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 П/Ш, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/Ш 004(549)-03-5018-0 13.07.2022 12.07.2025	1,5-4	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур.Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,5-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	4-6	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период или весной за 2 недели до посева яровых культур.Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
Торнадо 500, ВР (500 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-4288-0 04.12.2023 03.12.2026	2,4	Лиственные молодняки	Лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	1,5-3,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологии обработки почвы	Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияМноголетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	

4,0-8,0	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послепосевной период или весной за 2-4 недели до посева культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (в том числе корнеотпрысковые, такие как вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой пальчатый) сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
6,0-8,0	зерновые, овощные,	Злостные многолетние (в том числе корнеотпрысковые, такие как вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой пальчатый) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послепосевной период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
6,0-8,0	Дренажные каналы и их обочины	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (в том числе такие как вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (в том числе ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание каналов до затопления их водой Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послепосевной период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
1,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)
3,0-8,0	Паровые поля лесных питомников	Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
3,0-4,0	Чайные плантации (питомники)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) с интервалом 50 дней Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	7(7)

4,3-5,4	Лен - долгунец	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника и тростника), лиственные древесно-кустарнико вые породы (осина, береза, ольха)Относительно устойчивые нежелательные травянистые	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)
2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,4	Хвойно-ли ственные молодняки	Лиственные древесно-кустарнико вые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(7)
3,0-4,0	Картофель	Однолетние злаковые и двудольные сорные растенияМноголетни е злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
1,5-3,0	Поля, предназнач енные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, техническ их (в том числе лен), масличных , багчевых, цветочных декоратив	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)
4,0-6,0	Поля, предназнач енные под посев различных культур (яровые	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
3,0-6,0	Земли несельскох озийственн ого назначения (охранные зоны линий электропер едач и просеки, трассы газо-и нефтепров одов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых, таких как вейник, тростник), лиственные древесно-кустарнико вые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)

	2,4-4	Посевы и посадки сосны, ели, кедра в лесных питомниках	Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после окончания роста семян и саженцев Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4-4,8	Лесокультурные площади	Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4-4,8	Лесные культуры сосны, ели, кедра	Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,2-4,3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и др.)	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника и тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) Относительно устойчивые нежелательные травянистые	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	
Торнадо, ВР (360 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-4287-0 04.12.2023 03.12.2026	6,0-8,0	Дренажные каналы и их обочины	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (в том числе такие как вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание каналов до затопления их водой. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен

6,0-8,0	Пары	Злостные многолетние (в том числе корнеотпрыско-вые, такие как выюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый) сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
3,0-8,0	Паровые поля лесных питомников	Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
4-4,8	Лесные культуры сосны, кедр, ели	Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные, древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
3,0-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых, таких как вейник, тростник), лиственные, древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,4	Хвойно-лиственные молодняки	Лиственные, древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(7)
6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Злостные многолетние (в том числе корнеотпрыско-вые, такие как выюнок полевой, бодяк полевой, свиной пальчатый) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,0-4,0	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)

2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,4	Лиственные молодняки	Лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
4,0-8,0	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
4-4,8	Лесокультурные площади	Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,4-4	Посевы и посадки сосны, ели, кедра в лесных питомниках	Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после окончания роста сеянцев и саженцев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)

Дефолт, ВР (360 г/л) ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 П/Ш 347-03-4747-0 05.12.2024 04.12.2027	2,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые, цветочно-декоративные)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорные растения осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	2,0-4,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорные растения осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Пары	Корнеотпрысковые многолетние сорные растения (выюнок полевой, латук татарский, виды осота (бодяк))	Опрыскивание вегетирующих сорные растения осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	6,0-8,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые, цветочно-декоративные)	Корнеотпрысковые многолетние сорные растения (выюнок полевой, латук татарский, виды осота (бодяк))	Опрыскивание вегетирующих сорные растения осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4,0-6,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые, цветочно-декоративные)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорные растения осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	4,0-6,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорные растения осенью в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	4,0-6,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
--	---------	--	---	--	------	------	--

Глифосат кислоты (калиевая соль)

<p>Тотал 480, ВР, ВР (480 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-4827-0 19.03.2025 18.03.2028</p>	1,5-3,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	Активен
	1,0-2,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	3,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	
	3,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бобовые), а также однолетние	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)	

4,3-5,4	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)
2,0-3,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)
3,0-4,3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)
1,5-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)
1,0-3,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бобовые), а также однолетние	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га Расход рабочей жидкости - 100-200	-(1)	-(7)

Ампир Экстра, ВР (540 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 П/Ш 682-03-4376-0 24.01.2024 23.01.2027	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	3,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 15 дней до посева культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 15 дней до посева культур Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Глифосанс супер, ВР (540 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-03-4188-0 06.09.2023 05.09.2026	3,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы	Все виды нежелательных относительно устойчивых травянистых растений, в том числе вейник, тростник и лиственных древесно-кустарниковых пород (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	Активен

	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы)	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника) и листовых пород (за исключением относительно устойчивых осины, березы, ольхи)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	2,6-4,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	1,4-2,5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы)	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посевы (посадку) зерновых, зернобобовых, овощных, картофеля, технических (в том числе льна), масличных бахчевых	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
	2,5-4,0	Поля, предназначенные под посевы (посадку) зерновых, зернобобовых, овощных, картофеля, технических (в том числе льна), масличных бахчевых	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	15(7)	
Аргумент Стар, ВР (540 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт.	1,4-2,8 л/га	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен

ОГРН: - П/П 871-03-4076-0 26.04.2023 25.04.2026	2,0-3,0 л/га	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	3,0-5,0 л/га	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8 л/га	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
ГлиБест 540, ВР (540 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-03-4050-0 27.03.2023 26.03.2026	2,8-3,7	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послепосевный период или весной за две недели до посева яровых культур Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га (в зависимости от типа опрыскивателей)	-(1)	-(7)	Активен
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующей сорной растительности в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га (в зависимости от типа опрыскивателей)	-(1)	-(7)	
	3-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период или весной за две недели до посева яровых культур Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га (в зависимости от типа опрыскивателей)	-(1)	-(7)	
Глифор Форте, ВР (540 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/Ш 082-03-3562-0 22.03.2022 21.03.2025	1,4-0,28	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений весной и летом в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Не активен
	1,3-4	Поля, предназначенные под семенные посев яровых культур	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений летом или осенью Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения шоссейных дорог)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Спрут Экстра, ВР (540 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-03-4269-0 29.11.2023 28.11.2026	2,5 - 4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	3,0 - 5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

2,5 - 4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
1,4 - 2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,0 - 3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения, включая борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см. Продолжительность защитного периода 30-45 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
1,4 - 2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные декорат	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
1,4 - 2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)
2,0 - 3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)

	1,4 - 2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности.Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
<p>Силач, ВР (540 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Ш 085-03-3948-0 12.01.2023 11.01.2026</p>	2,5-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, картофель, бахчевые, технические (в том числе лен), масличные, цветочные декоративные	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2-3	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, картофель, бахчевые, технические (в том числе лен), масличные, цветочные, декоративные)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
<p>Тачдаун, ВР (540 г/л) ООО ТетраХим ОГРН: 1167746491681 П/Ш 642-03-3936-0 10.01.2023 09.01.2026</p>	4,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	1,3-2,6	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён, масличные))	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,4-4,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения, в том числе злостные	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	3,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

	2,6-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, техническое (в том числе лён, масличные))	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,3-2,6	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,4-2,8	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Ураган Форте, ВР (500 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-03-4284-0 04.12.2023 03.12.2026	3,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур, в том числе яровых культур (зерновые, бобовые, картофель, техническое (в т. ч. лён), масличные)	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	4,0-5,0	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,5-3,0	Поля, предназначенные под посев различных культур, в том числе яровых культур (зерновые, бобовые, картофель, техническое (в т. ч. лён), масличные)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	1,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,5-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	3,0-4,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Торнадо 540, ВР (540 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-3983-0 11.02.2023 10.02.2026	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	3,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 50	-(1)	7(7)	
	2,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	

	1,4-2,8	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологии обработки почвы	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	
	2,8-3,7	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологии обработки почвы	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 50	-(1)	7(7)	
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	7(7)	
Глиф, ВР (540 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-03-3997-0 03.03.2023 02.03.2026	3-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Запрещается сбор ягод и грибов в сезон обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен

	2-3	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых (вейника, тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Запрещается сбор ягод и грибов в сезон обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,5-3	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, техническое (в том числе лен), масличные, цветочные декоративн	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок выхода людей на обработанные территории не ранее 15 дней после обработки. Запрещается сбор ягод и грибов в сезон обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
<p>Голиаф, ВР (540 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 П/П, ООО «Агрохим XXI» ОГРН: 5067746338150 П/П 023(197)-03-4017-0 13.03.2023 12.03.2026</p>	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	3-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2-3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
<p>Аристократ Супер, ВР (540 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/Ш 192-03-4030-0 15.03.2023 14.03.2026</p>	1,3-2,6	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,6-4	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100 -200 л/га	-(1)	-(7)	
	3-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	2-3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач, трасы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы)	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовенные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	2,6-4	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых культур	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,3-2,6	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100 -200 л/га	-(1)	-(7)	
Вольник, ВР (540 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - П/Ш 297-03-4202-0 18.09.2023 17.09.2026	3-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовенные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	2-3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений(за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), листовенные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	

	2,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные, лекопа	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные, лекопа	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,4-2,8	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Тотал 480, ВР (480 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-3603-0 07.04.2022 06.04.2025	1,5-3,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	Активен
	4,3-5,4	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линейных электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), листовые древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	

3,0-4,3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением устойчивых вейника, тростника), листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
1,5-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
1,0-3,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бобовые), а также однолетние	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
2,0-3,0	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)
3,0-4,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)

	3,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, техническое, масличные, бобовые), а также однолетние	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
	1,0-2,0	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	7(7)	
Факел Экстра, ВР (500 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - П/Ш 064-03-3765-0 18.07.2022 17.07.2025	3,0-4,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, овощные, картофель, бобовые, техническое (в том числе лен), масличные, бахчевые, а также	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	Активен
	1,5-3,0	Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, овощные, картофель, бобовые, техническое (в том числе лен), масличные, бахчевые, а также	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
	1,5-3,0	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(7)	
Глюфосинат аммоний							
Баста, ВР (150 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/Ш 014-03(04)-2731-1 15.12.2015 16.12.2025	2,5-3,5	Плодовые культуры, виноградники	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений первой и второй волны весной и летом (при условии защиты культуры) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	21(1-2)	-(3)	Активен

ГлюфАгро, ВР (150 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03(04)-4669-1 20.09.2024 19.09.2034	2,5-3,5	Плодовые культуры (семечковые)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений первой и второй волны весной и летом (при условии защиты культуры) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	21(1-2)	3(3)	Активен
--	---------	--------------------------------	--	--	---------	------	---------

Глюфосинат аммоний + Глифосат кислоты (аммонийная соль)

Лайфлайн, ВР (280 г/л + 280 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-03(04)-3599-1 08.04.2022 07.04.2032	1,5-4,0	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,5-4,0	Поля, предназначенные под посев различных яровых культур (яровые зерновые, овощные, картофель, бобовые, технические, масличные)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
Мегаполис, ВР (150 г/л + 150 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03(04)-3761-1 15.07.2022 14.07.2032	2-5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100 -200 л/га	-(1)	-(3)	
	2-3	Картофель	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Подсолнечник, соя	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	2-4	Пары	Однолетние и многолетние сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста Расход рабочей жидкости - 100 -200 л/га	-(1)	-(3)	

Десмедифам + фенмедифам

Эксперт 22, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-2173-1 01.04.2019 31.03.2029	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
Бицепс 22, КЭ (100 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958	1,5	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	60(2)	-(3)	Активен

III/III 021-03-1722-1 07.11.2017 06.11.2027	3	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(2)	-(3)	
	1	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	60(3)	-(3)	
	3	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(1)	-(3)	
	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	-(3)	-(3)	
Бетаниум 22, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-4628-0 02.07.2024 01.07.2027	3	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
Бетарен 22, МКЭ (110 г/л + 110 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4399-0 01.02.2024 31.01.2027	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	3	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
Эксперт Некст, КС (160 г/л + 160 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-603-1 23.03.2015 22.03.2025	3	Свекла сахарная, свёкла кормовая Свекла сахарная, свёкла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Не активен
Десмедифам + фенмедифам + этофумезат							
Бетарен Экспресс АМ, КЭ (60 г/л + 60 г/л + 60 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427	2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. Щирица, и некоторые однолетние злаки	Опрыскивание посевов в фазу семядолей 2-4 листьев сорных растений первой и второй волны (с интервалом 7-15 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен

III/III 018-03-1918-1 21.05.2018 20.05.2028	4	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в т.Ч.Щирица, и некоторые однолетние злаки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	4	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.Ч.Щирица, и некоторые однолетние злаки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.Ч.Щирица, и некоторые однолетние злаки	Опрыскивание посевов в фазу семядолей 2-4 листьев сорных растений первой и второй волны (с интервалом 7-15 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	
Тринити, КЭ (71 г/л + 91 г/л + 112 г/л) ООО ХИМСНАБ ОГРН: 1072312011617 III/III 913-03-4470-1 08.11.2017 07.11.2027	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	3	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(3)	
	3	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Комрад, КЭ (71 г/л + 91 г/л + 112 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-03-4150-1 07.07.2023 06.07.2033	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы)и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы)и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы)и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Беташанс Трио, КЭ (71 г/л + 91 г/л + 112 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812	1	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	Активен

III/III 126-03-4002-1 06.03.2023 05.03.2023	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	3	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	

Десмедифам + этофумезат + фенмедифам

Бицепс Гарант, КЭ (70 г/л + 110 г/л + 90 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1721-1 07.11.2017 06.11.2027	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(3)	-(3)	Активен
	3	Свекла сахарная, свекла столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Свекла сахарная, свекла столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(3)	-(3)	
	3	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, свекла столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(2)	-(3)	
	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(3)	
Секира Элит, КЭ (71 г/л + 112 г/л + 91 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-3229-1 23.07.2021 22.07.2031	3,0	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Свекла столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(3)	-(3)	
	1,0	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(3)	

	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(2)	-(3)	
	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	3,0	Свекла столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	

дикамба (2-этилгексилловые эфиры) + 2,4-Д

<p>Чисталан экстра, КЭ (60 г/л + 420 г/л) ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» ОГРН: - П/П, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 П/П 068(116)-03-706-1 20.07.2015 19.07.2025</p>	0,67-0,9	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,67-0,8	Овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)	
	0,67-0,9	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)	
<p>Чисталан, КЭ (54 г/л + 376 г/л) ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ» ОГРН: - П/П, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 П/П 068(116)-03-726-1 29.07.2015 28.07.2025</p>	0,75-1	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-0,9	Овес, просо	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	55(1)	-(3)	
	0,75-1	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	55(1)	-(3)	

Дикамба (диметиламинная соль)

Дамба, ВР (480 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2493-1 09.12.2019 018-03-2493-1/352 352 08.12.2029	30 мл/3 л воды(Л)	Участки не предназначенные под посев или высадку культурны х растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	3(-)	Активен
	0,15-0,3	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения	Опрыскивание посевов в 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
	20 мл/3 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	3(-)	
Банвел, ВР (480 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-943-1 18.01.2016 17.01.2026	2,6-3,1	Сенокосны е угодья, пастбища	Чемерица, лютик, виды щавеля, борщевик	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	50(1)	-(3)	
	1,6-3,1	Земли несельскох о-зяйствен ного назначения	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения (за исключением горчака ползучего)	Опрыскивание вегетирующих сорняков Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	
	1,6-2	Сенокосны е угодья, пастбища	Чемерица, лютик, виды щавеля, борщевик	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Пшеница, рожь, овес, ячмень	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2.4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты умноголетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	55(1)	-(3)	
Витара, ВР (480 г/л) Тагрос Кемикалс Индия ПВТ Лимитед ОГРН: - III/III 636-03-2774-1 18.08.2020 17.08.2030	1,6-3,1	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (за исключением горчака ползучего)	Опрыскивание вегетирующих сорняков Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,6-3,1	Земли несельскох о-зяйственн ого назначения	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (за исключением горчака ползучего), борщевик	Опрыскивание вегетирующих сорняков.Запрещается сбор грибов и ягод в период проведения обработок Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	

	0,4-0,8	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание в фазу 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	59(1)	-(3)	
Гель-Деймос, Гель (50 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3493-1 10.02.2022 09.02.2032	0,1 г/100 см2 листовой поверхнос ти(Л)	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	На поверхность листа сорного растения выдавить из полимерной тубы полоску геля длиной 1 см (полоска геля длиной 1 см соответствует 0,1 г) и с помощью специального аппликатора в виде закругленного носика тубы распределить гель по поверхности листа на площадь 100 см2. Для предотвращения гибели газонных трав при проведении обработок необходимо минимизировать попадание гербицида на зеленые растения	-(1)	3(-)	Активен
Герб-480, ВР (480 г/л) Рейнбоу Агросайенс КфТ. ОГРН: - III/III 607-03-3739-1 04.02.2021 03.02.2031	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза (на зерно, кроме на масло)	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется самостоятельно, а также в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дикамбел, ВР (480 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2907-1 03.12.2020 02.12.2030	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес яровой, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки	Опрыскивание в фазу 3-5 листьев культуры и 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
Дианат, ВР (480 г/л) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - III/III 334-03-1559-1	1,6-2	Сенокосны е угодья	Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2,6-3,1	Сенокосны е угодья	Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	

28.09.2017 27.09.2027	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения	Применяется самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения	Применяется самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	50(1)	-(3)	
	2,6-3,1	Сенокосные угодья	Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	1,6-2	Сенокосные угодья	Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	50(1)	-(3)	
Девиз, ВР (480 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 Ш/Ш, Агрия АД ОГРН: - Ш/Ш 184(026)-03-2262-1 03.06.2019 02.06.2029	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, (включая виды осота, бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза (на зерно)	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, (включая виды осота, бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и 2М-4Х Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Деймос, ВРК (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03-4501-1	2,6-3,1	Сенокосные угодья, пастбища	Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью. Запрещается сбор дикорастущих грибов и ягод в течение 60 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен

03.04.2024 02.04.2034	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес, рожь	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота и бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,6-3,1	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения (за исключением горчака ползучего)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений. Запрещается сбор дикорастущих грибов и ягод в течение 60 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-400 л/га	-(1)	-(3)	
	1,6-2	Сенокосные угодья, пастбища	Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной. Запрещается сбор дикорастущих грибов и ягод в течение 60 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Кукуруза (в том числе на силос и масло)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота и бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,6-3,1	Пары	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения (за исключением горчака ползучего)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-400 л/га	-(1)	-(3)	
	2-5 мл/3 л воды	Газоны злаковых трав	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	3(-)	
	15-30 мл/ 3 л воды	Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений. Запрещается сбор дикорастущих грибов и ягод в течение 60 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	3(-)	
Оптимум, ВРК (480 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 ПП/П 063-03-2783-1 09.09.2020 08.09.2030	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	

Мономакс, ВР (480 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-3906-1 13.12.2022 12.12.2032	0,4-0,5	Просо	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения, включая виды бодяка и осота	Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды бодяка и осота	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения, включая виды бодяка и осота	Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
Губернатор, ВР (480 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III, ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 038-03-460-1 15.12.2014 20.10.2027	0,4-0,8	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,3	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Зерновые колосовые озимые, яровые, за исключением овса	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов (озимые обрабатывают весной) в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Пшеница и ячмень яровые, рожь	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Адвокат, ВР (480 г/л) ООО ХИМСНАБ ОГРН: 1072312011617 III/III 913-03-4471-1	0,15-0,3	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

26.04.2017 25.04.2027	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
Диастар, ВР (480 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 Ш/Ш 046-03-2689-1 28.11.2017 27.11.2027	20 мл/3 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(3)	Активен
	30 мл/3 л воды(Л)	Участки, не предназначенные под посев или высадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения	Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	
Ларт, ВР (480 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 Ш/Ш 050-03-2967-1 30.12.2020 29.12.2030	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(2)	Активен
	0,15-0,3	Пшеница яровая, пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяка), сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(2)	
Мурал, ВР (480 г/л) ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЯ А.Д. ОГРН: - Ш/Ш 742-03-3242-1 22.07.2021 21.07.2031	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Шанс ДКБ, ВР (480 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4015-1 10.03.2023 09.03.2033	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется самостоятельно, а также в качестве добавки к 2,4-Д Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,3	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Дикамба (диметиламинная соль) + римсульфурон

Титус Плюс, ВДГ (699 г/кг + 32,5 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-1928-1 28.05.2018 029-03-1928-1/287 287 27.05.2028	0,307-0,385	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые (в т.ч. однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних, фазу розетки листьев у многолетних двудольных сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с 200 мл/га Тренда-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,307-0,385	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние, двудольные и злаковые сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних, фазу розетки листьев у многолетних двудольных сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

дикамба (диметиламинные соли) + 2,4-Д

Диален Супер, ВР (120 г/л + 344 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/III 041-03-1867-1 12.04.2018 11.04.2028	1-1,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4- Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4- Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
Диамакс, ВР (120 г/л + 344 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 II/III	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота, бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

178-03-2213-1 07.05.2019 06.05.2029	0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота, бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные (включая виды осота, бодяка) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

дикамба (диметиламинные соли) + МЦПА

Дикогерб Супер, ВРК (90 г/л + 660 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/Ш 024-03-1318-1 12.01.2017 11.01.2027	0,7-1,3	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	46(1)	-(3)	Активен
	0,7-1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до конца выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	46(1)	-(3)	

Дикамба (натриевая соль) + никосульфурон + римсульфурон + изоксадифен-этил

Кордус Форте, ВДГ (510,42 г/кг + 62,48 г/кг + 31,25 г/кг + 31,25 г/кг) ООО Кортева Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 Ш/Ш 866-03-4042-1 29.03.2023 28.03.2033	0,36-0,48	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 до 5-8 листьев культуры и ранние фазы роста (1-4 листа однолетних двудольных и злаковых сорных растений и фазу розетки многолетних двудольных видов) с добавлением 400 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не проводить культивацию междурядий ранее, чем через 7 дней после обработки посевов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----------	----------	--	---	-------	------	---------

Дикамба (натриевая соль) + топрамезон

Стеллар Плюс, ВРК (160 г/л + 50 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/Ш 014-03-2686-1 28.05.2020 27.05.2030	1,0-1,2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений. Ограничения по севообороту – в течение 18 месяцев после применения препарата нельзя высевать сахарную свеклу, сою и горох. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------	---	--	-------	------	---------

Дикамба (натриевая соль) + триасульфурон + Дикамба кислота (натриевая соль)

Линтур, ВДГ (659 г/кг + 41 г/кг + 659 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш, ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-03-490-1 24.12.2014 10.02.2035	120-135	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе начало (2-3 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с pH не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	Активен
---	---------	-------------------------------------	--	--	------	------	---------

1,8 г/5 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание травостоя в мае – начале июня по вегетирующим сорнякам через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа – начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных газонах в течение 3-х дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(1)	3(-)
0,15-0,18	Пшеница и ячмень озимый, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
150-180	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,18	Газоны злаковых трав	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам в мае – начале июня через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа – начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных газонах в течение 3-х дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
150-180	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)

135	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе начало (2-3 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорных растений. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,12-0,135	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе начало (2-3 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
1,8 г/5 л воды (Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорным растениям в мае – начале июня через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа – начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных газонах в течение 3-х дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	-(1)	3(-)
0,135	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе начало (2-3 листа) – конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,15-0,18	Пшеница и ячмень озимые, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии глубокой вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)

	180	Газоны злаковых трав	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорным растениям в мае – начале июня через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа – начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных газонах в течение 3-х дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
--	-----	----------------------	--	--	------	------	--

Дикамба + клопиралид (диметилэтаноламинные соли) + пиклорам

<p>Генсек, ВГР (88,5 г/л + 177 г/л + 88,5 г/л) ООО «Агро-Инновации» ОГРН: - III/III, ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 146(002)-03-1974-1 07.08.2018 06.08.2028</p>	0,25-0,5	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4 и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	57(1)	-(-)	Активен
	1,5-2	Паровые поля и поля, предназначенные под посев пшеницы озимой	Горчак ползучий и другие злостные однолетние и многолетние (виды осота, амброзии, вьюнок полевой) двудольные сорные растения	Однократное опрыскивание вегетирующих сорных растений в фазе розетки листьев – начало бутонизации горчака ползучего. Озимые зерновые высевать осенью следующего после обработки года Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	1,5-2,5	Земли сельскохозяйственного назначения, засоренные горчаком ползучим (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и	Горчак ползучий и другие злостные однолетние и многолетние сорные растения, в том числе борщевик Сосновского (до выбрасывания цветоноса)	Опрыскивание вегетирующих нежелательных растений в фазу розетки листьев-начала бутонизации горчака ползучего, розетки листьев борщевика Сосновского (до выбрасывания цветоноса). Сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом земли сельскохозяйственного назначения, том числе для отдыха – не ранее 3 дней Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	1,5-2	Паровые поля и поля, предназначенные под посев пшеницы яровой	Горчак ползучий и другие злостные однолетние и многолетние (виды осота, амброзии, вьюнок полевой) двудольные сорные растения	Однократное опрыскивание вегетирующих сорных растений в фазе розетки листьев – начало бутонизации горчака ползучего. Яровые зерновые и кукурузу можно высевать весной следующего после обработки года Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(1)	-(-)	

Дикамба кислота

<p>Джанеро Элит, МЭ (200 г/л) РЕД СУРКОС С.А. ОГРН: - II/III 825-03-3692-1 23.05.2022 22.05.2032</p>	0,50-1,50	Кукуруза на зерно и на масло	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,40	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,40-0,70	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	-----------	-------------------------------	---	---	-------	------	--

дикамба кислота (диметиламинная соль)

Дюранор 480, ВР (480 г/л) Альбау Юроп Сарл ОГРН: - III/III 329-03-4397-1 30.01.2024 29.01.2034	0,15-0,30	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,15-0,30	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота и бодяка, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,6-3,1	Сенокосные угодья и пастбища	Чемерица, виды лютика, щавеля, борщевик	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,6 - 3,1	Земли несельскохозяйственного назначения	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (за исключением горчака ползучего) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений.Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – не ранее 60 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(3)	

Дикамба кислота + никосульфурон

Хорс Д, КС (200 г/л + 50 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2910-1 03.12.2020 02.12.2030	0,8-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние, двудольные и злаковые сорняки (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д)	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних сорняков, фазу розетки листьев у многолетних двудольных и при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------	---	--	-------	------	---------

Дикамба кислоты (диэтилэтаноламмониевая соль)

Рефери, ВГР (351 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-3048-1 15.03.2021 14.03.2031	0,4-0,5	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазилам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота, в том числе бодяк	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,17-0,2	Пшеница, ячмень озимые и яровые, рожь	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,45-0,5	Просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	----------	-------	---	---	-------	------	--

Дикват (дибромид) + Дикват (дибромид)

Голден Ринг, ВР (150 г/л + 150 (80,3 в пересчете на диквата ион) г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03(04)-2620-1 23.03.2020 22.03.2030	2,0	Картофель продовольственный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2-3 дня до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(7)	Активен
Суховой, ВР (150 г/л + 200 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03(04)-1700-1 28.10.2015 021-03(04)-1700-1/316 27.10.2025	1,0 -2,0	Поля, предназначенные под посев яровых культур (зерновые, соя, кукуруза, подсолнечник), возделываемых при минимальной или нулевой	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков до посева или до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(3)	Активен

Диклосулам

Плектор, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03-2651-1 20.04.2020 19.04.2030	0,015-0,03	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в чистом виде или с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). На следующий год после применения можно высевать зерновые, бобовые культуры. Через год сорго, кукурузу, рис. Через 2 года можно высевать сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, гречиху Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,05	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Обработка почвы до посева или до всходов культуры. На следующий год после применения можно высевать зерновые, бобовые культуры. Через год сорго, кукурузу, рис. Через 2 года можно высевать сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, гречиху Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Диклосоя, ВДГ (840 г/кг) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 Ш/Ш 097-03-3835-1 25.10.2022 24.10.2032	0,02-0,03	Соя	Однолетние двудольные (в том числе коммелина обыкновенная, виды амброзии, марь белая, канатник Теофраста, виды щирицы, акалифа южная) сорные растения	Обработка посевов в ранние фазы роста сорных растений и 1-4 настоящих листьев культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). При пересеве в год применения рекомендуется высевать сою, через 4 месяца – озимые пшеницу и ячмень, на следующий год – яровые и озимые зерновые и бобовые культуры, кукурузу, рис, табак, сорго; через 2 года – свеклу сахарную, подсолнечник, рапс, гречиху	60(1)	-(3)	Активен

	0,03-0,04	Соя	Однолетние двудольные (в том числе коммелина обыкновенная, виды амброзии, марь белая, канатник Теофраста, виды щирицы, акалифа южная) и некоторые злаковые (виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Обработка посевов в ранние фазы роста сорных растений и 1-4 настоящих листьев культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). При пересеве в год применения рекомендуется высевать сою, через 4 месяца – озимые пшеницу и ячмень, на следующий год – яровые и озимые зерновые и бобовые культуры, кукурузу, рис, табак, сорго; через 2 года – свеклу сахарную, подсолнечник, рапс, гречиху	60(1)	-(3)	
	0,024-0,040	Соя	Однолетние двудольные (в том числе коммелина обыкновенная, виды амброзии, марь белая, канатник Теофраста, виды щирицы, акалифа южная) сорные растения	Обработка почвы до посева или до всходов культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать сою, через 4 месяца – озимые пшеницу и ячмень, на следующий год – яровые и озимые зерновые и бобовые культуры, кукурузу, рис, табак, сорго; через 2 года – свеклу сахарную, подсолнечник, рапс, гречиху (в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	

Диметенамид-Р

Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - III/III 334-03-821-1 27.10.2015 26.10.2025	0,5+0,5	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих растений, начиная с фазы двух настоящих листьев свеклы в ранние фазы роста сорных растений первой и второй волны Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,8-1,2	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дифронт, КЭ (720 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-840-1 30.10.2015 29.10.2025	0,8-1,2	Кукуруза, соя, подсолнечник, свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Диметенамид-Р + тербутилизин

Акрис, СЭ (280 г/л + 250 г/л) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - III/III 334-03-2557-1 05.03.2020 04.03.2030	2,0-3,0	Кукуруза	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов до появления всходов или после всходов (до фазы 3-5 листьев) культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Дифлюфеникан + Изопротурон

Нерта, КС (100 г/л + 500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2666-1 24.04.2020 23.04.2030	0,75-1,0	Пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью (до появления всходов культуры) или в фазу 3 листьев – начало кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева высевать яровые зерновые (кроме овса), картофель, кукурузу. Для пересева крестоцветными и зернобобовыми культурами обязательна вспашка с оборотом пласта Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
---	----------	-------------------	--	---	------	------	---------

Дифлофеникан + мезосульфурон-метил + антидот мефенпир-диэтил + йодосульфурон-метил-натрий

Алистер Гранд, МД (180 г/кг + 6 г/кг + 27 г/кг + 4,5 г/кг) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-4052-1 29.03.2023 28.03.2033	0,6 - 0,8	Рожь озимая, тритикале озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листьев – начало кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева высевать яровые зерновые (кроме овса), картофель, кукурузу Расход рабочей жидкости - 150 -200 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,6-1,0	Пшеница озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листьев – начало кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева высевать яровые зерновые (кроме овса), картофель, кукурузу Расход рабочей жидкости - 150 -200 л/га	-(1)	-(3)	

Дифлофеникан + флуфенацет

Фомдос, КС (100 г/л + 400 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-4703-1 05.11.2024 05.11.2034	0,4-0,8	Пшеница озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева в год применения препарата, на том же поле можно выращивать пшеницу озимую и тритикале. Через 4-5 месяцев можно высевать пшеницу яровую и тритикале, ячмень яровой; через 6 месяцев – горох, кукурузу, бобы, подсолнечник. Нельзя в качестве замещающей культуры высевать свеклу сахарную и рапс яровой.	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-------------------	--	---	-------	------	---------

Изоксафлютол

Мерлин, ВДГ (750 г/кг) Байер САС ОГРН: - II/- 213-03-1208-1 05.09.2016 04.09.2026	0,1-0,16	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(30)	Активен
---	----------	----------	--	--	-------	-------	---------

Изоксафлютол + антидот ципросульфамид

Мерлин Флекс, КС (240 г/л + 240 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-2038-1 02.11.2018 01.11.2028	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазу 2-3 листьев кукурузы и ранние фазы развития сорных растений. В случае пересева в год применения можно высевать только кукурузу. Осенью в год применения высевать только озимую пшеницу. Весной следующего года, если в год применения гербицида отмечена засуха, нельзя высевать свеклу, рапс, подсолнечник, гречиху, картофель и овощные культуры. В условиях достаточного	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	----------	--	--	-------	------	---------

	0,2-0,3	Нут	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. В условиях достаточной влажности ограничения по севообороту отсутствуют. Если в год применения гербицида отмечена засуха, перед посевом чувствительных культур обязательна глубокая вспашка или рыхления на глубину не менее 15 см Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	60(1)	-(3)	
--	---------	-----	--	--	-------	------	--

Изопротурон + Дифлюфеникан

Морион, СК (500 г/л + 100 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03-1704-1 19.04.2017 18.04.2027	0,75-1	Пшеница и рожь озимые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов осенью (до появления всходов культуры) или в фазу 3 листьев – начало кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева высевать яровые зерновые (кроме овса), картофель, кукурузу. Для пересева крестоцветными и зернобобовыми культурами обязательна вспашка с оборотом пласта Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
--	--------	-----------------------	---	---	------	------	---------

Имазамокс

Родимич, ВР (40 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - Ш/Ш, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 Ш/Ш 297(042)-03-1240-1 27.09.2016 26.09.2026	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 мес.) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 мес.) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
Глобал, ВР (40 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 Ш/Ш 192-03-4211-1 27.09.2023 26.09.2033	0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	

	1,0-1,5	Подсолнечник, сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам на семена и масло	Подсолнечник, сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам на семена и масло	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дентайр, ВР (40 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-4353-1 09.01.2024 08.01.2034	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
Имквант, ВР (40 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-03-4259-1 23.11.2023 22.11.2033	0,8-1,1	Рапс яровой (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу 2-6 листьев у культуры и ранние фазы роста сорных растений. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	
	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,8-1,1	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Парсек, ВР (40 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 Ш/Ш, Агрия АД ОГРН: - Ш/Ш 184(026)-03-4149-1 07.07.2023 06.07.2033	0,75-1,0	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений 1-3 листа) и 1-3 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы сахарной (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 мес.) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений 1-3 листа) и 1-3 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы сахарной (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 мес.) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два	60(1)	-(3)	
Пульсар Плюс, ВР (25 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - Ш/Ш 224-03-1432-1 30.03.2017 224-03-1432-1/392 392 29.03.2027	1,4-1,6	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Безопасный интервал между применением препарата и высевам овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет- 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

	1,0-1,6	Горох	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Применять с учетом возможного проявления фитотоксичности препарата в условиях высоких температур и недостатка влаги, а также на почвах с низким содержанием гумуса. Безопасный интервал между применением препарата и высеом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев	58(1)	-(3)	
	1,4-2	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербицидам Пульсар Плюс, ВР (25 г/л имазамокса) и Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (16,5 г/л имазамокс	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; свеклу сахарную и свеклу столовую – через	60(1)	-(3)	
	1,0-1,6	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазы развития примордий-1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Применять с учетом возможного проявления фитотоксичности препарата в условиях высоких температур и недостатка влаги, а также на почвах с низким содержанием гумуса. Безопасный интервал между применением препарата и высеом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев	60(1)	-(3)	
Пульсар Старт, ВРК (120 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - П/П 224-03-3043-1 05.03.2021 04.03.2031	3-4	Подсолнечник на семена и масло (гибриды, устойчивые к гербициду Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (16,5 г/л имазамокса + 7,5 г/л имазапир	Заразиха, виды	Предпосевная обработка семян заблаговременно с последующим опрыскиванием посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры гербицидом Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (16,5 г/л имазамокса + 7,5 г/л имазапир) с нормой расхода 1,6 л/га. В случае пересева в год применения не рекомендуется высевать крестоцветные, сахарную и столовую свеклу, подсолнечник, картофель и овощные культуры. Ограничения по севообороту	60(1)	-(3)	Активен
Пульс-Стар, ВРК (120 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/П 063-03-2885-1 18.11.2020 17.11.2030	0,25-0,35	Соя, горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); через год – яровые и озимую пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и	60(1)	-(3)	Активен

Пропус, ВР (40 г/л) ООО «КЛЕВЕР ГРУПП» ОГРН: 1172801001350 III/III 570-03-2405-1 19.09.2019 18.09.2029	0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 листьев) и 1-3 настоящих листа у культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме свёклы сахарной (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свёклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений и 4-5 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме свёклы сахарной и рапса традиционных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свёклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,1	Рапс яровой (гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме свёклы сахарной и рапса традиционных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свёклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Парадокс, ВРК (120 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4485-0 29.03.2024 28.03.2027	0,25-0,35	Соя, горох (кроме овощного горошка)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинам); на следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинам); через два	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Люцерна	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа), начиная от 2-х настоящих листьев культуры, для устоявшихся посевов обработки выполнять до отрастания культуры весной или между укосами. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люпин, рапс	-(1)	-(3)	

	0,3-0,4	Рапс, подсол-нечник на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивы к имидазолинонам)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два	60(1)	-(3)	
Глобал Плюс, ВК (120 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-1382-1 06.03.2017 05.03.2027	0,3-0,4	Рапс озимый (гибриды, устойчивы к гербицидам на основе имидазолинонов)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: Пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; Люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; свеклу сахарную	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Подсолнечник на семена и масло (гибриды, устойчивы к гербицидам на основе имидазолинонов)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: Пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; Люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; свеклу сахарную, свеклу столовую, рапс	60(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой (гибриды, устойчивы к гербицидам на основе имидазолинонов)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: Пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; Люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; свеклу сахарную	60(1)	-(3)	
Имазошанс, ВР (40 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4535-0 25.04.2024	0,8-1,2	Рапс яровой и озимый (сорта и гибриды, устойчивы к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу 2-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

126-03-4535-0/488 488 24.04.2027	1,0-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Юнкер, ВР (40 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-4491-1 01.04.2024 31.03.2034	0,75-1	Горох	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Подсолнечник, сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листа культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Илот, ВР (40 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-1374-1 22.02.2017 21.02.2027</p>	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев. Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев. Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал	53(1)	-(3)	
<p>Курсар, ВР (40 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-03-1540-1 11.08.2017 10.08.2027</p>	0,75-1	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Раскол пабочей жилкости -	53(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Раскол пабочей жилкости -	60(1)	-(3)	
<p>Метас, ВР (40 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - III/III 607-03-3728-1 26.07.2017 25.07.2027</p>	0,25 - 0,35	Горох (кроме овощного горошка)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	52(1)	-(3)	Активен

	1	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербицидам на основе имидазолинонов) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорнякиОднолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры.Ограничения по севооборотам:Пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; свеклу сахарную и свеклу	50(1)	-(3)	
	0,75-1	Соя, горох (кроме зеленого горошка)	Однолетние злаковые и двудольные сорнякиОднолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры.На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев).На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	
Каспер, ВРК (40 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03-2736-1 07.07.2020 178-03-2736-1/381 381 06.07.2030	0,8-1,2	Рапс яровой и озимый (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (от 2–6 настоящих листьев до вытягивания стеблей) культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые посевы обрабатывают осенью или весной. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса традиционных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,4	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к действию имидазолинонов) (на семена и масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,0	Горох (при выращивании на зерно), соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Пульмакс, ВРК (120 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-3693-1 23.05.2022 22.05.2032	0,3 – 0,4	Рапс яровой на семена и масло (гибриды, устойчивы е к имидазо-л инонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	57(1)	-(3)	Активен
	0,25 – 0,35	Горох (кроме овощного горошка)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	
	0,25 – 0,35	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	
Пульсар, ВР (40 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - III/III 334-03-2185-1 05.04.2019 334-03-2185-1/276 276 04.04.2029	0,8-1,25	Подсолнеч ник (гибриды, устойчивы е к имидазоли нонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме овощных крестоцветных культур, картофеля и свеклы сахарной (безопасный интервал между применением гербицида и посевом овощных крестоцветных культур, свеклы и посадки картофеля – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Соя, горох (кроме овощного)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы сахарной (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 мес.). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Зонатор, ВР (40 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 Ш/Ш, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 Ш/Ш 050(360)-03-1061-1 07.04.2016 06.04.2026	0,8-1,1	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,1	Рапс яровой (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу 2-6 листьев у культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	
Имазабел, ВР (40 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 Ш/Ш 277-03-1024-1 11.03.2016 10.03.2026	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняках	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы-16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1	Горох и нут (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые сорняках	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы-16 месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	

Листего Про, ВР (50) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-03-2668-1 28.04.2020 27.04.2030	0,8-1,0 л/га	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду Листего Про, ВР (50 г/л имазамокса))	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь, свеклу сахарную и свеклу столовую, рапс (традиционные сорта и гибриды) можно	60(1)	-(3)	Активен
---	--------------	---	--	--	-------	------	---------

Имазамокс + Бентазон

Бастер, ВР (25 г/л + 460 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-4333-1 22.12.2023 21.12.2033	1,2-1,5	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	Активен
	1,4-2,2	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	
Корсар Супер, ВРК (25 г/л + 400 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-2051-1 12.11.2018 11.11.2028	1,2-1,6	Соя, горох (кроме овощного горошка)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	Активен

Имазамокс + Имазамокс

Зодиак, ВР (40 г/л + 40 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П, ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 П/П, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: -	0,8-1,1	Рапс яровой и озимый (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную, свеклу столовую, рапс	()	-(3)	Активен
--	---------	---	--	--	----	------	---------

<p>----- III/III 010(011)-03-1564-1 25.12.2014 09.01.2035</p>	0,75-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овёс, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную, свеклу столовую, рапс	()	-(3)	
	0,75 - 1,0	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы — 16 месяцев. Расход рабочей жидкости - 200 – -300 л/га	54(1)	-(3)	
	0,75 - 1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы — 16 месяцев. Расход рабочей жидкости - 200 – -300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1	Горох (при выращивании на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	52(1)	-(3)	
<p>Юзмар, ВР (40 г/л + 120 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3794-1 14.09.2022 13.09.2032</p>	0,3 - 0,4	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	Активен

0,75-1,0	Горох (при выращивании на зерно), нут	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)
0,3 - 0,4	Рапс яровой на семена и масло (гибриды, устойчивые к имидазо-линонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	57(1)	-(3)
0,25 - 0,35	Рапс яровой на семена и масло (гибриды, устойчивые к имидазо-линонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	57(1)	-(3)
0,25 - 0,35	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)
0,75-1,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листа у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

Имазамокс + Имазапир

Сотейра, ВРК (33 г/л + 15 г/л) ООО «Краснодарский биоцентр» ОГРН: 1082323000430 III/III, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 248(042,297)-03-1310-1 21.12.2016 20.12.2026	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не менее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох-через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	Активен
	2	Земли несельскохозяйственного назначения	Борщевик Сосновского	Опрыскивание участков, засоренных борщевиком Сосновского при его высоте 10-15 см Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	2	Земли несельскохозяйственного назначения	Амброзия полыннолистная	Опрыскивание участков, засоренных амброзией полыннолистной в фазу всходов и до высоты 10-15 см Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Диома, ВРК (33 г/л + 15 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-3394-1 06.12.2021 05.12.2031	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную и столовую, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
Евро-Лайтнинг, ВРК (33 г/л + 15 г/л) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - III/III 334-03-2534-1 19.02.2020 18.02.2030	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную и столовую, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
Еврошанс, ВРК (33 г/л + 15 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-618-1 01.04.2015 31.03.2025	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Не активен

Каптора, ВРК (33 г/л + 15 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-839-1 30.10.2015 29.10.2025	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к гербициду Каптора, ВРК)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох (через 9 месяцев). Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
Агро-Лайт, ВРК (33 г/л + 15 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - III/III 010(011)-03-1562-1 10.12.2015 09.12.2025	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
Имквант Супер, ВРК (33 г/л + 15 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-898-1 16.12.2015 097-03-898-1/378 378 15.12.2025	1-1,2	Рапс яровой и озимый (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); через год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	
Мантра, ВРК (33 г/л + 15 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-1373-1 22.02.2017 21.02.2027	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не менее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох-через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	Активен

Маркос, ВР (33 г/л + 50 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-4349-1 09.01.2024 08.01.2034	1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) на семена и масло	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
--	-----	---	--	---	-------	------	---------

Имазамокс + хлоримурон-этил

Концепт, МД (38 г/л + 12 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4126-1 19.06.2023 18.06.2033	0,6-1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листа) и 1-3 настоящих листьев у культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-------	-----	---	---	-------	------	---------

Имазапир

Ас, ВК (250 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-2459-1 07.11.2019 06.11.2029	2-5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 30 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	Активен
Шквал, ВК (250 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2428-1 16.10.2019 15.10.2029	2,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и другие)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	Активен
	2,0-2,5	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды сорных растений, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	

<p>Арбонал, ВК (250 г/л) ООО «Новокеми» ОГРН: - III/III 054-03-2481-1 21.11.2019 20.11.2029</p>	2,0-2,5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды сорняков, в том числе амброзия полыннолистная и горчак ползучий	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в том числе амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	Активен
	2,0-3,0	Вырубки разной давности при подготовке площадей под лесные культуры, для содействия естественному возобновлению хвойных	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в июле-августе, один раз за период выращивания насаждений. Посадка саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой не ранее, чем через месяц после опрыскивания; с открытой корневой системой – весной следующего года. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	
	2,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	
	0,8-2,4 мл/дерево	Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои (за исключением парков, скверов, бульваров, трамвайных и железнодорожных путей)	Осина	Инъекция в стволы деревьев в июне-августе. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней.	-(1)	15(15)	
	0,16-0,32 мл/дерево	Лиственные и лиственнично-хвойные древостои в фазе жердняка (за исключением парков, скверов, бульваров, трамвайных и железнодорожных	Мягколиственные древесные породы (осина, береза)	Инъекция в стволы деревьев в июне-августе. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод – 20 дней.	-(1)	15(15)	

<p>Грейдер, ВГР (250 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2335-1 25.07.2019 24.07.2029</p>	20-50 мл/ 3 л воды(Л)	Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(3)	Активен
	0,075 -0,12	Подсолнечник, рапс яровой и озимый (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); через год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и	60(1)	-(3)	
	2,0-5,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	15(15)	

Имазапир + Имазамокс

<p>Девайс Ультра, ВРК (15 г/л + 33 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - III/III 062-03-3092-1 07.04.2021 06.04.2031</p>	1,0-1,2	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам) (на семена и масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную и столовую, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
<p>Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК (7,5 г/л + 16,5 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - III/III 224-03-774-1 11.09.2015 10.09.2025</p>	1,6-2,5	Подсолнечник на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивые к гербициду Евро-Лайт нинг Плюс)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох - через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу	60(1)	-(3)	Активен

Евро-Ленд, ВРК (15 г/л + 33 г/л) ООО «Яровит» ОГРН: - III/III 282-03-545-1 06.02.2015 05.02.2025	1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох (через 9 месяцев). Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Не активен
Еврошанс Плюс, ВРК (7,5 г/л + 16,5 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-3045-1 04.03.2021 03.03.2031	1,6-2,5	Подсолнечник на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивые к гербициду Еврошанс Плюс, ВРК (16,5 г/л имазамокс а + 7,5 г/л имзапира))	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох (через 9 месяцев). Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев <i>Расход рабочей жидкости -</i>	60(1)	-(3)	Активен
Импекс Дуо, ВРК (15 г/л + 33 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4114-1 12.04.2017 11.04.2027	1-2	Подсолнечник на семена и масло (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох - через 9 месяцев после применения препарата. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев; сахарную и столовую свеклу	60(1)	-(3)	Активен
Челленджер, ВРК (15 г/л + 33 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-4337-1 26.12.2023 25.12.2033	1,0-1,2	Подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев <i>Расход рабочей жидкости -</i>	60(1)	-(3)	Активен
Каптора Плюс, ВРК (7,5 г/л + 16,5 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 II/III 041-03-2675-1 18.05.2020 17.05.2030	1,6-2,5	Подсолнечник (на семена и на масло) (гибриды, устойчивые к гербициду Каптора Плюс, ВРК (16,5 г/л имазамокс а + 7,5 г/л имзапира))	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную и столовую, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен

<p>Грант, ВРК (15 г/л + 33 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/ПП 046-03-3694-1 23.05.2022 22.05.2032</p>	1,0-1,2	Подсолнечник на семена и масло (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: пшеницу и рожь можно высевать не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, под-солнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, свеклу сахарную и столовую, рапс – через 26 месяцев	60(1)	-(3)	Активен
	20-40 мл/100 м2(Л)	Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений	Борщевик Сосновского	Опрыскивание участков, засоренных борщевиком Сосновского при его высоте 20-30 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	1(-)	

Имазапир + сульфометурон-метил

<p>АтронПро, ВДГ (250 г/кг + 75 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 ПП/ПП 002-03-3781-1 09.09.2022 08.09.2032</p>	1,0-2,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой от 20-30 см до фазы бутонизации. Запрещается пребывание на обработанных территориях, в т.ч. сбор грибов и ягод в течении 30 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	2,0-3,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива)	Опрыскивание вегетирующей растительности. Запрещается пребывание на обработанных территориях, в т.ч. сбор грибов и ягод в течении 30 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	
	1,5-2,0	Площади под плантации и другие посадки сосны и ели	Все виды нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности	Опрыскивание вегетирующей растительности, посадка саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой не ранее, чем через месяц после опрыскивания; с открытой корневой системой - весной следующего года. Запрещается пребывание на обработанных территориях, в т.ч. сбор грибов и ягод в течении 30 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	

	1,0-2,0	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные нежелательные травянистые растения	Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте до 35 см. Запрещается пребывание на обработанных территориях, в т. Ч. Сбор грибов и ягод в течении 30 дней Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	
--	---------	---	---	--	------	------	--

Имазетапир

<p>Геразол, ВРК (100 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/- 070-03-3812-1 05.10.2022 04.10.2032</p>	0,5-0,75	Нут, горох на зерно, горох овощной на семена, горох овощной для промыш-ленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы в течение 2-3-х дней после посева или опрыскивание посевов в фазе всходов 3-6-ти листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – 2-х тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	78(1)	-(3)	
<p>Тапир, ВК (100 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2212-1 07.05.2019 06.05.2029</p>	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Горох на зерно	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	27(1)	-(3)	

Пивот, ВК (100 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - III/III 334-03-2414-1 24.09.2019 23.09.2029	0,5-0,8	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание посевов до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – 2-х тройчатых листьев культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Виадук, ВК (100 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛС ИНК. ОГРН: - III/III 010-03-3659-1 27.04.2022 26.04.2032	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Горох овощной	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
Зета, ВРК (100 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-2634-1 27.03.2020 26.03.2030	0,5-0,75	Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные (в том числе виды амброзии) сорные растения	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 настоящих листьев культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Люпин (семенные посевы)	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные (в том числе виды амброзии) сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные (в том числе виды амброзии) сорные растения	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание вегетирующих растений в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	78(1)	-(3)	

Сerp, BPK (100 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-4256-1 16.11.2023 15.11.2033	0,5-0,75	Горох на зерно	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы в течение 2-3-х дней после посева или опрыскивание посевов в фазе всходов 3-6-ти листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – 2-х тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	78(1)	-(3)	
Тапирошанс, BPK (100 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-578-1 02.03.2015 01.03.2025	0,5-0,75	Нут, горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазу всходов 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Не активен
	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	78(1)	-(3)	
Гольф, BK (100 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «АГРОДИМ» ОГРН: 1136449005351 III/III 042(275)-03-737-1 31.07.2015 30.07.2025	0,5-0,75	Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазу всходов 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Солист, ВРК (100 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-2384-1 06.03.2017 05.03.2027	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Ранголи-Прадо, ВРК (100 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1866-1 10.04.2018 09.04.2028	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	78(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,75	Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазу 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	
Длясои, ВК (100 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-5020-1 26.05.2020 25.05.2030	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – 2-х тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Пивам, ВРК (100 г/л) ООО АМУРАГРОХИМЦЕНТР ОГРН: 1022800507080 III/III 665-03-2977-1 13.01.2021 12.01.2031	0,5-0,8	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные (в том числе виды амброзии) сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание вегетирующих растений в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Пузат Экстра, ВДГ (700 г/кг) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - II/III 699-03-4215-1 06.10.2023 05.10.2033	0,07-0,11	Горох на зерно	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	Активен
	0,07-0,13	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – 2-х тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Сапфир, ВРК (100 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-4769-0 10.01.2025 09.01.2028	0,5-0,75	Нут, горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазу всходов – 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Люпин (семенные посевы)	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры. Ограничения по севообороту: на следующий год рекомендуется высевать кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов – двух тройчатых листьев культуры. Ограничение по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	60(1)	-(3)	

	1	Люцерна	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения, в том числе виды повилики	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	
--	---	---------	---	--	------	------	--

Имазетапир + Имазамокс

Одиссей, ВГР (40 г/л + 30 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3472-1 13.01.2022 12.01.2032	0,5-1	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам) (на семена и масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 листьев у культуры. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); через год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-1	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры и в ранние фазы роста (до 4 листьев) сорных растений. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу, рапс озимый (устойчивый к имидазо-линонам); через год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник	60(1)	-(3)	

Имазетапир + Имазапир

Тапир Гибрид, МК (50 г/л + 20 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2597-1 16.03.2020 15.03.2030	0,8-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев подсолнечника. Соблюдать ограничения по севообороту. В год применения препарата (в случае пересева или повторные культуры) при условии глубокой вспашки рекомендуется высевать сою, горох, арахис, конские бобы. Через четыре месяца – пшеницу озимую; пшеницу яровую, овес, ячмень яровой и озимый, рожь. Спустя 18 месяцев можно высевать подсолнечник рис	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	---	--	--	-------	------	---------

Имазетапир + пропаквизафоп

Видблос Плюс, МЭ (37,5 г/л + 25 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-1917-1 16.05.2018 15.05.2028	1,6-2	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев подсолнечника. Соблюдать ограничения по севообороту. В год применения препарата (в случае пересева) рекомендуется высевать пшеницу озимую; на следующий после применения год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-------	---	---	---	-------	------	---------

	1,2-2	Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорные растений (2-4 листа) и всходов – двух тройчатых листьев культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. В год применения препарата (в случае пересева) рекомендуется высевать пшеницу озимую; на следующий после применения год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
--	-------	-----	---	---	-------	------	--

йодосульфурон-метил-натрий + антидот мефенпир-диэтил + мезосульфурон-метил

Вердикт, ВДГ (6 г/кг + 90 г/кг + 30 г/кг) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-3232-1 16.07.2021 15.07.2031	0,3	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения (овсюг, мятлик, лисохвост, метлица)	Опрыскивание посевов в фазе от начала до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2 – 4 листа) с добавлением 0,5 л/га адьюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л этоксилированного лаурилсульфата) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	Активен
	0,3 - 0,5	Пшеница озимая, тритикале озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения (овсюг, мятлик, лисохвост, метлица)	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2 – 4 листа) с добавлением 0,5 л/га адьюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л этоксилированного лаурилсульфата) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(1)	-(3)	
	0,3 - 0,5	Пшеница озимая, тритикале озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения (овсюг, мятлик, лисохвост, метлица)	Опрыскивание посевов осенью в фазе 3 листа – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2 – 4 листа) с добавлением 0,5 л/га адьюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л этоксилированного лаурилсульфата) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + Форамсульфурон + антидот ципросульфамид

Фориндо Микс, МД (1 г/л + 10 г/л + 31,5 г/л + 15 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-4057-1 31.03.2023 30.03.2033	1,25-1,5	Кукуруза (зеленая масса, зерно, силос)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	----------	--	--	--	-------	------	---------

йодосульфурон-метил-натрий + Форамсульфурон + антидот изоксадифен-этил

МайсТер, ВДГ (10 г/кг + 300 г/кг + 300 г/кг) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-2409-1 20.09.2019 19.09.2029	0,125 - 0,15	Кукуруза (зеленая масса, зерно, силос)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений совместно с адьювантом 1,0 л/га БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л алкил-эфир-сульфат-натриевой соли) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	--------------	--	--	--	-------	------	---------

йодосульфурон-метил-натрия + 2,4-Д (2-этилгексильный эфир) + антидот мефенпир-диэтила

Мушкет Плюс, МД (5 г/л + 285,2 г/л + 25 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-03-3480-1	0,5-0,7	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая, тритикале озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до формирования второго междоузлия культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--	---	---	-------	------	---------

19.01.2022 18.01.2032	0,5-0,7	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы трех листьев до формирования второго междоузлия культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

йодосульфурон-метил-натрия + антидот мефенпир-диэтила

Кантата, МД (100 г/л + 300 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-4662-0 05.09.2024 04.09.2027	0,07-0,10	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые злаковые (метлица полевая) сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы начало выхода в трубку культуры и ранние фазы роста (2-4 листа) сорных растений. Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения	60(1)	-(3)	Активен
	0,07-0,10	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые злаковые (метлица полевая) сорные растения	Опрыскивание посевов весной, в фазе кущения – начало выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений. Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения	60(1)	-(3)	
	0,07-0,10	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые злаковые (метлица полевая) сорные растения	Опрыскивание посевов осенью, в фазе 2-3 листьев – кущения культуры, и ранние фазы роста сорных растений. Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих	-(1)	-(3)	

калиевая + МЦПА (диметиламинная + натриевая соли, смесь)

Агрошанс, ВК (500 г/л + 500 г/л + 500 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/Ш 126-03-3168-1 01.06.2021 31.05.2031	0,8-1	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Пшеница, ячмень, рожь озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднепозднеспелые и позднепозднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес яровые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	

калиевая + натриевая соли, смесь) + МЦПА (диметиламинная

Агритокс, ВК (500 г/л + 500 г/л + 500 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/Ш 024-03-2107-1 14.03.2019 13.03.2029	0,8-1,2	Клевер луговой под покровом ячменя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кушения ячменя) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,2	Просо	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-1,5	Кострец безостый, лисохвост луговой, райграс высокий, овсяница луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорняков в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1-1,5	Пшеница, ячмень, рожь озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Клевер луговой и клевер ползучий	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1-1,5	Тимофеевка луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес яровые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-1,5	Сенокосные угодья и пастбища	Вредные ядовитые двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднепозднеспелые и позднепозднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Клевер луговой (семенные посевы)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

	0,8-1	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
карфентразон-этил							
Буцефал, КЭ (480 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050-03(04)-2968-1 30.12.2020 29.12.2030	0,025-0,03	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в том числе подмаренник цепкий, и устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
карфентразон-этил + 2,4-Д (сложный 2-этилгексировый эфир)							
Аврорекс, КЭ (21 г/л + 332 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 II/II 050-03-4562-1 07.05.2024 06.05.2034	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Квизалофоп-П-тефурил							
Пантера, КЭ (40 г/л) ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А. ОГРН: - III/III 869-03-4066-1 21.04.2023 20.04.2033	1,0-1,5	Свекла сахарная, кормовая, столовая, картофель, лен-долгун ец, лук, морковь, капуста белокочан ная, томаты рассадные и посевные, соя, рапс	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Лира, КЭ (40 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 III/III 653-03-4185-1 17.08.2023 16.08.2033	0,75-1	Свекла сахарная, подсолнеч ник, соя, горох, рапс озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Свекла сахарная, подсолнеч ник, соя, горох, рапс озимый	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Хилер, МКЭ (40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4600-1 07.06.2024 06.06.2034	1,0-1,5	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, лен долгунец, соя, подсолнеч ник	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,75-1,0	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, лен долгунец, соя, подсолнеч ник	Однолетние злаковые сорные растения (в том числе куриное просо, просо сорнополевое, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев злаковых сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	

Квизурил, КЭ (40 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3810-1 04.10.2022 03.10.2032	1,0-1,5	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, картофель, лук (кроме лука на перо), морковь, капуста белокочанная, рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Нут	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Нут	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, картофель, лук (кроме лука на перо), морковь, капуста белокочанная, рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Кормовая свекла, лен-долгунец	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Кормовая свекла, лен-долгунец	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Лемур, КЭ (40 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III, ООО «АФД» ОГРН: - III/III 085(086)-03-598-1 13.03.2015 12.03.2025	0,75-1	Нут	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	Не активен
	0,75-1	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, лук (кроме лука на перо), морковь, капуста белокочанная, картофель (кроме раннеспелых сортов).	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	1-1,5	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, лук (кроме лука на перо), морковь, капуста белокочанная, картофель (кроме раннеспелых сортов)	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-1,5	Свекла кормовая, лен-долгунец	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,75-1	Свекла кормовая, лен-долгунец	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1-1,5	Нут	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
Эвокат, КЭ (50 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-5047-1 14.06.2023 13.06.2033	0,9-1,2	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, лен-долгунец, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-0,9	Свекла сахарная, рапс яровой и озимый, лен-долгунец, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения (куриное просо, виды щетинника, просо сорное)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Квинмерак + Имазамокс

Нопасаран Ультра, КС (250 г/л + 35 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - III/III 224-03-1203-1 22.08.2016 21.08.2026	1	Рапс озимый, устойчивый к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений осенью в фазе 2-6 листьев культуры или весной (до появления цветочных бутонов) в ранние фазы развития сорных растений в смеси с ПАВ ДАШ при соотношении компонентов 1:1 (1 л/га).Безопасный интервал между применением препарата и высеом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---	--	--	--	-------	------	---------

	1	Рапс яровой, устойчивы й к имидазо линомам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазе 2-6 листьев культуры (до фазы вытягивания стеблей) и ранние фазы развития сорных растений в смеси с ПАВ ДАШ при соотношении компонентов 1:1 (1 л/га).Безопасный интервал между применением препарата и высеом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
--	---	---	--	--	-------	------	--

Квинмерак + Метазахлор

Бутизан Стар, КС (83 г/л + 333 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-03-3279-1 01.09.2021 31.08.2031	2-3	Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры осенью или весной в фазе до 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений (не позднее стадии семядолей) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	2-3	Рапс яровой	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазе от семядолей до 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений (не позднее стадии семядолей) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
ТРАНИШ Супер, СК (83 г/л + 333 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1701-1 25.03.2015 24.03.2025	2-3	Рапс яровой	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазе от семядолей до 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	2-3	Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры осенью или весной в фазе 1-4 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	
Орлан, МК (63 г/л + 250 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2665-1 24.04.2020 23.04.2030	2,0-3,0	Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры осенью в фазу 1-4 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков (семядоли) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,0	Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры весной в фазу 1-4 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков (семядоли) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Рапс яровой	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазу от семядолей до 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков (семядоли) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

Квинмерак + Метамитрон

Голтикс Титан, КС (40 г/л + 525 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-3714-1 14.06.2022 13.06.2032	1,5-2,0	Свёкла сахарная и свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных) по первой, второй и третьей волне Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	42(3)	-(3)	Активен
--	---------	--	---	---	-------	------	---------

Квинмерак + хлоридазон

Ребелл Т, КС (60 г/л + 360 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-03-1470-1 19.04.2017 18.04.2027	1,5-2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Активен
---	-------	--------------------	---	--	-------	------	---------

Клетодим

Берилл, КЭ (120 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-3867-1 10.11.2022 09.11.2032	0,7-1,0	Соя, кормовая свекла	Многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,6-1,8	Свекла столовая (кроме пучкового товара), сахарная, рапс яровой и озимый, подсолнеч ник на семена и масло	Многолетние злаковые сорные растения (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Соя, кормовая свекла	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла столовая (кроме пучкового товара), сахарная, рапс яровой и озимый, подсолнеч ник на семена и масло	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Эрроу, КЭ (120 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-4532-0 06.05.2024 05.05.2034	0,6-0,7	Свекла сахарная, свекла кормовая, лук, морковь, соя, подсолнеч ник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Соя, рапс яровой, рапс озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,6-1,8	Свекла сахарная, свекла кормовая, лук, морковь, соя, подсолнеч ник, рапс яровой, рапс озимый	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	«Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры	60(1)	-(3)	
Выбор, КЭ (360 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд.	0,3-0,4	Свекла сахарная, соя, рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

ОГРН: - III/III 699-03-3132-1 13.05.2021 12.05.2031	0,6	Свекла сахарная, соя, рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Граминион, КЭ (150 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3360-1 01.11.2021 021-03-3360-1/414 414 31.10.2031	1-1,5	Томат рассадный	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Люпин, клещевина (на техническ ие цели)	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Томат рассадный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Гречиха, томат посевной, лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Свекла сахарная, соя, подсолнеч ник (на семена и масло), картофель, лук (кроме лука на перо), морковь (кроме раннеспел ых сортов)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе 2-6 листьев у сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Люпин, клещевина (на техническ ие цели)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Свекла сахарная, соя, подсолнеч ник (на семена и масло), картофель, лук (кроме лука на перо), морковь (кроме раннеспел ых сортов)	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов весной при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-1,5	Гречиха, томат посевной, лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Злакобой, КЭ (240 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - III/III	0,7-1	Соя	Многолетние злаковые сорные растения (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

064-03-3547-1 21.03.2022 20.03.2032	0,2-0,4	Соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе 2-6 листьев) независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Злакофф, КЭ (240 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 III/III, ООО ХИМСНАБ ОГРН: 1072312011617 III/III 682(913)-03-4421-1 19.02.2024 18.02.2034	0,7 - 1,0	Свекла сахарная, соя, рапс яровой и озимый, лен-кудряш, подсолнечник (на семена и масло)	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2 - 0,4	Свекла сахарная, соя, рапс яровой и озимый, лен-кудряш, подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7 - 1,0	Лен - долгунец	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2 - 0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон-99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Злактерр, КЭ (240 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 III/III 424-03-2479-1 20.11.2019 19.11.2029	0,2-0,4	Подсолнечник	Однолетние (виды щетинника, просо куриное, просо полевое) злаковые сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,0	Свекла сахарная, соя	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя	Однолетние (виды щетинника, просо куриное, просо полевое) злаковые	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Подсолнечник	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Капило, КЭ (240 г/л) ООО «КЛЕВЕР ГРУПП» ОГРН: 1172801001350 III/III 570-03-3465-1 30.12.2021 29.12.2031	0,7-1	Свекла сахарная, соя, подсолнеч ник (на семена и масло)	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры, с добавлением 200 мл/га ПАВ Неонол АФ9-12 (800 г/л оксигетилированных алкилфенолов) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неонол АФ9-12 (800 г/л оксигетилированных алкилфенолов) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Клерк, КЭ (240 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3898-1 02.12.2022 01.12.2032	0,7-1,0	Лен - долгунец	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ-90, Ж 900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, картофель, морковь, лук, подсолнеч ник, рапс	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Свекла сахарная, соя, картофель, морковь, лук, подсолнеч ник, рапс	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ-90, Ж 900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Ланкастер, КЭ (240 г/л) ООО ТетраХим ОГРН: 1167746491681 III/III 642-03-2918-1 09.12.2020 08.12.2030	0,7-1,0	Лен - долгунец	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,4	Свекла сахарная, рапс яровой, подсолнеч ник, соя, горох, нут, картофель	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Свекла сахарная, рапс яровой, подсолнеч ник, соя, горох, нут, картофель	Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Макси Злак, КЭ (120 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-3277-1 31.08.2021 30.08.2031	0,5 - 0,7	Свекла сахарная, свекла столовая, рапс яровой и озимый, подсолнечник, соя, горох, картофель	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2 – 6 листьев) независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0 - 1,6	Свекла сахарная, свекла столовая, рапс яровой и озимый, подсолнечник, соя, горох, картофель	Многолетние злаковые сорные растения (в т.ч. пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10- 20 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Селектор, КЭ (240 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-2404-1 19.09.2019 002-03-2404-1/356 356 18.09.2029	0,2-0,4	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание сорняков в фазе 2-6 листьев у сорных растений независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1	Свекла сахарная, лук репчатый (репка, чернушка), соя	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорных растений с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)	
	0,7-1	Подсолнечник	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры, с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Лен масличный	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, лук репчатый (репка, чернушка), соя	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,7-1,0	Лен - долгунец	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Подсолнеч ник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-6 листьев у сорняков, независимо от фазы развития культуры, с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорных растений с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Селект, КЭ (120 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-03-534-1 03.02.2015 201-03-534-1/283 283 02.02.2025	1,6 - 1,8	Капуста белокочан ная рассадная, капуста белокочан ная посевная, томат рассадный, томат посевной, лук-репка, картофель (кроме раннеспел	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	7(3)	Не активен
	0,5 - 0,7	Капуста белокочан ная рассадная, капуста белокочан ная посевная, томат рассадный, томат посевной, лук-репка, картофель (кроме раннеспел	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,5-0,7	Соя, рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	7(3)	
	1,6-1,8	Свекла сахарная, столовая, кормовая, подсолнеч ник, соя, рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,6-0,7	Свекла сахарная, столовая, кормовая, подсолнеч ник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	7(3)	

<p>Тальвар, КЭ (240 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-4451-1 12.03.2024 11.03.2034</p>	0,7-1,0	Зернобобовые на зерно, за исключением сои	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,4	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Зернобобовые на зерно, за исключением сои	Однолетние злаковые сорные растения (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
<p>Цензор Макс, МКЭ (120 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3147-1 18.05.2021 17.05.2031</p>	0,6-0,7	Свёкла сахарная, соя, лук-репка, лен масличный, лен-долгунец, люпин	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,4-1,6	Свёкла сахарная, соя, лук-репка, лен масличный, лен-долгунец, люпин	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Центурион, КЭ (240 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-03-1056-1 04.04.2016 03.04.2026</p>	0,7-1,0	Подсолнечник, рапс яровой, горох, свекла сахарная	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с адьювантом Амиго Стар, КС (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) 1,4-2 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,4	Подсолнечник, рапс яровой, горох, свекла сахарная	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с адьювантом Амиго Стар, КС (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) 0,4-0,8 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, морковь, лук (кроме лука на перо), соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с адьювантом Амиго (285 г/л фосфат эфира) 0,6-1,2 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,7-1,0	Лен - долгунец	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с адьювантом Амиго, КС (285 г/л фосфат эфира) 2,1-3 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, морковь, лук (кроме лука на перо), соя	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с адьювантом Амиго, КС (285 г/л фосфат эфира) 2,1-3 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с адьювантом Амиго (285 г/л фосфат эфира) 0,6-1,2 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
<p>Легион Комби, КЭ (240 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 II/II 178-03-2598-1 16.03.2020 15.03.2030</p>	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)	Активен
	0,7-0,9	Свекла сахарная, подсолнеч ник, картофель (кроме ранних сортов), соя	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-0,9	Лен масличный	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, в фазу «елочки» льна масличного Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,7-0,9	Рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений в фазу «елочки» льна масличного Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Свекла сахарная, подсолнеч ник, картофель (кроме ранних сортов), соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Клетодим Плюс Микс, КЭ (240 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-4096-1 30.12.2021 29.12.2031</p>	0,7-1,0	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см в смеси с 0,7-1 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,0	Лен долгунец	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см в смеси с 0,7-1 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

	0,7-1,0	Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые сорные растения (в т. Ч. Пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфат эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорных растений с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорных растений с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфат эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Цензор, КЭ (240 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/Ш 018-03-4404-1 06.02.2024 05.02.2034	0,2-0,4	Свёкла сахарная, соя, подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев злаковых сорных растений, независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,5% от объема рабочей жидкости ПАВ Микадо, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,0	Свёкла сахарная, соя, подсолнечник (на семена и масло)	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,5% от объема рабочей жидкости ПАВ Микадо, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Центурион Нео, КЭ (240 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - Ш/Ш 201-03-2375-1 09.09.2019 08.09.2029	0,7 - 1,0	Свекла сахарная, столовая и кормовая, картофель, морковь, лен масличный, лук, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох, нут	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

	0,2 - 0,4	Свекла сахарная, столовая и кормовая, картофель, морковь, лен масличный, лук, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох, нут	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Элефант, КЭ (240 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010(038)-03-3597-1 07.04.2022 06.04.2032</p>	0,2-0,4	Свекла сахарная, лук (кроме лука на перо), соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1	Свекла сахарная, лук (кроме лука на перо), соя, подсолнечник	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Центурион Профи, КЭ (360 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-03-2043-1 02.11.2018 01.11.2028</p>	0,5-0,7	Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,3	Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры совместно с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Свекла сахарная, соя, подсолнечник, рапс яровой и озимый, горох	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен-долгунец, свекла кормовая	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,6-1,2 л/га адьюванта Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

16.04.2018 15.04.2028	0,7-1	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 2,1-3,0 л/га адьюванта Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,6-1,2 л/га адьюванта Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1	Лен-долгунец, свекла кормовая	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 2,1-3,0 л/га адьюванта Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Эфес, КЭ (240 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 Ш/Ш 042-03-552-1 12.02.2015 11.02.2025	0,7-1	Свекла сахарная, соя, морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99 Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99 Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Легат, КЭ (240 г/л) ООО «АФД» ОГРН: - Ш/Ш, ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 Ш/Ш 086(197)-03-1332-1 19.01.2017 18.01.2027	0,7-1	Свекла сахарная, соя, картофель, подсолнечник, рапс	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1	Лен - долгунец	Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя, картофель, подсолнечник, рапс	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2-0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорняки (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Легион, КЭ (240 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш	0,2-0,4	Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,6-1,2 л/га ПАВ Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

178-03-3981-1 09.02.2023 08.02.2033	0,2-0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,6-1,2 л/га ПАВ Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнеч ник	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры с добавлением 2,1-3,0 л/га ПАВ Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Лен - долгунец	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры с добавлением 2,1-3,0 л/га ПАВ Хелпер, Ж (285 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Клетошанс, КЭ (240 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-02-4061-1 07.04.2023 06.04.2033	0,2-0,4	Свекла сахарная, соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неонола АФ9-12, Ж (700 г/л оксиэтилированного нонилфенола) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1	Свекла сахарная, соя	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Неонола АФ9-12, Ж (700 г/л оксиэтилированного нонилфенола) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Элефант Экстра, КЭ (360 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-4749-1 09.12.2024 08.12.2034	0,15-0,3	Томат рассадный, томат посевной	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, в фазе 2-4 листьев культуры или через две недели после высадки рассады с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	37(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Лук (кроме лука на перо)	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	51(1)	-(3)	
	0,15-0,3	Гречиха	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и 2-4 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	

0,5-0,7	Свекла столовая (кроме пучкового товара), свекла сахарная, соя, горох (на зерно), подсолнечник, капуста белокочанная, картофель (кроме	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,15-0,3	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	35(1)	-(3)
0,15-0,3	Морковь	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)
0,15-0,3	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	51(1)	-(3)
0,5-0,7	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-15 см. с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	35(1)	-(3)
0,5-0,7	Морковь	Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)
0,15-0,3	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	37(1)	-(3)
0,15-0,3	Свекла столовая (кроме пучкового товара), свекла сахарная, соя, горох (на зерно), подсолнечник, капуста белокочанная, картофель (кроме	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

Клетодим + галоксифоп-Р-метил

Клегал, МКЭ (130 г/л + 80 г/л) ООО РЕГСЕРВИС ОГРН: 1160280059818	0,8	Картофель	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(1)	-(3)	Активен
--	-----	-----------	---	--	-------	------	---------

П/П 803-03-3780-1 09.09.2022 08.09.2032	0,4	Свекла сахарная, рапс яровой, соя, подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4	Картофель	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	54(1)	-(3)	
	0,4	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев у сорных растений (в фазе «елочки» культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8	Лен - долгунец	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8	Лен масличный	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,8	Свекла сахарная, рапс яровой, соя, подсолнечник (на семена и масло)	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев у сорных растений (в фазе «елочки» культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
Акцент, КЭ (150 г/л + 75 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-03-2639-1 03.04.2020 02.04.2030	0,3	Свекла (сахарная, кормовая), подсолнечник, соя, рапс	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7	Лен - долгунец	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7	Свекла (сахарная, кормовая), подсолнечник, соя, рапс	Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3	Лен - долгунец	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Клетодим + хизалофоп-П-этил							
Лигат, КЭ (150 г/л + 65 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-03-1400-1 06.03.2017 178-03-1400-1/234 234 05.03.2027	0,6-0,8	Рапс яровой	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,6-0,8	Свекла сахарная, соя, подсолнечник (семена, масло)	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Свекла сахарная, соя, подсолнечник (семена, масло)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Клодинафоп-пропаргил + антидот клокви́нтосет-мексил

<p>Овен, КЭ (80 г/л + 20 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2955-1 24.12.2020 23.12.2030</p>	0,5	Пшеница яровая	Просянки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Щетинники	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
	0,3	Пшеница яровая и озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
<p>Леггеро Форте, КЭ (240 г/л + 60 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ ОГРН: - II/III 781-03-4503-1 29.03.2024 28.03.2034</p>	0,25-0,3	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (метлица полевая, овсюг, просо куриное, просо сорнополевое, виды щетинника и лисохвоста)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,25	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,25-0,3	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (метлица полевая, овсюг, просо куриное, просо сорнополевое, виды щетинника и лисохвоста)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Топик, КЭ (80 г/л + 20 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-2532-1 17.02.2020 16.02.2030</p>	0,5	Пшеница яровая и озимая	Виды щетинника, ежовник обыкновенный	Опрыскивание посевов при появлении массовых всходов сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3	Пшеница яровая и озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Тердок, КЭ (80 г/л + 20 г/л) АО Агробест Групп Тарым Илчлары Тохумджулук Ималат-Итхалат Ихраджат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети ОГРН: - II/III</p>	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Щетинники	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,3	Пшеница яровая и озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	

158-03-4465-1 07.04.2017 06.04.2027	0,5	Пшеница яровая и озимая	Проснянки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
---	-----	-------------------------------	-----------	--	-------	------	--

Клодинафоп-пропаргил + антидот клокви́нтосет-мексил + феноксапроп-П-этил

Арго Прим, МЭ (45 г/л + 40 г/л + 90 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3783-1 09.09.2022 08.09.2032	0,4 - 0,55	Пшеница яровая, пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковидный)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим злаковым сорным растениям (от фазы 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	Активен
Орикс, КЭ (60 г/л + 60 г/л + 90 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-1399-1 06.03.2017 178-03-1399-1/417 417 05.03.2027	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорным растениям (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Скаут Ультра, КЭ (48,5 г/л + 57 г/л + 170 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ ОГРН: - III/III 781-03-3409-1 13.12.2021 12.12.2031	0,3-0,45	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорные растения	Опрыскивание по вегетирующим злаковым сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Алхимик, КЭ (90 г/л + 60 г/л + 140 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - II/III 699-03-4760-1 23.12.2024 22.12.2034	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорным растениям (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен

Клодинафоп-пропаргил + феноксапроп-П-этил + антидот клокви́нтосет-мексил

Ластик Топ, МКЭ (60 г/л + 90 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4006-1 07.03.2023 06.03.2033	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кущения) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кущения) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

Протеже, КЭ (60 г/л + 90 г/л + 40 г/л) ООО «Химагромакетинг» ОГРН: - III/III 064-03-4010-1 09.03.2023 08.03.2033	0,4-0,5	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кущения) сорняков независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-------------------------------	--	---	-------	------	---------

КЛОМАЗОН

Алстейдж, МКС, МКС (360 г/л) ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А. ОГРН: - III/III 869-03-4765-1 23.12.2024 22.12.2034	0,25-0,4	Рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300	60(1)	-(3)	Активен
	0,95-1,4	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300	60(1)	-(3)	
	0,5-0,75	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей двудольных и всходов злаковых сорных растений (по первой и второй волне), начиная с фазы 1-2 настоящих листьев сои. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300	60(2)	-(3)	
Галс, КЭ (480 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-03-3782-1 09.09.2022 08.09.2032	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2	Рапс яровой, рапс озимый, свёкла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Камелин, КЭ (480 г/л) ООО ВОЯЖ АГРОКЕМИКАЛ ОГРН: 1172536044559 II/III 677-03-3207-1 12.07.2021 11.07.2031	0,2-1	Соя	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 тройчатых листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Комманд, КЭ (480 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-03-2927-1 16.12.2020 15.12.2030	0,2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	0,2-0,5	Горох (при выращива нии на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,2	Рапс яровой и озимый	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,2-0,4	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	

	0,2	Морковь (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
Клордин, КЭ (480 г/л) ООО МИР ОГРН: 1177746067916 III/III 583-03-2463-1 08.11.2019 07.11.2029	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Алгоритм, КЭ (480 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050-03-4293-0 11.12.2023 10.12.2026	0,2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	0,2	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300	60(1)	7(3)	
	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,2	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300	60(1)	7(3)	
БАМБУ, КЭ (480 г/л) «РОТАМ Лтд» ОГРН: - III/III 102-03-502-1 22.01.2015 21.01.2025	0,7-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	0,2	Свекла сахарная, морковь (кроме пучковой), рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Трейсер, КЭ (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 II/III 021-03-2895-1 26.11.2020 021-03-2895-1/430 430 25.11.2030	0,2	Морковь (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,25-0,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,2	Рапс яровой и озимый	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Команч, КЭ (480 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 II/III, ООО «АФД» ОГРН: - II/III 010(086)-03-3626-1 13.04.2022 12.04.2032	0,7-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Сиртаки, МКС (360 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - III/III 528-03-3700-1 06.06.2022 05.06.2032	0,3-0,7	Свекла сахарная, рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,5-3,0	Рис	Однолетние двудольные (горец перечный, частуха подорожниковая) и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с 2-х листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-5 листьев). Для достаточной смачиваемости сорных растений перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0-2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняют водой до уровня 10-12 см. Сброс воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2-1,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

кломазон + Ацифлуорфен

Воленс, МЭ (42 г/л + 200 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-3319-1 27.09.2021 26.09.2031	1,2-1,8	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы появления примордиальных листьев до 3-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев) сорных растений Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-----	---	---	-------	------	---------

кломазон + Пендиметалин

Бисмарк, МКС (55 г/л + 275 г/л) СИПКАМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - -/- 528-03-4145-1 05.07.2023 04.07.2033	3,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Норма Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----	-----	---	---	-------	------	---------

кломазон + Пропизохлор

Пропонит Дуо, КЭ (30 г/л + 720 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - II/III 201-03-1090-1 21.04.2016 20.04.2026	2,0-3,0	Соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы весной до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Рапс озимый	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы осенью до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га или осенью	-(1)	-(3)	
	2,5-3,0	Соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание по вегетирующим растениям сои (2-3 листа) в ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

кломазон + С-Метолахлор

Акебоно, КЭ (75 г/л + 825 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - II/III 586-03-3478-1 17.01.2022 16.01.2032	1,3-1,8	Рапс яровой и рапс озимый, соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--	---	--	-------	------	---------

Клопиралид

Лорнет, ВР (300 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2800-1 16.09.2020 15.09.2030	0,1-0,3	Лен - долгунец	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и в фазе розетки многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, виды горца) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0	Кукуруза	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Лен масличный	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и в фазе розетки многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	44(1)	-(3)	
	3 мл/3 л воды(Л)	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, виды горца) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 3 л/50 м2	-(1)	3(-)	
	6 мл/5 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения (в том числе одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка)	Опрыскивание по вегетирующим растениям после первого укоса. Срок безопасного выхода пользователей на обработанные препаратом площади не ранее 3-х дней после обработки Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	3(-)	
	0,1+0,2	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов, начиная с фазы «вилочки» культуры, по сорным растениям первой и второй волны в фазе семядолей Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1,5 мл/5 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание по вегетирующим растениям после первого укоса. Срок безопасного выхода пользователей на обработанные препаратом площади не ранее 3-х дней после обработки Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	3(-)	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,16-0,66	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,16-0,66	Газоны (в том числе территории и спортивных сооружений)	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения (в том числе одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка)	Опрыскивание по вегетирующим растениям после первого укуса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Брис, ВДГ (750 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-3888-1 28.11.2022 046-03-3888-1/467 467 27.11.2032	0,12	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов весной в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2,5 г/5 л	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, лютик) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений через 1-2 дня после первого укуса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	-(3)	
	0,12	Рапс яровой	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гал-Балдукс, ВР (300 г/л) ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЯ А.Д. ОГРН: - III/III 742-03-4363-1 15.01.2024 14.01.2034	0,5-1,0	Рапс яровой	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-04	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 3-4 пар настоящих листьев рапса ярового Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гербимакс, ВР (300 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-03-4377-0 24.01.2024 23.01.2027	6 мл/5 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка, амброзия) сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укуса Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	1(-)	Активен
	3 мл/3 л воды(Л)	Земляника	Многолетние двудольные (виды осота, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние (виды ромашки, горца) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 3 л/50 м2	-(1)	1(-)	
	1,5 мл/5 л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укуса Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	1(-)	
Лонган, ВР (300 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-4310-1 12.12.2023 11.12.2033	0,3-0,5	Сахарная свекла	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука, гречишки выюнковой	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Рапс яровой и рапс озимый (в том числе семенные посевы)	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука, гречишки выюнковой	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Лонтрел-300, ВР (300 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБГЕЗЕЛЬШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - III/III 009-03-1235-1 21.09.2016 20.09.2026</p>	0,16-0,33	Газоны (территория спортивных сооружений)	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка, амброзия) сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,3	Лен - долгунец	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука,	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука,	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Лаванда	Виды осота, ромашки, бодяка, горца, латука	Опрыскивание плантаций в фазе отрастания культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,16-0,66	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука,	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние (виды ромашки, горца) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца, бодяка, латука	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
<p>Бис-300, ВР (300 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-2636-1 31.03.2020 002-03-2636-1/447 447 30.03.2030</p>	1,5 мл/5 л воды(Л)	Газоны	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(1)	3(-)	Активен
	0,5-1	Кукуруза	Виды ромашки, горца, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,16-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Виды ромашки, горца, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Озимые культуры обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,30-0,40	Рапс озимый (семенные посевы)	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов весной до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазы 3-4 настоящих листьев рапса ярового Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

	0,3-0,4	Рапс яровой	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,30-0,40	Рапс озимый	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов весной до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	6 мл/5 л воды(Л)	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик) сорняки	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	3(-)	
	0,16-0,66	Газоны (территории и спортивные сооружения)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Лонтерр, ВДГ (750 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III, ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 III/III 192(424)-03-2550-1 02.03.2020 01.03.2030	0,12	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,12	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, овес	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Клорит, ВР (300 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 III/III 050(360)-03-1058-1 07.04.2016 06.04.2026	1,5 мл/5 л воды(Л)	Газоны	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней после обработки Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	3(3)	Активен
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца гречишка вьюнковая, виды бодка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	0,5-0,6	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(3)	
	6 мл/5 л воды(Л)	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней после обработки Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	3(3)	
	0,16-0,66	Газоны (территории и спортивные сооружения)	Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(3)	
	0,16-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень	Виды ромашки, горца гречишка вьюнковая, виды бодка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Озимые культуры обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	3(3)	

	0,5-1	Кукуруза	Виды ромашки, горца, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	3 мл/3л воды(Л)	Земляника	Многолетние двудольные сорняки (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 3 л/50 м2	-(1)	3(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(3)	
	1,5 мл/5 л воды(Л)	Газоны	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса.Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2.	-(1)	3(3)	
Хатор, ВР (300 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-4139-1 29.06.2023 28.06.2033	0,3-0,5	Рапс яровой и озимый	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,3	Лен масличный	Виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры при фазе розетки у сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Лонтрел гранд, ВДГ (750 г/кг) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБГЕЗЕЛЬШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - П/П 009-03-1253-1 21.10.2016 20.10.2026	0,04+0,08	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев культуры по сорным растениям первой и второй волны Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(1)	Активен
	0,06-0,12	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кушения – до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(1)	
	0,12	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(1)	
	0,12	Лен - долгунец	Виды ромашки, осота, бодяка, горца, латука	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и в фазе розетки листьев многолетних корнеотпрысковых растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(1)	
	0,12	Рапс яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(1)	
	0,12	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(1)	
	0,12-0,25	Газоны (территории и спортивные сооружения)	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка амброзия)	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорнякам после первого укоса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(1)	

Лонтрел гранд КА, ВДГ (750 г/кг) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-03-4670-0 20.09.2024 19.09.2027	0,120	Рапс яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(1)	Активен
	0,120	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(1)	
	0,120	Лен - долгунец	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки листьев многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(1)	
	0,120-0,25 0	Газоны (территории и спортивные сооружения)	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения (одуванчик, подорожник, шавель, тысячелистник, ромашка, амброзия)	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(1)	
	0,040+0,08 0	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев культуры по сорным растениям первой и второй волны Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(1)	
	0,060-0,12 0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание (озимые обрабатываются весной) посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(1)	
Агрон, ВР (300 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2214-1 07.05.2019 06.05.2029	0,120	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(1)	Активен
	0,3-0,5	Земляника	Виды осота, щавеля, одуванчика, ромашки, горца	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свёкла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Лен - долгунец	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» льна и фазе розетки многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Агрон Гранд, ВДГ (750 г/кг)	0,16-0,66	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)	Активен
	0,12	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2215-1 07.05.2019 06.05.2029	0,04+0,08	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов последовательно в фазе семядолей сорняков первой и второй волны Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,12	Рапс яровой	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Клео, ВДГ (750 г/кг) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 III/III, ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 023(004,197,549)-03-5016-1 22.05.2019 21.05.2029	0,12	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,12	Лен - долгунец	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и фазе розетки многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,12	Рапс яровой (семенные посевы)	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,12	Лен масличный	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и фазе розетки многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
Клопер 750, ВДГ (750 г/кг) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2861-1 02.11.2020 01.11.2030	0,12	Рапс яровой	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,12	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,12	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Лен-кудряш (лен масличный)	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов с фазы 3-5 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Приклад, ВДГ (750 г/кг) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 II/- 653-03-3763-1 15.07.2022 14.07.2032	0,04+0,08	Сахарная свекла	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Последовательное опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев культуры по сорным растениям первой и второй волны Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	Активен
	0,12	Рапс озимый	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Рапс озимый (семенные посевы)	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,12	Сахарная свекла	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов с фазы 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,09	Лен - долгунец	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры и розетки листьев корнеотпрысковых сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Хакер, ВРГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/П 021-03-4292-1 07.12.2023 06.12.2033	0,12-0,2	Свекла сахарная, кормовая	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(-)	Активен
	0,2-0,4	Кукуруза	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(-)	
	0,08-0,12	Лен - долгунец	Виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(-)	
	0,12	Капуста белокочан ная	Виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание посадок после высадки рассады в грунт в фазу розетки у многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	3(-)	
	2 г/3 л воды(Л)	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, лютик и др.) сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям через 1-2 дня после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м 2	-(1)	3(-)	
	0,06-0,12	Зерновые колосовые озимые, за исключени ем овса	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	3(-)	
	0,06-0,12	Овес	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения– до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	3(-)	
	0,2	Газоны (в том числе территори и спортивны х сооружени й)	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчики, подорожник, щавель, лютик) сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорнякам через 1-2 дня после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	3(-)	
	0,12	Рапс яровой и рапс озимый	Виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 3-4 листьев и до появления цветочных бутонов у культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(-)	
	0,06-0,12	Зерновые колосовые озимые, за исключени ем овса	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	3(-)	
	0,12-0,16	Рыжик	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	3(-)	
	0,12-0,16	Горчица	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(-)	

	0,08-0,12	Лен масличный	Виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(-)	
Хакер 300, ВР (300 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 И/И 021-03-3602-1 07.04.2022 021-03-3602-1/439 439 06.04.2032	0,1-0,3	Лен - долгунец	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га (в зависимости от типа аспылителей)	- (1)	- (3)	Активен
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-5 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	- (3)	
	0,16-0,66	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	- (3)	
	0,1+0,2	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы «вилочки» культуры, по сорным растениям первой и второй волны в фазе семядолей Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(2)	- (3)	
	4 мл/ 3 л воды(Л)	Капуста белокочан ная	Однолетние двудольные и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посадок после высадки рассады в грунт в фазу розетки у многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(-)	
	0,5-0,6	Земляника	Многолетние дву-дольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые одно-летние (виды ромашки, горца) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожа Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	- (1)	- (3)	
	0,3-0,4	Рыжик	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50 - 300 л/га	41(1)	- (3)	
	0,3+0,6	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорные растения	Двукратное опрыскивание культуры, начиная с фазы двух настоящих листьев. Вторая обработка проводится через 3-4 недели после первой Расход рабочей жидкости - 50 - 300 л/га	58(2)	- (3)	
	0,3-0,4	Горчица	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	- (3)	
	3 мл/3 л воды + 6 мл/3 л воды(Л)	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Двукратное опрыскивание культуры, начиная с фазы двух настоящих листьев. Вторая обработка проводится через 3-4 недели после первой Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100м2	58(2)	- (3)	
	0,16-0,66	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения – до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	- (3)	
	0,4	Капуста белокочан ная	Однолетние дву-дольные и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посадок после высадки рассады в грунт в фазу розетки у многолетних двудольных сорняков(в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	- (3)	

	0,16-0,33	Газоны (в том числе территории и спортивных сооружений)	Однолетние и много-летние двудольные (одуванчик, подо-рожник, ромашка) сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,16-0,66	Овес	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения – до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла кормовая	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-5 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,6-3,3 мл/ 3 л воды(Л)	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка, амброзия) сорные растения	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	3(-)	
	0,1+0,2	Свекла кормовая	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы «вилочки» культуры, по сорным растениям первой и второй волны в фазе семядолей Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(2)	-(3)	
	0,5-1,0	Рапс яровой и озимый	Однолетние дву-дольные и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе розетки многолетних двудольных сорняков, начиная с фазы 3-4 настоящих листьев у рапса ярового и до появления цветочных бутонов у культуры Расход рабочей жидкости - 50 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га (в зависимости от типа аспылителей)	60(1)	-(3)	
	5-6 мл/ 3 л воды(Л)	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние (виды ромашки, горца) сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	3(-)	
Премьер 300, ВР (300 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 Ш/Ш 192-03-2865-1 02.11.2020 01.11.2030	0,5-1,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные (осот, бодяк) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,3	Лен - долгунец	Виды осота, бодяка, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Рапс яровой	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Корректор, ВР (300 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-2161-1 25.03.2019 16.05.2032</p>	0,12-0,25	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка)	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорнякам после первого укуса. Запрещается пребывание людей на обработанные территории Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овесСахар ная свекла Рапс яровой и озимый, в том числе семенные посевы	Виды ромашки, горца, осотаВиды ромашки, горца, осотаВиды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/гаОпрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры- 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,12	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,4	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овесСахар ная свекла Рапс яровой и озимый, в том числе семенные посевы	Виды ромашки, горца, осотаВиды ромашки, горца, осотаВиды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/гаОпрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры- 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,09	Лен – долгунец	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры и розетки листьев корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,12	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры (1-3 пары) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,16-0,66	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овесСахар ная свекла Рапс яровой и озимый, в том числе семенные посевы	Виды ромашки, горца, осотаВиды ромашки, горца, осотаВиды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Рапс яровой и озимый	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листа рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Шанстрел 300, ВР (300 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4012-1 10.03.2023 126-03-4012-1/481 481 09.03.2033</p>	0,1-0,3	Лен - долгунец	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки у сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый (в том числе семенные посевы)	Виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,3-0,5	Свекла сахарная, кормовая	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Сонхус, ВДГ (750 г/кг) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/Ш 085-03-3684-1 17.05.2022 16.05.2032	0,16-0,5	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,16-0,5	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,16-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
Цукрон+, ВР (300 г/л) ООО «Химагромакетинг» ОГРН: - П/Ш, ООО «Химагромакетинг» ОГРН: - П/Ш 064-03-461-1 15.12.2014 16.10.2034	0,3-0,5	Свекла кормовая	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла кормовая	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Монолит, ВДГ (750 г/кг) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240	0,06	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев по сорнякам первой и второй волны. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен

III/III 082-03-1309-1 16.12.2016 15.12.2026	0,09	Лен-долгунец	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки листьев корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,12	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Пшеница и ячмень озимые и яровые, овес	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние сорняки (осот, бодяк)	Опрыскивание посевов в фазе кушения до выхода в трубку культуры. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12-0,25	Газоны (территории и спортивные сооружения)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашки)	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорнякам после первого укуса. Запрещается пребывание людей на обработанные территории. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,04-0,08	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев по сорнякам первой и второй волны. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,12	Рапс яровой	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,12	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Все виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Аймокс, ВРГ (750 г/кг) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-4759-1 23.12.2024 22.12.2034	0,12	Рапс яровой и озимый	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,12 - 0,20	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Клопиралид (2-этилгексилловый эфир) + Имазамокс

Илион, МД (90 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-1104-1 04.05.2016 018-03-1104-1/487 487 03.05.2026	0,8-1,2	Рапс яровой, устойчивый к имидазолинонам	Однолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 2-6 листьев культуры (до фазы вытягивания стеблей). В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два	57(1)	-(3)	Активен
--	---------	--	--	--	-------	------	---------

	0,8-1,2	Рапс озимый, устойчивый к имидазо-линонам	Однолетние злаковые, однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной или осенью в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 2-6 листьев культуры (до фазы вытягивания стеблей). В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазо-линонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два	57(1)	-(3)	
--	---------	---	--	---	-------	------	--

Клопиралид (2-этилгексилловый эфир) + флуроксипир

Репер, ККР (100 г/л + 15 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-4553-1 03.05.2024 02.05.2034	0,8-1	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, виды ромашки, горца, щирицы, мари, бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы 3-6 настоящих листьев культуры до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-------	----------------------	--	---	-------	------	---------

Клопиралид + Аминопиралид + пиклорам

Галера Супер КА, ВР (267 г/л + 17 г/л + 80 г/л) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 П/П 866-03-4656-0 26.08.2024 25.08.2027	0,2-0,3	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	Активен
	0,2-0,3	Рапс озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений осенью с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева после весеннего применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	
	0,2-0,3	Рапс озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева после весеннего применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	

Клопиралид + пиклорам

<p>Галион, ВР (300 г/л + 75 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4216-1 05.10.2023 04.10.2033</p>	0,1-0,3	Лен - долгунец	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе. Подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, в фазе 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,27-0,31	Капуста белокочан ная	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе. Подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-4 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Лен масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе. Подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, в фазе 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,27-0,31	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе. Подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Зенарил, ВР (267 г/л + 67 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3462-1 29.12.2021 28.12.2031</p>	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Кригер, ВР (267 г/л + 67 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 II/III 046-03-4530-1 23.04.2024 22.04.2034</p>	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 листьев настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(1)	-(3)	Активен
<p>Актеон, ВР (267 г/л + 67 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «АГРОДИМ» ОГРН: 1136449005351 III/III 042(275)-03-823-1 28.10.2015 27.10.2025</p>	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щиряцы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

<p>Рапсан, ВР (267 г/л + 67 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-3974-1 02.02.2023 01.02.2033</p>	0,3-0,35	Рапс озимый и яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнная, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	----------	----------------------	---	---	-------	------	---------

Клопиралид(2-этилгексилловый эфир)

<p>Эфилон, КЭ (450 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III, ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 III/III 197(116)-03-4439-1 05.03.2024 04.03.2034</p>	0,1-0,2	Лен масличный	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	42(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,2	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пары настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Лен - долгунец	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,1-0,3	Рапс яровой и озимый	Виды ромашки, горца, осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Ленацил + фенмедифам + Десмедифам + этофумезат

<p>Эксперт Квадро ОФ, МКС (40 г/л + 90 г/л + 70 г/л + 110 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-600-1 18.03.2015 17.03.2025</p>	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(2)	-(3)	Не активен
	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(3)	-(3)	

Мезотрион

<p>Галоканекс, КС (480 г/л) ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЯ А.Д. ОГРН: - III/III 742-03-4418-1 15.02.2024 14.02.2034</p>	0,25-0,35	Кукуруза на зерно	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Десперадо, КС (480 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-03-1686-1 23.01.2018 22.01.2028</p>	0,15-0,25	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста (2-4 листа) сорных растений смеси с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смесь метиловых эфиров жирных кислот) (0,5 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Интермеццо, КС (480 г/л) АГРОСАВА ДОО ОГРН: - III/III 376-03-3706-1 12.04.2017 11.04.2027	0,2-0,25	Кукуруза (на зерно)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Каллисто, КС (480 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-889-1 11.12.2015 10.12.2025	0,15-0,25	Кукуруза на зерно	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в смеси с ПАВ Корвет, Ж (0,5 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Кидека, КС (100 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - III/III 024-03-1685-1 22.01.2018 21.01.2028	0,75-1,5	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Логано, КС (480 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - III/III 586-03-3875-1 14.11.2022 13.11.2032	0,25-0,35	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Мезокорн, КС (480 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2353-1 23.08.2019 22.08.2029	0,15-0,25	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Меис, КС (480 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-2809-1 17.09.2020 16.09.2030	0,15-0,25	Кукуруза на силос (кроме кукурузы на зеленый корм)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте до 10 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Франкорн, КС (480 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 297-03-1455-1 12.04.2017 11.04.2027	0,2-0,25	Кукуруза (на зерно)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Шанс Голд, СК (480 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-2890-1 23.11.2020 22.11.2030	0,15-0,25	Кукуруза на зерно	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Эгида, СК (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1811-1 13.01.2017 021-03-1811-1/311 12.01.2027	0,2-0,3	Лен масличный , лен-долгун ец	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,25-0,35	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста (2-4 листа) сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	

Мезотрион + Амикарбазон

Визион, ВДГ (288 г/кг + 280 г/кг) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - III/III 201-03-2608-1 18.03.2020 17.03.2030	0,275-0,3	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,275-0,3	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,25-0,3	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 до 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в смеси с ПАВ Амико Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) (0,5% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Мезотрион + Аминопиралид + никосульфурон

Бисау, МД (150 г/л + 7 г/л + 60 г/л) ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» ОГРН: 1152312010740 III/III 866-03-4720-1 11.11.2024 10.11.2034	0,5-1,0	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно высевать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через месяц после применения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-----------------------------------	--	--	-------	------	---------

Мезотрион + дикамба кислота (диметиламинная соль) + никосульфурон

Корнкордия, МД (75 г/л + 96 г/л + 37,5 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-4435-0 28.02.2024 27.02.2027	1,0-2,0	Кукуруза на зеленую массу, зерно и масло	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д)	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	--	---	---	-------	------	---------

Мезотрион + никосульфурон

Элюмис, МД (75 г/л + 30 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-3358-1 01.11.2021 31.10.2031	1-2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений). При необходимости пересева в год применения препарата можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Легенда, МД (75 г/л + 30 г/л) Кемикстор Кфт. ОГРН: - III/III 774-03-3375-1 17.11.2021 16.11.2031	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев у однолетних, в фазу розетки многолетних двудольных и при высоте 10-20 см многолетних злаковых) сорных растений. При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Мезотрион + никосульфурон + тифенсульфурон-метил

Суперкорн, МД (150 г/л + 60 г/л + 11,25 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2347-1 15.08.2019 14.08.2029	0,5-1,0	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------	--	--	-------	------	---------

Метазахлор

Бутизан 400, КС (400 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-03-1637-1 07.12.2017 06.12.2027	1,5-2	Капуста белокочанная (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы через 1-7 дней после высадки рассады с обязательным последующим поливом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	Активен
Султан, СК (500 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-3029-1 24.02.2021 23.02.2031	1,2-1,6	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	1,2-1,6	Капуста белокочанная (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы через 1-7 дней после высадки рассады с обязательным последующим поливом Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	7(3)	
	1,6-2,2	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазе от семядолей до 4 листьев культурных и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	7(3)	

Метазахлор + Имазамокс

Нопасаран, КС (375 г/л + 25 г/л) БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В. ОГРН: - III/III 224-03-3827-1 19.10.2022 18.10.2032	0,8-1,2	Рапс яровой, устойчивый к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений с добавлением ПАВ ДАШ, КЭ (348,75 г/л метилолеата) при соотношении компонентов 1:1 (0,8-1,2 л/га). Безопасный интервал между применением препарата и высеом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--	--	---	-------	------	---------

	1,2-1,5	Рапс озимый, устойчивый к имидазолинонам	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений осенью в фазе 2-6 листьев культуры или весной (до фазы вытягивания стебля) в ранние фазы развития сорных растений с добавлением ПАВ ДАШ, КЭ (348,75 г/л метилолеата) при соотношении компонентов 1:1 (1,2-1,5 л/га). Безопасный интервал между применением препарата и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	
--	---------	--	--	--	-------	------	--

Метамитрон

Пилот, ВСК (700 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03-1692-1 28.11.2017 27.11.2027	5-6	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)	Активен
	5-6	Мята перечная (маточник и)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посадки (с заделкой) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)	
	5-6	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	1,5-2	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в стадии семядольных листьев у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	7(3)	
	3-4	Шалфей мускатный (1-го года вегетации)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание плантаций в фазе 4-6 листьев культуры. Уборка на втором году вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)	
	1,5-2	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в стадии семядольных листьев у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
	5-6	Мята перечная (осенние посадки)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посадки (с заделкой) или до всходов культуры. Уборка на втором году вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)	
Гуд-Харвест Метамитрон, КС (700 г/л) Чжангсу Гуд Харвест Вейн Агрокемикал Ко., Лтд. (Китай) ОГРН: - Ш/Ш	1,5-2,0	Свёкла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных видов) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	-(2)	-(3)	Активен

563-03-2341-1 02.08.2019 01.08.2029	1,5-2,0	Свёкла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных видов) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(2)	-(3)	
Минотавр, ВДГ (700 г/кг) ООО «АНПП «Агрохим-ХХІ» ОГРН: 1027700119710 III/III 023-03-908-1 21.12.2015 20.12.2025	1,5-2	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние, двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Митрон, КС (700 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2807-1 16.09.2020 15.09.2030	1,5-2,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных и первого листа злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Метарон, ВДГ (700 г/кг) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ ОГРН: 1027743011207 III/III 050(360)-03-1059-1 07.04.2016 06.04.2026	1,5-2	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных сорняков) с последующий обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Скрин, КС (700 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-617-1 01.04.2015 31.03.2025	1,5-2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Не активен
Метафол, СК (700 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-03-4409-1 06.02.2024 05.02.2034	1,5-2,0	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей у двудольных видов) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Шансомитрон, КС (700 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-586-1 10.03.2015 09.03.2025	1,5-2	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядольных листьев у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Не активен
	5-6	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Мариус, КС (700 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 II/III 192-03-1284-1 12.12.2016 11.12.2026	1,5-2	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Малахит, ВДГ (700 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-1577-1 30.10.2017 29.10.2027	1,5-2	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных сорняков) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Ранголи-Метамитрон, КС (700 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1408-1 10.03.2017 09.03.2027	5-6	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Голтике Голд, КС (700 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-3631-1 15.04.2022 14.04.2032	1,5-2,0	Свёкла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) и кормовая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных и первого листа злаковых) с последующей обработкой через 8 – 14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Метамир, КС (700 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 II/III 002-03-3975-1 02.02.2023 01.02.2033	1,5-2,0	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядольных листьев у двудольных) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	Активен
	1,5-2,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядольных листьев у двудольных) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)	

Метамитрон + этофумезат

Голтике Супер, КС (350 г/л + 150 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-3806-1 26.09.2022 25.09.2032	1,5-2,0	Свекла кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных и первого листа злаковых) по первой, второй и третьей волне Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(3)	Активен
	2,0	Свекла кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе 2-4 листьев) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	

	1,5-2,0	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе семядолей двудольных и первого листа злаковых) по первой, второй и третьей волне Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	2,0	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазе 2-4 листьев) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

Метамифоп + Биспирибак натрия

Номини Суприм, СЭ (100 г/л + 40 г/л) Кумаи Кемикал Индастри Ко. Лтд. ОГРН: - Ш/Ш 603-03-2537-1 19.02.2020 18.02.2030	0,6-1,0	Рис	Однолетние злаки (просовидные), осоковые (клубнекамш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Рекомендации по применению: перед началом обработки необходимо слить воду с чеков, повторное затопление чеков можно проводить через 1 день после окончания обработки Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	60(1)	-(-)	Активен
---	---------	-----	---	---	-------	------	---------

Метрибузин

Сойл Флюид, КС (600 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03-2909-1 03.12.2020 02.12.2030	0,8-0,9	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посадок при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-1	Люпин	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,6	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-1,2 + 0,35	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Зино, СП (700 г/кг) Агрия АД ОГРН: - Ш/Ш, ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 Ш/Ш 184(026)-03-3453-1 27.12.2021 26.12.2031	1	Томат (рассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	1,1-1,4	Томат (рассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,5-1,0 + 0,3	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
Зонтран, ККР (250 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим»	0,4+0,8	Томат (безрассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 листьев и 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(2)	3(3)	Активен

ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2793-1 10.09.2020 018-03-2793-1/373 373 09.09.2030	1,0-1,5	Люпин	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(3)	
	4 мл/3 л воды + 8 мл/3 л воды(Л)	Томат посевной (безрассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 листьев и 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(2)	3(3)	
	1,0+(0,4-0,6)	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до появления всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	3(3)	
	10-15 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посадок при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	30(1)	3(3)	
	17 мл/5 л воды(Л)	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	60(1)	3(3)	
	1,2-1,5	Томат посевной (безрассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	3(3)	
	0,6-1,2	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	1,1-1,4	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посадок при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	30(1)	3(3)	
	1,7	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 500 л/га	60(1)	3(3)	
	1,0-1,5	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	60(1)	3(3)	
	10 мл/3 л воды + 4-6 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до появления всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	30(2)	3(3)	
	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(3)	
	12-15 мл/3 л воды(Л)	Томат посевной (безрассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(3)	
	0,5-1 + 0,3	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Ранголи-Гильотина, ВДГ (700 г/кг) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1995-1 25.09.2018 24.09.2028	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Мэр, КС (480 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-3241-1 22.07.2021 21.07.2031	0,75-1,5 + 0,44	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300	60(2)	-(3)	Активен
	1,0-1,13	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,63-2,0	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	1,5	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	1,0	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-2,0	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,25	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,38+0,63	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Лазурит, СП (700 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1725-1 21.11.2017 20.11.2027	10 г/3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетн его использова ния)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	3(3)	Активен
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннелетн его использова ния)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	3(3)	
	0,25+0,45	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	45(2)	3(3)	
	0,7-0,8	Картофель (кроме раннелетн его использова ния)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	3(3)	
	1,1-1,4	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	45(1)	3(3)	
	10 г/3 л воды + 10 г/9 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетн его использова ния)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	-(2)	3(3)	
	0,8-1	Кукуруза на зерно (кроме кукурузы на масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	3(3)	
	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	3(3)	

0,7	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	45(1)	3(3)
0,5-1 + 0,3	Картофель (кроме раннелетнего использования)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(2)	3(3)
0,75-1	Люцерна	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	3(3)
0,5+0,5	Кукуруза на зерно (кроме кукурузы на масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(2)	3(3)
0,75-1	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	3(3)
0,75-1	Люпин однолетний	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	3(3)
1	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	45(1)	3(3)
0,5	Эхинацея пурпурная	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	3(3)
1-1,3	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
10-15 мл/ 3 л воды(Л)	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивания вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л / 100м2	46(1)	3(-)
5 мл/ 3 л воды + 10 мл/ 3 л воды(Л)	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений последовательно в фазе 1-2 листьев культуры и в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л / 100м2	46(2)	3(-)
0,35+0,75	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений последовательно в фазе 1-2 листьев культуры и в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	46(2)	-(3)
1,1-1,4	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	46(1)	-(3)
10 мл/ 3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетнего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 3 л / 100м2	60(1)	3(-)
15 мл/ 5 л воды(Л)	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 5 л / 100м2	46(1)	3(-)

	1,6	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 500 л/га	46(1)	-(3)	
	10 мл/ 3л воды + 4,5 мл/ 3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетн его)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 3 л / 100м2	60(2)	3(-)	
	0,9+(0,35-0 ,55)	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорных растений до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Лазурит Т, СП (700 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3720-1 23.06.2022 22.06.2032	10 г/10 л воды + 10 г/6 л воды(Л)	Томат посевной	Однолетние злаковые и двудольные и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры	60(2)	3(-)	Активен
	10-12 г/3 л воды(Л)	Томат рассадный	Однолетние злаковые и двудольные и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(-)	
	20 г /10 л воды(Л)	Томат посевной	Однолетние злаковые и двудольные и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(-)	
	10 г/3 л воды(Л)	Томат рассадный	Однолетние злаковые и двудольные и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(-)	
Лазурит Ультра, СК (600 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2652-1 23.04.2020 021-03-2652-1/424 424 22.04.2030	0,8	Томаты (посевные)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,25-0,6	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,75	Люпин	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100 - 300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,9-1,2	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2	Томаты (рассадные)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,6	Картофель (кроме раннелетн его)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	13-16 мл/3л воды(Л)	Томаты рассадные	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(-)	
	8-16 мл/3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетн его использова ния)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(-)	

	0,6+0,6	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,3-0,75	Люцерна старовозрастная (более 12 месяцев)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры (3-5 см) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
	8-9 мл/3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетнего использования)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(-)	
	0,3+0,5	Томаты посевные	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,3-0,75	Люцерна первого года вегетации	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8-0,9	Картофель (кроме раннелетнего)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	8 мл/3 л воды(Л)	Томаты посевные	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(-)	
	0,6-1,2 + 0,35	Картофель (кроме раннелетнего)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,23-0,35	Пшеница и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100 - 300 л/га	-(1)	-(3)	
	12 мл/3 л воды(Л)	Томаты рассадные	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(-)	
	6-12 мл/3 л воды + 3,5 мл/3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннелетнего использования)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(2)	1(-)	
	3 мл/3 л воды + 5 мл/3 л воды(Л)	Томаты посевные	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(2)	1(-)	
	1,3-1,6	Томаты (рассадные)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Тирон, ВДГ (700 г/кг) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 Ш/Ш 063-03-1566-1 03.10.2017 02.10.2027	0,25+0,45	Томаты (посевные)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,7	Томаты (посевные)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,5-1 + 0,3	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Зенкор Ультра, КС (600 г/л) Байер КрокСайенс АГ ОГРН: - ПП/ПП 019-03-3929-1 09.01.2023 08.01.2033	10 - 12 мл/3 л воды(Л)	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(3)	Активен
	1,3 - 1,6	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	1(3)	
	0,8 - 1,6	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	1(3)	
	0,6 - 1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	1(3)	
	0,3+0,5	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	1(3)	
	10 - 12 мл/3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	1(3)	
	0,8	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	1(3)	
	0,8 - 0,9	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	1(3)	
	0,5	Кориандр (семена)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу 3-4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	60(1)	1(3)	
	1,2	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	1(3)	
	0,6 - 1,2 + 0,35	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	1(3)	
	0,3-0,5	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 4 настоящих листьев культуры до фазы «карандаша» Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	30(1)	1(3)	
Топкама, ВДГ (700 г/кг) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - ПП/ПП 699-03-4322-1 18.12.2023 17.12.2033	1,0	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	49(1)	-(3)	Активен
	0,25+0,45	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(2)	-(3)	
	0,7	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	47(1)	-(3)	

	0,5-1,0 + 0,3	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	57(2)	-(3)	
	0,7-1,3	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Контакт, ВДГ (700 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-3664-1 28.04.2022 27.04.2032	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7	Томаты (посевные)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Томаты (рассадные)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,1-1,4	Томаты (рассадные)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,25+0,45	Томаты (посевные)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-1 + 0,3	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Сойл, ВДГ (700 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-1340-1 25.01.2017 178-03-1340-1/270 270 24.01.2027	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-0,8	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих растений при высоте ботвы картофеля 5 см Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1,0	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1+0,3	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Зенкошанс, КС (600 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4545-1 03.05.2024 126-03-4545-1/478 478 02.05.2034	1,0	Томат рассадный (открытый грунт)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6 - 1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1	Кукуруза на зерно и масло	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,5-1,1	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5+0,3-0,5	Кукуруза на зерно и масло	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,7	Томат посевной (открытый грунт)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	
Юнимарк, ВДГ (700 г/кг) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-03-1602-1 21.11.2017 20.11.2027	1,1-1,4	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	Активен
	0,5+0,5	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-1+0,3	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,8-1	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
Мистраль Топ, КС (480 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-3632-1 15.04.2022 14.04.2032	0,25+0,45	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,75-1,55 + 0,45	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1,0-2,0	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,2	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посадок при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Метрибузин + Метрибузин	0,8-1,2	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-1 + 0,3	Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	Метрифар 70, ВГ (700 г/кг + 700 г/кг) Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ						

ОГРН: - III/III, Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СПРЛ ОГРН: - III/III 322-03-4718-1 22.08.2016 21.08.2026	1,1-1,4	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
	0,25+0,45	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,4	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,1-1,4	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
	1	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
	0,25+0,45	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,5-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7	Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
	0,5-1 + 0,3	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

Метсульфурон-метил

МетАлт, ВДГ (600 г/кг) ООО «Резерв» ОГРН: 1082224012738 III/III 130-03-3184-1 17.06.2021 16.06.2031	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазу розетки многолетних двудольных сорных растений (начиная с фазы 2 листьев – до конца кущения культуры). Соблюдая ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые культуры. На следующий год после уборки зерновых культур нельзя высевать свеклу, овощи, гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки.	60(1)	-(3)	Активен
---	------------	--	--	--	-------	------	---------

Террамет, ВДГ (600 г/кг) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III 038-03-2396-1 16.09.2019 15.09.2029	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазу розетки многолетних двудольных сорных растений (начиная с фазы 2-х листьев до конца кушения культуры). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или	60(1)	-(3)	Активен
	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых культур нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха	60(1)	-(3)	
Магнум, ВДГ (600 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1798-1 21.11.2017 20.11.2027	0,05-0,3	Железнодорожные пути, земли промышленного и иного специального назначения ; санитарно-защитные зоны промышленных	Борщевик Сосновского, а также однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2 г/3 л воды(Л)	Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10-15 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	1(-)	
	0,008-0,01	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см.Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки льна нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости	-(1)	-(3)	

0,008-0,01	Пшеница и ячмень озимые, рожь	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста сорняков однолетних (2-4 листа) и многолетних (фаза розетки), начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения культуры. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или если	60(1)	-(3)
0,008-0,01	Лен масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки льна нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости	60(1)	-(3)
0,1-0,2	Земли лесного фонда, не занятые древесной растительностью (в том числе обочины лесных дорог, просеки, сенокосы, сплошные вырубki), земли с	Однолетние и многолетние двудольные травянистые растения, включая борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)
0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые, овес, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков однолетних (2-4 листа) и многолетних (фаза розетки), начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения культуры. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или	60(1)	-(3)
0,1-0,2	Посадки березы и молодняки с ее участием	Однолетние и многолетние двудольные травянистые растения, включая борщевик Сосновского и нежелательная древесно –кустарниковая растительность (виды ивы, осина, рябина)	Опрыскивание вегетирующих растений в период вегетации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)

	0,05-0,3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в период активного роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,05-0,3	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Борщевик Сосновского, а также однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
<p>Аккурат, ВДГ (600 г/кг) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-03-848-1 30.10.2015 29.10.2025</p>	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки	60(1)	-(3)	Активен
	0,008-0,01	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересева обработанных площадей можно сеять только зерновые культуры. На следующий год нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в	-(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год	60(1)	-(3)	

<p>Ларен Про, ВДГ (600 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-1199-1 16.08.2016 15.08.2026</p>	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год	60(1)	-(3)	Активен
	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год	60(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорных растений (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки	60(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорных растений (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки	60(1)	-(3)	
<p>Гренч, СП (600 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Левой Маркетинг Актиенгезелльшафт ОГРН: - III/III 184(040)-03-1516-1 14.06.2017 13.06.2027</p>	0,010	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения	60(1)	-(3)	Активен

	0,008-0,010	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если	60(1)	-(3)	
	0,008-0,010	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки	60(1)	-(3)	
<p>Сарацин, СП (600 г/кг) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Ш 063-03-2398-1 16.09.2019 15.09.2029</p>	0,008-0,01	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних (2-4 листа), в фазу розетки многолетних двудольных сорных растений. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых культур нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная	60(1)	-(3)	Активен
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных (2-4 листа) и фазу розетки многолетних сорных растений, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения зерновых культур. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых культур нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5	60(1)	-(3)	
<p>Делегат, ВДГ (600 г/кг) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 Ш/Ш, ООО «АФД» ОГРН: - Ш/Ш, ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 Ш/Ш 085(086)-03-445-1 30.10.2014 06.02.2028</p>	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазу розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев – до конца кущения культуры). При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или	60(1)	-(3)	Активен

	0,008-0,01	Лен-долгу нец	Однолетние, в том числе устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная	-(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазу розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев – до конца кущения культуры). При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная	60(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Лен - долгунец	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только зерновые культуры. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная	-(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и в фазу розетки двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев – до конца кущения культуры). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год после применения препарата если pH почвы выше	57(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и в фазу розетки многолетних двудольных сорняков, начиная с фазы 2 листьев – до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в	60(1)	-(3)	Не активен

Метметил,
ВДГ
(600 г/кг)
ООО «АГРус»
ОГРН: 5087746677893
III/III
097-03-554-1
12.02.2015
11.02.2025

	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и фазе розетки зимующих и многолетних. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и	60(1)	-(3)	
Зингер, СП (600 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2134-1 04.03.2019 03.03.2029	0,15-0,2	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Борщевик Сосновск	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика до бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,007-0,01	Лен – долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год нельзя высевать свеклу и овощи. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости переосева обработанных гербицидом площадей можно высевать только яровые	-(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазу розетки многолетних. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или если была продолжительная засуха в период от применения	60(1)	-(3)	
	0,1-0,2	Земли сельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние многолетние двудольные и нежелательные растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности до начала цветения с целью формирования злакового покрова Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазу розетки многолетних. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или если была продолжительная засуха в период от применения	60(1)	-(3)
0,04-0,05	Земли сельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих однолетних растений борщевика Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазу розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения зерновых. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7.5	60(1)	-(3)
0,007-0,01	Лен – долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год нельзя высевать свеклу и овощи. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей можно высевать только яровые	-(1)	-(3)
0,2-0,3	Земли сельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после начала цветения с целью формирования злакового покрова Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)

	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазу розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения зерновых. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7,5	60(1)	-(3)	
Хит, СП (600 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03-2340-1 26.07.2019 25.07.2029	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних (2-4 листа), в фазу розетки многолетних двудольных сорных растений. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная	60(1)	-(3)	Активен
	0,008-0,01	Лен - долгунец	Однолетние, в том числе устойчивые к 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости	-(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных (2-4 листа) и фазу розетки многолетних сорных растений, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения зерновых. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7,5	60(1)	-(3)	
Ларен Мет Про, ВДГ (600 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 Ш/Ш 489-03-2951-1 22.12.2020 21.12.2030	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных (2-4 листа) и в фазу розетки многолетних двудольных сорных растений (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7,5	60(1)	-(3)	Активен

	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных (2-4 листа) и в фазу розетки многолетних двудольных сорных растений (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7,5	60(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха от	60(1)	-(3)	
	0,008-0,01	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха от	60(1)	-(3)	

Метсульфурон-метил + трибенурон-метил

Эллай Лайт, ВДГ (391 г/кг + 261 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-2032-1 30.10.2018 29.10.2028	0,006-0,008	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4 Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев- кущение культуры и ранние фазы роста сорных растений как самостоятельный, так и в баковой смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева высевать только яровые зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	3(3)	Активен
Магнум Супер, ВДГ (300 г/кг + 450 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3532-1 18.03.2022 021-03-1798-1/408 28.03.2025 408 17.03.2032	0,012	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

0,009-0,012	Овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры –фазу формирования второго междоузлия культуры (с учетом чувствительности сортов) и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,009	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,012	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,009-0,012	Овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры –фазу формирования второго междоузлия культуры (с учетом чувствительности сортов) и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,012	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,009	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)

	0,012	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения – фазу формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,012	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения – фазу формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Плуггер, ВДГ (125 г/кг + 625 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03-3571-1 28.03.2022 27.03.2032	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(2)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(2)	
	0,01-0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(2)	
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(2)	

	0,01-0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(2)	
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,1% от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(2)	

мефенпир-диэтил + йодосульфурон-метил-натрий + Амидосульфурон

Секатор Турбо, МД (250 г/л + 25 г/л + 100 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/Ш 019-03-2073-1 31.01.2019 30.01.2029	0,075-0,1	Пшеница яровая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры	60(1)	-(3)	Активен
	0,075-0,1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры	60(1)	-(3)	
	0,05-0,1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

0,05-0,075	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,075-0,1	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,05-0,075	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,075-0,1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и	60(1)	-(3)
0,05 - 0,1	Лен-масличный (на техническое цели), лен долгунец	Однолетние, в том числе устойчивые к 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

0,05 - 0,1	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 – 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,05-0,1	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,05-0,1	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,075-0,1	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры	60(1)	-(3)
0,075-0,1	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

	0,05-0,1	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать рапс озимый, а также на следующий год подсолнечник, рапс яровой, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	----------	-------------------------------	---	--	-------	------	--

Мефентрифлуконазол

Ревиона, КС (75 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - III/III 015-02-3896-1 02.12.2022 01.12.2032	1,0 - 1,25	Кукуруза	Фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная пятнистость, фузариоз початков	Опрыскивание растений профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний в фазы выметывания метелок, образование початков Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	50(1)	3(3)	Активен
	2,0	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса, альтернариоз (на слабом инфекционном фоне)	Опрыскивание в период вегетации в фазе розовый бутон, следующее – с интервалом 10 – 14 дней Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	30(2)	3(3)	
	1,0 - 1,3	Виноград	Оидиум, чёрная гниль, альтернариоз (на умеренном инфекционном фоне)	Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание – при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее – с интервалом 10 – 14 дней Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	21(2)	3(3)	

МЦПА (диметиламинная соль)

Агроксон, ВР (750 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - II/III 024-03-1052-1 29.03.2016 28.03.2026	0,5-1	Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,3	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(3)	
Дикопур М, ВР (750 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - II/III 024-03-2471-1 10.02.2020 09.02.2030	1,3-1,6	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние и некоторые многолетние (виды осота) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,3	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	

МЦПА (калиевая + натриевая соли)

Гербитокс-Л, ВРК (300 г/л + 300 г/л) АО Фирма «Август»	1,3-1,7	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------------	-------------------------------	--	------	------	---------

ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-1848-1 30.03.2018 29.03.2028	1,3-1,7	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
МЦПА кислоты (смесь диметиламинной, калиевой, натриевой солей)							
Антарес, ВК (500 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/П, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/П 050(360)-03-3156-1 21.05.2021 20.05.2031	0,7-1,2	Сорго	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднеспе лые и позднесе лые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Лен масличный	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	35(1)	-(3)	
Властелин, ВК (500 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-3500-1 02.03.2022 29.02.2032	1-1,5	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,5	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,8-1	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднеспе лые и позднесе лые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гербикс, ВК (500 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-3886-1 25.11.2022 24.11.2032	0,8-1,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница, ячмень, рожь озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	

	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднеспелые или позднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Момус, ВРК (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-3879-0 22.11.2022 21.11.2025	0,8-1,2	Клевер полевой под покровом ячменя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,2	Клевер полевой и ползучий	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1 тройчатого листа Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Лен масличный	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры до 10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	59(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	45(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница, рожь, ячмень озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес, яровые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
Царумин, ВК (500 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/Ш 070-03-3840-1 18.11.2022 17.11.2032	1,2	Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница, ячмень, рожь озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	

Напропамид

Девринол, СК (450 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 П/П 148-03-860-1 28.11.2014 27.11.2024	2,5	Рапс яровой и озимый	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы (с заделкой в течение суток на глубину 2-4 см) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	2,5-3	Томат рассадный	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы (с заделкой в течение суток на глубину 2-4 см) до высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

натриевая соли, смесь) + калиевая + МЦПА (диметиламинная

Аметил, ВРК (500 г/л + 500 г/л + 500 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/П 097-03-2421-1 06.11.2019 05.11.2029	0,8-1,2	Клевер луговой и клевер ползучий	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)	
	1,2	Картофель (среднеспе лые и позднеспе лые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,7-1,2	Просо	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Многолетн ие злаковые травы	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,7-1,5	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес яровой	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Клевер луговой (семенные посевы)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Клевер луговой под покровом ячменя ярового	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера (в фазе кущения ячменя) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе елочки при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

натриевая соли, смесь) + МЦПА (диметиламинная + калиевая

Линтаплант, ВК (500 г/л + 500 г/л + 500 г/л)	1,0-1,5	Пшеница, рожь озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------------------------	---	---	-------	------	---------

Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/Ш 024-03-2819-1 29.09.2020 28.09.2030	1,0-1,5	Сенокосны е уголья и пастбища	Вредные и ядовитые двудольные нежелательные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных и нежелательных растений. Выпас скота и скашивание трав разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
	0,7-1,2	Просо	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
	0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуры во время цветения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)
	1,2	Картофель	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)
	0,8-1,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе елочки при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
	0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес яровые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
	0,8-1,2	Клевер полевой и ползучий	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
	0,7-1,2	Сорго	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
	1,0-1,5	Костер безостый, лисохвост луговой, райграс высокий, овсяница луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
	1,0-1,5	Тимофеевк а луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
	0,8-1,2	Клевер полевой (семенные посевы)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Солому на корм скоту разрешается использовать не ранее, чем через 45 дней после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
	0,8-1,2	Клевер полевой под покровом ячменя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)

натриевая соли) + МЦПА (калиевая

Гербитокс, ВРК (500 г/л + 500 г/л) АО Фирма «Август»	1,0-1,5	Пшеница, рожь, ячмень озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	---------------------------------------	---	--	-------	------	---------

ОГРН: 1025006038958
П/П
021-03-4449-0
11.03.2024
10.03.2027

0,8-1,0	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
0,7-1,2	Сорго	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
1,0-1,5	Костер безостый, лисохвост луговой, райграсс высокий, овсяница луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
1,5	Рис	Клубнекамыш, монокория, частуха и сорные растения болотной группы	Опрыскивание посевов в фазе полного кущения культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,8-1,2	Клевер луговой и ползучий	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
1,0-1,5	Тимофеевк а луговая	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
0,8-1,0	Лен масличный	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	55(1)	-(3)
0,5-0,8	Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3–5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10–15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	54(1)	-(3)
1,0-1,5	Сенокосны е угодья и пастбища	Вредные и ядовитые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений и нежелательной растительности. Сбор грибов и ягод после обработок сенокосных угодий и пастбищ в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
0,7-1,2	Просо	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,8-1,2	Клевер луговой (семенные посевы)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
0,8-1,2	Клевер луговой под покровом ячменя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1–2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес яровые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)

никосульфурон

<p>Приоритет, КС (40 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 III/III 063-03-2784-1 09.09.2020 08.09.2030</p>	1,0-1,5	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Дублон, СК (40 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3531-1 18.03.2022 17.03.2032</p>	1-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Вояж, ВДГ (750 г/кг) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-03-3751-1 11.07.2022 10.07.2032</p>	0,08-0,1	Кукуруза на зерно и силос (кроме кукурузы на зеленый корм)	Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,06	Кукуруза на зерно и силос (кроме кукурузы на зеленый корм)	Многолетние и однолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Ниссин, КС (40 г/л) ИСК Биосаенсис Юроп Н.В. ОГРН: - III/III 066-03-434-1 21.10.2014 20.10.2024</p>	1-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
<p>Ниссин Экстра, МД (60 г/л) ИСК Биосаенсис Юроп Н.В. ОГРН: - III/III 066-03-462-1 15.12.2014 14.12.2024</p>	0,6-0,75	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
<p>Никобел, КС (40 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 III/III 277-03-488-1 24.12.2014 23.12.2024</p>	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
<p>Милафорт, КС (40 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4106-1 22.12.2014 21.12.2024</p>	1-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Не активен

Милена, КС (40 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-4329-1 21.12.2023 20.12.2033	1,0-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Корниκος, КС, МД (40 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III, ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-4763-0 23.12.2024 22.12.2027	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,5	Кукуруза на зерно	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Сквош, КС (240 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-03-713-1 21.07.2015 058-03-713-1/198 198 20.07.2025	0,16-0,25	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) сорных растений в смеси с ПАВ Фортуна, Ж (750 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) 0,125-0,25% от объема рабочей жидкости.Применение ПАВ целесообразно в случае доминирования в посевах многолетних и переросших сорных растений, а также при засушливых погодных условиях, которые могут	60(1)	-(3)	Активен
	0,16-0,25	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) сорных растений в смеси с 200-500 мл/га ПАВ Фортуна, Ж (750 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот).Применение ПАВ целесообразно в случае доминирования в посевах многолетних и переросших сорных растений, а также при засушливых погодных условиях, которые могут	60(1)	-(3)	
	0,16-0,25	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Агроника, КС (40 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-1369-1 16.02.2017 15.02.2027	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Никос, КС (40 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфт. ОГРН: - III/III 607-03-3731-1 17.09.2015 16.09.2025	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Стратег, КС (40 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «АГРОДИМ» ОГРН: 1136449005351 III/III 042(275)-03-822-1 28.10.2015 27.10.2025	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Никосав, МД (40 г/л) АГРОСАВА ДОО ОГРН: - III/III 376-03-3705-1 08.11.2016 07.11.2026	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Янтарь, КС (40 г/л) ООО «ГОРИЗОНТ» ОГРН: 1142801010450 III/III 398-03-1261-1 31.10.2016 30.10.2026	1-1,5	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фазтон, КС (40 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 297-03-1424-1 29.03.2017 28.03.2027	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Мелион, КС (40 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-03-1539-1 11.08.2017 10.08.2027	1-1,5	Кукуруза на зерно и силос	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних видов) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Нарвал, КС (40 г/л) «РОТАМ ЛТд» ОГРН: - III/III 102-03-1547-1 20.09.2017 19.09.2027	1-1,5	Кукуруза (только на зерно)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних видов) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Нэо, ВДГ (750 г/кг) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-5012-1 29.06.2020 28.06.2030	0,08-0,1	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,06	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) сорных растений с добавлением 300 мл/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфата эфира) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Талисман, МД (40 г/л) ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМ АЦИЯ А.Д. ОГРН: - III/III 742-03-3337-1 19.10.2021 18.10.2031	1,0-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

никосульфурон + 2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) + тербутилазин

Корнеги, СЭ (30 г/л + 80 г/л + 250 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-03-2258-1 31.05.2019 30.05.2029	1,75-2,0	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений (в фазе 3-5 листьев культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	----------	----------	---	---	-------	------	---------

никосульфурон + Дикамба (натриевая соль)

Милагро Плюс, МД (50 г/л + 220 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-2979-1 18.01.2021 17.01.2031	1,0-1,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего и гумая 10-15 см, в фазу розетки листьев многолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы в фазе 1-3 листьев однолетних злаковых и 2-4 листьев однолетних двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	

никосульфурон + Дикамба (натриевая соль) + Дикамба (натриевая соль) + никосульфурон

ДУБЛОН Супер, ВДГ, СП (125 г/кг + 425 г/кг + 425 г/кг + 125 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III, АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1794-1 26.05.2014 19.04.2033	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Адью, Ж Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	

никосульфурон + Дикамба (натриевая соль) + дифлуфензопир (натриевая соль)

Кельвин Плюс, ВДГ (106 г/кг + 424 г/кг + 170 г/кг) БАСФ Корпорэйшн ОГРН: - III/III 334-03-1925-1 23.05.2018 22.05.2028	0,3-0,4	Кукуруза	Однолетние и многолетние, двудольные и злаковые сорные растения (в том числе однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д)	Опрыскивание посевов в фазе от 3-5 до 7-8 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних сорных растений, фазу розетки листьев у многолетних двудольных и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением ПАВ ДАШ, КЭ (348,75 г/л метилолеата) при соотношении компонентов 1:3 Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	----------	---	--	-------	------	---------

никосульфурон + Мезотрион

Гавань Плюс, МД (30 г/л + 75 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-3449-1 27.12.2021 26.12.2031	1-2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Априори, ВДГ (230 г/кг + 570 г/кг) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-2023-1 25.10.2018 24.10.2028	0,15-0,25	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних) в смеси с 150-250 мл/га ПАВ МультиМастр, КЭ (960 г/л пинолена) (соотношение 1:1). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Агроника Гранд, МД (40 г/л + 70 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-2714-1 29.06.2020 28.06.2030	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Меткий, МД (30 г/л + 75 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-2904-1 02.12.2020 01.12.2030	1-2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Кугард, МД (30 г/л + 75 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-4802-1 06.02.2025 05.02.2035	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

никосульфурон + Мезотрион + пиклорам

Фултайм, МД (37,5 г/л + 75 г/л + 17,5 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3061-1 18.03.2021 17.03.2031	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 3 до 6 листьев культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев однолетних, в фазу розетки многолетних двудольных и при высоте 10-20 см многолетних злаковых) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	----------	--	---	-------	------	---------

никосульфурон + римсульфурон

Кордус, ВДГ (500 г/кг + 250 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-2095-1 01.02.2019 029-03-2095-1/285 285 31.01.2029	30-40	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних двудольных и злаковых сорняков и фазе розетки многолетних двудольных совместно с 200 мл/га Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Препарат не рекомендуется применять на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских линиях для производства семян Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	Активен
	30-40	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних двудольных и злаковых сорняков и фазе розетки многолетних двудольных с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Препарат не рекомендуется применять на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских линиях для производства семян Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	

никосульфурон + римсульфурон + Дикамба

Кордус Плюс, ВДГ (92 г/кг + 23 г/кг + 550 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III, ООО Кортева Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-03-4665-0 16.09.2024 16.08.2030	0,22-0,44	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения (в том числе однолетние двудольные виды, устойчивые к 2,4-Д)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних и фазу розетки листьев у многолетних двудольных сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не рекомендуется применять препарат на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских линиях при производстве семян Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,22-0,44	Кукуруза	Однолетние и многолетние, двудольные и злаковые сорные растения (в том числе однолетние двудольные виды, устойчивые к 2,4-Д)	Опрыскивание посевов в фазе в фазе 2-6 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних и фазу розетки листьев у многолетних двудольных сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не рекомендуется применять препарат на сахарной или лопающейся кукурузе, на родительских линиях при производстве семян Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

никосульфурон + флорасулам + 2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир)

Модерн, КЭ (80 г/л + 8 г/л + 412 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/П 192-03-1068-1 08.04.2016 07.04.2026	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние, том числе устойчивые к 2,4-Д, некоторые многолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	----------	---	--	-------	------	---------

никосульфурон + флорасулам + Мезотрион

Модерн Премиум, МД (38 г/л + 2,4 г/л + 75 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/П 192-03-3966-1 24.01.2023 23.01.2023	1-2	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----	----------	---	--	-------	------	---------

Оксифлуорфен

Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЬШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - П/П 009-03-2242-1 24.05.2019 23.05.2029	1,0	Лук всех генераций (кроме лука на перо), чеснок	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8- 1,0	Подсолнеч ник (семена и масло)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо), чеснок	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Акцифор, КЭ (240 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/П 050-03-3275-1 26.08.2021 25.08.2031	0,8-1,0	Подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Босфор, КЭ (240 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П 126-03-3266-1 16.08.2021 15.08.2031	1,0	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,0	Подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гаур, КЭ (240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-1808-1 15.03.2017 14.03.2027	0,8-1	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Лук всех генера-ций (кроме лука на перо), чеснок	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,5	Лук всех генера-ций (кроме лука на перо), чеснок	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Галиган, КЭ (240 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/П 156-03-2813-1 21.09.2020 20.09.2030	0,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо), чеснок	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,8-1,0	Подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
	1,0	Лук всех генераций (кроме лука на перо), чеснок	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(4)	
Пиранья, КЭ (240 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-03-2842-1 16.10.2020 15.10.2030	0,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1,0	Подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Пеларгоновая кислота

Мохофф, МКЭ (525 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-3288-1 08.08.2021 07.08.2031	100-200 мл/3 л воды(Л)	Газоны	Мхи, лишайники, нежелательная травянистая растительность	Опрыскивание засоренных участков с последующим подсевом газонной культуры Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	1(-)	Активен
---	------------------------------	--------	--	--	------	------	---------

Пендиметалин

Эстамп, КЭ (330 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-2180-1 02.04.2019 01.04.2029	2,3-4,5	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	3-6	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
Кобра, КЭ (330 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П, Агрия АД ОГРН: - П/П 184(026)-03-2289-1 24.06.2019 23.06.2029	3-6	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	2,3-4,5	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	3-6	Капуста белокочанная (кроме раннеспелых и среднеспелых сортов)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	

Стомп Профессионал, МКС (455 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - III/III 015-03-3290-1 10.09.2021 09.09.2031	2,2-4,35	Капуста белокочан ная (кроме раннеспел ых и среднеспе лых сортов)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3,25-3,5	Морковь	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов или вегетирующих растений в фазе всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,7-3,23	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов – в фазе «петелька» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Фист, КЭ (330 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-03-861-1 28.11.2014 27.11.2024	2,3-4,5	Капуста белокочан ная (кроме раннеспел ых и среднеспе лых сортов)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до высадки рассады или после посева до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	3-6	Подсолнеч ник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,3-4,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов - в фазе «петелька» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гайтан, КЭ (330 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 II/III 021-03-1807-1 22.06.2015 21.06.2025	3-6	Морковь (кроме пучковой), подсолнеч ник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,3-4,5	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

Пендиметалин + Диметенамид-Р

Винг-П, КЭ (250 г/л + 212,5 г/л) БАСФ Корпорейшн ОГРН: - III/III 334-03-1241-1 27.09.2016 26.09.2026	2-4	Подсолнеч ник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----	------------------	--	--	-------	------	---------

Пеноксулам

Гуд-Харвест Пеноксулам 25, МД (25 г/л) Чжангсу Гуд Харвест Вейн Агрокемикал Ко., Лтд. (Китай) ОГРН: - III/III 563-03-3082-1 31.03.2021 30.03.2031	1-1,6	Рис	Однолетние злаки (просовидные), осоковидные (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохрия, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Перед началом обработки необходимо слить воду с чеков. Повторное затопление чеков можно проводить не ранее, чем через 6 часов после окончания обработки. Запрещается технологический сброс воды из чеков с момента обработки пестицидов до конца фазы восковой спелости риса (начало	-(1)	-(3)	Активен
--	-------	-----	--	---	------	------	---------

Цитадель 25, МД (25 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБГЕЗЕЛЬШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - III/III 009-03-2763-1 29.07.2020 28.07.2030	1-1,6	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых) сорных растений. Перед началом обработки необходимо слить воду с чеков. Повторное затопление чеков можно проводить через 6 часов после окончания обработки. Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября)	60(1)	-(-)	Активен
Крепошанс, МД (25 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-3982-1 09.02.2023 08.02.2033	1,0-1,6	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листа – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Перед началом обработки необходимо слить воду с чеков. Повторное затопление чеков можно проводить через 6 часов после окончания обработки. Запрещается технологический сброс воды с чека с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября)	60(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,6	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листа – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Перед началом обработки необходимо слить воду с чеков. Повторное затопление чеков можно проводить через 6 часов после окончания обработки. Запрещается технологический сброс воды с чека с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября)	60(1)	-(3)	

пиклорам

Клинч, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3942-1 12.01.2023 11.01.2033	0,15-0,5	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны, линии электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения	Опрыскивание растений в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	-(1)	1(3)	Активен
	0,03-0,05	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 г/га в зависимости от типа распылителей	56(1)	1(3)	
	0,2-0,7	Сенокосы и пастбища	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок сенокосов и пастбищ в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	-(1)	1(3)	

0,6-1,2	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Злостные многолетние двудольные сорные растения и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок земель несельскохозяйственного назначения в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	-(1)	1(3)	
0,03-0,05	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	60(1)	1(3)	
0,7	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Разновозрастные заросли борщевика Сосновского	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок земель несельскохозяйственного назначения в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	-(1)	1(3)	
0,03-0,05	Рапс яровой, рапс озимый	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	60(1)	1(3)	
2-3,5 г/3л воды(Л)	Газоны злаковых трав	Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения	Опрыскивание растений в период вегетации. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 1 дня Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	1(3)	
0,1-0,35	Газоны злаковых трав (в том числе на землях населенных пунктов)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание растений в период вегетации. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей	-(1)	1(3)	

пиклорам (диметилэтаноламинные соли) + МЦПА

Горгон, ВРК (150 г/л + 350 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-1726-1 25.03.2015 24.03.2025	1,5-3,5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранная зона линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы	Борщевик Сосновского, другие злостные двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе розетки борщевика Сосновского (до выбрасывания цветоноса). Сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Срок безопасного входа на обработанные препаратом территории для временного пребывания - 3 дня Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	Не активен
---	---------	--	--	---	------	------	------------

1,5-4,5	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-нефтепроводов, насыпи и полосы)	Древесно-кустарниковая растительность, в том числе хвойные породы	Опрыскивание в период вегетации. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 100-1000 л/га	-(1)	-(3)
1,5-2	Паровые поля и участки, предназначенные под посев зерновых культур со слабой и средней степенью засоренности горчаком ползучим	Горчак ползучий и злостные двудольные сорняки	Опрыскивание нежелательных вегетирующих растений в фазе розетки листьев – начала бутонизации горчака ползучего. Яровые зерновые и кукурузу можно высевать весной следующего после обработки года. Озимые зерновые высевать осенью следующего после обработки года Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)
0,15-0,17	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,15-0,20	Лен-долгунец, лен масличный	Однолетние (в том числе устойчивые к 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, в фазе 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних двудольных сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	44(1)	-(3)
0,15-0,17	Кукуруза, в том числе на силос и масло	Однолетние (в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
1,5-3,5	Сенокосные угодья и пастбища	Травянистая и древесно-кустарниковая растительность, в том числе хвойные породы	Опрыскивание в период вегетации. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)
2,5-3,5	Сильно засоренные участки и очаги распространения горчака ползучего	Горчак ползучий и злостные двудольные сорняки	Опрыскивание нежелательных вегетирующих растений в фазе розетки листьев – начала бутонизации горчака ползучего. Кукурузу можно высевать весной следующего после обработки года. Яровые и озимые зерновые можно высевать на второй год после обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)

пиклорам + 2,4-Д кислота (2-этилгексилэвтер) + флорасулам

Аминка Трио, СЭ (51 г/л + 300 г/л + 6,25 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Ш 097-03-3362-1 10.11.2021 09.11.2031	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Однолетние, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	

пиклорам + Аминопирилад + Клопирилад (сложный 2-этилгексилэвтер)

<p>Репер Трио, МД (80 г/л + 17 г/л + 267 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-3211-1 13.07.2021 12.07.2031</p>	0,2-0,3	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2-0,3	Рапс озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений осенью или весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева после весеннего применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

пиклорам + Клопиралид

<p>Круцифер, ВР, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-03-4828-1 21.03.2025 20.03.2035</p>	0,30-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота, сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га Расход рабочей жидкости - 200-300	60(1)	-(3)	Активен
<p>Дикамерон, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/П 549-03-3164-1 27.05.2021 26.05.2031</p>	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Обработка озимого рапса – весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Меридиан, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-4140-1 29.06.2023 28.06.2033</p>	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Круцифер, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-03-646-1 23.04.2015 22.04.2025</p>	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Лерашанс, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/П</p>	0,3-0,35	Капуста белокочанная	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-4 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	Активен

126-03-4534-1 25.04.2024 24.04.2034	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Шкипер, ВР (67 г/л + 267 г/л) ОАО «Группа компаний «Агропром-МДТ» ОГРН: - III/III 006-03-709-1 20.07.2015 19.07.2025	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Мегалит, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-1393-1 06.03.2017 05.03.2027	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
РапсАгро, ВР (67 г/л + 267 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 III/III, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 III/III 023(197)-03-1904-1 08.05.2018 07.05.2028	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Пиноксаден + антидот – феноксапроп-П-этил

Алебарда, КЭ (23 г/л + 6 г/л + 23 г/л) ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 II/III 197-03-4271-0 01.12.2023 30.11.2026	1,0-1,3	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимый ячмень обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,3	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорным растениям (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Пиноксаден + антидот феноксапроп-П-этил

Апровадор, КЭ (45 г/л + 11,25 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 II/III 126-03-4496-1 01.04.2024 31.03.2034	0,7-1,3	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост) сорные растения	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,0	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг) сорные растения	Опрыскивание посевов начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,7-1,0	Ячмень озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гештальт, КЭ (45 г/л + 11,25 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III, ООО «АП Протекшен» ОГРН: 1077203028528 III/III 038(915)-03-4429-1 20.02.2024 19.02.2034	0,7-1,0	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,3	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Серапен, КЭ (100 г/л + 25 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-4373-0 30.01.2024 29.01.2027	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая, яровой ячмень	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное, овсюг, метлица полевая, лисохвост)	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	Активен

Пиноксаден + антидотклоквинтосет-мексил + флорасулам

Серапен Плюс, КЭ (45 г/л + 11,5 г/л + 5 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/III 699-03-4396-0 30.01.2024 29.01.2027	0,7-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы выхода в трубку культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	48(1)	-(3)	Активен
Аксакал Плюс, КЭ (50 г/л + 12,5 г/л + 6,25 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-4330-0 21.12.2023 20.12.2026	0,8 – 1,2	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим злаковым сорным растениям (от фазы 2-3 листьев до конца кущения) и ранним фазам роста двудольных сорных растений (2-4 пары настоящих листьев), независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Пиноксаден + клоквинтосет-мексил + флорасулам

Аксиал Кросс, КЭ (45 г/л + 11,25 г/л + 5 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-3495-1 10.02.2022 09.02.2032	0,7 - 1,1	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста (от 2-3 до 5 листьев) сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----------	---	--	---	-------	------	---------

Пиноксаден + феноксапроп-П-этил + антидот – клоквинтосет-мексил

Аксакал Практик, КЭ (50 г/л + 50 г/л + 25 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 II/III 002-03-4340-0 28.12.2023 27.12.2026	0,4-0,6	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (от фазы 2-3 листьев до конца кущения) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 50 - 300 л/га (в зависимости от типа распылителя)	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	--	-------------------------------------	--	-------	------	---------

Пиноксаден + флорасулам

Статус Крос, СЭ (45 г/л + 5 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-4474-1 30.03.2024 29.03.2034	07-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост) и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,7-1,0	Ячмень яровой, ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост) и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост) и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1,0	Ячмень яровой, ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост) и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

Пирazosульфурон-этил

Сириус, СП (100 г/кг) Ниссан Кемикал Корпорейшн ОГРН: - III/III 234-03-4649-1 26.07.2024 25.07.2034	0,15-0,3	Рис	Осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (5-7 листьев) при сильной засоренности посевов. Сброс воды с рисовых чеков – через 70 дней после обработки посевов риса препаратом Сириус, СП (100 г/кг пирazosульфурон-этила) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	90(1)	-(-)	Активен
	0,1-0,15	Рис	Осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (5-7 листьев) при слабой и средней засоренности посевов. Сброс воды с рисовых чеков – через 70 дней после обработки посевов риса препаратом Сириус, СП (100 г/кг пирazosульфурон-этила) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	90(1)	-(-)	

Пиракlostробин + Мефентрифлуконазол

Балая, КЭ (100 г/л + 100 г/л) БАСФ Агро Б.В. ОГРН: - III/III 015-02-3893-1 01.12.2022 30.11.2032	0,6-0,8	Овёс	Красно-бурая пятнистость, ржавчина корончатая	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(-)	Активен
	0,6-0,8	Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, рихоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(-)	
	0,6-0,8	Ячмень яровой, озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(-)	

	0,6-0,8	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (желтая пятнистость)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1-2)	-(-)	
--	---------	------------------------	---	---	---------	------	--

Пирафлуфен-этил

Кабуки, КЭ (26,5 г/л) Нихон Нояку Ко., Лтд. ОГРН: - П/Ш 516-03-2054-1 12.11.2018 11.11.2028	0,15- 0,2	Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культурных растений и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----------	---	---	--	-------	------	---------

Пиридат

Лентагран 600, КЭ (600 г/л) Бельхим Кроп Протекшн Н.В./С.А. ОГРН: - П/Ш 546-03-2194-1 09.04.2019 08.04.2029	1-1,5	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих культурных (в фазу 2-6 листьев) и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-------	---------------------	---------------------------------------	---	-------	------	---------

Пироксасульфен

Каритори, ВДГ (850 г/кг) Кумаи Кемикал Индастри Ко. Лтд. ОГРН: - П/Ш 603-03-3909-1 16.12.2022 15.12.2032	0,1-0,3	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы сразу после посева или в течение трех дней после него Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-----	--	--	-------	------	---------

Пироксулам + флуквифен-метил

Паллас КА, МД (45 г/л + 90 г/л) ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» ОГРН: 1152312010740 П/Ш 866-03-4260-1 17.11.2023 16.11.2033	0,4-0,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от начала до середины кущения), в фазе 6-8 листьев двудольных сорных растений. Оптимальная фаза развития культурных растений – от середины кущения до стадии 2-го междоузлия у пшеницы Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-------------------------	--	--	-------	------	---------

Прометрин

Промобел, КС (500 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/Ш 277-03-2139-1 04.03.2019 03.03.2029	3	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Промет, КС (500 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 Ш/Ш 023-03-1248-1 05.10.2016 04.10.2026	2,5-3,5	Соя, горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гезагارد, КС (500 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-03-1302-1 13.12.2016 12.12.2026	1,5-3	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	30(30)	Активен
	2,5-3	Горох (зерно), чеснок (кроме на перо)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2-3	Петрушка (для корнеплод ов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	45(1)	30(30)	
	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2-3	Петрушка (для зелени)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	30(30)	
	2-3,5	Кукуруза с подсевом подсолнеч ника	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2-3,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	30(30)	
	2-3	Сельдерей, укроп	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	28(1)	30(30)	
	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	

	3	Фасоль, вика	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	3	Чина, кормовые бобы	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
Гезадар, КС (500 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/П 097-03-217-1 31.12.2013 30.12.2023	2-3	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры.	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гезатрин, КС (500 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-03-4419-1 15.02.2024 14.02.2034	1,5-3,0	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Альфа-Прометрин, КС (500 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - П/П 062-03-560-1 16.02.2015 15.02.2025	2-3,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Кратерр, КС (500 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 П/П, ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 П/П, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/П 424(043,042)-03-2252-1 30.05.2019 29.05.2029	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-3,0	Морковь (за исключением пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Шансгард, КС (500 г/л) ООО «Шанс»	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен

ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-587-1 10.03.2015 09.03.2025	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Соя, горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Прометрин, СК (500 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-03-2457-1 06.11.2019 05.11.2029	2,5 - 3,5	Люпин	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(30)	Активен
	2,0-3,5	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	1,5	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры с последующей обработкой в фазе 1 – 2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	30(30)	
	2,0 - 3,5	Подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2,0-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	3,0	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(30)	
	1,5 - 3,0	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2,5 - 3,5	Горох (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(30)	
Позитив Плюс, КС (500 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - III/- 064-03-714-1 21.07.2015 20.07.2025	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Поптрин, КС (500 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд.	1,5-3,0	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

ОГРН: - III/III 699-03-4314-1 14.12.2023 13.12.2033	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,5	Подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гамбит, СК (500 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1727-1 25.04.2017 24.04.2027	2,5-3,0	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,5-3	Горох (на зерно)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Промекс, КС (500 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4111-1 12.04.2017 11.04.2027	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы одновременно до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Гордон, КС (500 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-03-1545-1 06.09.2017 05.09.2027	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Тристар, КС (500 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-3306-1 20.09.2021 19.09.2031	2-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Горох на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Форгис, КС (500 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 II/III 004-03-5005-1 14.06.2017 13.06.2027	2-3	Кориандр	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Сармат, КС (500 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2202-1 12.04.2019 11.04.2029	2-3,5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,5-3	Горох (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,5	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Бриг, КС (500 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2220-1	20-30 мл/3 л воды(Л)	Фасоль	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 3 л /100м2	60(1)	3(-)	Активен
	2-3,5	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	

07.05.2019 06.05.2029	20-35 мл/3 л воды(Л)	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 3 л /100м2	60(1)	3(-)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-30 мл/3 л воды(Л)	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 3 л /100м2	60(1)	3(-)	
	2-3	Фасоль	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-3	Морковь (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3,5	Подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	
Променад, СК (500 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ООО «РУСЮРОФАРМ» ОГРН: - III/III 010(154)-03-2677-1 18.05.2020 17.05.2030	2,0-3,5	Картофель (кроме раннего)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5	Морковь (за исключени ем пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры с последующей обработкой в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	2,0-3,5	Кукуруза на зерно	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5	Морковь (за исключени ем пучкового товара)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,5	Подсолнеч ник (на семена и масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	пропаквизафоп						
Шогун, КЭ (100 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-2823-1 06.10.2020 05.10.2030	1,0-1,2	Свекла сахарная, капуста белокочан ная, подсолнеч ник, соя	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,8	Картофель (кроме раннеспел ого)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев злаковых сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	39(1)	-(3)	

	0,6-0,8	Свекла сахарная, капуста белокочанная, подсолнечник, соя, горох на зерно (кроме овощного), рапс	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев злаковых сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,2	Свекла кормовая, лен-долгунец	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,6-0,8	Свекла кормовая, лен-долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев злаковых сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,2	Картофель (кроме раннеспелого)	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	39(1)	-(3)	

Пропизохлор

Вендор, КЭ (720 г/л) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - П/Ш 062-03-3489-1 24.01.2022 23.01.2032	2-3	Подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Ацетал Про, КЭ (720 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-03-1049-1 25.03.2016 24.03.2026	3	Соя, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2-4 настоящих листьев культурных и ранние фазы роста сорных растений в условиях орошения или при наличии достаточной влажности Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,5-3	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2-4 настоящих листьев культурных и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Соя, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Кукуруза, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Лабрадор, КЭ (720 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/Ш 097-03-1849-1 30.03.2018 29.03.2028	2-3	Подсолнечник, кукуруза, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

<p>Ладон про, КЭ (720 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 П/П, ООО «Франдеса» ОГРН: - П/П 590(297)-03-3539-1 18.03.2022 590(297)-03-3539-1/486 486 17.03.2032</p>	2,5-3,0	Рапс озимый	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу от 2 до 4-х листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	2,5-3	Рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов до всходов или в фазу 1-2 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Рапс озимый	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Подсолнеч ник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	115(1)	-(3)	
<p>Питон, КЭ (720 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-3522-1 14.03.2022 13.03.2032</p>	3	Соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих культурных растений в фазе от 2 до 4-х настоящих листьев и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,5-3	Кукуруза, свекла сахарная, рапс озимый	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих культурных растений в фазе от 2 до 4-х настоящих листьев и ранние фазы роста сорных растений. Озимый рапс обрабатывается осенью Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Кукуруза, подсолнеч ник, рапс яровой и рапс озимый, свекла сахарная, соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Прокул, КЭ (720 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 506774638150 П/П, ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 П/П, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 197(134,010)-03-2293-1 01.07.2019 30.06.2029</p>	2,0-3,0	Подсолнеч ник, кукуруза, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Пронто, КЭ (720 г/л) ПЕТЕРС & БУРГ Кфт. ОГРН: - П/П 017-03-3451-1 27.12.2021 26.12.2031</p>	2-3	Кукуруза, подсолнеч ник, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
<p>Пропонит, КЭ (720 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: -</p>	2,5-3	Свёкла сахарная, рапс озимый	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев культурных растений и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

П/Ш 201-03-3918-0 21.12.2022 20.12.2025	2,5-3	Картофель	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих культурных растений при высоте ботвы 5 см и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Рапс озимый	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2,5-3	Кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 3 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3	Соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев сои и ранние фазы роста сорных растений в условиях орошения или при наличии достаточной влажности Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3	Горох (на зерно), нут	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих культурных растений в фазе 1-3 настоящих листьев и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Горох (на зерно), картофель, кукуруза, нут, подсолнечник, рапс яровой, свёкла сахарная, соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
ПроФус, КЭ (720 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - П/- 064-03-4622-1 24.06.2024 23.06.2034	2,0-3,0	Подсолнечник на семена и масло, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-3,0	Кукуруза на зерно и масло	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев кукурузы Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Пропизохлор + тербутилазин							
Версия, МД (370 г/л + 185 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/Ш 018-03-4032-1 16.03.2023 15.03.2033	3,0-4,0	Кукуруза, подсолнечник, соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, после посева или до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
Просульфокarb							
Боксер, КЭ (800 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 Ш/Ш 041-03-3508-1 02.03.2022 01.03.2032	3+2	Морковь	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание вегетирующих культурных и сорных растений в фазу 2-3 и 4-5 листьев моркови (интервал между обработками не менее 7 дней) и ранние фазы роста сорных растений (злаковые – не более coleoptile, двудольные – всходы-первая пара настоящих листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен

	3-5	Картофель	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1+2+2	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные сорные растения	Последовательное опрыскивание вегетирующих культурных и сорных растений начиная с фазы 2 и более листьев лука (интервал между обработками не менее 7 дней) и ранние фазы роста двудольных сорных растений (всходы – первая пара настоящих листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
Индокарб, КЭ (800 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III, АгроЛайф Сайнс Корпорейшн ОГРН: - III/III 197(678)-03-3067-1 19.03.2021 18.03.2031	3,0-5,0	Картофель	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Просульфурон

Пик, ВДГ (750 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-2307-1 08.07.2019 07.07.2029	0,02-0,025	Кукуруза (на зерно)	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, горчицу, рапс и фацелию высевать не	60(1)	-(4)	Активен
	0,015-0,025	Лен - долгунец	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» (3-10 см) культуры и ранние фазы роста сорных растений. Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, свеклу сахарную, подсолнечник	-(1)	-(4)	
	0,015-0,025	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку весной или осенью в ранние фазы роста сорных растений (однолетние 2-4 листа, многолетние – розетка). Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH почвы более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры	60(1)	-(4)	

	0,015-0,025	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку в ранние фазы роста сорных растений (однолетние 2-4 листа, многолетние розетка). Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, сахарную	60(1)	-(4)	
--	-------------	-------------------------------	--	--	-------	------	--

римсульфурон

Дандрис, ВДГ (250 г/кг) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 Ш/Ш 070-03-3933-1 10.01.2023 09.01.2033	0,05	Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посадок после окуливания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,03+0,02	Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посадок после окуливания по первой и второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)	
	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гримс, ВДГ (250 г/кг) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 Ш/Ш, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 Ш/Ш 050(360)-03-1062-1 07.04.2016 06.04.2026	0,04	Кукуруза (на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	

	0,03+0,02	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
	0,05	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) (ПАВ) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
Префект, ВДГ (500 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 ППП 192-03-1016-1 09.03.2016 08.03.2026	0,025	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с 200 мл/га Стюарт, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (ПАВ) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Стюарт, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (ПАВ) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015+0,01	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания, по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорняков, и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с 200 мл/га Стюарт, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (ПАВ) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,025	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200мл/га Стюарт, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015+0,01	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200мл/га Стюарт, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (ПАВ) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	

<p>Кассиус, ВРП (250 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2829-1 08.10.2020 07.10.2030</p>	0,05	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,04	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03+0,02	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорных растений и повторно по второй волне сорных растений, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,05	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений (пырея) 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Титус, СТС (250 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-249-1 10.02.2014 029-03-249-1/286 286 09.02.2024</p>	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	Не активен
	0,05+0,05	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	15(2)	7(3)	

0,05+0,05	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(2)	7(3)
0,04	Кукуруза (на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	7(3)
0,05	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	15(1)	7(3)
0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
0,03+0,02	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	7(3)
0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	7(3)
0,05	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(1)	7(3)
0,05+0,05	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(2)	7(3)

	0,05	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	15(1)	7(3)	
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,05	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	15(1)	7(3)	
	0,05	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,05+0,05	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	15(2)	7(3)	
<p>Ранголи-Тиран, ВДГ (250 г/кг) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-2299-1 01.07.2019 30.06.2029</p>	0,03+0,02	Кукуруза на зерно	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	Активен
	0,05	Кукуруза на зерно	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	

	0,04	Кукуруза на зерно	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
<p>Римус, ВДГ (250 г/кг) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-5010-1 23.04.2020 22.04.2030</p>	0,04	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	Активен
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	3(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	3(3)	
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	0,05	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
<p>Ромул, ВДГ (250 г/кг) ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 III/III, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 043(042, 002)-03-2663-1 23.04.2020 22.04.2030</p>	0,04	Кукуруза (на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	0,05	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	

	0,05	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
<p>Маис, СТС (250 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03-2917-1 09.12.2020 08.12.2030</p>	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,05	Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,03+0,02	Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания по первой и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

<p>Римэкс, ВДГ (250 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 010(197)-03-3120-1 21.04.2021 20.04.2031</p>	0,04	Кукуруза (на зерно)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонлаАФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	0,03+0,02	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
	0,05	Кукуруза (на зерно)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окуливания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окуливания по первой и по второй волне сорных растений, при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	7(3)	
<p>Риманол, ВДГ (250 г/кг) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-4493-1 01.04.2024 31.03.2034</p>	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10- и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окуливания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Эскудо, ВДГ (500 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-3820-1 11.10.2022 10.10.2032</p>	0,025	Картофель	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окуливания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением ПАВ Адьо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	30(1)	-(3)	Активен

0,015+0,010	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(2)	-(3)
0,015+0,010	Картофель	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окучевания по первой и повторно по второй волне сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	30(2)	-(3)
0,015+0,010	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	20(2)	-(3)
0,015+0,010	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	20(2)	-(3)
0,025	Томат посевной	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	20(1)	-(3)
0,025	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)
0,025	Томат рассадный	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	20(1)	-(3)

	0,02	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Адьо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Цицерон, ВДГ (250 г/кг) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-1308-1 16.12.2016 15.12.2026	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания по первой волне и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	50(2)	-(3)	
Римлин, ВДГ (250 г/кг) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-03-1528-1 26.07.2017 25.07.2027	0,05	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окуливания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(1)	-(3)	Активен
	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание в посевы в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окулировки по первой и второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)	
	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Шангус, ВДГ (250 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4047-1 22.03.2023 126-03-4047-1/489 489 21.03.2023	0,05	Томат посевной (открытый грунт)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)	Активен
	0,03+0,02	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки по первой и повторно по второй волне сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Шанс- 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,05	Томат рассадный (открытый грунт)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(3)	
	0,05	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок после окулировки в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,04	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,05	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением ПАВ Шанс – 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,03+0,02	Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
--	-----------	----------	--	---	-------	------	--

римсульфурон + тифенсульфурон-метил

Слоузен, ВДГ (500 г/кг + 250 г/кг) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3825-1 29.10.2022 28.10.2032	0,02	Кукуруза на силос и на зерно	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	Активен
	0,025	Кукуруза на силос и на зерно	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-5 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и ранние фазы роста однолетних сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	

римсульфурон + тифенсульфурон-метил + изоксадифен-этил

Базис Форте, ВДГ (148,14 г/кг + 92,60 г/кг + 111,11 г/кг) ООО Кортева Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-03-4080-1 28.04.2023 27.04.2033	0,100-0,135	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 2-4 до 5-8 листьев культуры и ранние фазы роста (1-4 листа однолетних двудольных и злаковых сорных растений и фазу розетки многолетних двудольных видов) с добавлением 400 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не проводить культивацию междурядий ранее, чем через 7 дней после обработки посевов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-------------	----------	--	--	-------	------	---------

римсульфурон + тифенсульфурон-метил + флорасулам

Аркан, ВДГ (250 г/кг + 150 г/кг + 80 г/кг) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - III/III 062-03-2640-1 03.04.2020 02.04.2030	0,04-0,05	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры в ранние фазы роста однолетних сорных растений, при высоте многолетних сорных злаков 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----------	----------	--	--	-------	------	---------

С-Метолахлор

Дуал Голд, КЭ (960 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-3507-1 02.03.2022 01.03.2032	1,6-2	Подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры, или после всходов культуры до фазы 3-го листа Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,3	Свекла сахарная, столовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры с последующим опрыскиванием вегетирующих сорных растений первой волны (в фазу семядолей двудольных сорных растений и до 2-х листьев злаков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	
	1,3-1,6	Подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	1	Свекла сахарная, столовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей двудольных и до двух листьев у злаковых сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(3)	
	1,3-2	Свекла сахарная, столовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Капуста белокочанная посевная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Соя, кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Капуста белокочанная рассадная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Джиндур, КЭ (960 г/л) ООО ВОЯЖ АГРОКЕМИКАЛ ОГРН: 1172536044559 III/III 677-03-3363-1 15.11.2021 14.11.2031	1,3-1,6	Подсолнечник, кукуруза, соя, рапс яровой, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Хевимет, КЭ (960 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-4078-1 22.05.2023 21.05.2033	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Телус, КЭ (960 г/л) АГРОСАВА ДОО ОГРН: - III/III 376-03-3707-1 06.12.2016 05.12.2026	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата на глубину не более 5 см Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Дифилайн, КЭ (960 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050-03-988-1 04.03.2016 03.03.2026	1,3-2	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,3-1,6	Кукуруза, соя, подсолнечник, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	

Селена, КЭ (960 г/л) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 III/III 653-03-3753-1 13.07.2022 12.07.2032	1,3-1,6	Подсолнеч ник, кукуруза, соя, сахарная свекла	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до по-сева или до всходов культуры. В засушливых условиях ре-комендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Симба, КЭ (960 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1783-1 18.04.2016 021-03-1783-1/409 17.04.2026	1,3-1,6	Капуста посевная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,3-1,6	Подсолнеч ник, кукуруза, соя, рапс	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Капуста рассадная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-2	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Гречиха, сафлор, кабачки, арбуз, тыква	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 100-400 л/га	60(1)	-(3)	
Авангард, КЭ (960 г/л) ООО «ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 III/III 063-03-1268-1 02.11.2016 01.11.2026	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнеч ник, рапс яровой, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата в почву (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Душанс, КЭ (960 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-1600-1 21.11.2017 20.11.2027	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнеч ник, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата в почву (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Метолс, КЭ (960 г/л) ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 III/III, ООО «Ипрохим» ОГРН: 5087746217719 III/III, ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III 347(100, 004)-03-5015-1 26.05.2017 25.05.2027	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнеч ник, свекла сахарная, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Стрим, КЭ (960 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-03-1601-1 21.11.2017	1,3-1,6	Капуста белокочан ная рассадная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,3-1,6	Капуста белокочан ная посевная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

20.11.2027	1,3-2	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	1,3-1,6	Кукуруза, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата в почву (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Ранголи-Дон, КЭ (960 г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1768-1 22.02.2018 21.02.2028	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Бегин, КЭ (960 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III 010(038)-03-4137-1 22.06.2023 21.06.2033	1,3-1,6	Кукуруза (на зерно), соя, подсолнечник, рапс яровой, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Гуд-Харвест С-Металахлор, КЭ (960 г/л) Чжангсу Гуд Харвест Вейн Агрокемикал Ко., Лтд. (Китай) ОГРН: - III/III 563-03-3012-1 09.02.2021 08.02.2031	1,3-2	Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,3-1,6	Кукуруза, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

С-Металахлор + Мезотрион + тербутилазин

Люмакс, СЭ (375 г/л + 37,5 г/л + 125 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-3487-1 24.01.2022 23.01.2032	3-4	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или после всходов культуры (до фазы 3-го листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----	----------	--	--	-------	------	---------

С-Металахлор + тербутилазин

Грасс, КС (312,5 г/л + 187,5 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-3087-1 02.04.2021 01.04.2031	3,0-4,0	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов до появления всходов культуры или после всходов культуры (до фазы 3-го листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3,0-4,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Камелот, СЭ (312,5 г/л + 187,5 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-1785-1	3-4	Соя, люпин	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

01.03.2017 021-03-1785-1/334 28.02.2027	3-4	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посевов, до всходов или после всходов культуры (до фазы 3-го листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Хевимет Голд, КС (312,5 г/л + 187,5 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-1463-1 12.04.2017 097-03-1463-1/351 351 11.04.2027	3-4	Соя	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Подсолнечник, кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,5-3,5	Люпин	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Террагард, СЭ (312,5 г/л + 187,5 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-03-2862-1 02.11.2020 01.11.2030	3-4	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов до появления всходов или после всходов культуры (до фазы 3-го листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Бегин Турбо, КС (250 г/л + 250 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-2431-1 16.10.2019 010-03-2431-1/423 423 15.10.2029	2,2-4,0	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,2-3,0	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или до фазы 2-3 листа культуры и ранней фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Ирвин, СЭ (312,5 г/л + 187,5 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2993-1 25.01.2021 24.01.2031	3-4	Подсолнечник, кукуруза, соя	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

сульфометурон-метил

Эурон, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4631-1 08.07.2024 07.07.2034	0,12-0,24	Земли несельскохозяйственного назначения (охраняемые зоны линейных электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные нежелательные травянистые растения, за исключением относительно устойчивых (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник)	Опрыскивание нежелательной травянистой растительности при высоте до 35 см. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих ягод и грибов в сезон проведения обработки территорий не допускается Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	Активен
---	-----------	---	--	--	------	--------	---------

	0,24-0,35	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые однолетние и многолетние злаковые и двудольные нежелательные травянистые растения (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник)	Опрыскивание нежелательной травянистой растительности при высоте до 35 см. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих ягод и грибов в сезон проведения обработки территорий не допускается Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	
Веник, ВДГ (750 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03-2650-1 20.04.2020 19.04.2030	0,12-0,24	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные нежелательные травянистые растения (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника, осоки, лопуха, костяники, подмаренника)	Опрыскивание нежелательной травянистой растительности при высоте до 35 см. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	1(-)	Активен
	0,24-0,35	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и	Относительно устойчивые однолетние и многолетние злаковые и двудольные нежелательные травянистые растения (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник)	Опрыскивание нежелательной травянистой растительности при высоте до 35 см. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	1(-)	

Сульфометурон-метила кислота (калиевая соль)

Анкор-85, ВДГ (750 г/кг) ООО «Гербицид Первый» ОГРН: 1187746605903 Ш/Ш 111-03-2523-1 07.02.2020 06.02.2030	0,025-0,050	Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории	Дикорастущие незаконные заросли мака	Опрыскивание вегетирующих растений мака от всходов до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	0,120-0,240	Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории	Борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой от 20-30 см до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	

0,030-0,050	Посевы второго-третьего года выращивания сосны и ели в питомниках	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период до начала или после окончания роста сосны и ели. Не применять в последний год выращивания культур или содержать площадь под черным паром в течение года после выкопки сосны и ели Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)
0,240-0,350	Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодожелезных и шоссейных дорог, промышленные территории)	Относительно устойчивые однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)
0,020-0,030	Посевы сосны и ели первого года выращивания в питомниках	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период после окончания роста сосны и ели Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)
0,150-0,200	Плантации и другие посадки сосны	Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности в период до начала или после окончания роста сосны Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)
0,025-0,050	Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодожелезных и шоссейных дорог, промышленные территории)	Дикорастущие незаконные заросли конопли	Опрыскивание вегетирующих растений конопли от всходов до фазы 10-12 листьев Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)
0,100-0,150	Плантации и другие посадки ели	Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности в период после окончания роста ели Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)
0,120-0,240	Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодожелезных и шоссейных дорог, промышленные территории)	Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника, осоки, лопуха, костяники, подмаренника)	Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)

0,100-0,200	Площади под плантации и другие посадки сосны и ели или в целях содействия их естественному возобновлению	Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности. Посадка сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой через 35-40 дней после опрыскивания или позднее, с открытой корневой системой – весной следующего года Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	
0,120-0,240	Посевы и посадки кедра сибирского и корейского	Однолетние и многолетние однодольные и двудольные сорные растения (за исключением устойчивых вейника, тростника, осоки, лопуха, костяники, подмаренника)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений вне зависимости от фазы роста культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	
0,240-0,350	Посевы и посадки кедра сибирского и корейского	Относительно устойчивые однолетние и многолетние однодольные и двудольные сорные растения (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник)	Опрыскивание вегетирующих сорных растений вне зависимости от фазы роста культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(-)	

Темботрион + антидот изоксадифен-этила

Лаудис, ВДГ (200 г/кг + 100 г/кг) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-2868-1 18.11.2020 17.11.2030	0,4-0,5	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание вегетирующих культурных и сорных растений (в фазу от 3 до 8 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений) с добавлением 3 л/га адьюванта Метро, КЭ (733 г/л метилового эфира рапсового масла) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	70(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------	--	--	-------	------	---------

Темботрион + тиенкарбазон-метил + антидот изоксадифен-этил

Капрено, КС (345 г/л + 68 г/л + 134 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-3178-1 21.06.2021 20.06.2031	0,2-0,3	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 2 л/га адьюванта Метро, КЭ (733 г/л метилового эфира рапсового масла). В случае пересева посевов, обработанных гербицидом Капрено, КС (345 г/л темботриона + 68 г/л тиенкарбазон-метила + 134 г/кг антидота изоксадифен-этила) можно высевать только кукурузу. Осенью в год применения можно высевать только пшеницу озимую.	75(1)	-(3)	Активен
--	---------	----------	--	---	-------	------	---------

тербутилазин

Клик 500, КС (500 г/л) СИПКМ ОКСОН С.П.А. ОГРН: - III/III 528-03-3617-1 12.04.2022 11.04.2032	3-4	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние двудольные, сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Подсолнечник (на семена и масло)	Однолетние двудольные, сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

тербутилазин + никосульфурон + 2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) + Клопиралид (2-этилгексильный эфир)

Корнеги Плюс, МД (250 г/л + 30 г/л + 80 г/л + 40 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-4646-1 25.07.2024 24.07.2034	1,5-2,0	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------	--	--	-------	------	---------

тербутилазин + Прописохлор

АгроЗаряд, КС (187,5 г/л + 312,5 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/П 197-03-4311-1 12.12.2023 11.12.2033	3,5-4,5	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или после посева до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	3,0-4,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

тербутилазин + С-Метолахлор

Вождь, СК (187,5 г/л + 312,5 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/П 699-03-3598-1 07.04.2022 06.04.2032	3-4	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Гал-Басус, КС (187,5 г/л + 312,5 г/л) ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЯ А.Д. ОГРН: - П/П 742-03-4424-1 20.02.2024 19.02.2034	3,0-4,0	Кукуруза, подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растений	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Толазин, СЭ (187,5 г/л + 312,5 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 П/П 278-03-4101-1 05.11.2019 04.11.2029	3-4	Подсолнечник, кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Гардо Голд, СЭ (187,5 г/л + 312,5 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-03-3383-1 24.11.2021 041-03-3383-1/433 433 23.11.2031	4 - 4,5	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3,5- 4,5	Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или после посева до появления всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3,5-4,5	Нут	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Киборг, КС (187,5 г/л + 312,5 г/л) ООО «Яровит» ОГРН: - III/III 282-03-1023-1 11.03.2016 10.03.2026	3-4	Подсолнечник, кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Экстракорн, СЭ (187,5 г/л + 312,5 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III 590-03-4193-1 08.09.2023 07.09.2033	3,0-4,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	104(1)	-(3)	Активен
	3,0-4,0	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов или после всходов культурных растений (до фазы 3-го листа) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	105(1)	-(3)	

тиенкарбазон-метил + антидот мефенпир-диэтила + йодосульфурон-метил-натрия

Велосити Пауэр, ВДГ (22,5 г/кг + 135 г/кг + 11,3 г/кг) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-2877-1 16.11.2020 15.11.2030	0,22-0,33	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,5 л/га адьюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л алкил-эфир-сульфат-натриевой соли). В случае пересева посевов, обработанных указанным гербицидом, можно высевать зерновые колосовые культуры и кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,22-0,33	Пшеница яровая	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной от фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,5 л/га адьюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л алкил-эфир-сульфат-натриевой соли). В случае пересева посевов, обработанных указанным гербицидом, можно высевать зерновые колосовые культуры и кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

тиенкарбазон-метил + антидот ципросульфамид + Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий

МайсТер Пауэр, МД (10 г/л + 15 г/л + 31,5 г/л + 1 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-03-4081-1 17.05.2023 16.05.2033	1,25-1,5	Кукуруза (зеленая масса, зерно, силос)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	----------	--	--	--	-------	------	---------

тиенкарбазон-метил + Форамсульфурон

Конвизо 1, МД (30 г/л + 50 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-03-2832-1 08.10.2020 07.10.2030	0,5	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе от семядолей до 2 листьев сорных растений (по первой, второй и третьей волне). В случае пересева в год применения можно высевать кукурузу, свеклу сахарную (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1). Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года сев чувствительных культур: свекла (сахарная, столовая и кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха.	85(3)	-(3)	Активен
--	-----	---	--	--	-------	------	---------

	0,75	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне). В случае пересева в год применения можно высевать кукурузу, сахарную свеклу (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1). Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года сев чувствительных культур: свекла (сахарная, столовая и кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые и овощные культуры	85(2)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 6 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. В случае пересева в год применения можно высевать кукурузу, сахарную свеклу (гибриды, устойчивые к гербициду Конвизо 1). Осенью в год применения высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года сев чувствительных культур: свекла (сахарная, столовая, кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые и овощные культуры разрешен при условии	85(1)	-(3)	

Тиофанат - метил + флутриафол + антидот клоквинтосет-мексил + Клодинафоп-пропаргил

Феникс Дуо, КС, КЭ (310 г/л + 187 г/л + 20 г/л + 80 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III, ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - II/III 062-02-1838-1 22.03.2018 17.04.2032	3,0	Пшеница озимая и яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы (2-3 листа) роста сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Щетинники	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы (2-3 листа) роста сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница яровая	Просянки	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы (2-3 листа) роста сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

тифенсульфурон-метил

Танит, МД (20 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-03-3561-1 29.03.2022 28.03.2032	0,23-0,3	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев сои Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Тифенс, ВДГ (750 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-3129-1 29.04.2021 28.04.2031	0,01-0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	-(3)	Активен
	0,01-0,025	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	

	0,015-0,020	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01	Кукуруза на зерно (кроме кукурузы на масло)	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Тифи, ВДГ (750 г/кг) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 Ш/Ш, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 Ш/Ш 004(549)-03-5013-1 13.12.2022 12.12.2032	0,015 - 0,020	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,2 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфат эфира) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,01 - 0,015	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 – Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста с добавлением 0,2 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфат эфира) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 – Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,006 - 0,008	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1 – 2 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,2 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфат эфира) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,025	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4 – Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	-(1)	-(3)	

	0,01	Кукуруза на зерно (кроме кукурузы на масло)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе. Устойчивые к 2,4 – Д и триазинам	Опрыскивание посевов в фазе 3 – 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,2 л/га ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфат эфира) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Тифитерр, ВДГ (750 г/кг) ООО Грин Плант ОГРН: 1175029028790 III/III 617-03-4138-1 20.06.2023 19.06.2033	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в баковой смеси с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,01	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазилам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в баковой смеси с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Хармони Про, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-1903-1 03.05.2018 489-03-1903-1/308 02.05.2028	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,01-0,025	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Алсион, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2825-1 08.10.2020 07.10.2030	0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущение культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,025	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущение культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Шансти, ВДГ (750 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-599-1 13.03.2015 12.03.2025	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Лен-долгунец (только семенные посевы)	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе елочки культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,015	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и триазидам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,025	Лен - долгунец	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе елочки культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Альфа-Гард, ВДГ (750 г/кг) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - III/III 062-03-846-1 30.10.2015 29.10.2025	0,015	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и триазидам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Аллерт, СТС (750 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2209-1 26.04.2019 25.04.2029	25 г/га	Лен-масличный	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	10 г/га	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры в смеси с 0,6 кг/га д.в. МЦПА Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	10 г/га	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазидам, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений в смеси с ПАВ Бит-90, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	10-25 г/га	Лен - долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	6-8 г/га	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Бит-90, Ж (200 мл/га) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
ТифилАгро, ВДГ (750 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 И/И 197-03-1764-1 16.02.2018 15.02.2028	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Лен масличный	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Купаж, ВДГ (750 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 И/И 018-03-2195-1 11.04.2019 10.04.2029	0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Оправскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,01	Кукуруза	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015	Кукуруза	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазидам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

тифенсульфурон-метил + никосульфурон

Дублон Голд, ВДГ (150 г/кг + 600 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 И/И 021-03-2647-1 14.04.2020 13.04.2030	0,05-0,07	Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних двудольных и злаковых сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Адю, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----------	---	--	---	-------	------	---------

тифенсульфурон-метил + никосульфурон + флорасулам

<p>Крейцер, ВДГ (60 г/кг + 650 г/кг + 40 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2017-1 10.10.2018 021-03-2017-1/428 28.03.2025 428 09.10.2028</p>	0,07-0,11	Кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних злаковых и двудольных сорных растений с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50 -300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,09-0,11	Кукуруза (зеленая масса, зерно, масло)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в смеси с ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости, но не более 200 мл/га) в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних злаковых и двудольных сорняков Расход рабочей жидкости - 50 -300 л/га	60(1)	-(3)	

тифенсульфурон-метил + римсульфурон

<p>Базис, СТС (250 г/кг + 500 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-2705-1 19.06.2020 18.06.2030</p>	0,02	Кукуруза (кроме переработки на масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025	Кукуруза (кроме переработки на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-5 листьев культуры при высоте многолетних злаковых сорняков 10-15 см и ранние фазы роста однолетних сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил

<p>Суперстар Голд, ВДГ (375 г/кг + 375 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-4454-1 12.03.2024 11.03.2034</p>	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в том числе. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,05	Подсолнечник, устойчивый к трибенурон-метилу и тифенсульфурон-метилу	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	

	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Экспресс Голд, ВДГ (187,5 г/кг + 562,5 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 Ш/Ш 489-03-2030-1 25.10.2018 24.10.2028</p>	0,04	Подсолнечник, гибриды устойчивые к гербициду Экспресс, ВДГ (750 г/кг трибенуран-метила) и Экспресс Голд, ВДГ (562,5 г/кг трибенуран-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений в смеси с 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02	Подсолнечник, гибриды устойчивые к гербициду Экспресс, ВДГ (750 г/кг трибенуран-метила) и Экспресс Голд, ВДГ (562,5 г/кг трибенуран-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 и 6-8 листьев подсолнечника и ранние фазы роста сорных растений в смеси с 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	
<p>Гранстар Мег, ВДГ (250 г/кг + 500 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 Ш/Ш 489-03-2031-1 30.10.2018 29.10.2028</p>	0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1 – 2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,02 - 0,03	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2.4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)

Полиан, МД (76 г/л + 225 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 ПП/П 178-03-4525-1 25.04.2024 24.04.2034	0,050-0,1	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,050	Подсолнеч ник (гибриды, устойчивы е к трибенуро н-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Последовательное опрыскивание в фазу 2-4 и 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,075 - 0,1	Овёс	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листьев до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,075 - 0,1	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,050-0,1	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0.2 л/га ПАВ Бит-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,050-0,10	Овёс	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листьев до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,075 - 0,1	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0.2 л/га ПАВ Бит-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

	0,1	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к трибенурун-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2–8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением с 0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	-----	--	---	---	-------	------	--

тифенсульфурон-метил + трибенурун-метил + флорасулам

Статус Макс, ВДГ (500 г/кг + 250 г/кг + 80 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 ПП/П 192-03-1086-1 18.04.2016 17.04.2026	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Трисил, ВДГ (300 г/кг + 300 г/кг + 100 г/кг) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - ПП/П 062-03-2596-1 16.03.2020 15.03.2030	0,03-0,05	Пшеница яровая и пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Наземное опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

тифенсульфурон-метил + флорасулам

Кайен, ВДГ (500 г/кг + 170 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 ПП/П 178-03-2961-1 25.12.2020 24.12.2030	0,025-0,035	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,035	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025-0,035	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листьев до начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

тифенсульфурон-метил + Флуметсулам + трибенурун-метил

<p>Кайен Турбо, МД (75 г/л + 52 г/л + 75 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-4526-1 25.04.2024 24.04.2034</p>	0,25-0,35	Пшеница, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,25-0,35	Пшеница, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,25-0,35	Пшеница, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением 0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,25-0,35	Пшеница, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

триасульфурон

<p>Дукат, ВДГ (750 г/кг) ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 III/III, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III 043(042)-03-2207-1 19.04.2019 18.04.2029</p>	0,0065-0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес, рожь	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Применять на почвах с рН почвы не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии	60(1)	-(30)	Активен
	0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес, рожь	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков, в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое зосорение многолетниками) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(30)	

Триас, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-3257-1 09.08.2021 08.08.2031	0,0065-0,010	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорных растений и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорных растений. Или в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорных растений, слабое засорение многолетними), опрыскивание производить весной в фазе выхода в трубку	60(1)	-(3)	Активен
Логран, ВДГ (750 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-03-1696-1 31.01.2018 30.01.2028	0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорных растений и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорных видов, в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетними). Применять на почвах с рН не выше 7.5. При необходимости пересева	60(1)	-(4)	Активен
	0,0065-0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорных растений и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорных видов. Применять на почвах с рН не выше 7.5. При необходимости пересева высевать только пшеницу озимую и яровую. Не применять: на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения нахоятся в стрессовом	60(1)	-(4)	
	0,0065-0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорных растений и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорных видов. Применять на почвах с рН не выше 7.5. При необходимости пересева высевать только пшеницу озимую и яровую. Не применять: на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения нахоятся в стрессовом	60(1)	-(4)	
	0,01	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорных растений и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорных видов, в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетними). Применять на почвах с рН не выше 7.5. При необходимости пересева	60(1)	-(4)	

трибенурон-метил

Гренадер, ВДГ (750 г/кг) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4119-0 08.04.2022 07.04.2025	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гранат, ВДГ (750 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3901-1 13.12.2022 12.12.2032	0,02 - 0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2 – 4 листа, бодяк полевой – розетка) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,01 -0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ 200 мл/га Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015 - 0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015 - 0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ 200 мл/га Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Бенрил, ВДГ (750 г/кг) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 III/III 070-03-3586-1 05.04.2022 04.04.2032	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Гекстар, ВДГ (750 г/кг) АО «Группа компаний «ПРОАГРО» ОГРН: 1157746875109 III/III 535-03-3305-1 20.09.2021 19.09.2031	0,015 - 0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание яровых посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,05 0	Подсолнеч ник (гибрид Толедо, устойчивы й к гербициду Гекстар, ВДГ (750 г/кг трибенуро н-метила)	Однолетние двудольные некоторые многолетние сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или с добавлением 200 мл Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02 0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, бодяк полевой	Опрыскивание яровых посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл Неон 99, Ж (800 г/л неонола, АФ9-12). Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,010 - 0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание яровых посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,020 - 0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание яровых посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Саунар, ВДГ (750 г/кг) ООО Праймагро ОГРН: 1195081032596 III/III, ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 III/III 854(038)-03-4630-0 08.07.2024 07.07.2027	0,015-0,02 0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ 9-12). Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,020-0,02 5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02 0	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растений в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,010-0,01 5	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растений в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ 9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,025	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду трибенурион-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду трибенурион-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99,Ж (неонил АФ 9-12). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Трибун, СТС (750 г/кг) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03-3668-1 29.04.2022 28.04.2032	15-20 г/га	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3- листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	24-10	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2–4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-20 г/га	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3- листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-20	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2–4 листа) и розетки листьев бодяка полевого Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	20-25 г/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	20-25 г/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-20	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2–4 листа) и розетки листьев бодяка полевого Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	25-50	Подсолнечник, устойчивый к трибенурун-метилу	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) с добавлением 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-10	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2–4 листа) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Спецназ 750, ВДГ (750 г/кг) ООО АС-Агро ОГРН: 1040204593934 Ш/Ш, ООО НПП Институт синергетических препаратов и микроудобрений ОГРН: 1150280015302 Ш/Ш 941(942)-03-4635-1 18.07.2024 17.07.2034	0,015-0,020	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в том числе. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,020-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025-0,050	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду трибенурун-метил)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Суперстар, ВДГ (750 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 Ш/Ш 002-03-2181-1 02.04.2019 01.04.2029	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Суперстар, ВДГ (750 г/кг трибенурун-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Посевы и посадки ели и сосны в лесных питомниках	Однолетние двудольные сорняки и бодяк полевой	Опрыскивание посевов и посадок в период вегетации (за исключением семядольной фазы) и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Трибел, ВДГ (750 г/кг) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 III/III 277-03-2454-1 12.11.2019 11.11.2029</p>	15-20 г/га	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	20-25 г/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-20 г/га	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	10-15 г/га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Триметил, ВДГ (750 г/кг) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРЕЙШН» ОГРН: 1112310006104 III/III 653-03-3757-1 15.07.2022 14.07.2032</p>	0,015-0,025	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025- 0,05	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Триметил, ВДГ (750 г/кг трибенурило-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или с добавлением 200 мл/га ПАВ - 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015- 0,02	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ- 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,015-0,025	Подсолнечник, среднеустойчивый к гербициду Триметил, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или с добавлением 200 мл/га ПАВ – 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Террастар, ВДГ (750 г/кг) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 П/П 424-03-2510-1 26.12.2019 25.12.2029	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание яровых посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,020-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду трибенурон-метил)	Однолетние двудольные и некоторые многолетние сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Артстар, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П, ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-03-2275-1 17.06.2019 010-03-2275-1/503 503 16.06.2029	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывать весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Громстор, ВДГ (750 г/кг) АО АгроБест Груп Тарым Илачлары Тохумджулук Ималат-Итхалат Ихраджат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети ОГРН: - П/П 158-03-4463-1 13.03.2024 15.05.2027	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гранд Плюс, ВДГ (750 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560	0,015-0,02	Овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание яровых посевов в фазу 2-3-х листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

III/III 192-03-2866-1 02.11.2020 01.11.2030	0,025-0,05	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу)	Однолетние двудольные и некоторые многолетние сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Зерновые колосовые озимые, яровые, за исключением овса	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Санфло, ВДГ (750 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2320-1 18.07.2019 17.07.2029	0,025-0,05	Подсолнечник, устойчивый к трибенурон-метилу	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в смеси с 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Гран-при, ВДГ (750 г/кг) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-1070-1 11.04.2016 082-03-1070-1/455 10.04.2026	25	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Гран-при, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или с добавлением 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	15-25	Подсолнечник, среднеустойчивый к гербициду Гран-при, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или с добавлением 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Норман, ВДГ (750 г/кг) ООО «АФД» ОГРН: - III/III 086-03-2235-1 23.05.2019 22.05.2029	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га- 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т. Ч. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Мортира, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ППП 021-03-3103-1 09.04.2021 08.04.2031	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу 2-х листьев – начала кущения культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,050	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, самостоятельно, или с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости), в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, озимых – весной с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, озимых – весной с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и бодяка полевого (розетка) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, озимых – весной с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и бодяка полевого (розетка) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,01-0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, озимых – весной с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Аргамак, ВДГ (750 г/кг) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050-03-3457-1 28.12.2021 27.12.2031	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,05	Подсолнечник (на семена) (гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу)	Однолетние двудольные и некоторые многолетние сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Герсотил, ВДГ (750 г/кг) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - III/III 064-03-3291-1 14.09.2021 13.09.2031	0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Прометей, ВДГ (750 г/кг) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III, ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-577-1 02.03.2015 02.02.2035	0,015-0,025	Подсолнечник среднеустойчивый к гербициду Прометей, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	0,025-0,05	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Прометей, ВДГ	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Дар-90,Ж (200 мл/га).В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,025	Подсолнечник, среднеустойчивый к гербициду Прометей, ВДГ	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Дар-90,Ж (200 мл/га).В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	

	0,025-0,05	Подсолнечник устойчивый к гербициду Прометей, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксиата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Трибинстар, ВДГ (750 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-2360-1 13.03.2015 12.03.2025	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	0,02-0,025	Посевы и посадки ели и сосны в лесных питомниках	Однолетние двудольные сорняки и бодяк полевой	Опрыскивание посевов и посадок в период вегетации (за исключением семядольной фазы) и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой –розетка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Трибунал, ВДГ (750 г/кг) Альбау Юроп Сарл ОГРН: - III/III 329-03-790-1 05.10.2015 04.10.2025	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Агростар, ВДГ (750 г/кг) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 III/III, Агротекс ДМСС ОГРН: - III/III 023(395)-03-1277-1 05.12.2016 23(395)-03-1277-1/175 175 04.12.2026	0,025	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Агростар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Посевы и посадки ели и сосны в лесных питомниках	Однолетние двудольные сорняки и бодяк полевой	Опрыскивание посевов и посадок в период вегетации (за исключением семядольной фазы) и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
Ранголи-Трибенурон, ВДГ (750 г/кг) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

III/III 134-03-1750-1 09.02.2018 08.02.2028	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Экспресс, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-1965-1 17.07.2018 16.07.2028	0,025-0,050	Подсолнечник, устойчивый к трибенурон-метилу (гербициду Экспресс, ВДГ 750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (90% водный раствор этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	Активен
Тризлак, ВДГ (750 г/кг) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-3033-1 25.02.2021 24.02.2031	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Флюенс, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-3687-1 19.05.2022 18.05.2032	0,025-0,050	Подсолнечник, устойчивый к трибенурон-метилу (гербициду Флюенс, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов самостоятельно или в смеси с 200 л/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Таллер, ВДГ (750 г/кг) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-03-3699-1	0,025-0,05	Подсолнечник	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) с добавлением 200 мл/га ПАВ Агро, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

06.06.2022 05.06.2032	0,015-0,02	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые обрабатывают весной) с добавлением 200 мл/га ПАВ Агро, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)	
Химстар, ВДГ (750 г/кг) Рейнбоу Кропсайенсиз Кфт. ОГРН: - III/III 886-03-4235-1 20.10.2023 19.10.2033	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (однолетние-2-4 листа, бодяк полевой –розетка) Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(-)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(-)	
Шанстар, ВДГ (750 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4013-1 10.03.2023 09.03.2033	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2-4 листа, бодяк полевой – розетка). Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,025-0,05	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Шанстар, ВДГ (750 г/кг трибенуридин-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Сталкер, ВДГ (750 г/кг) ООО «Сибagroхим» ОГРН: 1025402493555 III/III, ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III 043(042)-03-2119-1 22.02.2019 21.02.2029	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,025	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду трибенуридин- метил)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,025	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к гербициду трибенурило-метил)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,01-0,015	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые посевы обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений – однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,02-0,025	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
25-50	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к трибенурило-метилу)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) в чистом виде или с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений – однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,02-0,025	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений – однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,02-0,025	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений – однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-3 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,01-0,015	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
0,015-0,02	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-3 листа) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)
0,01-0,015	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)

	0,02-0,025	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,01-0,015	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02-0,025	Яровые зерновые колосовые культуры (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений – однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – розетка Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Ферат, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 ПП/ПП 489-03-2522-1 16.01.2020 15.01.2030	0,015 - 0,020	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста однолетних сорных растений (2-4 листа) и бодяка полевого (розетка) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,010 - 0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,010 - 0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
Грэнери, ВДГ (750 г/кг) ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 ПП/ПП, ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 ПП/ПП 549(004)-03-5021-1 10.06.2019 549(004)-03-5021-1/436 09.06.2029	0,025	Подсолнечник, устойчивый к гербициду Грэнери, ВДГ (750 г/кг трибенурило-метила)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,020	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,020-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,020-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)	
--	-------------	---	---	--	-------	------	--

трибенурон-метил + Метсульфурон-метил

Эллада, ВДГ (261 г/кг + 391 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-3393-1 06.12.2021 05.12.2031	0,006-0,008	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Шанс 90, Ж (этоксилат изодецилового спирта). Озимые обрабатывают весной. При необходимости пересева высевать только яровые зерновые культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-------------	--	---	---	-------	------	---------

трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил

Калибр, ВДГ (250 г/кг + 500 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-1197-1 16.08.2016 15.08.2026	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	

	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Калибр Дуо, ВДГ (250 г/кг + 500 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 Ш/Ш 489-03-3046-1 05.03.2021 04.03.2031</p>	0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих жарких условиях) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	

	0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих жарких условиях) Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Калибр Дуо Голд, ВДГ (375 г/кг + 375 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 Ш/Ш 489-03-2926-1 16.12.2020 15.12.2030</p>	0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных вилдов	40(1)	-(3)	

0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	-(3)
0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, или в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов	40(1)	-(3)
0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	40(1)	-(3)
0,03-0,05	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	40(1)	-(3)
0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов	40(1)	-(3)
0,03-0,05	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазу появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов	40(1)	-(3)

Патрон, ВДГ (250 г/кг + 500 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-2464-1 20.11.2019 19.11.2029	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые, рожь	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-75 л/га	60(1)	-(3)	
	0,03-0,05	Пшеница и ячмень озимые, рожь	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил + флорасулам

Трибьют, ВГ (310 г/кг + 300 г/кг + 103 г/кг) Кемихистор Кфг. ОГРН: - III/III 774-03-3352-1 25.10.2021 24.10.2031	0,03-0,05	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кушения до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Дар 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Каскад Премиум, ВДГ (410 г/кг + 140 г/кг + 200 г/кг) Синтезия Кемии ГмбХ ОГРН: - III/III 781-03-3410-1 13.12.2021 12.12.2031	0,02-0,03	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кушения до фазы формирования второго междоузлия культуры и в ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

трибенурон-метил + флорасулам

Шанстар Плюс, ВДГ (500 г/кг + 104 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-1975-1 07.08.2018 06.08.2028	0,03-0,04	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----------	---	---	--	-------	------	---------

трифлусульфурон-метил

Малибу, ВДГ (120 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-5019-1 08.05.2023 20.12.2030	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа сорных растений и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорных растений в фазе 2 настоящих листьев с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР или Неонол АФ9-12 (800 г/л оксиэтилированных алкилфенолов) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
--	------	--------------------	--	--	-------	------	---------

	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2-х настоящих листьев сорных растений по первой, второй и третьей волне Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(3)	-(3)	
Карибу С, ВДГ (500 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-2812-1 21.09.2020 20.09.2030	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста (от семядолей до 2 настоящих листьев) двудольных сорных растений первой, второй и третьей волны Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(3)	-(3)	Активен
	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в фазе от семядолей до 2 настоящих листьев однолетних двудольных сорных растений первой волны и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорных растений (в фазе 2 настоящих листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	30(2)	-(3)	
Арбитр АГ, СП (500 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-2982-1 21.01.2021 20.01.2031	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2 настоящих листа сорняков и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Карамболь, СП (500 г/кг) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-03-4095-1 05.06.2023 04.06.2033	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2-х настоящих листьев у сорных растений и при необходимости повторно по второй волне сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
БитЛайт, КС (60 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-3165-1 28.05.2021 27.05.2031	0,25	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная	Опрыскивание посевов в фазе сорных растений – семядолей – 2-х настоящих листа и при необходимости повторно через 7 – 15 дней по второй волне сорных растений в фазе 2 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Кондор, ВДГ (500 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3995-1 02.03.2023 01.03.2033	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2 настоящих листьев и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Кари-Макс-Флюид, МД (300 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2430-1 16.10.2019 15.10.2029	40-50 мл/га	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2 настоящих листа сорных растений по первой, второй и третьей волне сорняков в чистом виде или с добавлением 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	Активен

Карриджу, ВДГ (500 г/кг) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2637-1 31.03.2020 30.03.2030	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа сорных растений и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорных растений в фазе настоящих листьев с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л оксигилированных алкилфенолов или Неонол АФ9-12) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Картель, ВДГ (500 г/кг) ООО «СЭЙФТИ ФИЛД КОРПОРАЙШН» ОГРН: 1112310006104 III/III 653-03-4161-1 20.07.2023 19.07.2033	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе сорняков – семядоли – 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев смеси с 200 мл ПАВ-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Кари-Макс, СП (500 г/кг) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2919-1 10.12.2020 09.12.2030	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Каришанс, ВДГ (500 г/кг) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4021-1 14.03.2023 13.03.2033	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа сорных растений и при необходимости по второй волне сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Шанс 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Трицепс, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2625-1 25.03.2020 24.03.2030	0,02	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа сорных растений и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне в фазе 2 настоящих листьев сорных растений с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Кондор Форте, МД (120 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3315-1 24.09.2021 23.09.2031	0,125	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2-х настоящих листьев сорных растений по первой и второй волне Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(2)	-(3)	Активен
	0,125	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2-х настоящих листьев сорных растений по первой, второй и третьей волне Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(3)	-(3)	

Олимп, ВДГ (500 г/кг) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-1642-1 12.12.2017 11.12.2027	0,03	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе сорняков – семядоли – 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 200 мл/га ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) при каждой обработке Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
Флуорон, ВДГ (500 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III, ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 192(050)-03-3183-1 17.06.2021 16.06.2031	0,030	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей – 2 настоящих листа сорных растений и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорных растений в фазе 2-х настоящих листьев с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л оксигилированных алкилфенолов) или Неонол АФ9-12 (800 г/л оксигилированных алкилфенолов) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен

трифлосульфурон-метил + Ленацил

Карибу Дуо Актив, ВДГ (71,4 г/кг + 714 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-2029-1 25.10.2018 24.10.2028	0,2	Сахарная свекла	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядоли – 2 настоящих листа сорняков по первой, второй и третьей волне сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изоцилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	30(3)	-(3)	Активен
	0,2	Сахарная свекла	Однолетние двудольные сорные растения в т.ч.марь белая, щирица жминивидная	Опрыскивание посевов в фазе семядоли-2 настоящих листа сорняков по первой, второй и третьей волне сорняков в смеси с 1 л/га препаратов на основе десмедифама и фенмедифама и 200 мл/га ПАВ ТРЕНД 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	30(3)	-(3)	

фенмедифам + Десмедифам

Бифор 22, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2916-1 09.12.2020 08.12.2030	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе виды Щирицы	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе виды Щирицы	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне сорняков) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе виды Щирицы	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	55(2)	-(3)	
Бицепс 300, МКЭ (150 г/л + 150 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2632-1 27.03.2020 26.03.2030	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Последовательное трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	60(3)	-(3)	

Секира Дуэт, КС (160 г/л + 160 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III, ПАНАМА АГРОКЕМИКАЛІС ИНК. ОГРН: - III/III 010(011)-03-1616-1 05.09.2016 04.09.2026	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	
	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	-(3)	
	3	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
Бетанал 22, КЭ (160 г/л + 160 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-901-1 16.12.2015 15.12.2025	1	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая	Однолетние двудольные сорные растения (включая виды щирицы)	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	3	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая	Однолетние двудольные сорные растения (включая виды щирицы)	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая	Однолетние двудольные сорные растения (включая виды щирицы)	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	
Бетацвай, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2096-1 01.02.2019 31.01.2029	1	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	
	3	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
Бельведер, СЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 III/III 156-03-2129-1 28.02.2019 27.02.2029	1,5	Свёкла кормовая, свёкла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(2)	-(3)	Активен
	3,0	Свёкла кормовая, свёкла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	

	1,0	Свёкла кормовая, свёкла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Опрыскивание посевов последовательно в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(3)	-(3)	
Вымпел 2, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050-03-4663-1 16.09.2024 15.09.2034	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щир	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щир	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щир	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
Бетинол 22, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО «АГРОБЮРО РУС» ОГРН: 5077746795748 III/III 142-03-940-1 30.12.2015 29.12.2025	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	3	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне сорных растений) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Десфен-80, КЭ (80 г/л + 80 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-476-1 17.12.2014 16.12.2024	2	Свекла сахарная, свёкла кормовая Свекла сахарная, свёкла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой и второй волне Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(2)	-(3)	Не активен
	4	Свекла сахарная, свёкла кормовая Свекла сахарная, свёкла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листьев) сорняков Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Битап ФД-11, КЭ (80 г/л + 80 г/л) ООО «ЮПЛ» ОГРН: 1157746848490 III/III 148-03-1484-1 27.04.2017 26.04.2027	1	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
Секунда, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО ХИМСНАБ ОГРН: 1072312011617 III/III 913-03-4469-1 20.03.2024 07.11.2027	3	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
	3	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(3)	
	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(2)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	
	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	-(3)	
Синбетан 22, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-2947-1 21.12.2020 20.12.2030	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
фенмедифам + Десмедифам + этофумезат							
Бифор Прогресс, КЭ (91 г/л + 71 г/л + 112 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-2618-1 23.03.2020 22.03.2030	1,0	Свекла сахарная и свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(3)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная и свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(2)	-(3)	

	3,0	Свекла сахарная и свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
Горизонт, КЭ (91 г/л + 71 г/л + 112 г/л) ООО «Химагромаркетинг» ОГРН: - III/III 064-03-602-1 23.03.2015 22.03.2025	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Не активен
	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Вымпел 3, КЭ (91 г/л + 71 г/л + 112 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III, ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 III/III 050-03-4664-1 16.09.2024 15.09.2034	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние дудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние дудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Свекла сахарная	Однолетние дудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев сорных растений двукратно (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Бифор Супер, МЭ (65 г/л + 50 г/л + 80 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-1752-1 12.02.2018 11.02.2028	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(3)	-(3)	Активен
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
фенмедифам + этофумезат + Десмедифам							
Древер, КЭ (91 г/л + 112 г/л + 71 г/л)	3	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 297-03-663-1 25.05.2015 24.05.2025	1	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов: первое – в фазе семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов: первое – в фазе 2-4 листьев сорняков; второе – по мере появления новых сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Лидер, КЭ (91 г/л + 112 г/л + 71 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-03-1272-1 14.11.2016 13.11.2026	1	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(3)	7(3)	Активен
	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	7(3)	
	3	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	7(3)	
	1,5	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	7(3)	
	3	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(1)	7(3)	
	1	Свекла кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(3)	7(3)	
	1,5	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(2)	7(3)	
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (91 г/л + 112 г/л + 71 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-902-1 16.12.2015 15.12.2025	3	Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательно опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(2)	-(3)	
Бельведер Форте, СЭ (100 г/л + 200 г/л + 100 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 II/III	1,0-1,5+1,5	Свекла сахарная, свёкла кормовая Свекла сахарная, свёкла кормовая	Однолетниедвудольн ые (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(2)	-(3)	Активен

156-03-2255-1 31.05.2019 30.05.2029	0,75-1,0	Свекла сахарная, свёкла кормовая Свекла сахарная, свёкла кормовая	Однолетниедвудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(3)	-(3)	
Битатрин, КЭ (91 г/л + 112 г/л + 71 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-03-1544-1 06.09.2017 05.09.2027	3	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Триумф, КЭ (91 г/л + 112 г/л + 71 г/л) Рейнбоу Агросайенс Кфг. ОГРН: - III/III 607-03-3938-1 10.01.2023 09.01.2033	1,0	Свёкла сахарная, свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200 -300 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	1,5	Свёкла сахарная, свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(2)	-(3)	
	3,0	Свёкла сахарная, свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Фенмедифама + десмедифама							
Беташанс Дабл, КЭ (160 г/л + 160 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-2027-1 25.10.2018 24.10.2028	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы	Опрыскивание посевов в фазе4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(3)	-(3)	
феноксапроп-П-этил							
Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-1464-1	0,5-0,75	Гречиха	Однолетние злаковые сорные растения (виды овсюга, щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с 2 листьев до конца кушения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

12.04.2017 11.04.2027	0,5-0,75	Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), свекла кормовая, морковь (кроме пучкового товара), соя (бобы, масло), рапс (зерно	Однолетние злаковые сорные растения (виды овсюга, щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с 2 листьев до конца кушения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--------------------------	----------	---	---	--	-------	------	--

феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил

<p>Авантикс 100, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 Ш/Ш 192-03-3443-1 23.12.2021 22.12.2031</p>	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, метлица, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев до конца кушения сорных растений независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кушения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Акбарс, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО «Резерв» ОГРН: 1082224012738 Ш/Ш 130-03-3276-1 30.08.2021 29.08.2031</p>	0,4 - 0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы расхода гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсяг, метлица, виды щетинника, просовидные)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы расхода гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Лама 100, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 III/III, Агрия АД ОГРН: - III/III 184(026)-03-4295-1 11.12.2023 10.12.2033	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсяг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсяг, метлица, лисохвост, мятлик, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Овсягун Супер, КЭ (140 г/л + 47 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2965-1 30.12.2020 29.12.2030	0,3	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсяг) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития – 2-3 листа, (независимо от фазы развития культуры) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсяг) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) (с учетом чувствительности сортов) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3	Ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсяг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам весной, в ранние фазы их развития – 2-3 листа, (независимо от фазы развития культуры) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	

	0,4	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Виды щетинника	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) (с учетом чувствительности сортов) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Виды щетинника	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) (с учетом чувствительности сортов) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) (с учетом чувствительности сортов) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
Ластик Экстра, КЭ (70 г/л + 40 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/П 021-03-2972-1 11.01.2021 10.01.2031	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки	Опрыскивание посевов весной в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Феноксип 100, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	Активен

III/III 046-03-4453-1 12.03.2024 11.03.2034	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное, метлица обыкновенная, мятлик)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150 - 200 л/га	60(1)	-(3)	
Фокстрот Турбо, КЭ (120 г/л + 23 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-03-4341-1 15.01.2024 14.01.2034	0,5-0,65	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,35-0,5	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное, овсюг)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Тайгер, ЭМВ (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-4323-1 18.12.2023 17.12.2033	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Шансюген, ВЭ (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-03-4069-1 24.04.2023 23.04.2033	0,8-1,0	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов (озимая пшеница обрабатывается весной) в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов) против однолетних злаковых сорных растений (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	Активен

	0,8-1,0	Ячмень яровой	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов) против однолетних злаковых сорных растений (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая). Расход рабочей	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов) против однолетних злаковых сорных растений (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	
Ирбис, ЭМВ (69 г/л + 34,5 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-2775-1 18.08.2020 17.08.2030	0,8-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой, пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных растений независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Пшеница озимая обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Скаут, КЭ (140 г/л + 30 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ ОГРН: - III/III 781-03-4405-1 06.02.2024 05.02.2034	0,3-0,45	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) морных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,45-0,65	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,45-0,65	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) морных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Ирбис 100, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2760-1 15.07.2020 14.07.2030	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) вегетирующих сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) вегетирующих сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Укротитель, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО ХИМСНАБ ОГРН: 1072312011617 П/П, ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 П/П 682(913)-03-4416-1 06.03.2024 31.03.2031</p>	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо, просо сорное, метлица обыкновенная, мятлик) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы расхода гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

феноксапроп-П-этил + антидот флоринтосет-мексил + Клодинафоп-пропаргил

<p>Силимакс, МКЭ (90 г/л + 40 г/л + 60 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/П 070-03-4620-0 24.06.2024 23.06.2027</p>	0,4-0,5	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	-------------------------	--	--	-------	------	---------

феноксапроп-П-этил + антидот мефенпир-диэтил

<p>Дракон Супер 100, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-03-3514-1 04.03.2022 03.03.2032</p>	0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
Пума Супер 7.5, ЭМВ (69 г/л + 75 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - Ш/Ш 019-03-881-1 10.12.2015 09.12.2025	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	59(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	59(1)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (в фазе кущения культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	59(1)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	59(1)	-(3)	
	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	59(1)	-(3)	
	0,8-1	Ячмень яровой	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (в фазе кущения культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	59(1)	-(3)	
	0,6-0,6	Пшеница яровая	Щетинник зеленый	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	59(1)	-(3)	
Полгар 7.5, КЭ (69 г/л + 75 г/л) ПЕТЕРС & БУРГ Кф.т. ОГРН: - Ш/Ш 017-03-1417-1 17.03.2017 16.03.2027	0,8-1	Зерновые колосовые яровые (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, просо куриное, лисохвост мышехвостико-видный)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

	0,6	Зерновые колосовые яровые (пшеница яровая, ячмень яровой)	Щетинник зеленый	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	60(1)	
Фидес, КЭ (100 г/л + 27 г/л) ООО ЭЛЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-03-4100-1 12.04.2017 11.04.2027	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды щетинника, куриное просо)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным злакам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	60(1)	-(3)	Активен
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы внесения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	

феноксапроп-П-этил + Клодинафоп-пропаргил + антидот мефенпир-диэтил

Тайпан, КЭ (90 г/л + 90 г/л + 40 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «АГРОДИМ» ОГРН: 1136449005351 III/III 042(275)-03-1669-1 25.12.2017 24.12.2027	0,25-0,35	Пшеница яровая, озимая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,25-0,3	Пшеница яровая, озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Дракон, КЭ (140 г/л + 90 г/л + 60 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 III/III 085-03-3320-1 27.09.2021 26.09.2031	0,3-0,4	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорные растения	Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное, овсюг) сорные растения	60(1)	-(3)	Активен

феноксапроп-П-этил + Пиноксаден + антидот клоквинтосет-мексил

Паноксон, КЭ (35 г/л + 22,5 г/л + 11,25 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 III/III 082-03-4770-1	1,2-1,5	Пшеница яровая и озимая	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кущения) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	-------------------------	--	---	-------	------	---------

10.01.2025 09.01.2035	0,9-1,3	Ячмень яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа до конца кушения) сорных растений независимо от фазы развития культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	
--------------------------	---------	------------------------------	--	--	-------	------	--

флорасулам

Флагман, КС (150 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III, ООО «АГРОДИМ» ОГРН: 1136449005351 III/III 042(275)-03-1675-1 29.12.2017 28.12.2027	0,033-0,05	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий	Опрыскивание в фазу с 3 листьев до появления флагового листа у культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,033	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий	Опрыскивание в фазу с 3 листьев до появления флагового листа у культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

флорасулам + 2,4-Д (2-этилгексилвый эфир) + Аминопиралид

Прима Форте КА, СЭ (5 г/л + 180 г/л + 10 г/л) ООО Кортёва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 II/III 866-03-4615-0 14.06.2024 13.06.2027	0,5-0,7	Пшеница озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно высевать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через месяц после применения препарата. При этом перед посевом необходимо проводить глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно высевать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через месяц после применения препарата. При этом перед посевом необходимо проводить глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5-0,7	Пшеница озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно высевать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через месяц после применения препарата. При этом перед посевом необходимо проводить глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	

флорасулам + 2,4-Д (сложный 2-этилгексилвый эфир)

<p>Статус Фло, КЭ (12 г/л + 418 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/Ш 192-03-3709-1 08.06.2022 07.06.2032</p>	0,3-0,5	Кукуруза, в том числе на силос и масло	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Ди 2М-4Х, и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница, ячмень, тритикале озимые и яровые, рожь, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Пшеница, ячмень, тритикале озимые и яровые, рожь, овес	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	57(1)	-(3)	
<p>Прима, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЫШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - П/Ш 009-03-2154-1 12.03.2019 11.03.2029</p>	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	Активен
	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(4)	
<p>Ассюлота Прайм, МК (15 г/л + 410 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/Ш 178-03-2429-1 16.10.2019 15.10.2029</p>	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	55(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

Балерина Супер, СЭ (15 г/л + 410 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/Ш 021-03-2797-1 14.09.2020 13.09.2030	0,3-0,5	Просо	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Сорго	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза, в том числе на силос и масло	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Зерновые культуры (озимые и яровые пшеница, ячмень и тритикале; рожь, овес)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) у культуры. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Зерновые культуры (озимые и яровые пшеница, ячмень и тритикале; рожь, овес)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
Камаро, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/Ш 156-03-1927-1 28.05.2018 27.05.2028	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Астэрикс, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/Ш 050-03-4488-1 29.03.2024 28.03.2034	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учётом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)	
Примавера, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/Ш 197-03-1383-1 06.03.2017 05.03.2027	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Флоробел, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ООО «БЕЛИН» ОГРН: 1127747077622 П/Ш	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен

277-03-3962-1 23.01.2023 22.01.2033	0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)

флорасулам + 2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир)

Премьера, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ОАО «Группа компаний «Агропром-МДТ» ОГРН: - П/Ш 006-03-710-1 20.07.2015 19.07.2025	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетниедвудольн ые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетниедвудольн ые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Октасулам, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ООО «АХК-Агро» ОГРН: 1030204614340 П/Ш 116-03-3889-1 29.11.2022 28.11.2032	0,4-0,6	Зерновые колосовые озимые и яровые (за исключени ем овса)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов в фазе кущения – выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,6	Кукуруза на зерно и масло	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 или 5-7 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Сварог, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л) ООО «Франдеса» ОГРН: - П/Ш 297-03-671-1 27.05.2015 297-03-671-1/426 426 26.05.2025	0,5-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,6	Пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
Тираназор, КЭ (7,4 г/л + 550 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/Ш 010-03-3917-1 20.12.2022 19.12.2032	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные, в том числе. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе. Устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-7 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	

<p>Флортек, СЭ (7,4 г/л + 550 г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/П 070-03-3541-1 18.03.2022 17.03.2032</p>	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, рожь озимая	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Элант Экстра, СЭ (7,4 г/л + 410 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 П/П, ООО СЗР МАСТЕР ОГРН: 1216100024678 П/П 042(847)-03-3887-1 16.05.2018 15.05.2028</p>	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе к 2,4-Д и МЦПА, некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Сорго	Однолетние двудольные сорняки, в том числе к 2,4-Д и МЦПА, некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Просо	Однолетние двудольные сорняки, в том числе к 2,4-Д и МЦПА, некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,5	Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе к 2,4-Д и МЦПА, некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые опрыскиваются весной Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
	0,3-0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные сорняки, в том числе к 2,4-Д и МЦПА, некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	
флорасулам + 2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + 2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир)							
<p>Опричник, СЭ (6,25 г/л + 300 г/л + 300 г/л) ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 П/П,</p>	0,5-0,6	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

ООО «АГРОКОМ» ОГРН: 1077758212685 П/П 038-03-444-1 28.10.2014 06.06.2034	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)
	0,4-0,6	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)
	0,4-0,6	Кукуруза (на зерно и масло)	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)
	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)
	0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	56(1)	-(3)
	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)
	0,6	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	58(1)	-(3)

флорасулам + Аминопиралид

Ланцелот 450, ВДГ (150 г/кг + 300 г/кг) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛШАФ Т М.Б.Х. ОГРН: - П/П 009-03-2795-1 14.09.2020 13.09.2030	0,03-0,033	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая подмаренник цепкий, виды осота, бодяка и горчак ползучий	Опрыскивание посевов весной от фазы кушения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно). При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	47(1)	-(3)	Активен
---	------------	---	---	---	-------	------	---------

	0,03-0,033	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая подмаренник цепкий, виды осота, бодяка и горчак ползучий	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно). При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц после внесения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	47(1)	-(3)	
--	------------	---	---	---	-------	------	--

флорасулам + Аминопиралид + 2,4-Д (2-этилгексильный эфир)

Прима Форте 195, СЭ (5 г/л + 10 г/л + 180 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБГЕЗЕЛЬШАФ Т.М.Б.Х. ОГРН: - II/III 009-03-2707-1 19.06.2020 18.06.2030	0,5-0,7	Пшеница озимая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно высевать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через месяц после применения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57(1)	-(3)	Активен
	0,5-0,7	Кукуруза	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. При необходимости пересева в сезон применения препарата на том же поле можно высевать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через месяц после применения препарата. При этом перед посевом необходимо провести глубокую вспашку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

флорасулам + Дикамба (диметиламинная соль)

Спикер, КЭ (18 г/л + 422 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-644-1 21.04.2015 192-03-644-1/206 206 20.04.2025	0,15-0,2	Кукуруза	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,15-0,2	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

флорасулам + мезосульфурон-метил + антидот мефенпир-диэтил + Флуметсулам

Баллиста, МД (12 г/л + 30 г/л + 90 г/л + 17 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4213-1 03.10.2023 02.10.2033	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые (в том числе овсюг, мятлик, лисохвост, метлица) сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазе 3 листа – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,3-0,5	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые (в том числе овсюг, мятлик, лисохвост, метлица) сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые (в том числе овсюг, мятлик, лисохвост, метлица) сорные растения	Опрыскивание посевов весной от фазы кушения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
--	---------	----------------	---	---	-------	------	--

флорасулам + Мезотрион + никосульфурон

Аризон, МД (3,5 г/л + 75 г/л + 30 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/ПП 046-03-4359-1 15.01.2024 14.01.2024	1,0-2,0	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	----------	--	---	-------	------	---------

флорасулам + никосульфурон

Октава, МД (3,6 г/л + 60 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/ПП 018-03-645-1 23.04.2015 22.04.2025	0,8-1	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние (виды бодяка) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см многолетних сорняков) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-------	----------	--	---	-------	------	---------

флорасулам + пиклорам + трибенурон-метил

НордСтрим, ВДГ (80 г/кг + 350 г/кг + 200 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 ПП/ПП 021-03-3059-1 18.03.2021 17.03.2031	0,05-0,075	Зерновые колосовые озимые (пшеница озима ячмень озимый, рожь озимая)	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Ди 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание в фазу кушения культуры и в ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объёма рабочего раствора). Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,075	Зерновые колосовые яровые (пшеница яровая, ячмень яровой)	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Ди 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание в фазу кушения культуры и в ранние фазы роста сорняков с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объёма рабочего раствора). Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	

флорасулам + трибенурон-метил

Агностар Гранд, ВДГ (120 г/кг + 630 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 ПП/ПП, ООО «АНПП «Агрохим-ХХ1» ОГРН: 1027700119710 ПП/ПП 197(023)-03-2469-1 13.11.2019 12.11.2029	0,02-0,025	Пшеница и ячмень озимые и яровые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,02	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листьев до начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Бомба, ВДГ (187 г/кг + 563 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4456-1 14.03.2024 13.03.2034	0,02-0,03	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и в ранние фазы роста сорных растений. Препарат может применяться самостоятельно или с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочего раствора, но не более 300 мл/га) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(2)	Активен
	0,02-0,03	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью от фазы 2-3 листа до конца кущения культуры и в ранние фазы роста сорных растений с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочего раствора, но не более 300 мл/га) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(2)	
	0,02-0,03	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и в ранние фазы роста сорных растений. Препарат может применяться самостоятельно или с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочего раствора, но не более 300 мл/га) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(2)	
Тандем, ВДГ (200 г/кг + 600 г/кг) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-03-475-1 17.12.2014 16.12.2024	0,015-0,02	Пшеница, ячмень яровые	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы 2-3 листьев до начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	0,02-0,025	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,02	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорняков в смеси с 0,5 л/га ПАВ Фортуна, Ж. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	

флорасулам + трибенурон-метил + тифенсульфулон-метил

Статус Голд, ВДГ (100 г/кг + 300 г/кг + 350 г/кг) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-4475-1 29.03.2024 29.03.2034	0,03-0,04	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключени ем овса	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	-----------	---	---	--	-------	------	---------

флорасулам + Флуметсулам

Дерби КА, СК (75 г/л + 100 г/л) ООО Кортэва Агрисаенс Рус ОГРН: 1106195008787 III/III 866-03-4648-0 25.07.2024 24.07.2027	0,05 - 0,07	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание вегетирующих растений весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы – 2-4 листа однолетних и розетка листьев многолетних) двудольных сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года: ограничения отсутствуют. В случае	60(1)	-(3)	Активен
	0,05 - 0,07	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание вегетирующих растений весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы – 2-4 листа однолетних и розетка листьев многолетних) двудольных сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года: ограничения отсутствуют. В случае	60(1)	-(3)	
Ксиор, КС (75 г/л + 100 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-03-3540-1 18.03.2022 590(297)-03-3540-1/485 485 17.03.2032	0,05-0,07	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. осоты, бодяки и устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорные растения	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия (включительно) культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,07	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные, в том числе осоты, бодяки и устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорные растения	Опрыскивание посевов от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы - 2-4 листа однолетних и розетка листьев многолетних) двудольных сорняков. После весеннего применения препарата, осенью того же года можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года ограничения отсутствуют. В случае необходимости пересева, на том же поле можно высевать яровые	60(1)	-(3)	

Флуазифоп-П-бутил

Легионер, КЭ (150 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 II/II, ООО «Агрохим ХХI» ОГРН: 5067746338150 II/II 023(197)-03-4594-1 06.06.2024 05.06.2034	1,5-2,0	Рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые (в том числе пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2,0	Картофель (кроме ранних и среднеспе лых сортов)	Многолетние злаковые (в том числе пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-2,0	Подсолнеч ник	Многолетние злаковые (в том числе пырей ползучий) сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-2,5	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев однолетних сорных злаков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,75-1,0	Картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,0	Подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,0	Рапс яровой и озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-03-4548-1 02.05.2024 01.05.2034	0,75-1,0	Горох (кроме овощного), подсолнечник, соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	Активен
	0,75-1,0	Свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белокочанная (кроме ранних сортов), лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель (кроме	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	1,5-2,0	Люпин желтый кормовой (семенные посевы)	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	1,5-2,0	Клевер ползучий и луговой, эспарцет (семенные посевы)	Многолетние и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов через 2-3 недели после уборки покровной культуры или после ранневесеннего подкашивания травостоя культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	1,5	Лен - долгунец	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» льна и при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	1,5-2,0	Горох (кроме овощного), подсолнечник, соя	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	1,5-2,0	Свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белокочанная (кроме ранних сортов), лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель (кроме	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	

	0,75-1,0	Люпин желтый кормовой (семенные посевы)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-03-1853-1 05.04.2018 04.04.2028	2 - 2,4	Свекла сахарная, лук всех генераций (кроме лука на перо)	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	Активен
	1 - 1,5	Картофель (кроме ранних и среднеспе лых сортов)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посадок в фазу 2 – 4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	1	Лен - долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и 2 – 4 листьев сорных злаков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	1-2	Бобы кормовые, люпин желтый (семенные посевы)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	1 - 1,5	Свекла кормовая	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	2	Лен - долгунец	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	2 - 2,5	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев однолетних сорных злаков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2 - 2,5	Капуста белокочан ная, рапс, подсолнеч ник	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	2 - 2,4	Свекла кормовая	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	30(30)	
	2 - 2,5	Картофель (кроме ранних и среднеспе лых сортов)	Пырей ползучий	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
	1-2	Горох (на зерно)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	

	1 - 1,5	Свекла сахарная, капуста белокочанная, лук всех поколений (кроме лука на перо), рапс, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2 – 4 листьев сорных злаков (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	30(30)	
Кроприш, КЭ (150 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/П 699-03-4319-1 15.12.2023 14.12.2033	0,75 - 1,0	Картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов)	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 листьев сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	46(1)	-(3)	Активен
	1,5 - 2,0	Свёкла сахарная, подсолнечник, соя	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75 - 1,0	Свёкла сахарная, подсолнечник, соя	Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорное)	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 листьев сорных растений (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5 - 2,0	Картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов)	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	46(1)	-(3)	

Флукарбазон натрия

Кентавр, ВДГ (700 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-3492-1 10.02.2022 09.02.2032	0,042-0,07	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (ширица запрокинутая, горчица полевая, фаллопия (гречишка) выюнная, пастушья сумка обыкновенная, неслия метельчатая, самосев рапса) сорные растения	Опрыскивание посевов по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатываются весной. Соблюдать ограничения по севообороту: пшеницу твердых сортов можно высевать не ранее, чем через 4 месяца после применения препарата, ячмень, картофель, сою, сахарную свеклу, рапс – через 9 месяцев; горох – через 11 месяцев. Капусту, морковь, репису, свеклу	60(1)	-(3)	Активен
	0,025	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (ширица запрокинутая, горчица полевая, фаллопия (гречишка) выюнная, пастушья сумка обыкновенная, неслия метельчатая, самосев рапса) сорные растения	Опрыскивание посевов с добавлением 0,1 % ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксила изодецилового спирта) по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту: пшеницу твердых сортов можно высевать не ранее, чем через 4 месяца после применения препарата, ячмень, картофель, сою, сахарную	60(1)	-(3)	

Эверест, ВДГ (700 г/кг) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - ПП/П 201-03-4444-1 06.03.2024 05.03.2034	0,042-0,07	Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (щирца запрокинутая, горчица полевая, гречишка выюнковая, пастушья сумка, неслия метельчатая)	Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (в фазу 1-3 листьев, начало кущения), ранние фазы роста двудольных сорных растений. Оптимальная фаза развития культурных растений – от одного листа до середины кущения для пшеницы яровой, кущение – для пшеницы озимой. Соблюдать ограничения по севообороту: пшеницу можно высевать не ранее чем через 4 месяца после применения препарата, ячмень, картофель, сою, сахарную	60(1)	-(3)	Активен
--	------------	-------------------------------	---	---	-------	------	---------

Флуметсулам + тифенсульфурон-метил + флорасулам

Пиксель, МД (24 г/кг + 90 г/кг + 18 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 ПП/П 018-03-2321-1 18.07.2019 17.07.2029	0,25 - 0,30	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия (включительно) и ранние фазы роста сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года на том же поле можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года ограничения отсутствуют. В случае необходимости пересева, на том же поле можно высевать яровые зерновые. kvkvrpvzv.sorgo.ne	60(1)	-(3)	Активен
	0,25 - 0,30	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения культуры до фазы формирования второго междоузлия (включительно) и ранние фазы роста сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года на том же поле можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года ограничения отсутствуют. В случае необходимости пересева, на том же поле можно высевать яровые зерновые. kvkvrpvzv.sorgo.ne	60(1)	-(3)	

Флуметсулам + флорасулам

Дерби 175, СК (100 г/л + 75 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЫШАФ Т.М.Б.Х. ОГРН: - ПП/П 009-03-2762-1 29.07.2020 28.07.2030	0,05-0,07	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание вегетирующих растений весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы – 2-4 листа однолетних и розетка листьев многолетних) двудольные сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года: ограничения отсутствуют. В случае	60(1)	-(3)	Активен
	0,05-0,07	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание вегетирующих растений весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы – 2-4 листа однолетних и розетка листьев многолетних) двудольные сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года можно высевать озимые зерновые, озимый рапс и злаковые травы. Весной следующего года: ограничения отсутствуют. В случае	60(1)	-(3)	

Пинта, МД (50 г/л + 36 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3535-1 18.03.2022 17.03.2032	0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание вегетирующих растений весной от фазы кущения до фазы формирования второго междоузлия культуры (включительно) и ранние фазы роста (всходы – 2-4 листа однолетних и розетка листьев многолетних) двудольных сорных растений. После весеннего применения препарата, осенью того же года можно высевать озимые зерновые культуры, рапс озимый и злаковые травы. Весной следующего года ограничения отсутствуют. В	60(1)	-(3)	Активен
---	----------	--	---	---	-------	------	---------

Флумиоксазин

Пледж, СП (500 г/кг) Сумитомо Кемикал Агро Юроп С.А.С. ОГРН: - III/III 032-03-4675-1 25.09.2024 24.09.2034	0,08	Соя, подсолнеч ник	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры. В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свёклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(2)	Активен
	0,1-0,12	Соя, подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свёклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(2)	
Халк, МД (350 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-03-4657-0 30.08.2024 29.09.2027	0,14-0,17	Соя, подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свёклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(2)	Активен
	0,10-0,11	Соя, подсолнеч ник	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры. В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свёклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(2)	
Импульс, КС (480 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-2309-1 07.10.2019 192-03-2309-1/401 401 06.10.2029	0,1-0,12	Нут	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свёклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,1-0,12	Соя, подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свёклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Сангейт Экстра, ВДГ (510 г/кг) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/Ш 699-03-4282-1 04.12.2023 03.12.2033	0,10-0,14	Соя, подсолнеч ник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Флазер, КС (250 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/Ш 050-03-4709-1 06.11.2024 05.11.2034	0,2-0,25	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него). В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,16	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры. В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

флуроксипир

Деметра, КЭ (350 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-03-3504-1 02.03.2022 01.03.2032	0,43-0,57	Просо	Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,43-0,57	Рожь озимая, овес	Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	35(1)	-(3)	
	0,57	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазу конец трубкования (виден последний узел стебля) культуры (после появления выюнка полевого). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	35(1)	-(3)	
	0,4-0,5	Лук (кроме лука на перо)	Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т. Ч. Подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 листьев культуры Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,43-0,57	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	35(1)	-(3)	
	0,43-0,57	Кукуруза	Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,43-0,57	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	35(1)	-(3)	
	0,57	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазу конец трубкования (виден последний узел стебля) культуры (после появления выюнка полевого). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	35(1)	-(3)	
Альфард, ВР (250 г/л) ООО «НПК ХИМИЯ» ОГРН: 1197746012199 III/III 682-03-4521-1 22.04.2024 21.04.2034	1,5-2,0	Соя	Однолетние двудольные, в том числе и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа, в ранние фазы развития сорных растений. При необходимости пересева в год применения не рекомендуется высевать капусту, просо, сорго, свеклу, пшеницу, лен и кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

флуорксипир + флорасулам + 2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир)

Дискатор Форте, КЭ (50 г/л + 5 г/л + 410 г/л) Синтезия Кеми ГмбХ ОГРН: - III/III 781-03-3411-1 13.12.2021 12.12.2031	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	Активен
	0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатываются весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	

флуорксипир + флорасулама

Унико, ККР (100 г/л + 2,5 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-1842-1 22.03.2018 21.03.2028	1,25 - 1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	При преобладании многолетних двудольных сорных растений (виды осота, бодяка, выюнок полевой)	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры по фазу появления флагового листа) и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	40(1)	-(3)	Активен
	1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Многолетние и однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов в фазе колошения культуры и ранние фазы роста сорных растений (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого и выюнка полевого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	40(1)	-(3)	
	1-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка выюнковая, выюнок полевой	Опрыскивание посевов от фазы кушения культуры по фазу появления флагового листа) и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	40(1)	-(3)	

Флуорохлоридона

<p>Рейсер, КЭ (250 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 П/П 156-03-2789-1 01.09.2020 31.08.2030</p>	2-3	Морковь	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. В течение 5 месяцев после применения на полях могут возделываться только картофель, морковь, пастернак, подсолнечник и петрушка. Озимые зерновые возделывать не ранее, чем через 6 месяцев после применения. Лук, томаты, тыквенные и крестоцветные культуры высаживать не менее чем через 12 месяцев после применения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	3-4	Подсолнечник (на семена, масло)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. В течение 5 месяцев после применения на полях могут возделываться только картофель, морковь, пастернак, подсолнечник и петрушка. Озимые зерновые возделывать не ранее, чем через 6 месяцев после применения. Лук, томаты, тыквенные и крестоцветные культуры высаживать не менее чем через 12 месяцев после применения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2-3	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы не позднее 2-3 дней после посадки. В течение 5 месяцев после применения на полях могут возделываться только картофель, морковь, пастернак, подсолнечник и петрушка. Озимые зерновые возделывать не ранее, чем через 6 месяцев после применения. Лук, томаты, тыквенные и крестоцветные культуры высаживать не менее чем через 12 месяцев после применения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

флуртамон + флуфенацет + Дифлюфеникан

<p>Бакара Форте, КС (120 г/л + 120 г/л + 120 г/л) Байер КропСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-03-1211-1 05.09.2016 04.09.2026</p>	0,6-1	Пшеница озимая	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева замещающих культур весной высевать только зерновые колосовые культуры после проведения глубокой вспашки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
---	-------	----------------	---	---	------	------	---------

флуфенацет + Метрибузин

<p>Аргист, ВДГ (240 г/кг + 175 г/кг) Байер КропСайенс АГ ОГРН: - П/П 019-03-1624-1 21.11.2017 019-03-1624-1/400 400 20.11.2027</p>	2-2,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Препарат применяется с учетом чувствительности ранних и средних сортов и гибридов картофеля Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2,0-2,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

фомесафен

Некус, ВР (240 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-3459-1 28.12.2021 27.12.2031	1-1,75	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Ограничения по севообороту: высевать сою, бобы и высаживать картофель можно в любое время. Пшеницу, ячмень, рожь можно высевать через 4 месяца; кукурузу, горох – через 10 месяцев; люцерну, сорго, сахарную свеклу, подсолнечник и другие культуры – через 18 месяцев Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1-1,75	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа сои, в ранние фазы развития сорных растений. Ограничения по севообороту: высевать сою, бобы и высаживать картофель можно в любое время. Пшеницу, ячмень, рожь можно высевать через 4 месяца; кукурузу, горох – через 10 месяцев; люцерну, сорго, сахарную свеклу, подсолнечник и другие культуры – через 18 месяцев Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	
Фирман, ВР (250 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/П, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 П/П 197(549)-03-3135-1 17.05.2021 16.05.2031	1,5-2	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа, в ранние фазы развития сорных растений. При необходимости пересева в год применения не рекомендуется высевать капусту, просо, сорго, свеклу, пшеницу, лен и кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фомесан, ВР (250 г/л) ООО АГРОХИМСТРОЙ ОГРН: 1172801013538 П/П 647-03-3448-1 27.12.2021 26.12.2031	1,5-2,0	Соя	Однолетние двудольные, в том числе и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа, в ранние фазы развития сорных растений. При необходимости пересева в год применения не рекомендуется высевать капусту, просо, сорго, свеклу, пшеницу, лен и кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фомесофт, ВК (250 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/П, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/П 050(360)-03-3055-1 17.03.2021 16.03.2031	1,5-2,0	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фомаз, ВР (250 г/л) ООО МИР ОГРН: 1177746067916 П/П 583-03-3304-1 20.09.2021 19.09.2031	1,5 - 2,0	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Фомфлаг, ВР (250 г/л) «Шандонг Вейфанг Рейбоу Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - П/П 699-03-4236-1 20.10.2023 19.10.2033	1,2-1,8	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа сои, в ранние фазы развития сорных растений. Ограничения по севообороту: сою и бобы можно высевать в любое время. Пшеницу, ячмень, рожь можно высевать через 4 месяца, кукурузу, горох – через 10 месяцев; люцерну, сорго, сахарную свеклу, подсолнечник и другие культуры – через 18 месяцев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Сиквел, ВР (250 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-03-4389-1 26.01.2024 25.01.2034	0,9-2,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 1-4 листа культуры и ранние фазы роста (2-6 листьев) сорных растений. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать картофель, зернобобовые, кроме фасоли, через четыре месяца - зерновые колосовые яровые и озимые, на следующий год - кукурузу, рис, бахчевые, через два года - все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	45(1)	-(3)	Активен
МарафонСоя, ВР (250 г/л) ООО «АГРОТЕХИНВЕСТ» ОГРН: 1112801009727 П/П 402-03-4797-1 03.02.2025 02.02.2035	1,5-2,0	Соя	Однолетние двудольные, в том числе и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа, в ранние фазы развития сорных растений. При необходимости пересева в год применения не рекомендуется высевать капусту, просо, сорго, свеклу, пшеницу, лен и кукурузу. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фомезафикс, ВР (250 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/П 002-03-4762-1 23.12.2024 22.12.2034	1,0-2,0	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа сои, в ранние фазы развития сорных растений. Ограничения по севообороту: сою и бобы можно высевать в любое время. Пшеницу, ячмень, рожь можно высевать через 4 месяца, кукурузу, горох – через 10 месяцев; люцерну, сорго, сахарную свёклу, подсолнечник и другие культуры – через 18 месяцев. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
Фомус, ВР (250 г/л) ООО «КЛЕВЕР ГРУПП» ОГРН: 1172801001350 П/П 570-03-4758-1 23.12.2024 22.12.2034	1,2–1,8	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа культуры, в ранние фазы развития сорных растений. При необходимости пересева в год применения не рекомендуется высевать капусту, просо, сорго, свеклу, пшеницу, лен и кукурузу Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

Фомесафен (натриевая соль)

Флекс, ВР (250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/Ш 041-03-3000-1 03.02.2021 02.02.2031	1,2-1,8	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа сои, в ранние фазы развития сорных растений. Ограничения по севообороту: сою и бобы можно высевать в любое время. Пшеницу, ячмень, рожь можно высевать через 4 месяца, кукурузу, горох – через 10 месяцев; люцерну, сорго, сахарную свеклу, подсолнечник и другие культуры – через 18 месяцев Расход рабочей жидкости - 100 - 200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	---------	-----	----------------------------------	---	-------	------	---------

фомесафен + Галоксифоп-П-метил

Фирман Экстра, МЭ (180 г/л + 70 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/Ш 197-03-4734-1 26.11.2024 25.11.2034	0,7	Соя	Однолетние злаковые и двудольные, а также некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу от 1-го до 3-го тройчатого листа, в ранние фазы развития сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----	-----	---	--	-------	------	---------

хизалофоп-П-этил

Химера, КЭ (125 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 Ш/Ш, ООО «Франдеса» ОГРН: - Ш/Ш 590(297)-03-2507-1 30.12.2019 29.12.2029	0,8-1,2	Подсолнеч ник	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,4-0,8	Подсолнеч ник	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Свекла сахарная	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Соя	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Свекла сахарная	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Соя	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Гал-Визия, КЭ (50 г/л) ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМ АЦИЯ А.Д. ОГРН: - П/Ш 742-03-4364-1 15.01.2024 14.01.2034	0,75-2,5	Подсолнеч ник, рапс	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	Активен
	1,0-2,0	Свекла сахарная	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	
	1,0-3,0	Соя	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	
	2,0-3,0	Свекла сахарная	Многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте сорных растений 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(1)	
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) Ниссан Кемикал Корпорейшн	1-2	Томат посевной, томат рассадный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	Активен

ОГРН: -
III/III
234-03-2005-1
12.12.2016
11.12.2026

2-3	Свекла сахарная, столовая, морковь, лук (кроме лука на перо)	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
1,5-2,5	Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
2-3	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посадок в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
2	Арбуз	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов и посадок в фазе "шарика" культуры (2-6 листьев у сорных растений) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
2-3	Соя	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
1-2	Свекла сахарная, столовая, морковь, лук (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
1-2	Соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
1-2	Шалфей мускатный	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание плантаций в фазе 2-6 листьев культуры по вегетирующим сорным растениям Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)
3-5	Роза эфиромасличная	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Направленное опрыскивание всходов злаковых сорных растений в рядах Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)
0,75-1,5	Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)
2-3	Лен - долгунец	Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе "елочки" культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)
2-3	Лен - долгунец	Многолетние и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	7(3)
2-4	Картофель (кроме ранних сортов)	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)

Таргет Супер,
КЭ
(51,6 г/л)
ООО «Агро Эксперт
Групп»
ОГРН: 1027708006996
III/III
178-03-2629-1
26.03.2020
25.03.2030

Активен

	1-2	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
	2-3	Свекла сахарная, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	7(3)	
Отличник, МКЭ (60 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 ПП/П 012-03-4554-1 03.05.2024 02.05.2034	9-12 мл/100 м2	Свекла столовая, морковь, томаты открытого грунта, картофель	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в период активного роста сорняков (в фазе 2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 2-3 л/ 100 м2	60(1)	3(-)	Активен
	17-20 мл/100 м2	Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих однолетних злаковых сорных растений в фазе 2-4 листьев и при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 2-3 л/ 100 м2	- (1)	3(-)	
	9-12 мл/100 м2	Лук (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в период активного роста сорняков (в фазе 2-6 листьев) Расход рабочей жидкости - 2-3 л/ 100 м2	51(1)	3(-)	
	17-20 мл/100 м2	Свекла столовая, морковь, томаты открытого грунта, картофель	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание растений при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 2-3 л/ 100 м2	60(1)	3(-)	
	17-20 мл/100 м2	Лук (кроме лука на перо)	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание растений при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 2-3 л/ 100 м2	51(1)	3(-)	
Хантер, КЭ (51,6 г/л) Агрия АД ОГРН: - ПП/П, ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 ПП/П 184(026)-03-4156-1 12.07.2023 11.07.2033	2,0-4,0	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание растений в фазе 2 – 4 листьев у однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1,5-2,5	Рапс яровой, рапс озимый	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Лен - долгунец	Многолетние (в том числе пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-2,0	Свёкла сахарная, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	2,0-3,0	Свёкла сахарная, соя, подсолнечник	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,75-1,5	Рапс яровой, рапс озимый	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

Миура, КЭ (125 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-2604-1 17.03.2020 021-03-2604-1/421 421 16.03.2030	8 мл/3 л воды(Л)	Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10-15 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	3(3)	Активен
	4 мл/5 л воды(Л)	Картофель, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковыесорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	60(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Томат рассада, перец	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	8-12 мл/3 л воды	Томат рассада, перец	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Рыжик, чечевица	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Горох (на зерно)	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	0,4-0,8	Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), подсолнечник, рапс яровой и	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Гречиха, люпин, фасоль, сафлор, горчица, кориандр, клецвина , арбуз, томат посевной	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Свекла (сахарная, столовая, кормовая), морковь, капуста белокочанная, соя, лук всех генераций (кроме лука на перо), подсолнечник, рапс яровой и	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	4-8 мл/3 л воды	Томат рассада, перец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(3)	

	4-8 мл/ 3 л воды	Фасоль, арбуз, томат посевной	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорных растений Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(3)	
	0,4-0,8	Лук на перо	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Лен масличный	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	3(3)	
	4 мл/5 л воды(Л)	Морковь (в том числе для пучкового товара)	Однолетние злаковыесорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(3)	
	0,8-1,2	Лук на перо	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	3(3)	
	8-12 мл/3 л воды	Фасоль, арбуз, томат посевной	Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий)	Опрыскивание при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	3(3)	
	0,4-0,8	Гречиха, люпин, фасоль, сафлор, горчица, кориандр, клецелина, арбуз, томат посевной	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,4-0,8	Томат рассадный, перец	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	8 мл/5 л воды(Л)	Морковь (в том числе для пучкового товара)	Многолетние злаковыесорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	20(1)	3(3)	
	0,4-0,8	Рыжик, чечевица	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	50(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Лен - долгунец	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	3(3)	
	8 мл/5 л воды(Л)	Картофель, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо)	Многолетние злаковыесорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	60(1)	3(3)	
Форвард, МКЭ (60 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/Ш 018-03-2458-1 06.11.2019 05.11.2029	1,2-2,0	Лен - долгунец	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений и при высоте пырея 10-15 см (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	0,9-1,2	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

	12 мл/3 л воды(Л)	Участки, не предназначенные под возделывание культурных растений	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(3)	
	0,9-1,2	Свекла (сахарная, столовая), соя, рапс яровой и озимый, подсолнечник, горох, нут	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2-2,0	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,9-1,2	Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2-2,0	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,9-1,2	Свекла (сахарная, столовая), соя, рапс яровой и озимый, подсолнечник, горох, нут	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2-2,0	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см, независимо от фазы развития культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2-2,0	Лен масличный	Многолетние злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	1,2-2,0	Лен - долгунец	Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорных растений и при высоте пырея 10-15 см (в фазе «елочки» льна) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)	
Норвел, КЭ (50 г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРКЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 П/Ш 063-03-4588-1 24.05.2024 23.05.2034	2,0-3,0	Свекла сахарная	Многолетние и злаковые сорные растения (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(1)	Активен
	1,0-2,0	Свекла сахарная	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(1)	
Ранголи-Таргон-С, КЭ (50 г/л) ООО «РАНГОЛИ»	2-3	Свекла сахарная	Многолетние и злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1157746217848 III/III 134-03-1909-1 11.05.2018 10.05.2028	1-2	Свекла сахарная	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	
хизалофоп-П-этил + Бентазон							
Гейзер, ККР (45 г/л + 300 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/II 018-03-1474-1 20.04.2017 018-03-1474-1/238 238 19.04.2027	2-3	Соя	Однолетние двудольные, в том числе дурнушник обыкновенный, однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста (2-6 листьев) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-2,5	Горох (на зерно, овощной)	Однолетние двудольные, в том числе дурнушник обыкновенный, однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 5-6 настоящих листьев культуры и в ранние фазы роста (2-6 листьев) сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	21(1)	-(3)	
хизалофоп-П-этил + Имазамокс							
Гермес, МД (50 г/л + 38 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4499-1 02.04.2024 01.04.2034	0,9-1	Подсолнеч ник на семена и масло (гибриды, устойчивы е к имидазоли нонам)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листа у культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	52(1)	-(3)	Активен
	0,7-0,9	Горох (на зерно)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 листа) и 1-3 настоящих листа культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 листа) и 1-3 настоящих листа культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,7-1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 листа) и 1-3 настоящих листа культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

	0,7-0,9	Горох (на зерно)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (1-3 листа) и 1-3 настоящих листа культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,9-1	Подсолнечник на семена и масло (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листа у культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	52(1)	-(3)	

хизалофоп-П-этил + Имазапир + Имамакс

Гермес Форте, МД (20 г/л + 12 г/л + 30 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 Ш/Ш 018-03-4727-1 26.11.2024 25.11.2034	1,0-1,5	Подсолнечник (гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: в год применения можно высевать пшеницу и рожь озимые, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); через 9 месяцев можно высевать яровые зерновые культуры, сою, горох, люцерну, бобы, кукурузу, сорго, люпин, подсолнечник (устойчивый к имидазолинонам); через 19	60(1)	-(3)	Активен
---	---------	---	--	---	-------	------	---------

хизалофоп-П-этил + Клетодим

Эволюшн, КЭ (70 г/л + 140 г/л) АРИСТА ЛАЙФСАЙЕНС С.А.С. ОГРН: - Ш/Ш 201-03-1663-1 18.12.2017 17.12.2027	0,75-1	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, рапс яровой и рапс озимый, горох	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры в смеси с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) – 0,5% от объема рабочей жидкости Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,35-0,5	Свекла сахарная, подсолнечник, соя, рапс яровой и рапс озимый, горох	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры в смеси с ПАВ Амиго Стар, КЭ (842 г/л смеси метиловых эфиров жирных кислот) – 0,5% от объема рабочей жидкости Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

хлоридазон

Пирамин Турбо, КС (520 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - Ш/Ш 014-03-1636-1 07.12.2017 06.12.2027	2,5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по первой и второй волне сорных растений в фазе семядолей, независимо от фазы развития культуры (интервал между обработками 10-15 дней) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(2)	-(14)	Активен
	3-5	Свекла сахарная, кормовая	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(14)	

хлоримурон-этил + Имзетапир

<p>Фабиан, ВДГ (150 г/кг + 450 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03-2624-1 25.03.2020 24.03.2030</p>	0,1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (до 2-3 листьев у злаков и до 4-6 листьев у двудольных) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,08-0,1	Соя	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (до 2-3 листьев злаков и до 4-6 листьев у двудольных) с добавлением 200 мл/га ПАВ АДЬЮ, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	

хлоримурон-этил + тифенсульфурон-метил

<p>Классик Форте, ВДГ (187,5 г/кг + 187,5 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - П/П 029-03-2097-1 08.02.2019 029-03-2097-1/288 288 07.02.2029</p>	25-50 г/га	Соя	Однолетние и некоторые многолетние (осот полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Соблюдать ограничения по севообороту. В случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую	60(1)	-(3)	Активен
	25-35 г/га	Соя	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков. Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Соблюдать ограничения по севообороту. В случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую весну – подсолнечник, рапс и упомянутые выше культуры. На третью весну – свёклу.	60(1)	-(3)	

	25-50 г/га	Соя	Однолетние и некоторые многолетние (осот полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков совместно с 200 мл/га Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Соблюдать ограничения по севообороту. В случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую весну – подсолнечник, рапс и	60(1)	-(3)	
	35-50 г/га	Соя	Однолетние и некоторые многолетние (осот полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков. Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Соблюдать ограничения по севообороту. В случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую весну – подсолнечник, рапс и упомянутые выше культуры. На третью весну – свёклу	60(1)	-(3)	
Тифенс Классик, ВДГ (187,5 г/кг + 187,5 г/кг) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/П 097-03-3378-1 18.11.2021 17.11.2031	0,025-0,05	Соя	Однолетние и некоторые многолетние (осот полевой) двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Следует соблюдать ограничения по севообороту: в случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую	60(1)	-(3)	Активен

хлорсульфурон (диэтилэтаноламинные соли) + Дикамба

Фенизан, ВР (22,2 г/л + 360 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-03-1449-1 07.04.2017 06.04.2027	0,14-0,2	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе начало кущения культуры (3-4 листа) – конец кущения и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,14-0,2	Лен масличный, лен долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе елочки (высота культуры 3-10 см) и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,14-0,2	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Не применять позднюю обработку на семеноводческих и селекционных посевах Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,14-0,2	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе начало кущения культуры (3-4 листа) – конец кущения и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	

	0,14-0,2	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Не применять позднюю обработку на семеноводческих и селекционных посевах Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,14-0,2	Лен масличный, лен долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе елочки (высота культуры 3-10 см) и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,14-0,2	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной или осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	60(1)	-(3)	

Цигалофоп-бутил + Биспирибак натрия

<p>Ристайл, МД (190 г/л + 50 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-3284-1 03.09.2021 02.09.2031</p>	0,7 - 0,8	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные широколистные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых) сорных растений. Рекомендации по применению: для лучшего эффекта перед началом обработки необходимо слить воду с чеков, повторное затопление чеков можно проводить через 1 день после окончания обработки Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	60(1)	-(-)	Активен
	0,7 - 0,8	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные широколистные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых) сорных растений. Рекомендации по применению: для лучшего эффекта перед началом обработки необходимо слить воду с чеков, повторное затопление чеков можно проводить через 1 день после окончания обработки Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(-)	

Цигалофоп-бутил + Пеноксулам

<p>Топшот 113, МД (100 г/л + 13,33 г/л) ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЬШАФ Т.М.Б.Х. ОГРН: - III/III 009-03-2935-1 17.12.2020 16.12.2030</p>	2-3	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Перед опрыскиванием воду из чеков рекомендуется слить. Повторное затопление чеков можно проводить не ранее 3-х дней после применения. Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября) Расход рабочей жидкости -	76(1)	-(-)	Активен
--	-----	-----	---	--	-------	------	---------

	2-3	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев – конец кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа у злаковых и 5-7 листьев у осоковых). Перед опрыскиванием воду из чеков рекомендуется слить. Повторное затопление чеков можно проводить не ранее 3-х дней после применения. Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября) Расход рабочей жидкости -	76(1)	-(-)	
--	-----	-----	---	--	-------	------	--

Циклоксимид

Стратос Ультра, КЭ (100 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-03-1337-1 20.01.2017 19.01.2027	1-2	Соя, подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый, свёкла сахарная, картофель	Однолетние злаковые сорняки (виды осюга, виды щетинника, просо куриное, просо сорное) и пырей ползучий	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения и при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры) в смеси с 1-2 л/га ПАВ ДАШ, КЭ (596 г/л смеси фосфат эфира с метил олеатом). Посевы рапса озимого обрабатывают весной Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
--	-----	---	--	---	-------	------	---------

Этаметсульфурон-метил

Сальса, ВДГ (750 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - III/III 029-03-1198-1 16.08.2016 15.08.2026	0,02-0,025	Подсолнечник	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Оптимальная фаза развития культурных растений – от 2 до 8 настоящих листьев культуры (до тех пор, пока развитые растения культуры не будут препятствовать попаданию препарата на сорные растения). При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую	60(1)	-(3)	Активен
	0,015-0,025	Рапс озимый	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью или весной в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева рапса озимого, обработанного осенью, можно высевать пшеницу озимую. Ячмень озимый можно высевать через	60(1)	-(3)	
	0,015-0,025	Рапс яровой	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую после вспашки или минимальной культивации почвы Расход рабочей жидкости -	60(1)	-(3)	

<p>Сальса Про, ВДГ (750 г/кг) ООО «ЭфЭмСи» ОГРН: 1037706002773 III/III 489-03-2873-1 03.11.2020 02.11.2030</p>	0,02-0,025	Подсолнечник	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью или весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста (от семядолей до 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних) двудольных сорных растений. Оптимальная фаза развития культурных растений – от 2 до 8 настоящих листьев культуры (до тех пор, пока развитые растения культуры не будут препятствовать попаданию препарата на сорные растения).	60(-)	-(3)	Активен
	0,015-0,025	Рапс яровой	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста (от семядолей до 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних) двудольных сорных растений. Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую после вспашки или <u>минимальной культивации</u> .	60(-)	-(3)	
	0,015-0,025	Рапс озимый	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью или весной с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста (от семядолей до 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних) двудольных сорных растений. Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева рапса озимого, обработанного осенью, можно <u>высевать пшеницу озимую</u> .	60(-)	-(3)	
<p>Этамет, ВДГ (750 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 III/III 197-03-1680-1 12.01.2018 197-03-1680-1/387 387 11.01.2028</p>	0,015-0,025	Рапс яровой, озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная от фазы семядолей до 3-5 настоящих листьев культуры в смеси с 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). После озимого или ярового рапса, обработанного весной гербицидом, возможно высевать в тот же год ячмень озимый, пшеницу озимую после вспашки или минимальной культивации почвы. Весной следующего года после вспашки или культивации <u>почвы можно высевать овес</u> .	60(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Подсолнечник	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в смеси с ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) 200 мл/га в ранние фазы роста двудольных сорняков (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних). Оптимальная фаза развития культурных растений – от 2 до 8 настоящих листьев культуры. При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую после вспашки или <u>минимальной культивации почвы</u> .	60(1)	-(3)	

	0,015-0,025	Рапс яровой, озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная от фазы семядолей до 3-5 настоящих листьев культуры в смеси с 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). После озимого или ярового рапса, обработанного весной гербицидом, возможно высевать в тот же год ячмень озимый, пшеницу озимую после вспашки или минимальной культивации почвы. Весной следующего года после вспашки или культивации почвы можно высевать овес.	60(1)	-(3)	
	0,020-0,025	Подсолнечник	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки у многолетних) с добавлением ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). Оптимальная фаза развития культуры – от 2 до 8 настоящих листьев. При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую после вспашки или минимальной культивации почвы.	60(1)	-(3)	
	0,015-0,025	Рапс озимый	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью или весной в смеси с ПАВ Адыо, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1% или 200 мл/га) в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних). Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева рапса озимого, обработанного осенью, можно высевать	60(1)	-(3)	
Этамастер, ВДГ (750 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-1681-1 12.01.2018 002-03-1681-1/230 230 11.01.2028	0,015-0,025	Рапс яровой и озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная от фазы семядолей до 3-5 настоящих листьев культуры в смеси с 200 мл/га ПАВ ЭТД – 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). После озимого или ярового рапса, обработанного весной гербицидом, возможно высевать в тот же год ячмень озимый, пшеницу озимую после вспашки или минимальной культивации почвы. Весной следующего года после вспашки или культивации почвы можно высевать овёс.	60(1)	-(3)	Активен
	0,02-0,025	Подсолнечник	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Оптимальная фаза развития культурных растений – от 2 до 8 настоящих листьев культуры (до тех пор, пока развитые растения культуры не будут препятствовать попаданию препарата на сорные растения). При необходимости пересева	60(1)	-(3)	

Эсток, ВДГ, ВДГ (750 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: - III/III 021-03-2543-1 12.03.2020 021-03-2543-1/366 366 11.03.2030	20-25	Подсолнечник	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки у многолетних) с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). Оптимальная фаза развития культуры – от 2 до 8 настоящих листьев. При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую после вспашки или минимальной культивации почвы. <u>Расход рабочей</u>	60(1)	-(3)	Активен
	15-25	Рапс озимый	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью или весной в смеси с ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1% или 200 мл/га) в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних). Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева рапса озимого, обработанного <u>осенью можно высевать</u>	60(1)	-(3)	
	15-25	Рапс яровой	Однолетние (в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов (в смеси с ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1% или 200 мл/га) в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних). Оптимальная фаза развития культурных растений – от семядолей до образования цветочных бутонов. При необходимости пересева можно высевать пшеницу яровую после вспашки или минимальной культивации	60(1)	-(3)	

Этаметсульфурон-метил + пиклорам

Этамастер Супер, ВДГ (150 г/кг + 450 г/кг) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-03-1259-1 26.10.2016 25.10.2026	0,065-0,08	Рапс яровой и озимый	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы первой пары листьев до 4-х пар настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж. Рапс озимый обрабатывается весной Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
---	------------	----------------------	---	--	-------	------	---------

этофумезат

Актюн, КС (500 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-4688-1 04.10.2024 03.10.2034	1,0-2,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений первой, второй или третьей волны (в фазу семядолей двудольных и 1 листа злаковых) от фазы вилочки до смыкания рядков свеклы. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1,5-2,0	Люпин	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазу семядолей двудольных и 1 листа злаковых) в фазу от 2-х до 4-х листьев люпина. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

этофумезат + Десмедифам + фенмедифам

Бетанал Прогресс ОФ, КЭ (112 г/л + 71 г/л + 91 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - III/III 019-03-903-1 16.12.2015 15.12.2025	3	Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	1	Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Эксперт Трио ОФ, КЭ (112 г/л + 71 г/л + 91 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 III/III 192-03-2174-1 01.04.2019 31.03.2029	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	3,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Свекла сахарная	Однолетние двудольные сорняки, в том числе щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
Синбетан Эксперт ОФ, КЭ (112 г/л + 71 г/л + 91 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-03-4098-1 24.02.2021 23.02.2031	1,0	Сахарная свекла, кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	1,5	Сахарная свекла, кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев сорных растений двукратно (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней) Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(2)	-(3)	
	3,0	Сахарная свекла, кормовая	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. все виды щирицы некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание посевов с фазы 4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста (2-4 листа) сорных растений Расход рабочей жидкости - 200 л/га	60(1)	-(3)	

этофумезат + Ленацил + Десмедифам + фенмедифам

Бетанал максПро, МД (75 г/л + 27 г/л + 47 г/л + 60 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - II/III 019-03-3931-1 09.01.2023 08.01.2033	1,5	Свёкла сахарная, свёкла столовая (кроме пучкового товара), свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	1,25	Свёкла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорные растения	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) в смеси с препаратами на основе трифлусульфурон-метила (10 г/га по действующему веществу) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	

этофумезат + Метамитрон

Себринг, СК (150 г/л + 350 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-03-4552-1 03.05.2024 02.05.2034	3-4	Свекла столовая (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 1-2-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(1)	-(3)	Активен
	2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Двукратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	2	Свекла столовая (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Двукратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(2)	-(3)	
	2	Свекла кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Двукратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	
	3-4	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 1-2-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	3-4	Свекла кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 1-2-х листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	
	2	Свекла столовая (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	53(3)	-(3)	
	2	Свекла кормовая	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(3)	
	2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	2-4	Люпин	Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов по всходам сорных растений (в фазу семядолей двудольных и первого листа злаковых) в фазу от 2 до 4 настоящих листьев люпина Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	

этофумезат + фенмедифам + Десмедифам

Бетарен Супер МД, МКЭ (126 г/л + 63 г/л + 21 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-03-2953-1 24.12.2020 23.12.2030	0,9-1,2	Свекла сахарная, свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	53(3)	-(3)	Активен
	2,7-3,6	Свекла сахарная, свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	53(1)	-(3)	
	1,35-1,8	Свекла сахарная, свекла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	53(2)	-(3)	

Бетакем, КЭ (112 г/л + 91 г/л + 71 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 III/III 097-03-2932-1 17.12.2020 16.12.2030	1	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	Активен
	3	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки	Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
Гуд-Харвест Свекольный Гербицид, КЭ (112 + 91 + 71) Чжангсу Гуд Харвест Вейн Агрокемикал Ко., Лтд. (Китай) ОГРН: - III/III 563-03-2342-1 02.08.2019 01.08.2029	3,0	Свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,5	Свёкла сахарная, свёкла столовая (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)	
	3,0	Свёкла сахарная, свёкла столовая (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0	Свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(3)	
	1,0	Свёкла сахарная, свёкла столовая (кроме для пучкового товара)	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(3)	-(3)	
	1,5	Свёкла кормовая	Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(3)	

Дефолиант, десикант

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обработываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Глюфосинат аммоний

Баста, ВР (150 г/л) «БАСФ СЕ»	2-2,5	Клевер луговой (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание при созревании 75-80 % головок при сильной засоренности). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
--	-------	---	-----------	---	-------	-------	---------

ОГРН: - П/П 014-03(04)-2731-1 15.12.2015 16.12.2025	2-2,5	Картофель продоволь- ственный (низкоросл ые сорта)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2-2,5	Рапс	Десикация	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70-75 % стручков или влажности семян 25-35 % при сильной засоренности. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2-2,5	Картофель продоволь- ственный (высокорос- лые, сильнообли- ственные сорта)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 7 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(2)	-(10)	
	1,5-2,5	Соя	Десикация	Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее, чем за 10 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(-)	
	1,5-2	Рапс	Десикация	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70-75 % стручков или влажности семян 25-35 % при слабой засоренности	10(1)	-(10)	
	1,5-2	Подсолнеч- ник	Десикация	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80 % побуревших корзинок (при 25-30 % относительной влажности семян)	5(1)	-(5)	
	1-1,5	Клевер луговой (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание при созревании 75-80 % головок (при слабой засоренности). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	1-1,5	Люцерна	Десикация	Опрыскивание при побурении 80-85 % бобов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(1)	-(5)	
	2-2,5	Лен - долгунец	Десикация	Опрыскивание в фазе начала ранней желтой спелости (количество зеленых семян 25 %) при слабой засоренности и сильной засоренности. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	1-2	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание в фазе побурения 70-75% бобов 5-6 ярусов или при влажности семян 25-35%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(1)	-(5)	
ГлюфАгро, ВР (150 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/П 197-03(04)-4669-1 20.09.2024 19.09.2034	1,5-2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее, чем за 10 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(8)	Активен
Глюфосинат аммоний + Глифосат кислоты (аммонийная соль)							
Лайфлайн, ВР (280 г/л + 280 г/л) ООО «ЮПЛ»	1,3-1,5	Картофель продоволь- ственный (низкоросл ые сорта)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3)	Активен

ОГРН: 1157746848490 П/П 148-03(04)-3599-1 08.04.2022 07.04.2032	0,8-1,3	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70-75% стручков или влажности семян 25-35%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3)	
	0,8-1,3	Соя	Десикация	Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее чем за 10 дней до уборки урожа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3)	
	0,8-1,1	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80% побуревших корзинок (при 25-30% относительной влажности семян). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(3)	
	0,8-1,1	Пшеница яровая	Десикация	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	12(1)	-(3)	
	1,3-1,5	Картофель продоволь- ственный (высокоро слые, сильно облиствен ные сорта)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 7 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3)	
	0,8-1,1	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80% побуревших корзинок (при 25-30% относительной влажности семян). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3)	
	0,5-1,1	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70-75% бобов 5-6 ярусов или при влажности семян 25-35%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3)	
Мегаполис, ВР (150 г/л + 150 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-03(04)-3761-1 15.07.2022 14.07.2032	2-2,5	Картофель продоволь- ственный (низкоросл ые сорта)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	1,5-2	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80 % побуревших корзинок (при 25-30 % относительной влажности семян). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	5(1)	-(5)	
	1,5-2,5	Соя	Десикация	Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее, чем за 10 дней до уборки урожа. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(10)	

	2-2,5	Картофель продовольственный (высокорослые, сильнооблиственные сорта)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 7 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(2)	-(10)	
--	-------	--	-----------	--	-------	-------	--

Дикват (дибромид)

<p>Волат, ВР (150 г/л) ООО ФРАНДЕСА ОГРН: 1157746513055 III/III, ООО «Франдеса» ОГРН: - III/III 590(297)-04-2969-1 09.01.2021 10.01.2031</p>	2	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	2	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
<p>Дикватерр Супер, ВР (150 г/л) ООО «ГРАНУМ» ОГРН: 1147746366261 III/III 424-04-2357-1 18.01.2019 19.09.2029</p>	1,5-2,0	Горох	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	1,5-2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0-2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
<p>Десикант Экспертоф, ВР (150 г/л) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 III/III, ООО «АгроХимИнвест» ОГРН: 5137746013400 III/III 004(549)-04-5001-1 18.05.2020 17.05.2030</p>	2,0	Подсолнечник	Десикация	Наземное опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	2	Подсолнечник, соя	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
<p>Результат Супер, ВР (150 г/л) ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» ОГРН: 1142310001404 III/III 446-04-1524-1 11.07.2017 10.07.2027</p>	2	Рапс яровой и озимый (товарные и семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	10(1-7)	Активен
	2	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(2)	10(1-7)	

	2	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов припобурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30 %. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2	Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов припобурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	10(1-7)	
Дикошанс, ВР (150 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 III/III 126-04-4533-1 25.04.2024 24.04.2034	2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(5)	Активен
	2,0	Картофель	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)	
	2,0	Пшеница яровая и озимая	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Горох	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)	
	2,0	Лен масличный	Десикация	Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(5)	
	2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)	
	2,0	Ячмень	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(-)	-(-)	
	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)	
Адекват, ВР (150 г/л) ООО «ФОРВАРД» ОГРН: 1105476055277 III/III 042-03-441-1 26.01.2014 27.10.2024	1,5 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	Не активен
	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	
	1,5 - 2,0	Люцерна (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-10(1)	-(3)	
	3,0 - 4,0	Капуста (семенники)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)	

2,0 - 4,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0 - 4,0	Сорго (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе восковой спелости. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,5 - 3,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Соя (товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
3,0 - 4,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)

2,0 - 4,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Люцерна (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7-10(1)	-(3)
1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3)
1,5-2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0 - 3,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)

2,0 - 3,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3)
2,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Соя (товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0	Свекла сахарная, столовая, кормовая (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 20-40% клубочков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,5 - 3,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3)
2,5 - 3,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
3,0 - 4,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0 - 4,0	Клевер красный ползучий (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 75-80% головок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)

	2,5 - 3,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)	
	2,0 - 4,0	Турнепс (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе восковой – начала полной спелости при влажности семян не более 45-50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)	
	2,0 - 4,0	Бобы кормовые (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в период, когда семена нижнего яруса бобов приобрели характерную для сорта окраску, семенной рубчик черный. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	
	2,0 - 4,0	Редис (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе восковой спелости семян при влажности не выше 55%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	
	2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)	
	2,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)	
	3,0 - 4,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)	
	2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	
<p>Ранголи-Реголон, В (150 (80,3 в пересчете на диквата ион) г/л) ООО «РАНГОЛИ» ОГРН: 1157746217848 III/III 134-04-1205-1 03.01.2016 04.09.2026</p>	2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание растений в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(12)	Активен
	2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(12)	
<p>Эквит, ВР (150(80 в пересчете на дикват ион) г/л) ООО «АНПП «Агрохим-XXI» ОГРН: 1027700119710 III/III, Кингтай Кемикалз Ко., Лтд ОГРН: - III/III 023(365)-04-1102-1 04.05.2016 023(365)-04-1102-1/480 480 03.05.2026</p>	2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(7)	Активен
	2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2,0	Картофель (продоволь ственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	

Регистан, ВРК (200 г/л) ООО ЭЛИПСАГРО ОГРН: 1142308002495 III/III 278-04-4105-1 25.12.2024 24.12.2024	2,0	Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(3)	Не активен
---	-----	--	-----------	---	-------	------	------------

Дикват (дибромид) + Дикват (дибромид)

Десикат Супер, ВР (280 г/л + 150 г/л) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 II/II, ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-04-2383-1 31.10.2024 06.11.2027	1-2	СояГорох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)	Активен
	2	Подсолнечник, соя	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в период побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	20(1)	-(10)	
	2,0	Подсолнечник	Десикация	Наземное опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	1-2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	1-2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)	
Реглон Эйр, ВР (150 г/л + 373,5 (200 в пересчете на диквата ион) г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-04-4479-0 28.03.2024 27.03.2027	1,0 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	1,0 - 2,0	Горох	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-12 дней до уборки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	9(1)	-(8-10)	
	1,0 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в период побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(2)	-(10)	
	1,0 - 2,0	Нут	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(8-10)	
	1,0 - 2,0	Нут	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(8-10)	
	1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в сторучках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	8(1)	-(8-10)	
	1,0 - 2,0	Лён масличный	Десикация	Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна за 7-12 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	8(1)	-(8-10)	

	1,0 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в период побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(2)	-(10)	
	1,0 - 2,0	Горох	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-12 дней до уборки. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	9(1)	-(8-10)	
	1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый (семенник и и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	1,0 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-12 дней до уборки. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	9(1)	-(8-10)	
	1,0 - 2,0	Лён масличный	Десикация	Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна за 7-12 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	8(1)	-(8-10)	
<p>Голден Ринг, ВР (150 г/л + 150 (80,3 в пересчете на диквата ион) г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 Ш/Ш 178-03(04)-2620-1 23.03.2020 22.03.2030</p>	2,0	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Картофель продовольственный и семенной (сильно облиственные сорта)	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Рапс яровой и озимый (семенник и и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в период побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(2)	-(10)	
	2,0	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(10)	
	1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Картофель продовольственный и семенной (сильно облиственные сорта)	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(10)	
	1,5 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в период побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(2)	-(10)	

	2,0	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
Диктатор, ВР (150 г/л + 150 (80,3 в пересчете на диквата ион) г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-4644-0 24.07.2024 23.07.2027	1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(12)	Активен
	1,5	Картофель	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га	12(1)	-(12)	
	1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
Ректон, ВР (150 г/л + 280 г/л) ООО «Интер Групп» ОГРН: 1084312000240 П/П 082-03-4621-0 24.06.2024 23.06.2027	1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)	Активен
	1,5 - 2,0	Лён масличный	Десикация	Опрыскивание посевов в фазу ранней спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3-10)	
	-2,0	Картофель	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)	
	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)	
	1,5 - 2,0	Горох	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	
	1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3-10)	
Дикватерр Мега, ВР (200 г/л + 150 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 П/П 192-04-2681-1 20.05.2020 19.05.2030	1,0 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)	Активен
	1,0 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3-7)	
	1,0 - 2,0	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)	
	1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(3-7)	
	1,0 - 2,0	Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый	Десикация	Опрыскивание растений в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3)	
Молоток, В (150 г/л + 200 г/л) ЗАО «ФМРус»	2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посеvy)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30 %. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	10(1-7)	Активен

ОГРН: 1097746208207 П/П, ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» ОГРН: 1027743011207 П/П 050(360)-04-1116-1 13.05.2016 050(360)-04-1116-1/264 264 12.05.2026	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2,0	Рапс яровой и озимый (товарные и семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100 л/га	10(1)	-(3-7)	
	2,0	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2,0	Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30 %. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	10(1-7)	
	2,0	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-7)	
	2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3-7)	
	2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-7)	
Регион Форте, ВР (200 г/л + 373,5 (200 в пересчете на диквата ион) г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/П 041-04-1019-1 09.03.2016 041-04-1019-1/154 154 08.03.2026	2,0	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	8(1)	-(8-10)	
Суходвей, ВР (150 г/л + 200 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03(04)-1700-1 28.10.2015 021-03(04)-1700-1/316 27.10.2025	1,5- 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(5)	Активен
	1,5- 2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(5)	
	2,0 - 4,0	Люцерна (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период побурения 85-90% бобов. (в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(5)	

1,5- 2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(5)
1,5- 2,0	Горох (семенной и фуражный)	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(-)
1,5- 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100 л/га	-(1)	-(5)
1,5- 2,0	Лен масличный	Десикация	Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры. (в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(5)
1,5- 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	-(1)	-(5)
2,0	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(10)
1,5-2,0	Соя (семенные и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(5)
1,5- 2,0	Горох (семенной и фуражный)	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(-)
1,5- 2,0	Нут	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. (в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(5)

Дикват (дибромид) + Дикват (дибромид) + Дикват (дибромид) + Дикват (дибромид)

<p>Тонгара, ВР (280 г/л + 150 г/л + 280 г/л + 150 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III, ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 II/III 018-03(04)-4645-1 25.07.2024 018-04-778-1/143 24.07.2034</p>	1,5 - 2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)	Активен
	1,5 - 2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	7(1)	-(3)	
	1,0 - 2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	
	1,5-2,0	Соя (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-10(1)	-(3-10)	
	1,5 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)	
	1,5 - 2,0	Люцерна (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-10(1)	-(3)	

2,0 - 4,0	Турнепс (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе восковой – начала полной спелости при влажности семян не более 45-50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)
2,0 - 4,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
1,0 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Лён масличный	Десикация	Опрыскивание посевов в фазу ранней спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(3-10)
1,5 - 2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3-10)
2,0 - 4,0	Редис (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе восковой спелости семян при влажности не выше 55%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3-10)
2,5 - 3,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0 - 4,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Соя (товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)

2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)
1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3-10)
2,0 - 4,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
3,0 - 4,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,5 - 3,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Горох	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)
2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Картофель (сильно облиственные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Капуста (семенники)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
2,0 - 4,0	Картофель (сильно облиственные сорта) (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)

1,5-2,0	Соя (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-10(1)	-(3-10)
1,5 - 2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5-2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Сорго (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе восковой спелости. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Люцерна (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7-10(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100 л/га	7-12(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Соя (товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
2,5 - 3,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)
3,0 - 4,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)
2,0 - 4,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7(1)	-(3)
2,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)

1,5 - 2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7(1)	-(3)
2,5 - 3,0	Морковь (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3-10)
2,0 - 3,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3-10)
1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3-10)
1,5 - 2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
3,0 - 4,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5-2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 4,0	Бобы кормовые (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в период, когда семена нижнего яруса бобов приобрели характерную для сорта окраску, семенной рубчик черный. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7-12(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1)	-(3)
2,0 - 3,0	Капуста (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)
1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10-12(1)	-(10)
2,0 - 3,0	Люцерна (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	7-10(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3)
1,5 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)

	1,5 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7-12(1)	-(3)	
	1,5 - 2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3)	
	2,0 - 4,0	Клевер красный ползучий (семенник и)	Десикация	Опрыскивание в период побурения 75-80% головок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	7(1-2)	-(3)	
	2,0	Картофель	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(3-10)	
	1,0 - 2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3-10)	
	2,0 - 3,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3-10)	
	1,5 - 2,0	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	7(1)	-(3)	

Дикват дибромида (в пересчете на дикват ион)

Дикват, ВРК (150 (80) г/л) ООО«ХИМАГРО-МАРК ЕТИНГ.РУ» ОГРН: 1023403447913 Ш/Ш 063-04-4243-1 28.01.2023 29.10.2033	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	Активен
Готланд, ВР (240 (128) г/л) ООО ТетраХим ОГРН: 1167746491681 Ш/Ш 642-04-3035-1 14.01.2021 15.03.2031	0,7-1,8	Горох	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 9-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	0,7-1,8	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	0,7-1,8	Картофель	Десикация	Опрыскивание в период формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	10(1)	-(10)	
	0,7-1,8	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	10(1)	-(10)	
	0,7-1,8	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	10(1)	-(10)	
	0,7-1,8	Рапс яровой	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	10(1)	-(10)	
Квад-Глоб, ВР (280 (150) г/л) Глобакем НВ	1,5-2	Соя (семенные и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-()	Активен

ОГРН: - П/П 586-04-4450-0 15.03.2024 14.03.2027	1,5-2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(-)	
Лост, ВР (150 (80) г/л) ООО «АГРОБИОРО РУС» ОГРН: 5077746795748 П/П 142-04-3958-1 20.01.2023 142-04-3958-1/472 472 19.01.2033	2,0	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	2,0-2,0	Зерновые колосовые культуры озимые и яровые (семенные посевы), за исключением овса	Десикация	Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0-2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
Диквабис, В (280 (150) г/л) ООО «АГРОМИР» ОГРН: 1187746148424 П/П 070-04-3460-1 29.12.2021 28.12.2031	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	Активен
	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	2,0	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	2	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
Полис, В (280 (150) г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-04-3485-1 21.01.2022 010-04-3485-1/456 456 20.01.2032	2,0	Соя	Десикация	Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее, чем за 10 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	Активен
	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2,0	Рапс озимый и яровой	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
Регулят Супер, ВР (280 (150) г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/П 097-04-3137-1	2	Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(2)	-(7)	Активен

21.05.2021 20.05.2031	1,5-2	Соя (семенные и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 10 дней до уборки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Картофель (продоволь ствен-ный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(7)	
	2	Соя (семенные и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Рапс яровой и озимый (семенник и и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Картофель (продоволь ствен-ный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(7)	
	2	Горох (на зерно)	Десикация	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 10 дней до уборки. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(7)	
	2	Картофель (сильно облиствен ные сорта) (продоволь ственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(2)	-(7)	
	2	Рапс яровой и озимый (семенник и и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(7)	
Скорпион Форте, ВР (280 (150) г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-04-4223-1 19.10.2023 18.10.2033	1,0-1,1	Горох	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	Активен
	1,0-1,1	Подсолнеч ник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	
	1,0-1,1	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	
	1,0-1,1	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	

Скорпион, ВР (150 (80) г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/П 085-04-4222-1 17.01.2023 18.10.2033	2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	18(1)	-(10)	Активен
	2,0	Рапс яровой	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	
Сейнер, ВРК (374 (200) г/л) ООО «Химагромакетинг» ОГРН: - П/П 064-04-4623-1 24.06.2024 23.06.2034	0,8 - 1,5	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзин (при влажности семян подсолнечника не более 30-35 %). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	Активен
	0,8 - 1,5	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзин (при влажности семян подсолнечника не более 30-35 %). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(10)	
	0,8 - 1,5	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего яруса (при влажности семян подсолнечника не более 35-40 %). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(10)	
	0,8 - 1,5	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего яруса (при влажности семян подсолнечника не более 35-40 %). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	
Тесло, ВР (280 (150) г/л) ООО «Агрорус и Ко» ОГРН: 1037739582825 П/П 184(026)-04-4560-1 07.05.2024 06.05.2034	1,5 - 2,0	Соя (семенные и товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(-)	Активен
	2,0	Картофель (продовольственный и семенной)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(-)	
	1,5 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(-)	
	1,5 - 2,0	Рапс яровой, рапс озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса.(в зависимости от типа распылителей) Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га	12(1)	-(-)	
	1,5 - 2,0	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 100 л/га	12(1)	-(-)	

карфентразон-этил

Буцефал, КЭ (480 г/л) ЗАО «ФМРус» ОГРН: 1097746208207 П/П 050-03(04)-2968-1 30.12.2020 29.12.2030	0,1-0,125	Подсолнечник (на семена и масло)	Десикация	Опрыскивание посевов в начале естественного созревания при побурении 70-80% корзинок (при влажности семян 25-30%). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(10)	Активен
	0,1-0,125	Картофель	Десикация	Опрыскивание посадок в период формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 250 л/га	10(1)	-(10)	
	0,1-0,125	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 70-75% стручков (при влажности семян 25-30%). Расход рабочей жидкости - 250 л/га	12(1)	-(10)	

	0,1-0,125	Картофель	Десикация	Опрыскивание посадок в период формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(10)	
	0,1-0,125	Подсолнечник (на семена и масло)	Десикация	Опрыскивание посевов в начале естественного созревания при побурении 70-80% корзинок (при влажности семян 25-30%). Расход рабочей жидкости - 250 л/га	12(1)	-(10)	
	0,1-0,125	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 70-75% стручков (при влажности семян 25-30%). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(10)	
Спотлайт Плюс, МЭ (60 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - П/П 058-04-2878-1 16.11.2020 15.11.2030	1,5	Картофель продовольственный и семенной (сильно облиственные сорта)	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	4(2)	-(-)	Активен
	1,0-1,5	Картофель продовольственный и семенной (низкорослые сорта)	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	4(1)	-(-)	
Сахара, КЭ (480 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 021-03(04)-3998-1 03.03.2023 02.03.2033	0,1 - 0,125	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 70-75 % стручков (при влажности семян 25-30 %). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3)	Активен
	0,06 - 0,125	Зерновые колосовые культуры	Десикация	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	12(1)	-(10)	
	0,1 - 0,125	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале естественного созревания при побурении 70-80 % корзинок (при влажности семян 25-30 %). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	0,1 - 0,125	Картофель	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	4(1)	-(10)	
	0,1 - 0,125	Рапс яровой и озимый	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 70-75 % стручков (при влажности семян 25-30 %). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	10(1)	-(10)	
	0,1 - 0,125	Картофель	Десикация	Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	4(1)	-(3)	
	0,06 - 0,125	Зерновые колосовые культуры	Десикация	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	12(1)	-(3)	
	0,1 - 0,125	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание посевов в начале естественного созревания при побурении 70-80 % корзинок (при влажности семян 25-30 %). Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	10(1)	-(3)	

Нематицид

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Аверсектин С + Аверсектин С + Аверсектин С

<p>ФитOVERM, КЭ, П (10 г/л + 2 г/л + 8 г/кг) ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 III/III, ООО НБЦ «Фармбиомед» ОГРН: - III/III, ООО АгроЭко ОГРН: 1175007003049 III/I 045-05-194-1 18.12.2013 02.12.2034</p>	18 г/лунку	Томат и огурец защищенного и открытого грунта	Галловые нематоды	В период вегетации при замене пораженных растений. Внесение в лунку и перемешивание с почвой. Период защитного действия – не менее двух недель.	-(1)	-(-)	Активен
	50 г/м2	Томат и огурец защищенного и открытого грунта	Галловые нематоды	За 1-3 дня до высадки рассады равномерное рассыпание по поверхности почвы и перемешивание любыми ротационными машинами на глубину 10-15 см. Период защитного действия – не менее двух месяцев.	-(1)	-(-)	
	94 г/м2	Томат и огурец защищенного и открытого грунта	Галловые нематоды	За 1-3 дня до высадки рассады равномерное рассыпание по поверхности почвы и перемешивание любыми ротационными машинами на глубину 25-30 см. Период защитного действия – не менее четырех месяцев.	-(1)	-(-)	

Оксамил

<p>Видат 5Г, Г (50 г/кг) ООО «Дюпон Наука и Технологии» ОГРН: - II/II 029-05-1929-1 28.05.2018 27.05.2028</p>	40-80	Свёкла сахарная	Свекловичная цистообразующая нематода, комплекс паразитических нематод (в том числе проникающая короткотелая нематода, северная галловая нематода)	Сплошное внесение перед посевом с заделкой в почву	56(1)	-(1)	Активен
	40-80	Морковь (кроме раннеспелых сортов)	Комплекс паразитических нематод (в том числе голловая нематода, проникающая короткотелая нематода)	Сплошное внесение перед посевом с заделкой в почву	60(1)	-(1)	
	40	Лук (кроме лука на перо)	Комплекс паразитических нематод (в том числе стеблевая нематода, проникающая короткотелая нематода)	Рядковое внесение одновременно с посадкой	60(1)	-(1)	
	80	Лук (кроме лука на перо)	Комплекс паразитических нематод (в том числе стеблевая нематода, проникающая короткотелая нематода)	Сплошное внесение перед посадкой с заделкой в почву	60(1)	-(1)	
	40-80	Картофель	Золотистая картофельная нематода, стеблевая картофельная нематода	Сплошное внесение перед посадкой с заделкой в почву	60(1)	-(1)	
	20	Картофель	Золотистая картофельная нематода, стеблевая картофельная нематода	Рядковое внесение одновременно с посадкой	60(1)	-(1)	

	20	Свёкла сахарная	Свекловичная цистообразующая нематода, комплекс паразитических нематод (в том числе проникающая короткотелая нематода, северная галловая нематода)	Рядковое внесение одновременно с посевом	56(1)	-(1)	
Палица, Г (50 г/кг) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 И/И 197-05-3517-1 05.03.2022 04.03.2032	20	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Золотистая картофельная нематода, стеблевая картофельная нематода	Рядковое внесение одновременно с посадкой	60(1)	-(-)	Активен
	40-80	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Золотистая картофельная нематода, стеблевая картофельная нематода	Сплошное внесение перед посадкой с заделкой в почву	60(1)	-(-)	

Флуопирам

Веранго, КС (400 г/л) Байер КронСайенс АГ ОГРН: - И/И 019-02(05)-4372-1 30.01.2024 29.01.2034	0,8-1,2	Картофель	Стеблевая нематода	Обработка почвы при посадке Расход рабочей жидкости - 60-100 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,8+1,2	Картофель	Стеблевая нематода	Обработка почвы при посадке Расход рабочей жидкости - 60-100 л/га	60(1)	-(3)	

штамм Arthrobotrys oligospora F-1303

Нематофагин-Микопро, Г (3x10^6 спор/г) ООО Микопро ОГРН: 1135476142152 И/И 825-05-3758-1 15.07.2022 14.07.2032	5	Картофель	Стеблевая (клубневая) нематода, Северная галловая нематода	Обработка клубней во время посадки Расход рабочей жидкости - 90 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	10	Картофель	Стеблевая (клубневая) нематода, Северная галловая нематода	Обработка клубней и дна борозды во время посадки Расход рабочей жидкости - 90 л/га	-(1)	-(-)	

Родентицид

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Бродифакум

Килмайс, ТБ, ТБ (0,05 г/кг) ООО НПО «Гарант» ОГРН: - И/И 962-06-4809-1 11.03.2025 10.03.2035	от 1 брикета (5 г) до 10 (50 г) брикетов в приманочный ящик или трубку	На всех культурах открытого и защищенного грунта, включая зерновые яровые и озимые, культуры, в том числе гречиха; полевые культуры	Полевка обыкновенная, полевка восточноевро-пейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая, полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы ¶и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработка не зависимо от сезона от начала заселения до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы до 400 нор/га. Обеспечение недоступности ¶к препарату детей, домашних животных, диких нецелевых птиц ¶и зверей. 1-2 обработки за сезон, интервал между обработками ¶14 дней, не более двух обработок в течение месяца. Контроль ¶за наличием	-(1-2)	-(-)	Активен
---	--	---	--	--	--------	------	---------

	1 брикет (5 г) в нору, или иную укрытую точку раскладки	На всех культурах открытого и защищенного грунта, включая зерновые яровые и озимые, культуры, в том числе гречиха; полевые культуры	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработка не зависит от сезона от начала заселения до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы до 400 нор/га. Обеспечение недоступности к препарату детей, домашних животных, диких нецелевых птиц и зверей. 1-2 обработки за сезон, интервал между обработками 14 дней, не более двух обработок в течение месяца. Контроль за наличием	-(1-2)	-(-)	
	от 1 брикета (5 г) до 10 (50 г) брикетов в приманочный ящик или трубку	На всех культурах открытого и защищенного грунта, включая зерновые яровые и озимые, культуры, в том числе гречиха; полевые культуры	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая, полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработка не зависит от сезона от начала заселения до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы до 400 нор/га. Обеспечение недоступности к препарату детей, домашних животных, диких нецелевых птиц и зверей. 1-2 обработки за сезон, интервал между обработками 14 дней, не более двух обработок в течение месяца. Контроль за наличием приманки в местах	-(1-2)	-(-)	
Антимышин, Г (2,5 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 П/- 126-06-3845-1 27.10.2022 26.10.2032	1 - 4 кг/га, 10 г/нору при плотности заселения 10 - 400 нор/га	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточно-европейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лушеним овсом, резаным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га при защите плодовых и других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели не	-(1-2)	-(-)	Активен
	10-20 г/нору, укрытия, 50 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лушеним овсом, резаным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами). От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление приманки по мере ее поедания грызунами в течение 2-х недель. При контроле всех грызунов – чередование с препаратами иного механизма действия. В	-(1-2)	-(-)	
Варат, Г, МБ, ТБ (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - П/-, ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - П/-, ООО «Валбрента Кемикалс»	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в том числе гречиха; прочие полевые культуры, в том числе овощные	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в	-(1)	-(-)	Активен

ОГРН: -
П/-
141-06-3619-1
12.04.2022
11.04.2032

5 г в нору или иную укрывную точку раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в том числе гречиха; прочие полевые культуры, в том числе овощные	Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м	-(1)	-(-)
5 г в нору или иную укрывную точку раскладки, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в том числе гречиха; прочие полевые культуры, в том числе овощные	Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)
2 брикета (7,2 г) в нору, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)
10 г в нору, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в том числе гречиха; прочие полевые культуры, в том числе овощные	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в	-(1)	-(-)
от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ ие, масличные	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием	-(1)	-(-)

1 брикет (3,6 г) в нору или иную укрытую точку раскладки, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желто-горлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)
1 брикет (13 г) в нору, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием	-(1)	-(-)
1 брикет (13 г) на две близко расположенные норы или иные укрытые точки раскладки, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием	-(1)	-(-)
от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием	-(1)	-(-)
от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в том числе гречиха; прочие полевые культуры, в том числе овощные	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в	-(1)	-(-)

1 брикет(13 г) на две близко расположенные норы или иные укрытые точки раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые, в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка обыкновенная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорл	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. <u>Контроль за наличием</u>	-(1)	-(-)
10 г в нору, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в том числе гречиха; прочие полевые культуры, в том числе овощные	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м	-(1)	-(-)
1 брикет(13 г) на две близко расположенные норы или иные укрытые точки раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка обыкновенная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорл	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. <u>Контроль за наличием</u>	-(1)	-(-)
1 брикет (13 г) в нору, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия <u>Контроль за наличием</u>	-(1)	-(-)
от 5 до 30 г в приманочный ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)

	2 брикета (7,2 г) в нору, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)	
	от 5 до 30 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)	
	1 брикет (3,6 г) в нору или иную укрытую точку раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)	
<p>Килрат Супер, Г (2,5 г/л) ООО ГК «ЗемлякоФФ» ОГРН: 1037724060560 Ш/- 192-06-3351-1 25.10.2021 24.10.2031</p>	20 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Водяная полевка	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклы сахарной или яблоками), внесение приманки в норы, другое укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели не	-(1)	-(-)	Активен
	20 мл/кг приманки, до 4кг/га, 10 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточно-европейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклы сахарной или яблоками), внесение приманки в норы, другое укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели не	-(1)	-(-)	

	10-20 г/ норы, укрытия, до 50 г в трубки и приманочные ящики	Помещение различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклы сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами). От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление приманки по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. При контроле всех грызунов чередование с препаратами иного механизма	-(-)	-(-)	
Клерат, Г (0,05 г/кг) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 П/- 041-01-1039-1 05.03.2016 14.03.2026	10 г в нору при наземном обитании (весной и летом), 20 г во вскрытую нору, на каждые 3-5 земляных холмиков (осенью и зимой)	Все культуры	Водяная полевка	Ручная обработка (аппликаторами ложечного или трубчатого типов): раскладка в норы, укрытия, трубки, приманочные ящики независимо от сезона или плотности заселения обыкновенной, восточноевропейской, рыжей полевками от начала заселения до 600 норм/га, против водяной полевки и серой крысы до 300 нор/га, в условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих	-(-)	-(-)	Активен
	10 г приманки в норму или иную точку раскладки	Помещение различного назначения и прилегающие территории	Крыса серая	Ручная обработка (аппликаторами ложечного или трубчатого типов): раскладка в норы, укрытия, трубки, приманочные ящики независимо от сезона или плотности заселения обыкновенной, восточноевропейской, рыжей полевками от начала заселения до 600 норм/га, против водяной полевки и серой крысы до 300 нор/га, в условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих	-(-)	-(-)	
	До 3 кг/га, 5 г в нору или иную точку раскладки, до 50 г в приманочный ящик или трубку	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, плодовые и другие культуры	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, общественная, рыжая, мышь домовая	Ручная обработка (аппликаторами ложечного или трубчатого типов): раскладка в норы, укрытия, трубки, приманочные ящики независимо от сезона или плотности заселения обыкновенной, восточноевропейской, общественной, рыжей полевками от начала заселения до 600 нор/га, в условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих территориях - добавление гранул	-(-)	-(-)	
Курант, Г (2,5 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 П/- 085-06-3803-1 23.09.2022 22.09.2032	20 мл/кг приманки, 4 кг/га, 10 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточно-европейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели не	-(1)	-(-)	Активен

	20 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Водяная полевка	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели не	-(1)	-(-)	
	10-20 г/нору, укрытия, 50 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами). От начала заселения, от 3-х до 5 метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление приманки по мере ее поедания грызунами в течение 2-х недель. При контроле всех грызунов чередование с препаратами иного механизма действия. В	-(1)	-(-)	
Раттикум, Г (2,5 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - И/- 141-06-3336-1 19.10.2021 18.10.2031	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку	Культуры в защищенном грунте; хранящиеся в помещениях различного назначения	Против всех видов целевых грызунов	Укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и типа грызунов; контроль за наличием приманки в местах раскладки производить 1-2 раза в неделю с перерывами 2-3 дня между раскладками. Обеспечение недоступности к препарату (и родентицидной приманки в состав которых он	-(1)	-(-)	Активен
	10 г родентицидной приманки в нору, до 2х кг родентицидной приманки на 1 га	Культуры в защищенном грунте; хранящиеся в помещениях различного назначения	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и типа грызунов; контроль за наличием приманки в местах раскладки производить 1-2 раза в неделю с перерывами 2-3 дня между раскладками. Обеспечение недоступности к препарату (и родентицидной приманки в состав которых он	-(1)	-(-)	
	20 мл на 1 кг родентицидной приманки, 5 г родентицидной приманки в нору или иную укрытую точку раскладки, до 2х кг родентици	Культуры в защищенном грунте; хранящиеся в помещениях различного назначения	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и типа грызунов; контроль за наличием приманки в местах раскладки производить 1-2 раза в неделю с перерывами 2-3 дня между раскладками. Обеспечение недоступности к препарату (и родентицидной приманки в состав которых он	-(1)	-(-)	

Бродифакум Гранд, Г (0,05 г/кг) ООО НПО «РАХ» ОГРН: 1037706005050 И/- 004-06-5002-1 23.07.2018 22.07.2028	До 4 кг/га, 10 г/нору	Все культуры открытого грунта (включая озимые зерновые, плодовые культуры, многолетн ие травы)	Полевки: обыкновенная и восточноевропейская	Ручное внесение специальными аппликаторами в норы, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели, не более 2-х обработок подряд в течение одного сезона. Пестициды других групп своим запахом и вкусом могут ухудшить поедание приманки грызунами. Одновременное применение с родентицидами другого механизма действия нецелесообразно.	-(1-2-)	-(-)	Активен
Морторат, Г (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - И/- 141-06-3437-1 22.12.2021 21.12.2031	10 г в нору, 0,2 кг/100 м2	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в	-(1)	-(-)	Активен
	10 г в нору, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в	-(1)	-(-)	
	от 5 до 40 г в приманочн ый ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в	-(1)	-(-)	
	от 5 до 40 г в приманочн ый ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в	-(1)	-(-)	

	5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м	-(1)	-(-)	
	5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 0,2 кг/100 м2	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без замены другим препаратом. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в	-(1)	-(-)	
Изоцин БФК, Г (2 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/- 018-06-2015-1 10.10.2018 09.10.2028	до 50 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие к ним территории	Домовая мышь	Перемешивание препарата с приманочным продуктом (пшеницей, лущенным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами).Раскладывание приманки в приманочные ящики, трубки путем ручного внесения специальными аппликаторами в местах обитания грызунов – под укрытиями, вдоль стен, перегородок.От начала заселения от 3-х до 5-ти метров	-(-)	-(-)	Активен
	до 50 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие к ним территории	Серая крыса	Перемешивание препарата с приманочным продуктом (пшеницей, лущенным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами).Раскладывание приманки в приманочные ящики, трубки путем ручного внесения специальными аппликаторами в местах обитания грызунов – под укрытиями, вдоль стен, перегородок.От начала заселения от 3-х до 5-ти метров	-(-)	-(-)	
	10 г приманки/нору, укрытия	Помещения различного назначения и прилегающие к ним территории	Домовая мышь	Перемешивание препарата с приманочным продуктом (пшеницей, лущенным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами).Раскладывание приманки в приманочные ящики, трубки путем ручного внесения специальными аппликаторами в местах обитания грызунов – под укрытиями, вдоль стен, перегородок.От начала заселения от 3-х до 5-ти метров	-(-)	-(-)	

10 г приманки/ Нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, древесно-кустарниковые	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, общественная, рыжая и мышевидные грызуны-вредители	Перемешивание препарата с приманочным продуктом – 20-30 мл/кг приманки (зерно пшеницы, лущеный овес, подсолнечник, 1-2 см кубики моркови, картофеля, сахарной свеклы, тыквы, яблока), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики путем ручного внесения специальными аппликаторами независимо от сезона при плотности заселения от начала заселения до 600 нор/га, по мере необходимости с	-(-)	-(-)
до 6 кг приманки/ га	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, древесно-кустарниковые	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, общественная, рыжая и мышевидные грызуны-вредители	Перемешивание препарата с приманочным продуктом – 20-30 мл/кг приманки (зерно пшеницы, лущеный овес, подсолнечник, 1-2 см кубики моркови, картофеля, сахарной свеклы, тыквы, яблока), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики путем ручного внесения специальными аппликаторами независимо от сезона при плотности заселения от начала заселения до 600 нор/га, по мере необходимости с	-(-)	-(-)
20 г приманки/ нору, укрытия	Помещения различного назначения и прилегающие к ним территории	Серая крыса	Перемешивание препарата с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резанным картофелем, морковью, свеклой сахарной или яблоками, мясными и рыбными продуктами). Раскладывание приманки в приманочные ящики, трубки путем ручного внесения специальными аппликаторами в местах обитания грызунов – под укрытиями, вдоль стен, перегородок. От начала заселения от 3-х до 5-ти метров	-(-)	-(-)
20 г приманки/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, древесно-кустарниковые	Водяная полевка, слепыш обыкновенный, хомяк обыкновенный	Перемешивание препарата с приманочным продуктом – 20-30 мл/кг приманки (зерно пшеницы, лущеный овес, подсолнечник, 1-2 см кубики моркови, картофеля, сахарной свеклы, тыквы, яблока), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики путем ручного внесения специальными аппликаторами независимо от сезона при плотности заселения от начала заселения до 600 нор/га, по мере необходимости с	-(-)	-(-)

Бродифакум + Бродифакум

Дедмайс, Г (0,05 г/кг + 2,5 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 П/-, ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 П/-, 097-06-3885-1 25.11.2022 22.10.2033	10 г в нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, плодовые культуры	Полевки: обыкновенная, восточно-европейская, общественная	Ручное внесение приманки специальными аппликаторами в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики при плотности заселения обыкновенной, общественной, восточноевропейской полевки от 10-20 нор/га до 400 нор/га (по 10 г приманки в нору) и водяной полевки – от 10-20 до 200 нор/га (по 20 г приманки в нору) при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели	-(1-2)	-(-)	Активен
--	-------------	--	---	---	--------	------	---------

20 мл/кг приманки	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы	Водяная полевка	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га (для обыкновенной, восточно-европейской и общественной полевки) и от 10-20 нор/га до 200 нор/га (для водяной полевки). при защите	-(1)	-(-)
20 г на нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, плодовые культуры	Водяная полевка	Ручное внесение приманки специальными аппликаторами в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики при плотности заселения обыкновенной, общественной, восточноевропейской полевки от 10-20 нор/га до 400 нор/га (по 10 г приманки в нору) и водяной полевки – от 10-20 до 200 нор/га (по 20 г приманки в нору) при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели	-(1-2)	-(-)
4 кг/га	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы	Обыкновенная, восточно-европейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га (для обыкновенной, восточно-европейской и общественной полевки) и от 10-20 нор/га до 200 нор/га (для водяной полевки). при защите	-(1)	-(-)
10 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы	Обыкновенная, восточно-европейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га (для обыкновенной, восточно-европейской и общественной полевки) и от 10-20 нор/га до 200 нор/га (для водяной полевки). при защите	-(1)	-(-)
20 мл/кг приманки	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы	Обыкновенная, восточно-европейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га (для обыкновенной, восточно-европейской и общественной полевки) и от 10-20 нор/га до 200 нор/га (для водяной полевки). при защите	-(1)	-(-)

	4 кг/га	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы	Водяная полевка	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га (для обыкновенной, восточно-европейской и общественной полевки) и от 10-20 нор/га до 200 нор/га (для водяной полевки). при защите	-(1)	-(-)	
	4,0 кг/га	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, покосы, пастбища, плодовые культуры	Полевки: обыкновенная, восточно-европейская, общественная	Ручное внесение приманки специальными аппликаторами в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики при плотности заселения обыкновенной, общественной, восточноевропейской полевки от 10-20 нор/га до 400 нор/га (по 10 г приманки в нору) и водяной полевки – от 10-20 до 200 нор/га (по 20 г приманки в нору) при защите плодовых или других культур – от начала заселения по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели	-(1-2)	-(-)	
	20 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы	Водяная полевка	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, лущеным овсом, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га (для обыкновенной, восточно-европейской и общественной полевки) и от 10-20 нор/га до 200 нор/га (для водяной полевки). при защите	-(1)	-(-)	

Бромадиолон

<p>Норат, Г (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - П/- 141-06-3560-1 22.03.2022 21.03.2032</p>	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)	Активен
	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)	

	10 г в нору, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)	
	10 г в нору, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)	
	5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)	
	5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточноевро-пейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)	
Раттидион, Г (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - П/- 141-06-3542-1 18.03.2022 17.03.2032	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)	Активен

5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточноевро-пейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)
от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)
10 г в нору, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)
5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 2 кг/га	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и	-(1)	-(-)
10 г в нору, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, техническ	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Контроль за наличием приманки проводить 1-2 раза в неделю с перерывом 2-3 дня	-(1)	-(-)

Бром-БД, Г (2,5 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - I/- 141-06-3616-1 12.04.2022 11.04.2032	20 мл на 1 кг родентици дной приманки, 5 г родентици дной приманки нору или иную укрытую точку раскладки, до 2х кг родентици	Культуры в защищен ом грунте; хранящие я запасы, помещени я различног о назначения	Полевка обыкновенная, полевка восточно-европейска я, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены приманочной основы. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в	-(1)	-(-)	Активен
	10 г родентици дной приманки в нору, до 2-х кг родентици дной приманки на 1 га	Культуры в защищен ом грунте; хранящие я запасы, помещени я различног о назначения	Полевка водяная, крыса серая	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены приманочной основы. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в	-(1)	-(-)	
	от 5 до 40 г родентици дной приманки в приманочн ый ящик или трубку	Культуры в защищен ом грунте; хранящие я запасы, помещени я различног о назначения	Против всех видов целевых грызунов	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены приманочной основы. В последствии в течение нескольких месяцев с использованием препаратов иного механизма действия. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в	-(1)	-(-)	

Регуляторы роста растений

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применени я препарата (л/га, кг/га)	Культура, обработыв аемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизи рованных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

-аланин + -глутаминовая кислота + 3-индолилуксусная кислота

Агат-25 Супер, ТПС (60 мг/кг + 70 мг/кг + 18 мг/кг) ООО «НЭЛЖ» ОГРН: 1137746504565 IV/III 471-07-1781-1 05.03.2018 04.03.2028	1-3 г/10 л воды(Л)	Цветочно- декоративн ые культуры (горшечны е)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств растений	Опрыскивание или полив растений 2 раза в месяц при опрыскивании Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(2)	-(-)	Активен
--	-----------------------	--	--	---	------	------	---------

4-7 г/кг	Огурец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
14 г/ л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
100 г/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
0,4 мг/3 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 листьев , 2-е - в фазе рыхлого кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
1-3 г/10 л воды	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Опрыскивание растений в первой половине вегетационного сезона двукратно с интервалом 14-18 дней (куст) Расход рабочей жидкости - 2 л/куст	-(2)	-(-)

106-135 г/т	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-3 г/10 л воды(Л)	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Опрыскивание растений в первой половине вегетационного сезона двухкратно с интервалом 14-18 дней (куст) Расход рабочей жидкости - 2 л/куст	-(2)	-(-)
14 г/га	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе смыкания ботвы в рядках Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
200 г/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	-(-)
30-40 г/т	Пшеница яровая, пшеница озимая, рожь озимая, ячмень яровой, овес	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
25-30 г/га	Пшеница яровая, пшеница озимая, рожь озимая, ячмень яровой, овес	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения - выхода в трубку, 2-е - в фазе флаг лист - колошение Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

135 г/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
7 г/л воды	Земляника	Повышение приживаемости, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, увеличение выхода посадочного материала	Обмакивание корневой системы рассады перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/20-30 растений	-(1)	-(-)
30-40 г/га	Лен - долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе «елочки», 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
30 г/га	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала цветения (раскрытия корзинок) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1-1,5 г/100 мл воды(Л)	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 мл/100 г	-(1)	-(-)

10 г/кг	Эхинаacea пурпурная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
135-162 г/т	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
14 г/га	Перец	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
15 г/га	Эхинаacea пурпурная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
4-7 г/л воды(Л)	Огурец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)

106-135 г/т	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
4-7 г/л воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)
140 мг/3 л воды(Л)	Огурец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
1-3 г/10 л воды	Цветочно-декоративные культуры (горшечные)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств растений	Опрыскивание или полив растений 2 раза в месяц при опрыскивании Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(2)	-(-)
14 г/га	Огурец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

3,5 г/л воды(Л)	Томат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)
14 г/га	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
40 мг/л воды(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 6 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)
4-7 г/кг	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
30 г/га	Рапс	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

40-50 г/т	Лен - долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)
40 г/га	Капуста белокочан ная (семенник и)	Повышение приживаемости, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности	Опрыскивание растений перед цветением Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
200 г/т	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50-300 г/га	Цветочные культуры	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, ускорение наступления периода цветения, увеличение выхода цветочной продукции, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1- е - в начале вегетации, 2-е - в период бутонизации - начала цветения Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(2)	-(-)
40-50 г/т	Рапс	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-3 г/10 л воды(Л)	Декоратив ные культуры (деревья и кустарник и)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Опрыскивание растений в первой половине вегетационного сезона двухкратно с интервалом 14-18 дней (дерево высотой 5-10 м) Расход рабочей жидкости - 10 л/дерево	-(2)	-(-)

2 г/10 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(-)
1-3 г/10 л воды(Л)	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Опрыскивание растений в первой половине вегетационного сезона двухкратно с интервалом 14-18 дней (дерево высотой 10-20 м) Расход рабочей жидкости - 20 л/дерево	-(2)	-(-)
1-3 г/10 л воды	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Опрыскивание растений в первой половине вегетационного сезона двухкратно с интервалом 14-18 дней (дерево высотой 10-20 м) Расход рабочей жидкости - 20 л/дерево	-(2)	-(-)
7 г/кг	Томат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
140 мг/3 л воды(Л)	Перец	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
7 г/л воды	Земляника	Повышение приживаемости, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, увеличение выхода посадочного материала	Обмакивание корневой системы рассады перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/20-30 растений	-(1)	-(-)

40 мг/кг	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
40 г/га	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 листьев , 2-е - в фазе рыхлого кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1-3 г/10 л воды	Декоратив ные культуры (деревья и кустарник и)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Опрыскивание растений в первой половине вегетационного сезона двухкратно с интервалом 14-18 дней (дерево высотой 5-10 м) Расход рабочей жидкости - 10 л/дерево	-(2)	-(-)
140 мг/3 л воды(Л)	Томат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
140 мг/3 л воды(Л)	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе смыкания ботвы в рядках Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)

7 г/л воды(Л)	Земляника	Повышение приживаемости, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, увеличение выхода посадочного материала	Обмакивание корневой системы рассады перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/20-30 растений	-(1)	-(-)
100-150 мг/кг	Сосна, ель, лиственница	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
140 мг/3 л воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
1 г/4 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)
14 г/га	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе смыкания ботвы в рядках Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

	40 г/120 шт.	Капуста белокочанная (семенники)	Повышение приживаемости, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности	Обмакивание семенников перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/120 шт	-(1)	-(-)	
	500 мг/л воды	Ель (саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 1 час Расход рабочей жидкости - 1 л/50 растений	-(1)	-(-)	
	1-3 г/10 л воды(Л)	Цветочные культуры	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, ускорение наступления периода цветения, увеличение выхода цветочной продукции, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале вегетации, 2-е - в период бутонизации - начала цветения Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(2)	-(-)	
	14 г/га	Томат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	

1-метилциклопропен

ПроФреш, П (30 г/кг) ООО ПРОФРЕШГРУПП ОГРН: 1225000040880 III/- 921-07-4467-1 19.03.2024 18.03.2034	0,05-0,3 г/м3	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2°C в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая	-(1)	через 15 мин(через 15 мин)	Активен
СмартФреш ПроТабс, ТАБ (20 г/кг) АГРОФРЕШ Инк. ОГРН: - III/- 741-07-3240-1 21.07.2021 20.07.2031	1 таблетка розового цвета СмартФреш ПроТабс (массой 0,84 г, с содержанием 1-метилциклопропена - 0,017 г/табл.) + 8 таблеток СмартФреш	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов, побурения, маслянистости), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой	-(1)	-(-)	Активен

	1 таблетка желтого цвета СмартФре ш ПроТабс (массой 4,2 г, с содержани ем 1-метил-ци клопропен а - 0,084 г/табл.) + 40 таблеток СмартФре	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности консистенции мякоти плодов, побурения, маслянистости), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой	-(1)	-(-)	
Фитомаг-Пак, П (0,5 г/кг) ООО «ФитомагИнтер» ОГРН: 1107746188395 IV/- 163-07-3464-1 02.10.2020 01.10.2030	1 пакет/12-1 8 кг	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов яблоня	-(1)	-(-)	Активен
Фреш Форма, П (35 г/кг) ООО «Фреш Форма» ОГРН: 5077746421792 IV/III 456-07-1623-1 21.11.2017 20.11.2027	0,5-0,15 г/м3	Яблоня (плоды)	Ингибирование процессов послеуборочного созревания и старения плодов, повышение сохранности и товарных качеств плодов, продление сроков хранения продукции	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2°C в течение 24 часов не позднее чем через 2-7 дней после сбора урожая	-(1)	через 15 минут после проветри-в ания(через 15 минут после проветри-в ания)	Активен
Харвест Смарт, П (33 г/кг) ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» ОГРН: - IV/- 825-07-3752-1 11.07.2022 10.07.2032	0,05-0,2 г/м3	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1-2 °C в течение 12-24 часов не позднее чем через 7 дней после сбора урожая	-(1)	-(-)	Активен

1-метилциклопропен + 1-метилциклопропен

Фитомаг, ТАБ, П (15 г/кг + 30 г/кг) ООО «ФитомагИнтер» ОГРН: 1107746188395 IV/-, ООО «ФитомагИнтер» ОГРН: 1107746188395 IV/- 163-07-2834-1 02.10.2020 22.11.2033	1 таблетка (20 г)/9,8 т (49 м3 объема камеры)	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1 до +15°C в течение 24 часов не позднее чем через 7 дней после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 500-600 мл/9,8 т (49 м3 объема камеры)	-(1)	через 15 минут после проветри-в ания(через 15 минут после проветри-в ания)	Активен
	0,05-0,2 г/м3 объема камеры(ил и 0,25-1 г/т плодов)	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов яблоня в холодильной герметичной камере при температуре от +1 до +15°C в течение 24 часов перед закладкой на хранение или транспортировкой не позднее чем через 7 дней после сбора урожая	-(1)	через 15 минут после проветри-в ания(через 15 минут после проветри-в ания)	

	1 таблетка (10 г)/4,9 т (24,5 м3 объема камеры)	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1 до +15°С в течение 24 часов не позднее чем через 7 дней после сбора урожая (24,5 м3 объема камеры) Расход рабочей жидкости - 250-300 мл/4,9 т (24,5 м3 объема камеры)	-(1)	через 15 минут после проветривания(через 15 минут после проветривания)	
	1 таблетка (40 г)/19,6 т (98 м3 объема камеры)	Яблоня (плоды)	Торможение процессов послеуборочного созревания и старения плодов, сохранение товарных качеств яблок (твердости, плотности, консистенции мякоти плодов), продление сроков хранения	Обработка плодов перед закладкой на хранение или транспортировкой в холодильной герметичной камере при температуре +1 до +15°С в течение 24 часов не позднее чем через 7 дней после сбора урожая (98 м3 объема камеры) Расход рабочей жидкости - 1000-1200 мл/19,6 т (98 м3 объема камеры)	-(1)	через 15 минут после проветривания(через 15 минут после проветривания)	

1-нафтилуксусная кислота

Обстормон, ВР (75 г/л) ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» ОГРН: 1177746516210 III/III 778-07-3841-1 26.10.2022 25.10.2032	0,2-0,4	Яблоня	Предотвращение предуборочного опадения плодов, частичное улучшение окраски	Опрыскивание растений за 14 дней до предполагаемой даты уборки плодов Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	0,2-0,3	Яблоня	Химическое прореживание завязи	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – в конце фазы опадения лепестков, 3-е – в фазе образования и развития завязей (диаметр завязи 8-11 мм) Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	1(1)	

1-хлорметилсилатран + Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль

Энергия-М, КРП, ТАБ (95 г/кг + 855 г/кг) ООО «Флора-Си» ОГРН: - III/III 124-07-1881-1 26.04.2018 25.04.2028	15 г/га	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации - начала цветения первой кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	Активен
	1 табл./ 100 мл воды(Л)	Баклажан	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)	

1,5 табл./3 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полной листовой розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
15 г/т	Соя	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./100 мл воды(Л)	Перец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
10 г/га	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 г/кг	Перец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

1 табл./3 л воды(Л)	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
2 табл./л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (саженцы)	Повышение приживаемости	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 6-8 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/шт	-(1)	-(-)
1 табл./200 мл воды	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
10 г/га	Лук репчатый (чернушка)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./3 л воды(Л)	Лук репчатый (чернушка)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)

1 табл./3 л воды(Л)	Лук репчатый (севок)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
1 табл./3 л воды(Л)	Редис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений в фазе 3-5 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
1 табл./500 мл воды(Л)	Виноград (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости	Замачивание черенков перед посадкой на 8-12 часов Расход рабочей жидкости - 500 мл/50 шт	-(1)	-(-)
1,5 табл./3 л воды(Л)	Перец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
10 г/га	Лен	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
10 г/га	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, рожь озимая, овес	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, морозостойкости (для озимых культур), устойчивости растений к болезням и к температурному и водному стрессам (жара и засуха). Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Опрыскивание растений в фазе кущения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

15 г/га	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
5 г/т	Рапс	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./100 мл воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
4 табл./л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
4-5 г/т	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой, рожь озимая, овес	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, морозостойкости (для озимых культур), устойчивости растений к болезням и к температурному и водному стрессам (жара и засуха). Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

1 г/кг	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 30-40 мин Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
4 г/т	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(-)	-(-)
60 г/га	Плодовые культуры (семечковые, косточковые)	Снижение осыпания завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе опадения лепестков, 3-е - в фазе образования завязей Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)
1,5 табл./3 л воды(Л)	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
2 г/кг	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

1 г/кг	Капуста цветная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
10 г/га	Свекла сахарная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е – в фазе - 8-10 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Капуста цветная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 г/кг	Баклажан	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
15 г/га	Капуста цветная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полной листовой розетки, 2-е - в фазе формирования головки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

1 г/кг	Капуста белокочан ная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
20 г/т	Подсолнеч ник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 г/га	Рапс	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
2 табл./ 100 мл воды(Л)	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
2 табл./8 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(3)	-(-)

15 г/га	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1,5 табл./3 л воды(Л)	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
15 г/га	Капуста белокочан ная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полной листовой розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)
1,5 табл./3 л воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации - начала цветения первой кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)

2 г/кг	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
10 г/га	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 6-8 листьев Расход рабочей жидкости - 250 л/га	-(1)	-(-)
15 г/т	Лен	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5 г/т	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
6 табл./ 10 л воды(Л)	Плодовые культуры (семечков ые, косточков ые)	Снижение осыпания завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе опадения лепестков, 3-е - в фазе образования завязей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	-(-)

1 г/кг	Редис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
15 г/га	Баклажан	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
10 г/га	Лук репчатый (севок)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
10 г/га	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
20 г/т	Свекла сахарная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

20 г/га	Подсолнечник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 листьев, 2-е - в фазе начала формирования корзинки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
2 табл./3-5 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3-5 л/100 м ²	-(2)	-(-)
1 г/кг	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1,5 табл./3 л воды	Капуста цветная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полной листовой розетки, 2-е - в фазе формирования головки Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
20 г/га	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

1 г/кг	Лук репчатый (чернушка)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./100 мл воды(Л)	Редис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
5 г/т	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./200 мл воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 30-40 мин Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
10-15 г/га	Соя	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

	10 г/га	Редис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений в фазе 3-5 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	15 г/га	Перец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	1 табл./ 100 мл воды(Л)	Лук репчатый (чернушка)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)	

1Н-индолил-3-этановой кислоты + 1Н-индолил-3-этановой кислоты + 1Н-индолил-3-этановой кислоты

<p>Гетероауксин, ВРП, ТАБ, П (780 г/кг + 50 г/кг + 695 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/П, ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 ПП/-, ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/П 046-07-1247-1 05.10.2016 04.10.2026</p>	0,2 г/10 л воды	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период распускания почек; 2-й – осенью, в период пожелтения листьев Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(2)	-(-)	Активен
	20-30 г/л воды(Л)	Виноград	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание базальной части привоя и верхней части подвоя перед прививкой на 2-3 секунды Расход рабочей жидкости - 100 мл/ 50 шт	-(1)	-(-)	
	0,5 г/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)	
	4 г/ л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки одревесневшие, полуодревесневшие, зеленые)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/ 50 шт	-(1)	-(-)	

0,5 г/10 л воды(Л)	Овощные культуры (томат, огурец, капуста, лук, кабачок, перец сладкий) (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)
4 г/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/50 шт	-(1)	-(-)
0,2 кг/га	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период образования розетки; 2-й – через 30-35 дней после сбора урожая (3-я декада августа) Расход рабочей жидкости - 10000 л/га	-(2)	-(-)
0,2 г/10 л воды	Ягодные культуры (смородина, крыжовник, малина)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период распускания почек; 2-й – осенью, в период пожелтения листьев Расход рабочей жидкости - 5 л/растение	-(2)	-(-)
0,5 кг/га	Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста, лук, кабачки, перец сладкий (рассада))	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 20000 л/га	-(1)	-(-)
2 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные, корневищные)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 16-20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/0,5 кг	-(1)	-(-)
0,2 г/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы, саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание или замачивание на 1-2 часа корневой системы растений перед посадкой в водном растворе препарата, или обмакивание корневой системы растений в сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешанную на растворе гетероауксина Расход рабочей жидкости - 10 л/20 шт	-(1)	-(-)
10-30 г/ 5 000 шт.	Виноград	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание базальной части привоя и верхней части подвоя перед прививкой на 2-3 секунды Расход рабочей жидкости - 10 л/ 5 000 шт	-(1)	-(-)
0,2 г/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период распускания почек; 2-й – осенью, в период пожелтения листьев Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(2)	-(-)

0,2 г/10 л воды(Л)	Ягодные культуры (смородина, крыжовник, малина)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период распускания почек; 2-й – осенью, в период пожелтения листьев Расход рабочей жидкости - 5 л/растение	-(2)	-(-)
1 табл./2 л воды(Л)	Овощные культуры (томат, огурец, капуста, лук, кабачок, перец сладкий (рассада))	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)
1 г/ 10 кг	Цветочные культуры (гладиолус, тюльпан, крокус) (луковицы, клубнелуковицы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 16-20 часов Расход рабочей жидкости - 10 л/10 кг	-(1)	-(-)
0,5 г/200 шт.	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 10 л/200 шт	-(1)	-(-)
0,2 г/20 шт.	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы, саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание или замачивание на 1-2 часа корневой системы растений перед посадкой в водном растворе препарата, или обмакивание корневой системы растений в сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешанную на растворе гетероауксина Расход рабочей жидкости - 10 л/20 шт	-(1)	-(-)
5 табл./20 л воды(Л)	Овощные культуры (томат, огурец, капуста, лук, кабачок, перец сладкий (рассада))	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 20 л/10 м ²	-(1)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень через 5 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 0,5 л/растение	-(1)	-(-)
1-3 табл./100 мл воды(Л)	Виноград	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание базальной части привоя и верхней части подвоя перед прививкой на 2-3 секунды Расход рабочей жидкости - 100 мл/ 50 шт	-(1)	-(-)
1-3 г/л воды(Л)	Виноград	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание базальной части привоя и верхней части подвоя перед прививкой на 2-3 секунды Расход рабочей жидкости - 100 мл/ 50 шт	-(1)	-(-)

1 табл. /5 л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик черенков	Замачивание одревесневших и полуодревесневших черенков в течение 16-20 часов, зеленых черенков – 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
0,2 г/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы, саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)
4 г/10 л воды(Л)	Овощные культуры (капуста, томат, перец сладкий, огурец, баклажан) (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)
2 табл. /10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы, саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)
5 табл. /20 л воды(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 20 л/10 м ²	-(1)	-(-)
2 табл. /10 л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной в период образования розетки, 2-й – через 30-35 дней после сбора урожая (3-я декада августа) Расход рабочей жидкости - 10 000 л/га	-(1)	-(-)
4 г/л воды(Л)	Роза (черенки полуодревесневшие, зеленые)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание черенков перед посадкой на 16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
1 табл. /л воды(Л)	Цветочные культуры (гладиолус, тюльпан, крокус) (луковицы, клубнелуковицы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 16-20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

0,5 г/20 л воды(Л)	Овощные культуры (томат, огурец, капуста, лук, кабачок, перец сладкий) (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 20 л/10 м2	-(1)	-(-)
0,2 г/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание одревесневших и полуодревесневших черенков перед посадкой – на 16-20 часов, зеленых черенков – на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/ 20 шт	-(1)	-(-)
0,2 г/10 л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период образования розетки; 2-й – через 30-35 дней после сбора урожая (3-я декада августа) Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2	-(1)	-(-)
2 табл. /10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина) (сеянцы, саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессовПовышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание или замачивание на 1-2 часа корневой системы растений перед посадкой в водном растворе препарата, или обмакивание корневой системы растений в сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешанных на растворе гетероауксина Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)
2 табл. /10 л воды(Л)	Ягодные культуры (смородина, крыжовник, малина)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период распускания почек; 2-й – осенью, в период пожелтения листьев Расход рабочей жидкости - 5 л/растение	-(2)	-(-)
1 табл. /2 л воды(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)

0,2 г/л воды(Л)	Роза (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание зеленых и полуодревесневших черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
2 табл. /л воды(Л)	Роза (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик черенков	Замачивание зеленых и полуодревесневших черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
0,2 г/10 л воды	Плодово-я годные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина , крыжовник, малина) (сеянцы, саженцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (гладиолус , тюльпан, крокус) (луковицы, клубнелуковичные)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 16-20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,5 г/20 л воды(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 20 л/10 м ²	-(1)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Плодово-я годные культуры (яблоня, груша, вишня, слива, смородина , крыжовник, малина) (сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень через 5 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)
2 табл. /10 л воды(Л)	Плодово-я годные культуры (яблоня, груша, вишня, слива)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – весной, в период распускания почек; 2-й – осенью, в период пожелтения листьев Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(2)	-(-)
2 г/1000 шт.	Роза (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание зеленых и полуодревесневших черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 10 л/1000 шт	-(1)	-(-)

	0,5 кг/га	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень после посадки Расход рабочей жидкости - 20000 л/га	-(1)	-(-)
	0,2 г/1000 шт.	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание одревесневших и полуодревесневших черенков перед посадкой – на 16-20 часов, зеленых черенков – на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 10 л/1000 шт	-(1)	-(-)
	0,5 г/200 шт.	Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста, лук, кабачки, перец сладкий (рассада))	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 10 л/200 шт	-(1)	-(-)

2-(1,3-диоксоланил-2) фурана

<p>Фуrolан, Ж (988,9 г/л) Кубанский ГТУ ОГРН: 1022301604610 III/III 602-07-2530-1 12.02.2020 11.02.2030</p>	3,4 мл/га	Морковь	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала формирования корнеплодов Расход рабочей жидкости - 400 л/га	1(2)	2(1)	Активен
	3,4 мл/га	Свекла сахарная	Активизация формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 3-4 пар листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	1(2)	2(1)	
	0,427 мл/т	Рис (на зерно)	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	2(1)	
	1,7 мл/га	Персик	Активизация формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, снижение опадения завязей, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений	1(2)	2(1)	

3,4-5,1 мл/га	Пшеница озимая	Активизация формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, устойчивости растений к полеганию, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений:	1(2)	2(1)
3,4 мл/га	Абрикос, слива, алыча, черешня	Активизация формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, снижение опадения завязей, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений	1(2)	2(1)
1,7 мл/га	Томат	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания и увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	1(2)	2(1)
3,4 мл/га	Перец сладкий	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания и увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	1(2)	2(1)

2-хлорэтилфосфоновая кислота

Дозреватель, ВР (629 г/л) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 И/И 033-07-3169-1 28.05.2021 27.05.2031	0,35	Томат открытого и защищенного грунта	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание за 10-14 дней до сбора урожая (при созревании 5-30 % плодов) Расход рабочей жидкости - 500 л/га	14(1)	1(1)	Активен
	3,5 мл/5 л воды(Л)	Томат открытого и защищенного грунта	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание за 10-14 дней до сбора урожая (при созревании 5-30 % плодов) Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	14(1)	1(1)	
Зеленец, ВР (500 г/л) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 И/И 033-07-549-1 09.02.2015 08.02.2025	0,085-0,14	Огурец	Повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе 2-3 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	2(1)	Не активен
Зеленец-Л, ВР (500 г/л) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 И/И 033-07-486-1 23.12.2014 22.12.2024	1,5 мл/3-5 л воды(Л)	Огурец	Повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе 2-3 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	2(1)	Не активен

Эсфон, ВР (650 г/л) ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» ОГРН: 1177746516210 III/III 778-07-3446-1 24.12.2021 23.12.2031	1,2-1,5	Томат (защищенный грунт)	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание растений	14(1-4)	1(1)	Активен
	0,2	Яблоня	Снижение количества завязей плодов на дереве, повышение урожая, улучшение качества плодов, снижение периодичности плодоношения	Опрыскивание растений в период формирования завязей (размер 18-22 мм) при температуре ниже 18°C Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	1(1)	
	0,5-1	Томат (открытый грунт)	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание растений	14(1-4)	1(1)	
	0,3	Яблоня	Ускорение вызревания древесины, повышение зимостойкости	Опрыскивание растений после сбора плодов Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	1(1)	
	0,1	Яблоня	Снижение количества завязей плодов на дереве, повышение урожая, улучшение качества плодов, снижение периодичности плодоношения	Опрыскивание растений в период формирования завязей (размер 18-22 мм) при температуре 18-20°C Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	1(1)	
	0,3-0,5	Яблоня	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание растений: 1-е -	14(2)	1(1)	

24-эпибрасинолид

Эпин-Экстра, Р (0,025 г/л) ННПП «НЭСТ М» ОГРН: 1027739149580 III/III 233-07-1771-1 20.05.2016 19.05.2026	1 мл/кг	Тюльпан	Стимуляция формирования корней, повышение устойчивости к перезимовке, ускорение начала цветения, улучшение декоративных качеств. Повышение качества луковиц. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание луковиц перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)	Активен
	0,12 мл/л воды(Л)	Вишня, клоновый подвой (укоренение черенков)	Повышение укореняемости черенков	Замачивание зеленых черенков перед укоренением на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 черенков	-(1)	-(-)	
	0,6 мл/3 л воды(Л)	Арбуз	Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов, ускорение прохождения фаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе «шатрика», 2-е - в начале цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	0,1 мл/кг	Салат листовой (на семена)	Ускорение созревания, повышение семенной продуктивности	Замачивание семян перед посевом на 8 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)	
	100 мл/га	Свекла сахарная	Повышение всхожести и усиление ростовых процессов. Увеличение урожайности, сахаристости	Опрыскивание в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)	

50 мл/га	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности, улучшение качества зерна, повышение устойчивости растений к засухе, болезням	Опрыскивание в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(-)
100 мл/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, защитных свойств от неблагоприятных условий среды, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е - в фазе цветения первой кисти Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)
1,5 мл/30 черенков	Яблоня, клоновый подвой (укоренение черенков)	Повышение укореняемости	Замачивание зеленых черенков перед укоренением на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 черенков	-(1)	-(-)
0,05 мл/200 мл воды (Л)	Лук репчатый (севок)	Стимуляция корнеобразования, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания. Повышение урожайности и выхода стандартной продукции	Обработка луковиц перед посадкой Расход рабочей жидкости - 200 мл/кг	-(1)	-(-)
30 мл/га	Крокус	Стимуляция корнеобразования, сокращение срока выгонки, повышение продолжительности цветения	Опрыскивание растений в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	-(1)	-(-)
0,5 мл/л воды (Л)	Гладиолус	Ускорение прорастания и начала цветения, улучшение декоративных качеств, повышение урожая клубнелуковиц и клубнечек, увеличение выхода элитной продукции. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание клубнечек перед посадкой на 12 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,3 мл/кг	Эхинаcea пурпурная (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, повышение густоты стояния, усиление ростовых процессов, улучшение перезимовки растений	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 250 мл/кг	-(1)	-(-)
12 мл/га	Гречиха	Усиление ростовых процессов, повышение урожайности. Улучшение качества семян	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)

0,1-0,2 мл/кг	Перец сладкий (открытый и защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов, повышение ранней и общей урожайности. Улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 1-2 л/кг	-(1)	-(-)
50 мл/100 м2	Гелениум	Усиление роста, увеличение количества соцветий на растении, ускорение начала цветения	Опрыскивание: 1-е - при высоте 30-40 см, 2-е и 3-е - с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 100 л/100м2	-(3)	-(-)
0,005 мл/м2	Шампиньо н	Ускорение скорости разрастания мицелия, сокращение срока начала плодоношения. Повышение урожая	Внесение с поливом в фазе начала плодообразования перед каждой волной плодоношения (трех- или четырехкратно) Расход рабочей жидкости - 0,8-1 л/ м2	-(3-4)	-(-)
150 мл/га	Редис	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов. Повышение урожайности	Опрыскивание в фазе 2-4 пар листьев Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га	-(1)	-(-)
50 мл/га	Пустырни к сердечный , змееголовн ик молдавски й	Усиление ростовых процессов, ускорение прохождения фенофаз, повышение антистрессовой активности, урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - через 7-8 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/га	Копеечник альпийски й (второго года и последую щих лет вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, зимостойкости растений	Опрыскивание: 1 - весной в начале возобновления вегетации, 2-е - через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)
35 мл/га	Эхинацея пурпурная (второго года и последую щих лет вегетации)	Усиление ростовых процессов. Повышение урожайности, улучшение качества сырья. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание: 1-е – весной в фазе начала отрастания культуры, 2-е - через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)
0,25 мл/кг	Капуста белокочан ная	Повышение энергии прорастания, всхожести семян, получение рассады высокого качества. Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,25 мл/кг	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Повышение всхожести, увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к болезням и накоплению тяжелых металлов в продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/кг	Редис	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов. Повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

0,5 мл/л воды(Л)	Гелениум	Усиление роста, увеличение количества соцветий на растении, ускорение начала цветения	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-6 настоящих листьев, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1 л /м2	-(2)	-(-)
0,002 мл/кг	Вешенка обыкновенная	Ускорение скорости разрастания мицелия, сокращение срока начала плодоношения. Повышение урожая	Обработка зернового мицелия Расход рабочей жидкости - 100 мл/1,2 кг	-(1)	-(-)
1,5 мл/100 м2	Хризантема корейская	Стимуляция образования корней, усиление роста растений, улучшение приживаемости после пересадки, ускорение прохождения фазы бутионизации и перехода к цветению	Опрыскивание: 1-е - после высадки в грунт, 2-е и 3-е - с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)
0,5 мл/100 черенков	Хризантема корейская	Стимуляция образования корней, усиление роста растений, улучшение приживаемости после пересадки, ускорение прохождения фазы бутионизации и перехода к цветению	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 черенков	-(1)	-(-)
0,025 мл/100мл воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение энергии прорастания, всхожести семян, получение рассады высокого качества. Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 6 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100г	-(1)	-(-)
0,05 мл/кг	Лук репчатый (севок)	Стимуляция корнеобразования, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания. Повышение урожайности и выхода стандартной продукции	Обработка луковиц перед посадкой Расход рабочей жидкости - 200 мл/кг	-(1)	-(-)
0,4 мл/кг	Копеечник альпийский (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, зимостойкости растений	Обработка семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 250 мл/кг	-(1)	-(-)
0,25 мл/л воды(Л)	Роза (укорененные черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, усиление ростовых процессов. Стимуляция корнеобразования у трудно укореняемых сортов	Замачивание зеленых черенков перед укоренением на 12-14 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 черенков	-(1)	-(-)
1-1,5 мл/5 л воды(Л)	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожая Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 3-4 л/100 м2	-(2)	-(-)

40 мл/га	Подсолнечник	Усиление ростовых процессов. Увеличение урожайности, улучшение качества семян. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)
60 мл/га	Дыня	Повышение всхожести семян, усиление роста стимулирующей активности, ускорение прохождения фаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3-х листьев, 2-е - в начале цветения Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	-(-)
0,05 мл/200 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, защитных свойств от неблагоприятных условий среды, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,1 мл/ 200 мл воды (Л)	Ель обыкновенная	Ускорение прорастания семян и повышение сохранности сеянцев, усиление ростовых процессов	Замачивание семян перед посевом на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,005 мл/м2	Вешенка обыкновенная	Ускорение скорости разрастания мицелия, сокращение срока начала плодоношения. Повышение урожая	Опрыскивание в период плодообразования (трехкратно) Расход рабочей жидкости - 0,25 л/ м2	-(3)	-(-)
30-50 мл/га	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания, усиление ростовых процессов, повышение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале фазы бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)
1 мл/кг	Крокус	Стимуляция корнеобразования, сокращение срока выгонки, повышение продолжительности цветения	Замачивание луковиц перед посадкой на 2 часа Расход рабочей жидкости - 3 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Смородина красная, виноград (укоренение черенков)	Повышение укореняемости черенков	Замачивание одревесневших черенков перед укоренением на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 черенков	-(1)	-(-)
100 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести, увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к болезням и накоплению тяжелых металлов в продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)

0,5 мл/кг	Дыня	Повышение всхожести семян, усиление роста стимулирующей активности, ускорение прохождения фаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1,0 мл/5 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение энергии прорастания, всхожести семян, получение рассады высокого качества. Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе полной листовой розетки Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(1)	-(-)
0,05 мл/100мл воды(Л)	Арбуз	Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов, ускорение прохождения фаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,01 мл/200 мл воды(Л)	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов, повышение ранней и общей урожайности. Улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 мл/5 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести, увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к болезням и накоплению тяжелых металлов в продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3-4 л/100 м ²	-(2)	-(-)
12 мл/т	Свекла сахарная	Повышение всхожести и усиление ростовых процессов. Увеличение урожайности, сахаристости	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 - л/т	-(1)	-(-)
1,5 мл/2-2,5 л воды (Л)	Редис	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов. Повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе 2-4 пар листьев Расход рабочей жидкости - 2,0-2,5 л/100 м ²	-(1)	-(-)
1 мл/кг	Ель обыкновенная	Ускорение прорастания семян и повышение сохранности сеянцев, усиление ростовых процессов	Замачивание семян перед посевом на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,005 мл/250 мл воды(Л)	Вешенка обыкновенная	Ускорение скорости разрастания мицелия, сокращение срока начала плодоношения. Повышение урожая	Опрыскивание в период плодообразования (трехкратно) Расход рабочей жидкости - 250 мл/м ²	-(3)	-(-)

0,2 мл/кг	Баклажан (открытый и защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Тюльпан	Стимуляция формирования корней, повышение устойчивости к перезимовке, ускорение начала цветения, улучшение декоративных качеств. Повышение качества луковиц. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание растений в начале формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
0,1 мл/200 мл воды (Л)	Редис	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов. Повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Лук репчатый (севок)	Стимуляция корнеобразования, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания. Повышение урожайности и выхода стандартной продукции	Опрыскивание растений в фазе 4-5 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Салат листовой (на семена)	Ускорение созревания, повышение семенной продуктивности	Опрыскивание в фазе 6-ти листьев Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/5 л воды(Л)	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, защитных свойств от неблагоприятных условий среды, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание растений растений: 1-е – в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе цветения первой кисти Расход рабочей жидкости - 3-4 л/100 м2	-(2)	-(-)
0,5 мл/кг	Гладиолус	Ускорение прорастания и начала цветения, улучшение декоративных качеств, повышение урожая клубнелуковиц и клубнепочек, увеличение выхода элитной продукции. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,002 мл/100 мл воды(Л)	Вешенка обыкновенная	Ускорение скорости разрастания мицелия, сокращение срока начала плодоношения. Повышение урожая	Обработка зернового мицелия Расход рабочей жидкости - 100 мл/1,2 кг	-(1)	-(-)

0,5 мл/л воды(Л)	Хризантема корейская	Стимуляция образования корней, усиление роста растений, улучшение приживаемости после пересадки, ускорение прохождения фазы бутонизации и перехода к цветению	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 черенков	-(1)	-(-)
1,5 мл/л воды(Л)	Яблоня, клоновый подвой (укоренение черенков)	Повышение укореняемости	Замачивание зеленых черенков перед укоренением на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 черенков	-(1)	-(-)
0,02 мл/100 мл воды(Л)	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожая Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 мл/л питательной среды	Картофель в культуре in vitro	Сокращение периода роста растений, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности. Повышение возрастной устойчивости к вирусной инфекции	Введение препарата в состав стандартной питательной среды Мурасиге-Скуга при оздоровлении от вирусной инфекции и микроклональном размножении	-(1)	-(-)
30-50 мл/га	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов, повышение ранней и общей урожайности. Улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале фазы бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)
1 мл/250 мл воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых процессов, увеличение общей и товарной урожайности, повышение устойчивости растений к болезням	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 250 мл/50 кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Гладиолус	Ускорение прорастания и начала цветения, улучшение декоративных качеств, повышение урожая клубнелуковиц и клубнечек, увеличение выхода элитной продукции. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание в начале формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)
35 мл/га	Эхинацея пурпурная (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, повышение густоты стояния, усиление ростовых процессов, улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-6 настоящих листьев, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)

50 мл/га	Рис	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов. Увеличение урожайности, улучшение качества зерна. Повышение устойчивости растений к болезням	Опрыскивание в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Роза миниатюрной группы, бересклет, сирень (укоренение черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудно укореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 черенков	-(1)	-(-)
1 мл/10 черенков	Роза миниатюрной группы, бересклет, сирень (укоренение черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудно укореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 черенков	-(1)	-(-)
60 мл/га	Тюльпан	Стимуляция формирования корней, повышение устойчивости к перезимовке, ускорение начала цветения, улучшение декоративных качеств. Повышение качества луковиц. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание растений в начале формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)
0,5 мл/л	Хризантема корейская	Стимуляция образования корней, усиление роста растений, улучшение приживаемости после пересадки, ускорение прохождения фазы бутонизации и перехода к цветению	Опрыскивание укорененных (в перлите) черенков после пересадки в сосуды Расход рабочей жидкости - до смачивания поверхности листьев	-(1)	-(-)
30-50 мл/га	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
20 мл/т	Картофель	Усиление ростовых процессов, увеличение общей и товарной урожайности, повышение устойчивости к болезням	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3 мл/2-2,5 л воды(Л)	Крокус	Стимуляция корнеобразования, сокращение срока выгонки, повышение продолжительности цветения	Опрыскивание растений в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 2-2,5 л/100 м ²	-(1)	-(-)

30 мл/га	Женьшень	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, устойчивости к болезням	Опрыскивание в фазе 2-х листьев Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Дыня	Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов, ускорение прохождения фенофаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3-х листьев, 2-е - в начале цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
80 мл/га	Картофель	Усиление ростовых процессов, увеличение общей и товарной урожайности, повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/30 черенков	Смородина красная, виноград (укоренение черенков)	Повышение укореняемости	Замачивание одревесневших черенков перед укоренением на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 черенков	-(1)	-(-)
0,25 мл/500 черенков	Роза (укоренение черенков)	Ускорение появления каллуса и корней, усиление ростовых процессов. Стимуляция корнеобразования у трудно укореняемых сортов	Замачивание зеленых черенков перед укоренением на 12-14 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/500 черенков	-(1)	-(-)
0,5 мл/л воды(Л)	Хризантема корейская	Стимуляция образования корней, усиление роста растений, улучшение приживаемости после пересадки, ускорение прохождения фазы бутонизации и перехода к цветению	Опрыскивание укорененных (в перлите) черенков после пересадки в сосуды Расход рабочей жидкости - до смачивания поверхности листьев	-(1)	-(-)
0,1 мл/300 мл воды(Л)	Крокус	Стимуляция корнеобразования, сокращение срока выгонки, повышение продолжительности цветения	Замачивание луковиц перед посадкой на 2 часа Расход рабочей жидкости - 300 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,008 мл/л	Картофель в культуре in vitro	Сокращение периода роста растений, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности. Повышение возрастной устойчивости к вирусной инфекции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
0,05 мл/100 мл воды (Л)	Дыня	Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов, ускорение прохождения фенофаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)

0,5 мл/кг	Арбуз	Повышение всхожести семян, усиление роста стимулирующей активности, ускорение прохождения фаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
2 мл/ 5 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых процессов, снижение опадания завязей, повышение устойчивости к засухе. Увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е - через 20 дней после цветения Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	-(2)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Гладиолус	Ускорение прорастания и начала цветения, улучшение декоративных качеств, повышение урожая клубнелуковиц и клубнепочек, увеличение выхода элитной продукции. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание растений в начале формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
60 мл/га	Лук репчатый (севок)	Стимуляция корнеобразования, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания. Повышение урожайности и выхода стандартной продукции	Опрыскивание в фазе 4-5 листьев Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(1)	-(-)
0,5 мл/л воды(Л)	Гладиолус	Ускорение прорастания и начала цветения, улучшение декоративных качеств, повышение урожая клубнелуковиц и клубнепочек, увеличение выхода элитной продукции. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
80 мл/га	Капуста белокочанная	Повышение энергии прорастания, всхожести семян, получение рассады высокого качества. Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе полной листовой розетки Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(1)	-(-)
0,5 мл/л воды(Л)	Хризантема корейская	Стимуляция образования корней, усиление роста растений, улучшение приживаемости после пересадки, ускорение прохождения фазы бутонизации и перехода к цветению	Опрыскивание растений: 1-е - после высадки в грунт, 2-е и 3-е - с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)

200 мл/га	Яблоня	Усиление ростовых процессов, снижение опадания завязей, повышение устойчивости к засухе. Увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е - через 20 дней после цветения Расход рабочей жидкости - 500-600 л/га	-(2)	-(-)
0,12 мл/30 черенков	Вишня, клоновый подвой (укоренение черенков)	Повышение укореняемости	Замачивание зеленых черенков перед укоренением на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 черенков	-(1)	-(-)
0,1 мл/200 мл воды(Л)	Тюльпан	Стимуляция формирования корней, повышение устойчивости к перезимовке, ускорение начала цветения, улучшение декоративных качеств. Повышение качества луковиц. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание луковиц перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
4 мл/т	Подсолнечник	Усиление ростовых процессов. Увеличение урожайности, улучшение качества семян. Повышение устойчивости к болезням	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5 мл/кг	Женьшень	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 12 часов Расход рабочей жидкости - 3 л/кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Арбуз	Повышение всхожести семян, усиление роста стимулирующей активности, ускорение прохождения фаз, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание: 1-е - в фазе «шатрика»; 2-е - в начале цветения Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	-(-)
0,025 мл/100 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести, увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к болезням и накоплению тяжелых металлов в продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,5 мл/кг	Гладиолус	Ускорение прорастания и начала цветения, улучшение декоративных качеств, повышение урожая клубнелуковиц и клубнечек, увеличение выхода элитной продукции. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание клубнечек перед посадкой на 12 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

0,005 мл/0,8-1 л воды(Л)	Шампиньон	Ускорение скорости разрастания мицелия, сокращение срока начала плодоношения. Повышение урожая	Внесение с поливом в фазу начала плодообразования перед каждой волной плодоношения (трех- или четырехкратно) Расход рабочей жидкости - 0,8-1 л/ м2	-(3-4)	-(-)
400 мл/га	Виноград	Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности и улучшение качества продукции, повышение устойчивости к засухе	Опрыскивание: 1-е - в конце фазы дифференциации соцветий-начала цветения; 2-е – в фазе активного роста ягод Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(1)	-(-)
2-4 мл/ 8-10 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности и улучшение качества продукции, повышение устойчивости к засухе	Опрыскивание растений: 1-е - в конце фазы дифференциации соцветий-начала цветения; 2-е – в фазе активного роста ягод Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(1)	-(-)
1-1,5 мл/5 л воды(Л)	Перец сладкий (открытый и защищен ный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов, повышение ранней и общей урожайности. Улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 3-4 л/100 м2	-(2)	-(-)
200 мл/т	Рис	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов. Увеличени е урожайности, улучшение качества зерна. Повышение устойчивости растений к болезням	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/5 л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых процессов, увеличение общей и товарной урожайности, повышение устойчивости растений к болезням	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
0,5 мл/кг	Томат (открытый и защищен ный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести, защитных свойств от неблагоприятных условий среды, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества. Повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
50 мл/га	Копеечник альпийски й (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, зимостойкости растений	Опрыскивание: 1-е - в фазе полных всходов роста; 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га	-(2)	-(-)

	200 мл/т	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности, улучшение качества зерна, повышение устойчивости растений к засухе, болезням	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
КомКат, ВРП (0,025 г/л) ООО «АграФорУм Россия» ОГРН: - IV/III 314-07-744-1 04.08.2015 03.08.2025	50-100 г/га	Пшеница яровая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	Активен
	50 г/га	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе 6-8 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	

3-индолилуксусная кислота калиевой соли

Гетероауксин+, ВРП (50 г/кг) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 III/III 033-07-3057-1 18.03.2021 17.03.2031	4 г/50 шт.	Смородина черная, смородина красная, крыжовник, малина, жимолость (черенки полуудревшие)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/50 шт	-(1)	-(-)	Активен
	10 г/20 растений	Яблоня, груша, вишня, слива (сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	10 г/10 л воды(Л)	Яблоня, груша, вишня, слива, смородина черная, смородина красная, крыжовник, малина (саженцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	4 г/200 растений	Цветочные культуры (рассада)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 10 л/200 растений	-(1)	-(-)	
	10 г/растение	Яблоня, груша, вишня, слива, смородина черная, смородина красная, крыжовник, малина (саженцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень через 5 дней после посадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)	

10 г/20 растений	Яблоня, груша, вишня, слива, смородина черная, смородина красная, крыжовник, малина (саженцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/20 растений	-(1)	-(-)
20-30 г/л воды(Л)	Виноград	Стимуляция укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости	Замачивание базальной части привоя и верхней части подвоя перед прививкой на 2-3 секунды Расход рабочей жидкости - 100 мл/ 50 шт	-(1)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Яблоня, груша, вишня, слива (сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень через 5 дней после посадки Расход рабочей жидкости - 0,5 л/растение	-(1)	-(-)
4 г/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)
4 г/л воды(Л)	Роза (черенки полуодревесневшие, зеленые)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков перед посадкой на 16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Яблоня, груша, вишня, слива (сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/20 растений	-(1)	-(-)
20-30 г/ 500 шт.	Виноград	Стимуляция укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости	Замачивание базальной части привоя и верхней части подвоя перед прививкой на 2-3 секунды Расход рабочей жидкости - 1 л/ 500 шт	-(1)	-(-)
4 г/200 растений	Томат, перец, огурец, баклажан, капуста (рассада)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 10 л/200 растений	-(1)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Яблоня, груша, вишня, слива, смородина черная, смородина красная, крыжовник, малина (саженцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень через 5 дней после посадки Расход рабочей жидкости - 5-10 л/растение	-(1)	-(-)
4 г/л воды(Л)	Вишня, слива (черенки полуодревесневшие)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/50 шт	-(1)	-(-)

4 г/10 л воды(Л)	Томат, перец, огурец, баклажан, капуста (рассада)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обмакивание корневой системы растений перед высадкой в грунт Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)
10 г/20 растений	Яблоня, груша, вишня, слива (сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень через 5 дней после посадки Расход рабочей жидкости - 0,5 л/растение	-(1)	-(-)
4 г/л воды(Л)	Смородин а черная, смородина красная, крыжовник, малина, жимолость (черенки полуодревесневшие)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/50 шт	-(1)	-(-)
4 г/100 шт.	Роза (черенки полуодревесневшие, зеленые)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков перед посадкой на 16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)
2 г/0,5 кг	Цветочные культуры (луковичные, клубне-луковичные, корневищные)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 16-20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/0,5 кг	-(1)	-(-)
4 г/50 шт.	Вишня, слива (черенки полуодревесневшие)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков перед посадкой на 10-16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/50 шт	-(1)	-(-)
2 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные, корневищные)	Стимуляция корнеобразования, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 16-20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/0,5 кг	-(1)	-(-)

4-хлорфеноксиуксусная кислота

<p>Томатон, Р (2,5 г/л) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 Ш/Ш 033-07-961-1 04.02.2016 03.02.2026</p>	80 мл/га	Томаты открытого и защищенного грунта	Улучшение завязываемости плодов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Однократное обмакивание 1-ой и 2-ой цветочных кистей Расход рабочей жидкости - 40 л/га	20(2)	-(-)	Активен
	1 мл/0,5 л воды(Л)	Томаты открытого и защищенного грунта	Улучшение завязываемости плодов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Однократное обмакивание 1-ой и 2-ой цветочных кистей Расход рабочей жидкости - 0,4 л/100м2	20(2)	-(-)	

4(индол-3ил) масляная кислота

<p>Коренник, СП (5 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/- 018-07-1869-1 12.04.2018 11.04.2028</p>	10-20 г/1000 черенков	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, улучшение качества посадочного материала	Обмакивание предварительно увлажненного базального среза черенка	-(1)	-(-)	Активен
	1 г/л воды(Л)	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растение	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 50 л/100 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Цветочные культуры (сеянцы, рассада)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 0,5 л/растение	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (сеянцы, рассада)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	0,1-0,2 г/10 черенков(Л)	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, улучшение качества посадочного материала	Обмакивание предварительно увлажненного базального среза черенка	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 100 л/100 растений	-(1)	-(-)	
<p>Корень Супер, ВРГ (5 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-07-3934-1 10.01.2023 09.01.2033</p>	1 г/л воды	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 0,5 л/растение	-(1)	-(-)	Активен
	10-20 мг на черенок	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (черенки)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Обмакивание предварительно увлажненного нижнего среза черенка	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растение	-(1)	-(-)	

<p>Корневин, СП (5 г/кг) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 ПП/- 427-07-919-1 22.12.2015 21.12.2025</p>	1 г/л воды(Л)	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растение	-(1)	-(-)	Активен
	1 г/л воды	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 100 л/200 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 1 л/2растения	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Цветочные культуры сеянцы (рассада)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	10-20 г/100 черенков	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, улучшение качества посадочного материал	Обработка базального среза черенка	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (сеянцы, рассада)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Цветочные культуры сеянцы (рассада)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 100 л/100 растений	-(-)	-(-)	
	1-2 г/10 черенков(Л)	Плодовые, ягодные, декоративн ые культуры (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, улучшение качества посадочного материала	Обработка базального среза черенка	-(1)	-(-)	

<p>Корней, С (5 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 III/III 012-07-3073-1 25.03.2021 24.03.2031</p>	1 г/л воды(Л)	Плодовые, ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Полив растений под корень через 10 дней после посадки Расход рабочей жидкости - 0,5 л/ растение	-(1)	-(-)	Активен
	1-2 г/ 10 черенков(Л)	Плодовые, ягодные, декоративные культуры (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, улучшение качества посадочного материала	Обмакивание предварительно увлажненного базального среза	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (однолетние, двулетние) (сеянцы, рассада)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиления ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Полив растений под корень сразу после посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/ 20 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Овощные культуры (рассада)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиления ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Полив растений под корень сразу после посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/ 20 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Плодовые, ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Замачивание корневой системы растений перед посадкой 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растение	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (горшечные растения)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, усиления ростовых процессов, улучшение декоративных качеств	Полив растений под корень сразу после посадки Расход рабочей жидкости - 50-100 мл/ растение	-(1)	-(-)	
<p>Корнерост М, К (5 г/кг) ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 III/III 046-07-3941-1 14.03.2019 13.03.2029</p>	1-2 г/10 черенков(Л)	Плодовые (яблоня, груша, вишня, черешня, слива, алыча, абрикос, персик), ягодные (смородина черная, смородина красная, крыжовник, малина)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости, улучшение качества посадочного материала	Обработка предварительно увлажненного базального среза черенка	-(1)	-(-)	Активен
<p>Корнестим, С (5 г/кг) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-07-1288-1 12.12.2016 11.12.2026</p>	1 г/л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 1 л/2растения	-(1)	-(-)	Активен
	1 г/20 растений	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	

	1 г/л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растение	-(1)	-(-)	
	10-20 мг/ черенок	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обработка базального среза черенка	-(1)	-(-)	
	10-20 мг/ черенок(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обработка базального среза черенка	-(1)	-(-)	
	1 г/растение	Плодово-ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растений	-(1)	-(-)	
	1 г/20 растений(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
УкоренитЪ, С (5 г/кг) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 III/III 033-07-1287-1 12.12.2016 11.12.2026	10-20 мг/ черенок(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обработка базального среза черенка	-(1)	-(-)	Активен
	1 г/растение	Плодово-ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив под корень через 10 дней после высадки Расход рабочей жидкости - 1 л/2растения	-(1)	-(-)	
	10-20 мг/ черенок	Плодово-ягодные, декоративные культуры (черенки)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Обработка базального среза черенка	-(1)	-(-)	
	1 г/20 растений(Л)	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	
	1 г/л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (саженцы, сеянцы)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание корневой системы на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/растение	-(1)	-(-)	
	1 г/20 растений	Цветочные культуры (рассада)	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив под корень сразу после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 1 л/20 растений	-(1)	-(-)	

6-бензиладенин

Сальдо, ВР (20 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-07-2179-1 02.04.2019	7,5	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе размер плода «лещина» (диаметр плода 12-14 мм) Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(1)	1(1)	Активен
---	-----	--------	--	--	------	------	---------

01.04.2029	75 мл / 10 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе размер плода «лещина» (диаметр плода 12-14 мм) Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (8-10 л/100 м2)	-(1)	1(1)	
	7,5	Груша	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе размер плода «лещина» (диаметр плода 12-14 мм) Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(1)	1(1)	
	75 мл / 10 л воды(Л)	Груша	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе размер плода «лещина» (диаметр плода 12-14 мм) Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево (8-10 л/100 м2)	-(1)	1(1)	

6-бензиламинопурин

Ботаник, ВРК (10 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-07-3673-1 29.04.2022 28.04.2032	1-10 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры семейства орхидные (защищенный грунт, горшечные растения)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, ускорение наступления цветения, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Полив растений или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: 1-е – в фазе выхода соцветий; 2-е - через 15 дней после первого полива (погружения) Расход рабочей жидкости - 2-3 л/м2	-(2)	1(-)	Активен
	1 - 3 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, ускорение наступления цветения, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после высадки, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(-)	
	1-10 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры семейства орхидные (защищенный грунт, горшечные растения)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, ускорение наступления цветения, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе выхода соцветий; 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(-)	
	1 - 3 мл/л воды(Л)	Капуста	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 15 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(3)	1(-)	
	1 - 3 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после всходов, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(2)	1(-)	

	1 - 3 мл/л воды(Л)	Томат (защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после высадки рассады, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(2)	1(-)	
	1 - 3 мл/л воды(Л)	Перец (открытый грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после высадки рассады, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	20(2)	1(-)	
Глобарилл, ВР (100 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - П/П 586-07-3313-1 23.09.2021 22.09.2031	1-1,5	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений	20(1)	1(1)	Активен
Почкорост, П (10 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 П/П 005-07-2101-1 07.02.2019 06.02.2029	1,5-2,0 мг/почку(Л)	Фиалка (сенполия)	Стимуляция цветения	Нанесение препарата на место прикрепления прицветников к цветоносу тонким слоем специальным аппликатором	-(1)	-(-)	Активен
	2 мг/шт(Л)	Цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные)	Пробуждение спящих почек, стимуляция образования «деток»	Нанесение препарата на донце луковиц, клубнелуковицы тонким слоем специальным аппликатором	-(1)	-(-)	
	2 мг/почку(Л)	Цветочно-декоративные культуры (кустарники)	Пробуждение спящих почек, стимуляция образования новых побегов	Нанесение препарата на спящую почку с интервалом 10 дней тонким слоем специальным аппликатором	-(2)	-(-)	

6-бензиламинопурин + Гиббереллиновая кислота А4 + F7

ЭплЛин, ВРП (180 г/кг + 180 г/кг + 180 г/кг) ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» ОГРН: 1177746516210 П/П 778-07-3946-1 12.01.2023 11.01.2033	0,1 кг/га	Яблоня	Активизация цветения, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	0,6 г/л воды	Яблоня	Снижение вегетативного роста (уменьшение длины однолетних приростов)	Обработка верхушки саженца по достижении саженцами высоты 0,6 м от места прививки или окулировки с интервалом 7-10 дней, при условии увеличения ежедневного прироста (или от предполагаемой линии начала заглубления саженца в почву) не менее, чем на 1 см/сутки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(6)	1(1)	
	0,025 кг/га	Яблоня	Снижение количества завязей плодов на дереве, улучшение качества плодов (уменьшение образования сетки на плодах), снижение периодичности плодоношения	Опрыскивание растений: 1-е – после цветения, 2-е – через 7-10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(2)	1(1)	

6-фурфуриламинопурин

Х-Сайт, Ж (0,4 г/л) Столлер Интерпрайсис, Инк. ОГРН: - IV/П 639-07-3213-1	0,5-1	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений:	-(2)	1(1)	Активен
---	-------	--------------	--	------------------------	------	------	---------

13.07.2021 12.07.2031	0,5-1	Пшеница озимая и яровая	Стимуляция развития корневой системы; усиление ростовых процессов; увеличение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений	-(1)	1(1)
	0,5-1	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений:	-(2)	1(1)

Аcremoniumlichenicola симбионтного гриба продукты метаболизма + Аcremonium lichenicola симбионтного гриба продукты метаболизма

Эмистим, Р (0,01 г/л + 0,01 г/л) ИП ЯНИНА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА ОГРН: 3047700012893 III/III 392-07-1237-1 21.09.2016 20.09.2026	1 мл/га	Хлопчатник	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	1 мл/га	Земляника	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в начале возобновления вегетации, 2-е – в фазе бутонизации, 3-е – после сбора урожая Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	10-30 мл/т	Хлопчатник	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 12 часов Расход рабочей жидкости - 200-400 л/т	-(1)	-(-)	
	1 мл/га	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	

0,01 мл/т	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 30 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/т	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,03 мл/т	Свекла сахарная, свекла кормовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 30 л/т	-(1)	-(-)
0,00001 мл/л воды (Л)	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 мл/га	Яблоня	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в период появления первых листьев, 2-е и 3-е с интервалом 1 месяц Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(1)	-(-)

0,1 мл/л воды (Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
1 мл/т	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,01 мл/10 л воды (Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в период отрастания листьев, 2-е и 3-е с интервалом 1 месяц Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(1-3)	-(-)
10 мл/т	Рис	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,01 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в период появления первых листочков, 2-е и 3-е с интервалом 1 месяц Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	-(1-3)	-(-)

3 мл/га	Хмель	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в начале формирования шишек Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,01 мл/10 л воды (Л)	Смородин а черная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в период появления первых листочков, 2-е и 3-е с интервалом 1 месяц Расход рабочей жидкости - 1,5 -3 л/деревцо	-(1-3)	-(-)
1 мл/га	Смородин а черная	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в период появления первых листьев, 2-е и 3-е с интервалом 1 месяц Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(1)	-(-)
10 мл/га	Гречиха	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала цветения соцветий главного побега Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/га	Хмель	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе появления колосовидных побегов Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	-(-)

	1 мл/га	Рис	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	
	1 мл/га	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)	

L-аланин + L-глутаминовая кислота

Рибав-Экстра, Р (0,00152 г/л + 0,00196 г/л) ЗАО «Сельхозэкосервис» ОГРН: - IV/III 075-07-877-1 09.12.2015 08.12.2025	600 мл/га	Сосна обыкновенная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы. Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	1 мл/т	Горох	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, повышение урожайности зеленой массы и семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,01 мл/3 л воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, повышение урожайности зеленой массы и семян	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100м2	-(1)	-(-)	
	1 мл/ 10 л воды(Л)	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Полив под корень через 1, 5 месяца после посадки Расход рабочей жидкости - 4-5 л/ 10 м2	-(1)	-(-)	
	0,2 мл/кг	Лук репчатый (семена)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразованных процессов, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)	

0,02 мл/200 мл воды(Л)	Лук репчатый (семена)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
600 мл/га	Ель европейск ая (сеянцы)	Повышение всхожести семян. Улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразованных процессов, повышенире урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,1 мл/ л воды(Л)	Картофель	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовыхх и формообразовательн ых процессов, повышение урожаности, увеличение выхода товарных клубней	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100м2	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Мака перуанская (<i>Lepidium peruvianu m Chacon sp. Nov</i>)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, повышение адаптации к критическим условиям выращивания, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/га	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, устойчивости к болезням, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е в фазы выхода в трубку, 2 – е в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 мл/га	Горох	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к болезням, повышение урожайности зеленой массы и семян	Опрыскивание в фазе бутонициации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

0,01 мл/100 мл воды(Л)	Капуста	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
0,01 мл/ 100 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Ель европейская (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание семян перед посевом на 18 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
2 мл/га	Лен – долгунец	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, устойчивости семян и растений к поражению грибными и бактериальными болезнями, усиление ростовых и формообразовательных процессов. Повышение урожайности соломы и семян	Опрыскивание растений в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Ель европейская (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста Расход рабочей жидкости - 3 л/м2	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды	Плодово - ягодные и декоративные культуры (вишня, груша, яблоня, слива, алыча, жимолость, рябина красная, арония, малина, ежевика)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание зеленых черенков или корневой системы саженцев на 18 часов	-(1)	-(-)

0,1 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
1-2 мл/кг	Лен – долгунец	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, устойчивости семян и растений к поражению грибными и бактериальными болезнями, усиление ростовых и формообразовательных процессов. Повышение урожайности соломы и семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 5 л/кг	-(1)	-(-)
4 мл/га	Капуста	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е через 2 недели после первого опрыскивания, 3 – е в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
1 мл/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные и декоративные культуры (вишня, груша, яблоня, слива, алыча, жимолость, рябина красная, арония, малина, ежевика)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание зеленых черенков или корневой системы саженцев на 18 часов	-(1)	-(-)
3-4 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-5 настоящих листьев, 2-е через две недели после первого опрыскивания, 3-е – перед цветением Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(3)	-(-)
1 мл/т	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, устойчивости к болезням, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

1 мл/ 10л воды(Л)	Лук репчатый (семена)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Полив под корень через 1,5 месяца после посева Расход рабочей жидкости - 4-5 л/ 10м2	-(1)	-(-)
0,1 мл/ 10 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-5 листьев, 2-е – через две недели после первого опрыскивания, 3-е – перед цветением Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)
1 мл/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклоненный, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик	Полив растений под корень: 1-й – в фазе 2-3 листьев, 2-й – после пикировки рассады Расход рабочей жидкости - 4 л/м2	-(2)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Ель европейская (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Полив под корень в фазе 3-4 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Сосна обыкновенная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста Расход рабочей жидкости - 3 л/м2	-(1)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, повышение урожайности зеленой массы и семян	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100г	-(1)	-(-)

2 мл/кг	Ель европейская (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизации ростовых процессов	Замачивание семян перед посевом на 18 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,4 мл/100 м2	Цветочные культуры (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклоненный, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(1)	-(-)
0,01 мл/л питательной среды	Малинно-ежевичный гибрид, жимолость, рябина в культуре in vitro	Стимулирование корнеобразования, усиление ростовых процессов	Введение препарата в состав питательной среды	-(1)	-(-)
0,02 мл/200мл воды(Л)	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
1 мл/л питательной среды	Плодово-ягодные культуры (семечковые и косточковые), ежевика, сирень, роза миниатюрная в культуре in vitro	Стимулирование корнеобразования, усиление ростовых процессов	Введение препарата в состав питательной среды	-(1)	-(-)
6 л/га	Сосна обыкновенная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы. Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста Расход рабочей жидкости - 30000 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/ 10 л воды(Л)	Цветочные культуры (бегония вечноцветущая, бегония клубневая, тагетес отклоненный, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(1)	-(-)

0,2 мл/кг	Капуста	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,001 мл/л питательной среды	Земляника в культуре in vitro	Стимулирование корнеобразования, усиление ростовых процессов	Введение препарата в состав питательной среды	-(1)	-(-)
0,1 мл/ 10 л воды(Л)	Капуста	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е – через 2 недели после первого опрыскивания, 3-е – в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 4 л/ 100м2	-(3)	-(-)
1 мл/т	Картофель	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода клубней	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные и декоративные культуры (вишня, груша, яблоня, слива, алыча, жимолость, рябина красная, арония, малина, ежевика)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Полив при посадке Расход рабочей жидкости - 1-5 л/растение	-(1)	-(-)
0,4 мл/га	Сосна обыкновенная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы. Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста Расход рабочей жидкости - 30000 л/га	-(1)	-(-)

1 мл/10 л воды	Плодово - ягодные и декоративн ые культуры (вишня, груша, яблоня, слива, алыча, жимолость , рябина красная, арония, малина, ежевика	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Полив при посадке Расход рабочей жидкости - 1,5 л/растение	-(1)	-(-)
1 мл/ 10л воды(Л)	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение	Полив растений под корень в фазе 3-4 настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(1)	-(-)
6 л/га	Ель европейск ая (сеянцы)	Повышение всхожести семян. Улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Полив растений под корень в период интенсивного роста Расход рабочей жидкости - 30000 л/га	-(1)	-(-)
0,4 мл/га	Сосна обыкновен ная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы. Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание семян перед посевом на 18 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению грибными болезнями, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
3 мл/га	Картофель	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Сосна обыкновен ная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Опрыскивание растений через 3-4 недели после полива Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(1)	-(-)

0,02 мл/ 200 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищен ный грунт)	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
1 мл/0,5 л питательн ой среды	Малина в культуре in vitro	Стимулирование корнеобразования, усиление ростовых процессов	Введение препарата в состав питательной среды	-(1)	-(-)
2 мл/ 2 л воды(Л)	Лук репчатый (севок)	Ускорение отрастания, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, повышение урожайности	Замачивание севка перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Сосна обыкновен ная (сеянцы)	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание семян перед посевом на 18 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
1 мл/ 10 л воды(Л)	Лук репчатый (севок)	Ускорение отрастания, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, повышение урожайности	Полив под корень через 1,5 месяца после посадки Расход рабочей жидкости - 4-5 л/10 м2	-(1)	-(-)
10 мл/г	Лук репчатый (севок)	Ускорение отрастания, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, повышение урожайности	Замачивание севка перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 100 л/г	-(1)	-(-)
40 мл/100 м2	Цветочные культуры (бегония вечноцвету щая, бегония клубневая, тагетес отклоненн ый, виола гибридная)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных характеристик растений	Полив растений под корень: 1 – й в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-й – после пикировки рассады Расход рабочей жидкости - 40 л/100м2	-(2)	-(-)

L-пролин + L-аргинин + L-лейцин

<p>Стимунол ЕФ, Ж (0,3 г/л + 8,84 г/л + 0,68 г/л) ООО «ЭКОПРОЕКТ-НТ» ОГРН: 1103610000229 IV/III 792-07-3533-1 18.03.2022 17.03.2032</p>	0,025	Соя	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(-)	Активен
---	-------	-----	---	------------------------------	------	------	---------

0,02-0,05	Пшеница яровая и озимая	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,05	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,05	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(-)
0,03	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период от фазы 5 листьев до смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,02-0,05	Ячмень яровой	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,025	Соя	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,07	Подсолнеч ник	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(-)

N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N'-фенилмочевины)

<p>Цитодеф-100, ВРП (100 г/кг) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 III/III 429-07-3433-1 17.12.2021 16.12.2031</p>	300-400 г/га	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период от фазы кущения до фазы флаг-лист Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(1)	Активен
	300-400 г/га	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период от фазы кущения до фазы флаг-лист Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(1)	
	20-30 г/т	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	20-30 г/т	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	300-400 г/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	1(1)	

Pseudomonas fluorescens 1-Б

<p>Биоагро-РР, Ж (1x10⁸ КОЕ/Мл) ООО НПО «БИОАГРО» ОГРН: 1151322000037 III/III, ФГБУ «Россельхозцентр» ОГРН: 1077762014110 III/III 591(526)-07-2502-1 12.12.2019 11.12.2029</p>	2 л/га	Виноград	Стимуляция образования завязей и уменьшение их опадения. Ускорение созревания; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления роста (весной); 2-е и 3-е с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	1(1)	Активен
	5 мл/л воды(Л)	Огурец (защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 5 мл/кг	-(1)	-(-)	

1 л/т	Ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
300 мл/ 10 л воды(Л)	Томат (защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)
5 мл/кг	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
200 мл/ 10 л воды(Л)	Огурец (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев; 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)
200 мл/10 л воды(Л)	Земляника	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период нарастания листьев; 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)

2 л/га	Земляника	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления роста (весной); 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	1(1)
2 л/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е – через 10-15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	1(1)
5 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
500 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Стимуляция образования завязей и уменьшение их опадения. Ускорение созревания; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период нарастания листьев; 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)
5 мл/л воды(Л)	Виноград	Стимуляция образования завязей и уменьшение их опадения. Ускорение созревания; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)

5 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 5 мл/кг	-(1)	-(-)
1 л/га	Рожь озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения-начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)
1 л/т	Рожь озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 л/т	Пшеница яровая и озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 л/га	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев; 2-е – через 10-15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	1(1)

5 мл/л воды(Л)	Томат (защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)
5 мл/л воды(Л)	Томат (защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 л/га	Пшеница яровая и озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе кущения-начало выхода в трубку; 2-е – в фазе начала колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)
5 мл/л воды(Л)	Огурец (защищен ый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
5 мл/л воды(Л)	Томат (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательн ых процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)

5 мл/л воды(Л)	Виноград	Стимуляция образования завязей и уменьшение их опадения. Ускорение созревания; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/га	-(1)	-(-)
5 мл/л воды(Л)	Огурец (защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)
5 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)
5 мл/л воды(Л)	Томат (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 5 мл/кг	-(1)	-(-)
5 мл/л воды(Л)	Земляника	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)

2 л/га	Люцерна (2-го и последующих лет вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления роста (весной), 2-е – через 10 дней после первого укоса Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)
300 мл/10 л воды(Л)	Огурец (защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев; 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)
1 л/т	Люцерна (1-го года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
200 мл/10 л воды(Л)	Томат (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)
5 мл/л воды(Л)	Томат (открытый грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание корневой системы рассады перед посадкой в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 растений	-(1)	-(-)

	1 л/га	Ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе кущения-начало выхода в трубку; 2-е – в фазе начала колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)	
	5 мл/кг	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян; усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 1 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(1)	

α-глутаминовая кислота + 3-индолилуксусная кислота + α-аланин

Беркана, ВРК (70 мг/л + 18 мг/л + 60 мг/л) ООО «АГРОФИРМА ПОИСК-ПРОФИ» ОГРН: 5157746204831 ПП 810-07-3644-1 19.04.2022 18.04.2032	50 мл/га	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 пар листьев, 2-е – через 3 недели после первого опрыскивания, 3-е – в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)	Активен
	50 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов или при высадке рассады, 2-е – в начале бутонизации, 3-е – в период плодоношения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)	
	100 мл/га	Рис	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)	

100 мл/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение степени вызревания побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – через 14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)
100 мл/га	Плодовые культуры (семечковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение степени вызревания побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе обособления бутонов, 2-е – в фазе опадения лепестков, 3-е - в период роста плодов Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	1(-)
30 мл/га	Подсолнечник	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)
50 мл/га	Салат	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 1-2 листьев, 2-е – в фазе 3-4 листьев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
100 мл/га	Плодовые культуры (косточковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, снижение опадения завязей, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в фазе опадения лепестков, 3-е - в период роста плодов Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	1(-)

100 мл/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов(при высоте растений 10-15 см), 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
50 мл/га	Лук репчатый	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е – в начале образования луковицы, 3-е – в период формирования луковицы Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
40-50 мл/га	Рожь	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е – в фазе выхода в трубку-колошения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)
30 мл/га	Цветочные культуры (однолетние, многолетние)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления цветения, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации весной или в фазе полных всходов, 2-е - перед формированием бутонов, 3-е, 4-е и -5-е – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3-5)	1(1)
100 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10-60 л/т	-(1)	-(-)

40-50 мл/га	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е – в фазе выхода в трубку-колошения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)
50 мл/т	Рожь	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
30 мл/га	Цветочно-декоративные культуры (деревья, кустарники, лианы)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления цветения, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации весной, 2-е, 3-е, 4-е и -5-е – с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(3-5)	1(1)
40-50 мл/га	Ячмень озимый	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е – в фазе выхода в трубку-колошения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)
50 мл/т	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

50 мл/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов или при высадке рассады, 2-е – в начале бутонизации, 3-е – в период плодоношения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
50 мл/т	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
70 мл/га	Капуста белокочанная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов или при высадке рассады, 2-е – в фазе 5-6 листьев, 3-е – в фазе образования кочана Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
50 мл/га	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, <u>улучшение качества продукции</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 пар листьев, 2-е – через 3 недели после первого опрыскивания, 3-е – в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
50 мл/т	Ячмень озимый	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л	-(1)	-(-)

50 мл/га	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов или при высадке рассады, 2-е – в начале бутонизации, 3-е – в период плодоношения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
40-50 мл/га	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е – в фазе выхода в трубку-колошения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)
50 мл/га	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов или при высадке рассады, 2-е – в начале бутонизации, 3-е – в период плодоношения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
40 мл/га	Кукуруза	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, <u>улучшение качества продукции</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе выметывания метелки Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)
50 мл/га	Рапс озимый	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, <u>улучшение качества продукции</u>	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)

	50 мл/га	Рапс яровой	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(1)	
--	----------	-------------	--	---	------	------	--

А7 + Гиббереллиновые кислоты А4

Берелин, ВРП (200 г/кг + 200 г/кг) ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» ОГРН: 1177746516210 III/III 778-07-3395-1 06.12.2021 05.12.2031	0,025-0,05	Яблоня	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции, устранение сетки на плодах	Опрыскивание растений: 1-е – размер завязи 14 мм, 2-е - через 10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(2)	-(1)	Активен
---	------------	--------	--	---	------	------	---------

Альфа-нафтилукусная кислота

Обстактин, ВР (75 г/л) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 III/III 429-07-3627-1 13.04.2022 12.04.2032	0,2-0,4	Яблоня	Снижение предуборочного опадения плодов, ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов и их окраски	Опрыскивание растений за 10-14 дней до предлагаемой даты сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	1(1)	Активен
	0,2-0,3	Яблоня	Снижение количества завязей плодов на дереве, повышение урожая, улучшение качества плодов, снижение периодичности плодоношения	Опрыскивание растений в конце фазы цветения, после полного опадения лепестков до диаметра завязи 8-12 мм Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	1(1)	

Аммоний диметилфосфорнокислый диметилди(2-гидроксиэтил)

Рутамон, ВР (500 г/л) ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» ОГРН: 1177746516210 III/III 778-07-3842-1 26.10.2022 25.10.2032	30-50 мл/га	Томат (защищенный грунт технология малообъемной гидропоники)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: 1-е - после высадки рассады, 2-е - в начале плодоношения Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	-(1)	Активен
	100 мл/га	Огурец (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	1(1)	
	30-50 мл/га	Огурец (защищенный грунт технология малообъемной гидропоники)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: 1-е - после высадки рассады, 2-е - в начале плодоношения Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	-(1)	
	100 мл/га	Томат (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	1(1)	

	0,1 мл/л воды(Л)	Огурец (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,0 л/м2	-(2)	1(1)	
	0,1 мл/л воды(Л)	Томат (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,0 л/м2	-(2)	1(1)	
Этамон Био, ВРП (10 г/кг) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 ПП/П 427-07-2227-1 20.05.2019 19.05.2029	7,5-10 г/л воды(Л)	Лук	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе 4-6 настоящих листьев, второе - через 10-14 дней после первого Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(2)	1(1)	Активен
	5-7,5 г/л воды(Л)	Морковь	Усиление ростовых процессов, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: первое - в фазе 5-6 листьев, второе - через 14 дней после первого Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(2)	1(1)	
	5-7,5 г/л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе активного роста ботвы (высота растений 10-15 см), второе - в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(2)	1(1)	
	7,5 г/л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое – в фазе распускания листьев, второе и третье с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 2-10 л/растение	-(3)	1(1)	
	5 г/л воды(Л)	Томат, перец, огурец, баклажан, цветочные культуры (рассада)	Активизация роста вегетативной массы и корневой системы; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; улучшение качества рассады	Опрыскивание растений: первое - в фазе 3-6 листьев, второе через	-(2)	1(1)	
	5 г/л воды(Л)	Капуста (рассада)	Увеличение выхода стандартной рассады, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений в фазе 2-3-х листьев Расход рабочей жидкости - 0,5 л/5 м2	-(1)	1(1)	

5-7,5 г/л воды(Л)	Травы газонные	Активизация роста вегетативной массы и корневой системы; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: первое – весной в период возобновления вегетации или в фазе 3-4 листьев (новые посевы), второе и третье– последовательно после каждого укоса, или с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(3)	1(1)
5-7,5 г/л воды(Л)	Томат, перец, баклажан, огурец (открытый и защищенн ый грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: певрое - после высадки рассады в грунт, второе – в фазе массового цветения, третье - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(3)	1(1)
5-7,5 г/л воды(Л)	Цветочно- декоратив- ные культуры (многолетн ие)	Активизация роста вегетативной массы и корневой системы; повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды; повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: первое – весной в период возобновления вегетации, второе и третье с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(3)	1(1)
10 г/л воды(Л)	Капуста белокочан ная	Улучшение развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: первое - в фазе 4-5 листьев, второе - в фазе начала формирования кочана Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(2)	1(1)
5-7,5 г/л воды(Л)	Земляника	Повышение урожайности, сокращение сроков до начала сбора урожая, увеличение выхода усов	Опрыскивание растений: первое – до начала цветения, второе – после сбора урожая в период возобновления роста – начала усообразования Расход рабочей жидкости - 1 л /10 м2	-(2)	1(1)
1-1,5 мл/100 м2	Капуста (рассада)	Усиление ростовых процессов, увеличение выхода сндартной рассады	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	1(1)
100-200 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	2(1)
100-120 мл/га	Кукуруза	Активизация ростовых формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(1)
80-100 мл/га	Морковь	Активизация ростовых формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е –	-(2)	1(1)

0,1 мл/л воды(Л)	Огурец открытого и защищенн ого грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание:1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Томат открытого и защищенн ого грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание:1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(-)
50-100 мл/га	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообра-зовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения (весной) Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(1)
80-100 мл/га	Рис	Активизация ростовых формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(1)
0,1 мл/л воды(Л)	Баклажан открытого и защищенн ого грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание:1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(-)
100 мл/га	Огурец открытого и защищенн ого грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание:1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(1)
50-100 мл/га	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообра-зовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(1)
30-50 мл/га	Баклажан (в условиях малообъем ной гидропони ки)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: первое - после высадки рассады, второе - в фазе начала плодоношения Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	2(1)
30-50 мл/га	Огурец (в условиях малообъем ной гидропони ки)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: первое - после высадки рассады, второе - в фазе начала плодоношения Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	2(1)

100 мл/га	Томат открытого и защищенного грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(1)
100-200 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 пар листьев, 2-е - через 12-14 дней после первого опрыскивания (в фазе смыкания рядков) Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	2(1)
30-50 мл/га	Томат (в условиях малообъемной гидропоники)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: первое - после высадки рассады, второе - в фазе начала плодоношения Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	2(1)
100 мл/га	Баклажан открытого и защищенного грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(1)
100 мл/га	Подсолнечник	Активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(1)
80-100 мл/га	Соя	Активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(1)
100-120 мл/га	Лук	Активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(2)	1(1)
25-50 мл/т	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)
100 мл/га	Перец сладкий открытого и защищенного грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(1)
80-100 мл/га	Рапс яровой	Активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(1)

100-500 мл/га	Капуста	Активизация ростовых формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е –	-(2)	1(1)
25-50 мл/т	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообра-зовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
30-50 мл/га	Перец сладкий (в условиях малообъем ной гидропони ки)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: первое - после высадки рассады, второе - в фазе начала плодоношения Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	-(2)	2(1)
0,1 мл/л воды(Л)	Перец сладкий открытого и защищенн ого грунта	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-ое - после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе массового цветения, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	2(-)
50-100 мл/га	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообра-зовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(1)
25-50 мл/т	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообра-зовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Арахидоновая кислота

Биодукс, Ж (0,3 г/л) ООО «ОРГАНИК ПАРК» ОГРН: 1127746020918 IV/III 173-07-730-1 29.07.2015 28.07.2025	0,02-0,05 мл/ 4 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенн ый грунт)	урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе 2-4 листьев, 2-ое – в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)	Активен
	1 мл/т	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

0,2 мл/кг	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести,усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Огурец (открытый и защищенн ый грунт)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести,усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
1 мл/т	Горох	Повышение полевой всхожести,усиление ростовых и	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/т	Рожь озимая	Повышение полевой всхожести,усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды,повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-3 мл/га	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести,усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды,повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,03-0,05 мл/3 л воды(Л)	Свекла столовая	формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)

1 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5 мл/т	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2-5 мл/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе цветения 1-й кисти, 2-ое - в фазе цветения 2-й кисти, 3-е - в фазе цветения 3-й кисти Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
2-5 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе 2-4 листьев, 2-ое – в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1-3 мл/га	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
3-10 мл/га	Соя	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе ветвления, 2-ое – в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

1 мл/т	Ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды(Л)	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
1-10 мл/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/т	Гречиха	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5-1 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – перед цветением, 2-ое - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(2)	-(-)
1-3 мл/га	Ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кушения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,2 мл/кг	Лук (чернушка)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,02-0,05 мл/ 4 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)
3-5 мл/га	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

1 мл/т	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/т	Соя	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2-5 мл/га	Лук (чернушка)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е – через 30-40 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды (Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
3-5 мл/га	Свекла столовая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1-3 мл/га	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды (Л)	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)

0,2 мл/кг	Морковь	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,1 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
1-3 мл/га	Рожь озимая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения-выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
2-5 мл/га	Капуста белокочанная	процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
3-10 мл/га	Горох	формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе полных всходов, 2-ое – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1-5 мл/га	Подсолнечник	формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 3-6 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)

1 мл/т	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
3-5 мл/га	Морковь	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,02 мл/ 200 мл воды(Л)	Лук (чернушка)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
1-2 мл/га	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе 2-5 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/т	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,02-0,05 мл/ 4 л воды(Л)	Лук (чернушка)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е – через 30-40 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
50-100 мл/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – перед цветением, 2-ое - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	-(-)

3-5 мл/га	Гречиха	формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,02-0,05 мл/4 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе цветения 1-й кисти, 2-ое - в фазе цветения 2-й кисти, 3-е - в фазе цветения 3-й кисти Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)
0,03-0,05 мл/3 л воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
1 мл/т	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,02 мл/100 мл воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)
2 мл/т	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)

0,02 мл/100 мл воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Огурцы открытого и защищенн ого грунта	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 3-х листьев, 2-е - в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(-)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в период бутонизации - начало цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
0,02 мл/100 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)

0,4 мл/кг	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения - выход в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,4 мл/кг	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,3 мл/1,5 л воды(Л)	Роза	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е после посадки (или в начале отрастания побегов), 2-е – в фазе выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
2 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,4 мл/2 л воды(Л)	Цветочные культуры (луковичн ые, клубнелук овичные, корневищн ые)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание в фазе выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 2 л/50 м2	-(1)	-(-)

60 мл/га	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е - через 30 дней после первого Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале фазы бутонизации, 2-е - в период цветения второй кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 4-5 листьев, 2-е - через 30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е в фазе выдвижения цветоносов, 2-е - через 30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
60 мл/га	Смородина черная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - через 30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

0,02 мл/ 100 мл воды(Л)	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян в течение 0,5-1 часа Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Смородин а черная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале фазы цветения, 2-е - через 30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
0,02 мл/ 100 мл воды(Л)	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание лука-севка перед посадкой на 0,5-1 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	-(1)	-(-)
0,02 мл/100 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищенн ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян в течение 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)
60 мл/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

1,6 мл/8 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(2)	-(-)
0,4 мл/кг	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян в течение 0,5-1 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,02 мл/100 мл воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)
0,6 мл/3 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 3 -х листьев, 2-е - в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
60 мл/га	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в период бутонизации - начало цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,3 мл/1,5 л воды(Л)	Декоративные культуры (кустарники)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е после посадки (или в начале отрастания побегов), 2-е – в период интенсивного роста побегов, 3-е – в фазе выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(3)	-(-)

60 мл/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в период цветения второй кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,3 мл/1,5 л воды(Л)	Цветочные культуры (однолетние, многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е в фазе полных всходов (или в начале отрастания побегов), 2-е – в фазе выдвижения бутонов Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
2 мл/т	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
160 мл/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(1)	-(-)
0,4 мл/кг	Огурцы открытого и защищенного грунта	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
200 мл/га	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - через месяц после первого Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	-(-)

60 мл/га	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е перед цветением, 2-е - через месяц после первого Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные, корневищные)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание посадочного материала перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 мл/кг	-(1)	-(-)
1,4 мл/т	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание лука-севка перед посадкой на 0,5-1 час Расход рабочей жидкости - 7 л/т	-(1)	-(-)
0,4 мл/кг	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

	0,6 мл/3 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	2 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе «рыхления бутонов», 2-е - через 30 дней после первого Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)	
Проросток, Р (0,015 г/л) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 Ш/Ш 033-07-1375-1 27.02.2017 26.02.2027	0,2 мл/ 100 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищённый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)	Активен
	2 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	
	0,2 мл/ 100 мл воды(Л)	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 0,5-1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)	

0,2 мл/ 100 мл воды(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)
4 мл/кг	Огурец (открытый и защищён ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
4 мл/кг	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 0,5-1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/ 100 мл воды(Л)	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание лука-севка перед посадкой на 0,5-1 час Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	-(1)	-(-)
4 мл/кг	Томат (открытый и защищён ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

4 мл/кг	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
14 мл/т	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание лука-севка перед посадкой на 0,5-1 час Расход рабочей жидкости - 7 л/т	-(-)	-(-)
0,2 мл/ 100 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищённый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)
4 мл/кг	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
20 мл/т	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

	20 мл/г	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2 мл/ 100 мл воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 20 мл/10 г	-(1)	-(-)	

Бензиладенина

Цаца, П (10 г/л) ООО «ТПК «РОСТИ» ОГРН: 1062312034223 Ш/Ш 286-07-2092-1 01.02.2019 31.01.2029	1,5-2 мг/ почку(Л)	Фиалка (сенполия)	Стимуляция размножения и цветения	Нанесение препарата тонким слоем, специальным аппликатором на спящую почку в пазухе листа на цветоносе	-(1)	-(-)	Активен
---	-----------------------	----------------------	-----------------------------------	--	------	------	---------

брасинон + 28-гомобрасинолид + долихолид

Эпиво Вигор, Ж (0,02 г/л + 0,025 г/л + 0,02 г/л) Плант Дизайнс Инк. ОГРН: - IV/III 681-07-3085-1 01.04.2021 31.03.2031	0,4-0,7	Пшеница яровая и озимая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,4-0,7	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	0,4-0,7	Ячмень яровой и озимый	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	

	0,8-1,4	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
	0,4-0,7	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(2)	-(-)
	0,4-0,7	Пшеница яровая и озимая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
	0,8-1,4	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	0,4-0,7	Ячмень яровой и озимый	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

гиббереллиновая кислота АЗ

Х-Панд, Ж (135 г/л) Столлер Интерпрайсис, Инк. ОГРН: - III/III 639-07-2810-1 29.09.2020 28.09.2030	0,2-0,4	Яблоня	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – после цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания, 3-е – через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	1(1)	Активен
	0,2-0,4	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – в фазе начала цветения второй кисти, 3-е – в фазе начала цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)	

	0,2-0,4	Пшеница озимая и яровая	Стимуляция развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	1(1)	
--	---------	-------------------------	---	---	------	------	--

гиббереллиновая кислота А3 + 4(индол-Зил) масляная кислота + 28-гомобрасинолид

Эрайз, Ж (0,01 г/л + 0,12 г/л + 0,032 г/л) «АВЕНТРО» Сарл ОГРН: - IV/- 018-07-3793-1 14.09.2022 13.09.2032	0,8-1,5	Ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести семян, иммунитета растений к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,8-1,5	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести семян, иммунитета растений к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

гиббереллиновая кислота А3 + 6-фурфуриламинопурина + 4(индол-Зил) масляная кислота

Стимулэйт, Ж (0,05 г/л + 0,09 г/л + 0,05 г/л) Столлер Интерпрайсис, Инк. ОГРН: - IV/III 639-07-3214-1 13.07.2021 12.07.2031	0,25-0,5 л/т	Пшеница озимая и яровая	Повышение полевой всхожести семян, стимуляция развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,25-0,5 л/т	Ячмень озимый и яровой	Повышение полевой всхожести семян, стимуляция развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,5-1 л/га	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	
	0,5-1 л/га	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 листьев, 2-е - в фазе 7-9 листьев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	

Гиббереллиновые кислоты А4 + А7

Гибб Плюс, ВРК (10 г/л + 10 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - III/III 586-07-2470-1 14.11.2019 13.11.2029	0,5	Яблоня	Стимуляция плодообразования, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в конце фазы цветения, 2-е и 3-е с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	1(1)	Активен
--	-----	--------	--	---	------	------	---------

Гиббера, ВР (10 г/л + 10 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-07-2170-1 28.03.2019 018-07-2170-1/344 344 27.03.2029	0,2	Капуста белокочан ная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе начала завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	Активен
	1 мл/л воды(Л)	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – в фазе начала цветения второй кисти, 3-е – в фазе начала цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	1(1)	
	1 мл/1,5 л воды(Л)	Капуста белокочан ная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе начала завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)	
	0,25-0,5	Яблоня	Стимуляция плодообразования, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в конце фазы цветения, 2-е и 3-е с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	1(1)	
	1 мл/л воды(Л)	Перец (защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)	
	0,3	Перец (защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	

2,5-5,0 мл/ 10 л воды(Л)	Яблоня	Стимуляция плодообразования, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в конце фазы цветения, 2-е и 3-е с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дерево	-(3)	1(1)
0,3	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – в фазе начала цветения второй кисти, 3-е – в фазе начала цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
1 мл/1,2 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)
1 мл/л воды(Л)	Баклажан (защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)
0,25	Огурец (открытый и защищенн ый грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

	0,3	Баклажан (защищенный грунт)	Стимуляция плодообразования, снижение опадения завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
--	-----	--------------------------------	---	---	------	------	--

Гиббереллиновые кислоты А4, А7

Новагиб, Р (10 г/л) Файн Агрокемикалс Лтд. ОГРН: - ПП/П 900-07-4297-1 11.12.2023 10.12.2033	0,5	Яблоня	Стимуляция плодообразования, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е и 3-е с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(3)	1(1)	Активен
---	-----	--------	--	---	------	------	---------

Гиббереллиновых кислот натриевые соли

Бутон, ВРП (5 г/кг) ЗАО «ТПК» «Техноэкспорт» ОГРН: 1025005325070 ПП/П 046-07-1861-1 09.04.2018 08.04.2028	15 г/10 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, увеличение выхода ранней продукции, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – в фазе начала цветения второй кисти, 3-е – в фазе начала цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)	Активен
	15 г/10 л воды(Л)	Капуста цветная	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 5-6 листьев, 2-е - в начале формирования головки, 3-е -- перед смыканием листьев над головкой Расход рабочей жидкости - 4 л/ 100м2	-(3)	-(-)	
	2 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (открытый и защищенный грунт)	Увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(2)	-(-)	
	10 г/10 л воды(Л)	Смородин а черная	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - после цветения, 3-е – в фазе начала формирования ягод Расход рабочей жидкости - 0,5 л/куст	-(3)	-(-)	
	15 г/10 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е -в фазе начала появления первого настоящего листа, 2-е –в фазе 6-8 листьев, 3-е – в фазе начала завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)	
	15 г/10 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе появления первого настоящего листа, 2-е – в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)	

15 г/10 л	Черешня, вишня	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - после цветения, 3-е - в фазе начала формирования ягод Расход рабочей жидкости - 1-3 л/дереву	-(3)	-(-)
20 г/10 л воды(Л)	Лук репчатый	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе массового отрастания листьев, 2-е - через 4-6 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
15 г/10 л воды(Л)	Дайкон	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазах 4-х листьев, 2-е - через 12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
15 г/10 л воды(Л)	Картофель	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
15 г/10 л воды(Л)	Перец сладкий (открытый и защищен ный грунт)	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, увеличение выхода ранней продукции, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начале цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
15 г/10 л воды(Л)	Картофель	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(1)	-(-)
1-2 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (луковичн ые, клубнелук овичные)	Повышение энергии прорастания, ускорение выхода цветоносов, улучшение декоративных качеств, увеличение урожая «деток»	Замачивание посадочного материала перед посадкой на 5 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	-(1)	-(-)
15 г/10 л воды(Л)	Баклажан (открытый и защищен ный грунт)	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, увеличение выхода ранней продукции, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)

	10 г/10 л воды(Л)	Земляника	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы цветения, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)	
	2 г/л воды(Л)	Цветочные культуры (горшечные растения)	Увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - до смачивания поверхности листьев	-(2)	-(-)	
	10 г/10 л воды(Л)	Яблоня	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - после цветения, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву	-(3)	-(-)	
	15 г/10 л воды(Л)	Горох овощной, фасоль	Увеличение ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)	
Гибберсиб, П (90 г/кг) ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН: 1035404721780 ПП 034-07-1313-1 23.12.2016 22.12.2026	0,9-1,2	Виноград (бессемянные сорта)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в конце фазы цветения Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	30 г/га	Лук репчатый (семенные посадки)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности.	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе массового стрелкования, 2-е - через 4-6 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	30-40 г/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения 1-й кисти, 2-е – в фазе цветения 2-й кисти, 3-е - в фазе цветения 3-й кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)	
	21 г/га	Капуста белокочанная (поздние сорта)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе начала завязывания кочана, 3-е - через 10-12 дней после второй обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)	

0,1 г/1,5 л воды(Л)	Капуста белокочан ная (поздние сорта)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе начала завязывания кочан, 3-е - через 10-12 дней после второй обработки Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(3)	-(-)
0,1 г/2 л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение общей и товарной урожайности. Улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала массового цветения, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 2 л/70 м2	-(2)	-(-)
0,1 г/2 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенн ый грунт)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1 –е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 2 л/40 м2	-(2)	-(-)
30 г/га	Люцерна (семенные посевы)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности.	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
21 г/га	Капуста белокочан ная (ранние сорта)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - через 10-12 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучше ние товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в конце фазы цветения, 2-е - в фазе образования завязи Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(2)	-(-)
30 г/га	Баклажан (открытый и защищенн ый грунт)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
30 г/га	Многоком понент-ная бобово-зла ковая травосмес ь	Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности. Улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе побегообразования (клевер) и начала кущения (злаковые культуры), 2-е и 3-е- через 5-7 дней после скашивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

30 г/га	Кострец безостый, фестулолиум (травостой первого года пользования)	Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности. Улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е - через 5-7 дней после скашивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,1 г/1,5 л воды(Л)	Капуста белокочанная (ранние сорта)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 6-8 листьев, 2-е – через 10-12 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
15 г/га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение общей и товарной урожайности. Улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е- в фазе начала массового цветения, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
7,5 г/га	Горох овощной	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
20-40 г/га	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала образования корзинки, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
6-20 г/га	Фасоль	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,1 г/л воды(Л)	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 1 л/30 м2	-(2)	-(-)
0,1 г/л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения 1-й кисти, 2-е – в фазе цветения 2-й кисти, 3-е – в фазе цветения 3-й кисти Расход рабочей жидкости - 1 л/30 м2	-(3)	-(-)

	21-30 г/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида плодов, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)	
	60-90 г/га	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в конце фазы цветения, 2-е - в фазе образования завязи Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(2)	-(-)	
Гибберелон, ВРП (40 г/кг) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 Ш/Ш 427-07-2226-1 20.05.2019 19.05.2029	20-80 г/га	Перец (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	Активен
	150 г/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазу цветения, 2-е в фазу образования завязи Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	-(-)	
	0,2-0,4 г/2 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	-(2)	-(-)	
	70-100 г/га	Горох	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	1,5-2 г/10 л воды(Л)	Яблоня	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - после цветения, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 2-5 л/дереву	-(3)	-(-)	

0,4 г/2 л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы массового цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	-(2)	-(-)
80-120 г/га	Пшеница яровая, пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)
20-80 г/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)
25-75 г/га	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе начала образования корзинки, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)
50-80 г/га	Рапс яровой и озимый	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – фазе ветвления, 2-е – в период бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)
0,2-0,4 г/2 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения 1-ой кисти, 2-е – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	-(3)	-(-)
5-20 г/10 л	Цветочно-декоративные культуры	Улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Опрыскивание растений: 1-е в фазе бутонизации, 2-е в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	-(2)	-(-)

50-80 г/т	Пшеница яровая, пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
80-120 г/га	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)
30-70 г/га	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)
5-20 г/10 л воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры	Улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Опрыскивание растений: 1-е в фазе бутонизации, 2-е в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	-(2)	-(-)
150-200 г/га	Яблоня	Снижение осыпаемости завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - после цветения, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 7-10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)
40-80 г/т	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50-80 г/т	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,2-0,4 г/2 л воды(Л)	Перец (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 2-4 л/100 м2	-(2)	-(-)
80-120 г/га	Рис	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения - начала выхода в трубку, 2-е - в фазе выметывания метелки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
40-80 г/га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы массового цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)
1,5-2 г/10 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазу цветения, 2-е в фазу образования завязи Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(2)	-(-)
4-8 г/л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
20-80 г/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения 1-ой кисти, 2-е – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	-(-)
50-80 г/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания; повышение урожайности; улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 6-8 листьев или в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(-)

Плодостим, К (5,5 г/кг) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-07-443-1 28.10.2014 27.10.2024	420 г/га	Капуста белокочанная (ранние и поздние сорта)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе начала завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	Не активен
	14 г/10 л воды(Л)	Фасоль	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	3 кг/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в конце цветения Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(1)	-(-)	
	20 г/10 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в конце цветения Расход рабочей жидкости - 15 л/100м2	-(1)	-(-)	
	800 -1200 г/га	Малина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	-(-)	
	420 г/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	180 г/га	Горох овощной	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	

20 г/10 л воды(Л)	Перец сладкий	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
1200 г/га	Слива	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)
1200 г/га	Смородина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)
20 г/10 л воды(Л)	Груша	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
20 г/10 л воды(Л)	Баклажан	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
20 г/10 л воды(Л)	Земляника садовая	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале появления цветоносов, 2-е - через 7 дней после первого Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
1200 г/га	Вишня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)

20 г/10 л воды(Л)	Малина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	-(2)	-(-)
20 г/10 л воды(Л)	Смородина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(2)	-(-)
300 г/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы массового цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
14 г/10 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
800 г/га	Земляника садовая	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале появления цветоносов, 2-е - через 7 дней после первого Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
1200 г/га	Яблоня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)
420 г/га	Фасоль	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
6 г/10 л воды(Л)	Горох овощной	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)

20 г/10 л воды(Л)	Яблоня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание : 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 6 л/100м ²	-(2)	-(-)
14 г/10 л воды(Л)	Капуста белокочанная (ранние и поздние сорта)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе начала завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
600 г/га	Баклажан	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
20 г/10 л воды(Л)	Вишня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 6 л/100м ²	-(2)	-(-)
800 г/га	Груша	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
10 г/10 л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в начале фазы массового цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
600 г/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения 1-ой кисти, 2-е – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

	20 г/10 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения 1-ой кисти, 2-е – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)	
	600 г/га	Перец сладкий	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	20 г/10 л воды(Л)	Слива	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадания лепестков Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(2)	-(-)	
Цветень, К (0,9 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 Ш/Ш 012-07-759-1 24.08.2015 23.08.2025	5 г/3 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	Активен
	2,5 г/3 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение общей урожайности, увеличение выхода товарной продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е – в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	5 г/3 л воды	Фасоль	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышения урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	5 г/2,5-3 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышения урожайности	Опрыскивание в конце цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/9 растений	-(1)	-(-)	

	5 г/3 л воды(Л)	Баклажан, перец сладкий	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	5 г/3 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости плодов, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в начале цветения 1-й кисти, 2-е – в начале цветения 2-ой кисти, 3-е – в начале цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)	
Завязь, КРП (5,5 г/кг) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 Ш/Ш 186-07-4808-1 12.02.2025 11.02.2035	1,2 кг/га	Смородина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(1)	Активен
	0,3 кг/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы массового цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)	
	1,2 кг/га	Вишня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(1)	
	3 кг/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в конце фазы цветения. Расход рабочей жидкости - 1500 л/га	-(2)	-(1)	
	0,42 кг/га	Капуста белокочанная (среднепоздние и поздние сорта)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе начала завязывания кочана, 3-е – через 10-12 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(1)	
	20 г/10 л воды (Л)	Груша	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	-(2)	1(-)	

20 г/10 л воды (Л)	Смородин а	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей. Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м2	-(2)	1(-)
1,2 кг/га	Яблоня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(1)
0,8 кг/га	Груша	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	-(1)
20 г/10 л воды (Л)	Вишня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м2	-(2)	1(-)
0,8 кг/га	Земляника садовая	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе выдвижения цветоносов, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(1)
20 г/10 л воды (Л)	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
0,6 кг/га	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

0,18 кг/га	Горох овощной	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)
20 г/10 л воды (Л)	Яблоня	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м2	-(2)	1(-)
0,42 кг/га	Огурец (открытый и защищен ный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
14 г/10 л воды (Л)	Огурец (открытый и защищен ный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения (появление единичных цветков), 2-е – в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
6 г/10 л воды (Л)	Горох овощной	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
10 г/10 л воды (Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы массового цветения, 2-е – через 7 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
14 г/10 л воды (Л)	Капуста белокочан ная (среднепоз дние и поздние сорта)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе начала завязывания кочана, 3-е – через 10-12 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(3)	1(-)
20 г/10 л воды (Л)	Малина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей. Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	-(2)	1(-)

14 г/10 л воды (Л)	Фасоль	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
0,6 кг/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения 1-ой кисти, 2-е – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
0,8-1,2 кг/га	Малина	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - в фазе зеленых завязей. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	-(1)
0,42 кг/га	Фасоль	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)
14 г/10 л воды (Л)	Капуста белокочанная (ранние сорта)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе начала завязывания кочана. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
1,2 кг/га	Слива	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(1)
20 г/10 л воды (Л)	Слива	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - после опадения лепестков. Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м2	-(2)	1(-)

20 г/10 л воды (Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения 1-ой кисти, 2-е – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(3)	1(-)
20 г/10 л воды (Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в конце фазы цветения Расход рабочей жидкости - 15 л/100 м2	-(2)	1(-)
20 г/10 л воды (Л)	Земляника садовая	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе выдвижения цветоносов, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2	-(2)	1(-)
0,42 кг/га	Капуста белокочанная (ранние сорта)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 листьев, 2-е - в фазе начала завязывания кочана. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)
0,6 кг/га	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Стимуляция образования и снижение опадения завязей, ускорение созревания, повышение устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации, 2-е – в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

Гидроксикоричная кислота

Домоцвет, Р (0,05 г/л) ННПП «НЭСТ М» ОГРН: 1027739149580 ППП 233-07-1772-1 30.03.2016 29.03.2026	1 мл/2 л воды(Л)	Мелисса лекарственная	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Замачивание корневой системы перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/5 шт	-(1)	-(-)	Активен
	0,1 мл/200 мл воды(Л)	Роза	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 шт	-(1)	-(-)	

2 мл/л воды(Л)	Нарцисс	Активизация ростовых процессов, увеличение размера бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Замачивание луковиц перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды	Сенполия фиалковая	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание маточного растения за сутки до отбора листьев	-(1)	-(-)
60 мл/га	Мелисса лекарствен ная	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е - при достижении высоты растений 4-5 см, 2-е - через 12-14 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,1 мл/500 мл воды(Л)	Роза	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание укорененных черенков: 1-е - через 7 дней после высадки, 2-е - через 7 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 150 мл/10 шт	-(2)	-(-)
1 мл/100 шт.	Лимон	Повышение приживаемости, активизация корнеобразования	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)
0,1 мл/500 мл воды(Л)	Бегония	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств растений, повышение устойчивости к поражению болезнями	Опрыскивание в начале появления первых бутонов, второе и третье опрыскивание с интервалом 10-14 дней	-(3)	-(-)
1 мл/100 шт.	Фигус бенджами- на, жасмин, мирт, драцена	Повышение приживаемости	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/100 шт	-(1)	-(-)
0,2 мл/100 шт.	Бальзамин новогвинейский	Стимуляция развития корневой системы, укоренения и начала цветения	Опрыскивание черенков, помещенных в сосуды с питательным раствором, за 7-10 дней до высадки Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/100 шт	-(1)	-(-)
0,2 мл/100 шт.	Бальзамин новогвинейский	Стимуляция развития корневой системы, укоренения и начала цветения	Опрыскивание черенков, помещенных в сосуды с питательным раствором, за 7-10 дней до высадки Расход рабочей жидкости - 2 л/100 шт	-(1)	-(-)
30-60 мл/га	Тюльпан	Ускорение появления всходов, активизация ростовых процессов, увеличение высоты растений, размера листьев и бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Опрыскивание: 1-е - в фазе первого листа, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

1 мл/100 шт.	Хризантем а корейская	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/100 шт	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Бальзамин новогвинейский	Стимуляция развития корневой системы, укоренения и начала цветения	Опрыскивание черенков, помещенных в сосуды с питательным раствором, за 7-10 дней до высадки Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 шт	-(1)	-(-)
1 мл/кг	Цикламен	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Душица обыкновенная	Повышение всхожести, ускорение прорастания, повышение качества рассады, активизация ростовых процессов: увеличение высоты растений, числа побегов и их облиственности	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3 пар листьев, 2-е - через 12 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,5 мл/кг	Душица обыкновенная	Повышение всхожести, ускорение прорастания, повышение качества рассады, активизация ростовых процессов: увеличение высоты растений, числа побегов и их облиственности	Замачивание семян перед посевом на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Душица обыкновенная	Повышение всхожести, ускорение прорастания, повышение качества рассады, активизация ростовых процессов: увеличение высоты растений, числа побегов и их облиственности	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3 пар листьев, 2-е - через 12 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(2)	-(-)
0,1-0,2 мл/л воды(Л)	Тюльпан	Ускорение появления всходов, активизация ростовых процессов, увеличение высоты растений, размера листьев и бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Опрыскивание: 1-е - в фазе первого листа, 2-е - в фазе бутонизации	-(2)	-(-)
2 мл/кг	Нарцисс	Активизация ростовых процессов, увеличение размера бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Замачивание луковиц перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
60 мл/га	Гладиолус	Ускорение появления всходов, наступления начала цветения, увеличение длины цветоносов	Опрыскивание: 1-е – в фазе всходов, 2-е – в фазе начала образования соцветий Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

30 мл/га	Цикламен	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е – в начале отрастания первых листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - при необходимости (при неблагоприятных условиях выращивания) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2-3)	-(-)
0,1 мл/200 мл воды(Л)	Душица обыкновенная	Повышение всхожести, ускорение прорастания, повышение качества рассады, активизация ростовых процессов: увеличение высоты растений, числа побегов и их облиственности	Замачивание семян перед посевом на 6 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Мелисса лекарственная	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е - при достижении высоты растений 4-5 см, 2-е - через 12-14 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(2)	-(-)
1 мл/5 л воды	Хризантема корейская	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание укорененных черенков через 7 дней после высадки и через 7 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/100 шт	-(2)	-(-)
0,1-0,2 мл/л воды(Л)	Ипомея	Повышение приживаемости, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, удлинение срока продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(1)	-(-)
2 мл/кг	Лук декоративный	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, удлинение срока продолжительности цветения, повышение декоративных качеств растений	Замачивание луковиц перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Цикламен	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е – в начале отрастания первых листьев, 2-е – в фазе бутонизации, 3 –е – при необходимости (при неблагоприятных условиях выращивания) Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(2-3)	-(-)

2 мл/кг	Тюльпан	Ускорение появления всходов, активизация ростовых процессов, увеличение высоты растений, размера листьев и бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Замачивание луковиц перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,1 мл/100 мл воды(Л)	Лимон	Повышение приживаемости, активизация корнеобразования	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 шт	-(1)	-(-)
1 мл/л воды	Фикус бенджамина, жасмин, мирт, драцена	Повышение приживаемости	Опрыскивание черенков: 1-е - после высадки, 2-е - через 12 дней после первой обработки	-(2)	-(-)
30-60 мл/га	Лук декоративный	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, удлинение срока продолжительности цветения, повышение декоративных качеств растений	Опрыскивание в фазе начала	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Цикламен	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание в начале отрастания первых листьев, в фазе бутонизации и при необходимости (при неблагоприятных условиях выращивания) Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(2-3)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Тюльпан	Ускорение появления всходов, активизация ростовых процессов, увеличение высоты растений, размера листьев и бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Замачивание луковиц перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/100 шт.	Роза	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/100 шт	-(1)	-(-)
0,1-0,2 мл/л воды(Л)	Ипомея	Повышение приживаемости, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, удлинение срока продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание за сутки до высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 шт	-(1)	-(-)
30 мл/га	Пиретрум девичий	Активизация ростовых процессов, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание: 1-е - в фазе всходов, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - через 14 дней после второй обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

0,1-0,2 мл/л воды(Л)	Лук декоративн ый	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, удлинение срока продолжительности цветения, повышение декоративных качеств растений	Опрыскивание в фазе начала	-(1)	-(-)
0,1-0,2 мл/л воды(Л)	Нарцисс	Активизация ростовых процессов, увеличение размера бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Опрыскивание: 1-е - в фазе всходов, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(2)	-(-)
0,1-0,2 мл/20 шт.	Сенполия фиалковая	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, улучшение декоративных качеств растений	Выдерживание листочков в растворе перед укоренением в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)
0,1-0,2 мл/л воды(Л)	Сенполия фиалковая	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, улучшение декоративных качеств	Выдерживание листочков в растворе перед укоренением в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/20 шт	-(1)	-(-)
0,1 мл/200 мл воды(Л)	Хризантем а корейская	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 шт	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды	Бегония, бальзамин, пеларгония и цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение приживаемости, активизация корнеобразования	Опрыскивание маточного растения за сутки до отбора листьев	-(1)	-(-)
1-2 мл/кг	Гладиолус	Ускорение появления всходов, наступления начала цветения, увеличение длины цветоносов	Замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/5 л воды	Роза	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание растений через	-(2)	-(-)
0,1 мл/л воды	Сенполия фиалковая	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание листочков, помещенных на укоренение в воду: 1-е - через 7 дней, 2-е - через 17 дней после первой обработки	-(2)	-(-)

0,1 мл/500 мл воды(Л)	Хризантем а корейская	Ускорение корнеобразования, стимуляция роста побегов, ускорение цветения, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание укорененных черенков: 1-е - через 7 дней после высадки, 2-е - через 7 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 150 мл/10 шт	-(2)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Бегония, бальзамин, пеларгония и цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение приживаемости, активизация корнеобразования	Опрыскивание маточного растения за сутки до отбора листьев	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Сенполия фиалковая	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание маточного растения за сутки до отбора листьев	-(1)	-(-)
1-2 мл/л воды(Л)	Гладиолус	Ускорение появления всходов, наступления начала цветения, улучшение декоративных качеств	Замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/50 шт.	Мята перечная	Ускорение прорастания, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Замачивание корневищ перед посадкой на 4 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/50 шт	-(1)	-(-)
60 мл/га	Мята перечная	Ускорение прорастания, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е - в начале отрастания, 2-е - через 14 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,1 мл/500 мл воды(Л)	Гладиолус	Ускорение появления всходов, наступления начала цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е - в фазе всходов, 2-е - в фазе начала образования соцветий Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(2)	-(-)
0,2 мл/л воды(Л)	Мята перечная	Ускорение прорастания, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е - в начале отрастания, 2-е - через 14 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(2)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Цикламен	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Замачивание клубнелуковиц перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

0,1 мл/100 мл воды(Л)	Фигус бенджамина, жасмин, мирт, драцена	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Опрыскивание черенков: 1-е - после высадки, 2-е - через 12 дней после первой обработки	-(2)	-(-)
0,1 мл/л воды	Бегония, бальзамин, пеларгония и цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение приживаемости, активизация корнеобразования	Опрыскивание листьев с черешками, помещенных на укоренение в воду, до появления развитой корневой системы с интервалом 5-6 дней и после высадки в горшки с интервалом 30 дней	-(8)	-(-)
30-60 мл/га	Нарцисс	Активизация ростовых процессов, увеличение размера бутонов, улучшение декоративных качеств, увеличение продолжительности цветения	Опрыскивание: 1-е - в фазе всходов, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,2-0,4 мл/100 шт.	Ипомея	Повышение приживаемости, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, удлинение срока продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание за сутки до высадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 2 л/100 шт	-(1)	-(-)
30-60 мл/га	Ипомея	Повышение приживаемости, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, удлинение срока продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Пиретрум девичий	Активизация ростовых процессов, улучшение декоративных качеств растений	Опрыскивание: 1-е - в фазе всходов, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - через 14 дней после второй обработки Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(3)	-(-)
0,1 мл/200 мл воды(Л)	Фигус бенджамина, жасмин, мирт, драцена	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов	Замачивание черенков перед укоренением на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 шт	-(1)	-(-)
0,2 мл/л воды	Бегония	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, улучшение декоративных качеств, повышение устойчивости к поражению болезнями	Опрыскивание: 1-е - в начале появления первых бутонов, 2-е и 3-е опрыскивание - с интервалом 10-14 дней	-(3)	-(-)
0,1 мл/л воды(Л)	Бегония, бальзамин, пеларгония и цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение приживаемости, активизация корнеобразования	Опрыскивание листьев с черешками, помещенных на укоренение в воду, до появления развитой корневой системы с интервалом 5-6 дней и после высадки в горшки с интервалом 30 дней	-(8)	-(-)

	0,1 мл/200 мл воды(Л)	Мята перечная	Ускорение прорастания, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Замачивание корневищ перед посадкой на 4 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/5 шт	-(1)	-(-)	
	0,1 мл/л воды(Л)	Сенполия фиалковая	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, увеличение количества бутонов, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание листочков, помещенных на укоренение в воду: 1-е - через 7 дней, 2-е - через 17 дней после первой обработки	-(2)	-(-)	
	2 мл/л воды(Л)	Лук декоративный	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, удлинение срока продолжительности цветения, повышение декоративных качеств растений	Замачивание луковиц перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)	
	1 мл/50 шт.	Мелисса лекарственная	Повышение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями	Замачивание корневой системы перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/50 шт	-(1)	-(-)	
	30-60 мл/га(Л)	Лук декоративный	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления цветения, удлинение срока продолжительности цветения, повышение декоративных качеств растений	Опрыскивание в фазе начала	-(1)	-(-)	
Циркон, Р (0,1 г/л) ННПП «НЭСТ М» ОГРН: 1027739149580 Ш/Ш 233-07-1775-1 30.03.2016 29.03.2026	0,1 мл/4 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение энергии прорастания, всхожести семян, улучшение развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание в фазе полной листовой розетки и в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)	Активен
	25-40 мл/га	Рапс яровой	Активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(-)	

50 мл/га	Копеечник альпийский (второго года и последующих лет вегетации)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – весной, в фазе отрастания культуры, 2-е - через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
30 мл/га	Сосна крымская	Активизация ростовых процессов	Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
80 мл/га	Плодовые культуры (семечковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение степени вызревания побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 500 -800 л/га	-(1)	-(-)
0,05 мл/100 мл воды(Л)	Барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга (укоренение черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудноукореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 черенков	-(-)	-(-)
3 мл/3 л воды(Л)	Перец открытого и защищенного грунта	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение ранней и общей урожайности	Опрыскивание в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
0,012 мл/100 мл воды(Л)	Крыжовник (укоренение черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(-)	-(-)
0,1-0,2 мл/150 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорения созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 150 мл/100 г	-(1)	-(-)
30 мл/га	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, активизация ростовых процессов	Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

4 мл/т	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5 мл/л воды	Вишня (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
125 мл/га	Черешня, вишня, слива	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, снижение опадания завязей, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 500 л/га	-(1)	-(-)
0-16 мл/кг	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	-(1)	-(-)
0,3 мл/3 л воды(Л)	Сосна крымская	Усиление ростовых процессов	Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль) Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
10 мл/га	Арбуз	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение	Опрыскивание: 1-е - в фазе "шарика", 2-е - в начале цветения, 3-е - в начале формирования завязей Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(3)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Хризантема гелениум	Ускорение начала цветения	Опрыскивание перед формированием бутонов Расход рабочей жидкости - 1 л/30 м ²	-(1)	-(-)

0,25 мл/кг	Морковь	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/кг	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, улучшение приживаемости рассады, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, повышение урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,05 мл/4 л воды(Л)	Морковь	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, улучшение качества, улучшение фитосанитарного состояния посевов	Опрыскивание в фазе 2-3-х настоящих листьев и в фазе пучковой спелости (8-10 настоящих листьев) Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	-(-)
10 мл/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в начале бутонизации Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(2)	-(-)
25 мл/га	Капуста цветная	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, улучшение приживаемости рассады, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание через 7 дней после высадки рассады Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)

0,1 мл/кг	Копеечник альпийский (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 250 мл/кг	-(1)	-(-)
2 мл/8-10 л воды(Л)	Виноград (южная зона промышленного возделывания)	Усиление ростовых процессов, повышение степени вызревания побегов, урожайности и качества продукции	Опрыскивание в конце фазы цветения и через 14 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м ²	-(2)	-(-)
35 мл/га	Ноготки лекарственные	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
50-100 мл/га	Лен - долгунец	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности семян и льносоломы, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е – в фазе “елочки” Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(2)	-(-)
0,1 мл/350 мл воды(Л)	Дыня	Повышение всхожести семян, усиление ростостимулирующей активности, ускорение прохождения фенофаз, увеличение урожайности, улучшение качества, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание семян на 8 часов	-(1)	-(-)
0,2-0,25 мл/л воды	Роза (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 4 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
3 мл/3 л воды(Л)	Огурец открытого и защищенного грунта	Повышение всхожести, увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)

3 мл/3 л воды(Л)	Баклажан открытого и защищенного грунта	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
1 мл/л воды	Яблоня (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
70 мл/га	Хризантема корейская	Улучшение приживаемости растений, активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления фазы бутонизации и цветения, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение	Опрыскивание растений после посадки Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
20-40 мл/га	Кукуруза	Активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе 7-8 листьев Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(2)	-(-)
0,1 мл/3 л воды(Л)	Дыня	Повышение всхожести семян, усиление ростостимулирующей активности, ускорение прохождения фенофаз, увеличение урожайности, улучшение качества, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание: в фазе 2-3 настоящих листьев, в начале цветения и в начале формирования завязей Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(3)	-(-)
10 мл/т	Рис	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,25 мл/л воды	Груша (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
30 мл/га	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, снижение опадания завязей, повышение иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,18 мл/л воды	Смородина красная (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
2,5 мл/2,5 л воды(Л)	Капуста цветная	Увеличение выхода стандартной рассады, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений через Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
0,3-0,6 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
40-50 мл/га	Мята перечная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе 5-6 листьев, 2-е - через 20-25 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
35 мл/га	Наперстянка шерстистая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - весной, в фазе начала отрастания культуры, 2-е - через 7-10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)

0,12 мл/л воды	Крыжовник (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
0,05 мл/100 мл воды(Л)	Вишня (укоренение черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(-)	-(-)
1 мл/кг	Арбуз	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение	Замачивание семян на 4-8 часов Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(1)	-(-)
0,1 мл/100 мл воды(Л)	Сакура, туя западная (укоренение черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудноукореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков на 14 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 черенков	-(-)	-(-)
0,02-0,025 мл/100 мл воды(Л)	Роза (укоренение черенков)	Ускорение появления каллуса и корней, усиление ростовых процессов	Замачивание черенков на 4 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(-)	-(-)
150 мл/га	Чубушник, бирючина, гортензия (саженцы)	Улучшение приживаемости растений, активизация ростовых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание через день после пересадки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,5-1 мл/л воды	Клематис (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 16 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
4 мл/8-10 л воды(Л)	Виноград (северная зона промышленного возделывания)	Усиление ростовых процессов, повышение степени вызревания побегов, урожайности и качества продукции	Опрыскивание в конце фазы цветения и через 14 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(2)	-(-)

0,2 мл/кг	Валериана лекарственная (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Замачивание семян на 4 часа Расход рабочей жидкости - 250 мл/кг	-(1)	-(-)
0,02 мл/кг	Пихта кавказская	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, активизация ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
30 мл/га	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
30 мл/га	Валериана лекарственная (второго года вегетации)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – весной, в фазе начала отрастания культуры, 2-е - через 7-10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
20-40 мл/га	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е – в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1-2)	-(-)
30 мл/га	Чубушник, бирючина, гортензия (саженцы)	Улучшение приживаемости растений, активизация ростовых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание перед пересадкой Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
40 мл/га	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе первой пары листьев, 2-е – в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(2)	-(-)

0,001 мл/100 мл воды(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение энергии прорастания, всхожести семян, улучшение развития корневой системы, усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, улучшение качества	Замачивание семян на 6-12 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,1 мл/л воды	Дейция шершавая, миндаль трехлопаст ный, сирень, вишня войлочная (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 14 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/500 шт	-(1)	-(-)
0,1 мл/100 мл воды(Л)	Капуста цветная	Увеличение выхода стандартной рассады, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества	Замачивание семян на 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
30 мл/га	Валериана лекарствен ная (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 настоящих листьев, 2-е - через 7-10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
25 мл/га	Морковь	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе пучковой спелости (8-10 листьев) Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
10 мл/га	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации - начала цветения Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(-)
2 мл/кг	Плодовые культуры (семечков ые)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, улучшение качества сеянцев	Замачивание семян на 18 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

0,2 мл/кг	Кедр сибирский, кедр корейский	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, активизация ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2 мл/200 мл воды(Л)	Груша	Повышение всхожести семян, ускорение прорастания, повышение устойчивости к болезням	Замачивание семян перед стратификацией на 18 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(2)	-(-)
5 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,2 мл/л	Облепиха (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 14-16 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/100 шт	-(1)	-(-)
0,4-0,8 мл/4 л воды(Л)	Роза защищенн ого грунта	Усиление ростовых процессов, увеличение высоты растений, числа побегов, повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание в начале отрастания побегов Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(1)	-(-)
1 мл/5-10 л воды(Л)	Яблоня	Увеличение урожайности, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/дерево	-(2)	-(-)
1,5 мл/1,5л воды(Л)	Капуста цветная	Увеличение выхода стандартной рассады, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание рассады в фазе 2-3-х настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 1,5 л/100м2	-(1)	-(-)
5 мл/5 л воды(Л)	Алыча	Снижение опадания завязей, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	-(1)	-(-)
20-50 мл/га	Соя	Активизация ростовых формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е -в фазе 3-х листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(2)	-(-)

0,1 мл/100 мл воды(Л)	Яблоня (укоренени е черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(1)	-(-)
10 мл/га	Дыня	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, <u>повышение</u>	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3-х настоящих листьев, 2-е -в начале цветения, 3-е - в начале формирования завязей Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(3)	-(-)
1 мл/кг	Капуста цветная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, улучшение приживаемости рассады, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, <u>повышение урожайности</u>	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,3-0,6 мл/3 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорения созревания, увеличение выхода ранней продукции, <u>повышение</u>	Опрыскивание: 1-е - за 1-2 дня до высадки рассады, 2-е - в начале бутонизации, 3-е - в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(3)	-(-)
30 мл/га	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе 2-4-х листьев Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
3 мл/3 л воды(Л)	Земляника	Увеличение урожайности, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)

0,025 мл/100 мл воды(Л)	Морковь	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожайности, улучшение качества, улучшение фитосанитарного состояния посевов	Замачивание семян на 6-12 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,5 мл/л	Кипарисовик горохоплодный, ель колючая, можжевельник сибирский (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 14 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)
35 мл/га	Копеечник альпийский (первого года вегетации)	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание при высоте растений 10-12 см Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1)	-(-)
0,05 мл/100 мл воды(Л)	Кипарисовик горохоплодный, ель колючая, можжевельник сибирский (укоренение черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудноукореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков на 14 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/10 черенков	-(-)	-(-)
1 мл/100 мл воды(Л)	Перец открытого и защищенного грунта	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение ранней и общей урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1,25 мл/100 мл воды(Л)	Огурец открытого и защищенного грунта	Повышение всхожести, увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание семян на 1-8 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
400 мл/га	Виноград (северная зона промышленного возделывания)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным факторам среды, повышение степени вызревания побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в конце фазы цветения, 2-е - через 14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(2)	-(-)
1,25 мл/5 л воды(Л)	Черешня, вишня, слива	Снижение опадания завязей, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	-(2)	-(-)

0,1 мл/3 л воды(Л)	Арбуз	Повышение всхожести семян, усиление ростостимулирующей активности, ускорение прохождения фенофаз, увеличение урожайности, улучшение качества, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание: в фазе “шарика”, в начале цветения и в начале формирования завязей Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)
1 мл/кг	Женьшень	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Замачивание семян на 12 часов Расход рабочей жидкости - 3 л/кг	-(1)	-(-)
0,7 мл/3 л воды(Л)	Хризантема корейская	Увеличение средней высоты растения, ускорение наступления фазы бутонизации и цветения, увеличение количества бутонов на растении	Опрыскивание после посадки Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
30 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
30 мл/га	Хризантема гелениум	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления цветения, повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание перед формированием бутонов Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
0,1 мл/кг	Салат листовой (на семена)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, повышение семенной продуктивности	Замачивание семян на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

40 мл/т	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/га	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, улучшение приживаемости рассады, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е - в фазе 5-6 листьев, 2-е – в фазе начала образования кочана Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(2)	-(-)
0,18 мл/л воды	Слива (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/200 шт	-(1)	-(-)
40-50 мл/га	Лапчатка белая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала отрастания культуры, 2-е – через 25-30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
500 мл/га	Алыча	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, снижение опадания завязей, повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 500 л/га	-(1)	-(-)
200 мл/га	Виноград (южная зона промышленного возделывания)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение степени вызревания побегов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в конце фазы цветения, 2-е - через 14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га	-(2)	-(-)

0,3 мл/3 л воды(Л)	Чубушник, бирючина, гортензия (пересадка растений)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Опрыскивание перед пересадкой Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
0,5-1 мл/л воды	Шиповник (корнеотпрыски)	Улучшение приживаемости растений, активизация ростовых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды	Замачивание корневой системы на 14-16 часов Расход рабочей жидкости - 10 л/30 растений	-(1)	-(-)
35 мл/га	Женьшень	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание при появлении 2-х настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1)	-(-)
0,1 мл/кг	Наперстянка шерстистая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 250 мл/кг	-(1)	-(-)
40 мл/га	Смородина черная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, снижение опадания завязей, повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/л воды	Сакура, туя западная (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 14 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/500 шт	-(1)	-(-)
0,2 мл/кг	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, активизация ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

1 мл/кг	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/кг	Цветочно-декоративные культуры (луковичные, клубнелуковичные)	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления и цветения, повышение декоративных качеств	Замачивание посадочного материала на 20-22 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 -2 мл/т	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3 мл/3 л воды(Л)	Листовница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов	Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль) Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(1)	-(-)
0,5 мл/л	Барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 черенков	-(1)	-(-)
10 мл/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-ое - за 1-2 дня до высадки рассады, 2-е - в начале бутонизации, 3-е - в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(3)	-(-)

5 мл/га	Морковь	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе 2-3-х листьев Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/кг	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Гладиолус	Ускорение начала цветения	Замачивание клубнелуковиц на 20-22 часа перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
60-100 мл/га	Шиповник	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – весной, в фазе отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
35 мл/га	Змееголовник молдавский	Активизация ростовых процессов, снижение опадения завязей, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в начале возобновления вегетации, 2-е - через 7-8 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
15 мл/га	Капуста цветная	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательных процессов, улучшение приживаемости рассады, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе 2-3-х настоящих листьев Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)

1 мл/кг	Дыня	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, <u>повышение</u>	Замачивание семян на 4-8 часов Расход рабочей жидкости - 350 мл/100 г	-(1)	-(-)
40-80 мл/га	Роза (защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления цветения, повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание в начале отрастания побегов Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(1)	-(-)
0,04 мл/100 мл воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	-(1)	-(-)
0,018 мл/100 мл воды(Л)	Смородина красная (укоренение черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(-)	-(-)
0,35 мл/3,5 л воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации - начало цветения Расход рабочей жидкости - 3,5 л/100м ²	-(1)	-(-)
0,05-0,1 мл/100 мл воды(Л)	Клематис (укоренение черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудноукореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков на 16 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(-)	-(-)

0,002 мл/200 мл воды(Л)	Пихта кавказская	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, усиление ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,1 мл/350 мл воды(Л)	Арбуз	Повышение всхожести семян, усиление ростостимулирующе й активности, ускорение прохождения фенофаз, увеличение урожайности, улучшение качества, повышение устойчивости к грибным болезням	Замачивание семян на 8 часов Расход рабочей жидкости - 350 мл/100 г	-(1)	-(-)
20 мл/га	Рис	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе кушения Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га	-(1)	-(-)
0,02 мл/200 мл воды(Л)	Лиственни ца сибирская, сосна обыкновен ная, ель обыкновен ная	Повышение всхожести семян, усиление ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,01 мл/100 мл воды(Л)	Дейция шершавая, миндаль трехлопаст ный, сирень, вишня войлочная (укоренени е черенков)	Повышение процента укоренения, особенно у трудноукореняемых растений, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, повышение качества укореняемых черенков	Замачивание черенков на 14 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(-)	-(-)
1 мл/кг	Перец сладкий (открытый и защищенн ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

30 мл/га	Баклажан (открытый и защищен ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
0,025 мл/100 мл воды(Л)	Груша (укоренени е черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(1)	-(-)
1 мл/200 мл воды(Л)	Баклажан открытого и защищен ого грунта	Повышение энергии прорастания, всхожести, усиление ростовых процессов, повышение урожайности	Замачивание семян на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,15 мл/кг	Нюотки лекарствен ные	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 250 мл/кг	-(1)	-(-)
0,018 мл/100мл воды(Л)	Слива (укоренени е черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 18 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/20 черенков	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Салат листовой (на семена)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, повышение семенной продуктивности	Опрыскивание в фазе 6 листьев Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га	-(1)	-(-)
4 мл/т	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,02 мл/200 мл воды(Л)	Кедр сибирский, кедр корейский	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, усиление ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
35 мл/га	Пустырни к сердечный	Активизация ростовых процессов, снижение опадения завязей, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в начале возобновления вегетации, 2-е - через 7-8 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
1,5 мл/3 л воды(Л)	Чубушник, бирючина, гортензия (пересадка растений)	Повышение приживаемости, усиление ростовых процессов	Опрыскивание через день после пересадки Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)
2 мл/10 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание клубней или кратковременное погружение в раствор препарата Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
0,4 мл/4 л воды(Л)	Смородин а черная	Увеличение урожайности, повышение устойчивости к грибным болезням	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(1)	-(-)
0,02 мл/100 мл воды(Л)	Облепиха (укоренени е черенков)	Повышение количества укорененных черенков, увеличение зоны укоренения, количества и средней длины корней, улучшение качества посадочного материала	Замачивание черенков на 14-16 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/10 черенков	-(-)	-(-)

Гуминовых кислот калиевые соли

Бигус, ВР (25 г/л) ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ОГРН: 1157746561862 IV/III 351-07-1040-1 04.03.2016 03.03.2026	0,25-0,5 л/га	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазк 3-х листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	Активен
	4 мл/200 мл воды(Л)	Баклажан (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)	

40 мл/кг	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,2-0,4 л/га	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(-)
40 мл/кг	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
4 мл/200 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 пар листьев, 2-е и 3-е с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10м2	-(3)	-(-)
0,4-0,6 л/т	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

3-5 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(3)	-(-)
5 мл/ 200 мл воды(Л)	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2 – е – в фазе бутонизации; 3-е в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(3)	-(-)
40 мл/ 4 л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 4 л/ 100 кг	-(1)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 пар листьев, 2-е и 3-е с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Травы газонные	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание: 1-е – после первого скашивания травостоя, последующие 3-5 опрыскиваний с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(4-6)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(3)	-(-)

0,4-0,6 л/га	Цветочные культуры	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – после появления всходов (или весной в начале возобновления вегетации), последующие 3-4 опрыскивания с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-500 л/га	-(4-5)	-(-)
0,6 л/т	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Гречиха	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе 2-3 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,3-0,5 л/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 10-14 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
40 мл/кг	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,6-0,8 л/га	Плодово-ягодные культуры	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – через 5-7 дней после цветения; 2-е в начале физиологического опадения завязей, 3-е и 4-е с интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(4)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе 3-4 пар листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

0,2-0,4 л/га	Пшеница озимая, пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе кущения начала выхода в трубку, 2-е – в фазе начала молочно-восковой спелости Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
40 мл/кг	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
0,4-0,6 л/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации; 2-е – фазе цветения; 3-е – через 3 недели после 2-го опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800 - 1000 л/га	-(3)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – через 7 дней после высадки рассады в грунт, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е в начале цветения Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м ²	-(3)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в начале отрастания листьев, последующие 2-3 опрыскивания с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м ²	-(2-3)	-(-)
0,6 л/т	Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3-0,5 л/га	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е – в фазе бутонизации; 3-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

0,6 л/т	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е – в фазе бутонизации; 3-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
0,4-0,6 л/т	Пшеница озимая, пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
40-60 мл/кг	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – после появления всходов (или весной в начале возобновления вегетации), последующие 3-4 опрыскивания с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(4-5)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2 – е – в фазе бутонизации; 3-е в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/10 м2	-(3)	-(-)
40 мл/кг	Баклажан (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

3-5 мл/л воды(Л)	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – после высадки рассады, 2-е и 3-е с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/ 10 м2	-(3)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе 3-5 листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/ 10 м2	-(2)	-(-)
4 мл/ 100 мл воды(Л)	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,3-0,6 л/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(2)	-(-)
0,4-0,6 л/т	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,4-0,6 л/га	Травы газонные	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание: 1-е после первого скашивания травостоя, последующие 3-5 опрыскиваний с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400-500 л/га	-(4-6)	-(-)

4 мл/200 мл воды(Л)	Перец сладкий (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,25-0,5 л/га	Подсолнеч ник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е и 3-е с интервалом 15-20 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(-)
0,3-0,5 л/га	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – через 7 дней после высадки в грунт, 2-е – в фазе бутонизации, 3-е – в начале цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
4 мл/200 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
4 мл/200 мл воды(Л)	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
3-5 мл/л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации; 2-е – в фазе цветения; 3-е – через 3 недели после 2-го опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение	-(3)	-(-)
0,4-0,6 л/т	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

	50 мл/кг	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян в течение 6 часов Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)	
	0,4-0,6 л/т	Гречиха	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	3-5 мл/л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – через 5-7 дней после цветения; 2-е – в начале физиологического опадения завязей, 3-е и 4-е – интервалом 14-21 день Расход рабочей жидкости - 1,5-8 л/растение	-(4)	-(-)	
	0,3-0,5 л/га	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – после высадки рассады, 2-е и 3-е с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(3)	-(-)	
	0,4-0,6 л/га	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – весной в начале отрастания листьев, последующие 2-3 опрыскивания с интервалом 10-15 дней Расход рабочей жидкости - 400 - 500 л/га	-(2-3)	-(-)	

Гуминовых кислот калиевые соли + фульвокислоты

ГуматАктив, Ж (120 г/л + 25 г/л) ООО СХП «НИВА» ОГРН: 1149102116426 Ш/Ш 283-07-3272-1 26.08.2021 25.08.2031	0,5	Свекла сахарная	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	-----	-----------------	---	--	------	------	---------

0,5-1	Пшеница яровая и озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений:	-(2)	-(-)
0,5	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5-1	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га	-(2)	-(-)
0,5-1	Свекла сахарная	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений:	-(2)	-(-)
0,5-1	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений:	-(2)	-(-)
0,5	Пшеница яровая и озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

	0,5	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--	-----	-----	---	--	------	------	--

Даминозид

<p>Регулар, ВРП (950 г/л) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 III/II, ООО «МосАгро» ОГРН: 1057747879342 III/II 427(175)-07-1711-1 31.01.2018 30.01.2028</p>	3-6 г/л воды(Л)	Цветочные культуры	Снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Опрыскивание растений: 1-е - при длине боковых побегов 5-10 см, 2-е - через 14-17 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - до увлажнения поверхности листьев	-(2)	1(-)	Активен
	0,5 г/л воды(Л)	Томат (рассада)	Предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе 3-4 листьев Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(1)	1(-)	
	30-60 г/100 м2	Цветочно-декоративные культуры (кустарники)	Снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе сформированных, неокрашенных бутонов, 2-е – через 7-10 дней, после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)	
	30-60 г/100 м2	Цветочные культуры	Снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Опрыскивание растений: 1-е - при длине боковых побегов 5-10 см, 2-е - через 14-17 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	1(1)	
	3-6 г/л воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры (кустарники)	Снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе сформированных, неокрашенных бутонов, 2-е – через 7-10 дней, после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м2	-(2)	1(-)	

Дигидрокверцетин

<p>АгроСтимул, ВЭ, ВЭ (50 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 III/III 002-07-4818-0 11.03.2025 10.03.2028</p>	100-150	Рапс яровой	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе ветвления, 2-е – в период бутонизации - начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)	Активен
	1,0-1,5 мл/3 л воды (Л)(Л)	Травы газонные	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – весной, в период отрастания; 2-е, 3-е, 4-е – с интервалом 10-15 дней (после скашивания травостоя). Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(3-4)	1(-)	
	1,0-1,5	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости - 1 л/кг Расход рабочей жидкости - 1	-(1)	-(-)	

2 мл/3 л воды (Л)(Л)	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации-начала цветения, 2-е – через 20 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
1,0-1,5 мл/3 л воды (Л)(Л)	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе 5-6 листьев. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
4,0 мл/10 л воды (Л)(Л)	Яблоня, груша	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е – «плод грецкий орех». Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение	-(2)	1(-)
50-100	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка лука-севка. Расход рабочей жидкости - 20-30 л/т Расход рабочей жидкости - 20-30	-(1)	-(-)
100-150	Травы газонные	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – весной, в период отрастания; 2-е, 3-е, 4-е – с интервалом 10-15 дней (после скашивания травостоя). Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(3-4)	-(1)
100-250	Сахарная свекла	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, увеличение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-5 пар листьев, 2-е в фазе смыкания рядков. Расход рабочей жидкости – 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)
1,0 мл/2 л воды (Л)(Л)	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание лука-севка перед посадкой на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости – 200 мл/100 г Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
80	Рожь озимая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе появления флагового листа. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300(Расход рабочей жидкости - 300 л/га)	-(2)	-(1)

100	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 20 л/т Расход рабочей жидкости - 20	-(1)	-(-)
4,0 мл/10 л воды (Л)(Л)	Персик, абрикос	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в начале образования завязей. Расход рабочей жидкости –1,5-5 л/растение Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение	-(2)	1(-)
400	Яблоня, груша	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е – «плод грецкий орех». Расход рабочей жидкости - 1000 л/га Расход рабочей жидкости - 1000	-(2)	-(1)
100	Рожь озимая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10(Расход рабочей жидкости – 10 л/т)	-(1)	-(-)
250	Виноград	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения, 2-е – через 15-25 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га Расход рабочей жидкости - 800-1000	-(2)	-(1)
20	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10	-(1)	-(1)
80	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)
200	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации - начала цветения, 2-е – через 20 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(-)

2 мл/4 л воды (Л)(Л)	Огурцы открытого и защищенн ого грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе начала цветения, 3-е - в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2	-(3)	1(-)
1,0-1,5 мл/3 л воды (Л)(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)
60-100	Цветочно- декоративн ые культуры	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в начале вегетации, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га Расход рабочей жидкости - 400-600	-(3)	1(1)
2 мл/л воды (Л)(Л)	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 1 л/100 кг Расход рабочей жидкости - 1л / 100кг	1(1)	-(-)
100-150	Рапс озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования розетки (осенью), 2-е – в фазе ветвления, 3-е – в период бутонизации - начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(3)	-(1)
0,6 мл/4 л воды (Л)(Л)	Томаты открытого и защищенн ого грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2	-(3)	1(-)
100	Рапс яровой	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10	-(1)	-(-)
1,0-1,5 мл/л воды (Л)(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости –200 мл/100 г Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)

400	Персик, абрикос	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в начале образования завязей. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га Расход рабочей жидкости - 1000	-(2)	-(1)
80	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе появления флагового листа. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300(Расход рабочей жидкости - 300 л/га)	-(2)	-(1)
1,0-1,5 мл/л воды (Л)(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости – 200 мл/100 г Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
100-150	Кукуруза	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе выбрасывания метелки. Расход рабочей жидкости – 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)
200	Огурцы открытого и защищенного грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе начала цветения, 3-е - в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости - 400 л/га Расход рабочей жидкости - 400	-(3)	1(1)
100	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10	-(1)	-(-)
50-100	Рис	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300(Расход рабочей жидкости - 300 л/га)	-(1)	-(1)
0,01 мл /100 мл воды (Л)(Л)	Томаты открытого и защищенного грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости – ¶100 мл/100 г семян¶ Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г семян	-(1)	-(-)

50-100	Рис	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10(Расход рабочей жидкости – 10 л/т)	-(1)	-(-)
0,1	Огурцы открытого и защищенного грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости - 1 л/кг Расход рабочей жидкости - 1	-(1)	-(-)
100	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10(Расход рабочей жидкости – 10 л/т)	-(1)	-(-)
0,6 мл/4 л воды (Л)(Л)	Цветочно-декоративные культуры	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в начале вегетации, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е – через 10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 4-6 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	-(3)	1(-)
100	Ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10(Расход рабочей жидкости – 10 л/т)	-(1)	-(-)
100-200	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале образования корзинок, 2-е – в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)
100	Рапс озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10	-(1)	-(-)
1,0 мл/3 л воды (Л)(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-10 листьев, 2-е – в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(-)

100-150	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)
0,1	Томаты открытого и защищенного грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости - 1 л/кг Расход рабочей жидкости - 1	-(1)	-(-)
50-100	Горох, нут, люпин	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10	-(1)	-(-)
0,01 мл /100 мл воды (Л)(Л)	Огурцы открытого и защищенного грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г семян Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
60	Томаты открытого и защищенного грунта	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения первой кисти, 2-е - через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(3)	1(1)
100-150	Цветочные культуры (луковичные)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений в период формирования бутонов. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(1)	1(1)
100-150	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе 5-6 листьев. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)
2,5 мл/8-10 л воды (Л)(Л)	Виноград	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения, 2-е – через 15-25 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 8-10 л/100 м ² Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м ²	-(2)	1(-)

	250	Сахарная свекла	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, увеличение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 20 л/т Расход рабочей жидкости - 20	-(1)	-(-)	
	1,0-1,5 мл/3 л воды (Л)(Л)	Цветочные культуры (луковичные)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений в период формирования бутонов. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(1)	1(-)	
	100-200	Горох, нут, люпин	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-10 листьев, 2-е в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га Расход рабочей жидкости - 300	-(2)	-(1)	
АгроСтимул, ВЭ (50 г/л) ООО «АГРУСХИМ» ОГРН: 1057747562509 ПП/П 002-07-472-1 15.12.2014 002-07-472-1/142 142 14.12.2024	100 мл/т	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Не активен
	80 мл/га	Рожь озимая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	2,5 мл/8-10 л воды(Л)	Виноград	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе цветения, 2-е – через 15-25 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(2)	-(-)	
	1-1,5 мл/3 л воды(Л)	Цветочные культуры (луковичные)	Повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание в период формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	-(-)	
	4 мл/10 л воды(Л)	Яблоня, груша	Повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е – «плод грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение	-(2)	-(-)	

4 мл/10 л воды(Л)	Персик, абрикос	Повышение иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в начале образования завязей Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растений	-(2)	-(-)
2 мл/4 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе начала цветения, 3-е - в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(3)	-(-)
1-1,5 мл/3 л воды(Л)	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе 5-6 листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
1 мл/3 л воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе розетки, 2-е в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
200 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
100 мл/т	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)
1,0-1,5 мл/кг	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
250 мл/га	Виноград	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе цветения, 2-е – через 15-25 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	-(-)

100-150 мл/га	Кукуруза	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе выбрасывания метелки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,6 мл/4 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)
1-1,5 мл/3 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе розетки, 2-е – в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	-(-)
50-100 мл/т	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка лука-севка Расход рабочей жидкости - 20-30 л/т	-(1)	-(-)
20 мл/т	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,01 мл /100 мл воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
100-200 мл/га	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, у повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в начале образования корзинок, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
80 мл/га	Ячмень яровой	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

100-150 мл/га	Рапс озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе образования розетки (осенью), 2-е – в фазе ветвления, 3-е – в период бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
50-100 мл/га	Рис	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
2 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации-начала цветения, 2-е – через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	-(-)
1-1,5 мл/3 л воды(Л)	Травы газонные	Повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – весной в период отрастания; 2-е,3-е,4-е – с интервалом 10-15 дней (после скашивания травостоя) Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3-4)	-(-)
1-1,5 мл/л воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
50-100 мл/т	Горох, нут, люпин	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
400 мл/га	Персик, абрикос	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е- в фазе бутонизации, 2-е – в начале образования завязей Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(2)	-(-)

100-150 мл/га	Рапс яровой	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – фазе ветвления, 2-е – в период бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
80 мл/га	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1-1,5 мл/л воды(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
100-150 мл/га	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе розетки, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50-100 мл/т	Рис	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
400 мл/га	Яблоня груша	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе «розовый бутон», 2-е – «плод грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(2)	-(-)
100 мл/т	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, у повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
100-250 мл/га	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 4-5 пар листьев, 2-е – в фазе смыкания рядков Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

0,1 мл/кг	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
100 мл/т	Рапс озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,6 мл/4 л воды(Л)	Цветочно- декоративн ые культуры	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – в начале вегетации, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	-(3)	-(-)
100 мл/т	Рожь озимая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
80 мл/га	Ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100 мл/т	Рапс яровой	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
250 мл/т	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)
60 мл/га	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала цветения первой кисти, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

0,01 мл /100 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение сроков созревания, повышение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г семян	-(1)	-(-)
80 мл/га	Пшеница яровая и озимая	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе начала выхода в трубку, 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100-150 мл/га	Цветочные культуры	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание в период формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/ 2 л воды(Л)	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезнями неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание лука-севка перед посадкой на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
60-100 мл/га	Цветочно-декоративные культуры	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – в начале вегетации, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 10 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(3)	-(-)
200 мл/га	Картофель	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации-начала цветения, 2-е – через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100-150 мл/га	Травы газонные	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – весной в период отрастания; 2-е,3-е, 4-е – с интервалом 10-15 дней (после скашивания травостоя) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3-4)	-(-)
100-150 мл/га	Лук репчатый	Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе 5-6 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100-200 мл/га	Горох, нут, люпин	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-10 листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

<p>Лариксифол, ВЭ (50 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 III/III 010-07-3391-1 02.12.2021 01.12.2031</p>	100 мл/т	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	100 мл/га	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е в фазе начала образования корзинок, 2-е –	-(2)	-(-)	
	100 мл/т	Рапс яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	100 мл/т	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	125 мл/га	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е –	-(2)	-(-)	
	80 мл/га	Рапс яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
<p>ЭкоЛарикс, ВРП (250 г/кг) ЗАО «Аметис» ОГРН: 1042800015422 III/III 253-07-721-1 29.07.2015 28.07.2025</p>	8 г/т	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала цветения и через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(3)	Активен
	20 г/т	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Обработка семян перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

БиоЛарикс, ВРК (50 г/л + 250 г/л) ЗАО «Аметис» ОГРН: 1042800015422 III/III 253-07-2237-1 23.05.2019 22.05.2029	20-40 мл/т	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 7,5 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	8-16 мл/га	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	8-16 мл/га	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	20-40 мл/т	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Имидаклоприд

Имидор Про, КС (200 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/-, ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/- 018-07-3032-1	0,75-1,25	Горох	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
--	-----------	-------	---	--	------	------	---------

25.02.2021 17.03.2032	0,6-1	Нут	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожайности и улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
--------------------------	-------	-----	---	--	------	------	--

калий азотнокислый + карбамид + магний сернокислый + калий фосфорнокислый + Поли-бета-гидроксимасляная кислота

Экопин, Т (91,2 г/кг + 181,5 г/кг + 29,8 г/кг + 91,1 г/кг + 6,2 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 IV/III 012-07-2246-1 28.05.2019 27.05.2029	1 г/10 л воды(Л)	Томат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Опрыскивание растений: первое - в фазе 2-3 листьев, второе - через 15 дней после первого Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	Активен
	0,5 г/л воды(Л)	Смородина черная	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое – в фазе бутонизации, второе и третье с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	-(3)	-(-)	
	1 г/10 л воды(Л)	Салат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания	Опрыскивание растений: первое - в фазе 2-3 листьев, второе - через 15 дней после первого Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)	
	0,5 г/л воды(Л)	Крыжовник	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое – в фазе бутонизации, второе и третье - с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/куст	-(3)	-(-)	

2 г/ л воды(Л)	Перец сладкий	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Замачивание семян перед посевом в течение 3 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
2 г/л воды(Л)	Кабачок	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества получки	Замачивание семян в течение	-(1)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Виноград	Повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, активизация восстановления ослабленных и поврежденных растений, увеличение выполненности и массы грозди, числа вызревших ягод в	Опрыскивание растений: первое – в фазе бутонизации, второе - после цветения, третье – в фазе начала роста ягод, четвертое – в фазе смыкания ягод в грозди, пятое – в фазе окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(5)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе смыкания ботвы в рядках, второе - через 3 недели после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Яблоня	Активация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение массы плода, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое – в фазе выдвижения соцветий – розовый бутон, второе - после цветения, третье – через две недели после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 5 л/дереву	-(3)	-(-)

1 г/10 л воды(Л)	Земляника	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое – в период отрастания листьев (весной), второе и третье - с интервалом в 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)
10 г/л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
1 г/л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом в течение 3 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (открытый и защищенный грунт)	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: первое - в начале фазы бутонизации, второе - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 7 л/100м2	-(2)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Баклажан	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе 2-3 листьев, второе - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)

2 г/л воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом в течение 3 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание: первое - в фазе 3-5 листьев, второе и третье с интервалом в 14 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	-(-)
1 г/л воды(Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья и кустарники)	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Замачивание черенков перед посадкой на 3-5 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/5-25 черенков	-(1)	-(-)
2 г/л воды(Л)	Баклажан	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян в течение 3-х часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
5-10 г/л воды(Л)	Лук репчатый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение содержания	Замачивание луковиц перед посадкой на 1 час Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

1 г/10 л воды(Л)	Кабачок	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе 2-3 листьев, второе - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе 2-3 листьев, второе - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
0,5-5 г/ л воды(Л)	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: первое – в период возобновления вегетации (весной), второе и (или) третье - с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1-10 л/растение	-(2-3)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Перец сладкий	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Опрыскивание растений: первое - в фазе 2-3 листьев, второе - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
2 г/л воды(Л)	Томат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)

1 г/10 л воды(Л)	Травы газонные	Активация ростовых процессов, усиление отрастания после перезимовки и скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание растений: первое – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), второе – после скашивания травостоя Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(1-2)	-(-)
2 г/10 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Опрыскивание растений: первое - в фазе бутонизации, второе - через 10-15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	-(-)
2 г/л воды(Л)	Огурец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, снижение содержания нитратов	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 г/5 л воды(Л)	Вишня	Активация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: первое - в фазе бутонизации, второе и третье – с интервалом 15 дней	-(3)	-(-)
2 г/ л воды(Л)	Салат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания	Замачивание семян перед посевом в течение 3 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)

калий азотнокислый + кислота борная + хелат марганца + хелат цинка + магний азотнокислый + хелат меди + аммоний молибденовокислый + хе

<p>Вигор Форте, К (200 г/кг + 15 г/кг + 30 г/кг + 75 г/кг + 250 г/кг + 75 г/кг + 5 г/кг + 100 г/кг + 150 г/кг + 100 г/кг) ООО «ВАТР» ОГРН: 1115018001207 IV/III 786-07-3512-1 03.03.2022 02.03.2032</p>	25 г/т	Ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, повышение сохранности узла кушения при низких температурах, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	15 г/т	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	50 г/га	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 5-6 листьев, 2-е – через 10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)	
	50 г/га	Соя	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе	-(1)	-(1)	
	100 г/т	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	25 г/га	Ячмень яровой и озимый	Повышение полевой всхожести, повышение сохранности узла кушения при низких температурах, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе кушения - выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(1)	

50 г/га	Арбуз, дыня	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в начале плетения; 2-е – перед смыканием плетей Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
5 г/кг	Арбуз, дыня	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 4-6 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(1)
50 г/га	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности корнеплодов и выхода сахара	Опрыскивание: 1-е - в фазе 3-4 пар листьев; 2-е - в период массового формирования корнеплодов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
25 г/га	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести, повышение сохранности узла кущения при низких температурах, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе кущения - выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(1)
25 г/т	Пшеница яровая и озимая	Повышение полевой всхожести, повышение сохранности узла кущения при низких температурах, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)
50 г/т	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности корнеплодов и выхода сахара	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)

50 г/га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см); 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
50 г/т	Кукуруза	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
50 г/га	Кукуруза	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-6 листьев, 2-е - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(1)	
50 г/т	Соя	Повышение полевой всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанид гидрохлорид

Плантарел, ВР (0,5 г/л + 0,5 г/л) ООО «ХЭБАРАГИ» ОГРН: 1167746577217 Ш/Ш 734-07-3223-1 15.07.2021 14.07.2031	5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Огурец (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-8 настоящих листьев, 2-е - в начале цветения, 3-е - в фазе образования плодов Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(3)	-(-)	Активен
	100-150 мл/т	Ячмень озимый	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	150-250 мл/га	Томат (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(3)	-(-)	

100 мл/т	Подсолнечник	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Баклажан	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е-после пикировки рассады (в фазе 1 -2 пар настоящих листьев), 2-е - в фазе бутонизации, 3-е – в фазе налива плодов Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(3)	-(-)
100-150 мл/т	Ячмень яровой	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Яблоня	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе «розовый бутон», 2-е - в фазе «плод грецкий орех», 3-е - в фазе созревания плодов Расход рабочей жидкости - 2-10 л/растение	-(3)	-(-)
150 мл/га	Кукуруза	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(2)	-(-)
100-150 мл/га	Ячмень озимый	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
10 мл/кг	Баклажан	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

100-200 мл/т	Свекла сахарная	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
250-350 мл/га	Яблоня	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе «розовый бутон», 2-е - в фазе «плод грецкий орех», 3-е - в фазе созревания плодов Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)
150-250 мл/га	Баклажан	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - после пикировки рассады (в фазе 1 -2 пар настоящих листьев), 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - в фазе налива плодов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
1 мл/100 мл воды(Л)	Баклажан	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
200 мл/га	Подсолнеч ник	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
100-200 мл/га	Рис	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
10 мл/кг	Томат (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

1 мл/100 мл воды(Л)	Огурец (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
100-150 мл/т	Лён-долгунец	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
150-200 мл/га	Морковь	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-6 настоящих листьев, 2-е - через 10-15 дней после первого опрыскивания, 3-е – через	-(3)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Картофель	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе смыкания рядков, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(2)	-(-)
100-200 мл/т	Соя	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Цветочные культуры	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е - через 12-18 дней после первого, 3-е - через 12-18 дней после второго Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(3)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Вишня	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - через 10-15 дней после цветения, 3-е - в фазе налива ягод Расход рабочей жидкости - 2-5 л/ растение	-(3)	-(-)

100-150 мл/т	Пшеница яровая	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Персик	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – через 10-15 дней после цветения, 3-е — в фазе созревания плодов Расход рабочей жидкости - 2-5 л/растение	-(3)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Томат (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 пар настоящих листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - в фазе налива плодов Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(3)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Кабачок	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 настоящих листьев, 2- - в фазе бутонизации, 3-е - в фазе налива плодов Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(3)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Виноград	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - через 15-20 дней после первого опрыскивания, 3-е-через 15-20 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1 -3 л/растение	-(3)	-(-)
100-150 мл/т	Картофель	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Морковь	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-6 настоящих листьев, 2-е-через 10-15 дней после первого опрыскивания, 3-е – через 10-15 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3-5 л/100 м2	-(3)	-(-)

150-250 мл/га	Кабачок	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(3)	-(-)
200-300 мл/га	Персик	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: первое - растений: 1 -е - в фазе бутонизации, 2-е - через 10-15 дней после цветения, 3-е в фазе созревания плодов Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)
300 мл/га	Кукуруза	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: в фазе 7-9 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
100-150 мл/га	Пшеница яровая	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений в фазе конец кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
200 мл/га	Подсолнечник	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений в фазе 2-5 пар листьев Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
100-150 мл/га	Лён масличный	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений - в фазе «елочка» Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
100-150 мл/т	Лён масличный	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

100-200 мл/га	Свекла сахарная	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100-150 мл/10 л воды(Л)	Картофель	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/100 кг	-(1)	-(-)
1 мл/100 мл воды(Л)	Томат (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
100-150 мл/га	Пшеница озимая	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
5-10 мл/ 10 л воды(Л)	Лук репчатый	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-6 настоящих листьев, 2-е - через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 5-10 л/100 м2	-(3)	-(-)
200-300 мл/га	Вишня	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - через 10-15 дней после цветения, 3-е - в фазе налива ягод Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)
100-150 мл/га	Ячмень яровой	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений в фазе конец кушения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)

1 мл/100 мл воды(Л)	Кабачок	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
100-200 мл/га	Картофель	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1 -е - Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100-150 мл/га	Лён- долгунец	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений - в фазе «елочка» Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
200 мл/т	Кукуруза	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
100-200 мл/га	Соя	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений 1-е - Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
150-200 мл/га	Цветочные культуры	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-5 настоящих листьев, 2-е - через 12-18 дней после первого, 3-е - через 12-18 дней после второго Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
10 мл/кг	Кабачок	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

100-150 мл/т	Пшеница озимая	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
200-300 мл/га	Виноград	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе цветения, 2-е - через 15- 20 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 15-20 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)
10 мл/кг	Огурец (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Замачивание семян перед посевом Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
150-200 мл/га	Огурец (открытого грунта)	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(3)	-(-)
100-200 мл/т	Рис	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
150-200 мл/га	Лук репчатый	Повышение неспецифического иммунитета к болезням и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышениеурожайно сти, улучшение качества сельхозпродукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-6 настоящих листьев, 2-е-через 10-12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

Липо-хитоолигосахариды

Б-360, ВР (1х10 -6 г/л) Байер Агрикалче БВ ОГРН: - IV/- 090-07-3218-1 26.04.2018 25.04.2028	330 мл/т	Кукуруза	Повышение полевой всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
---	----------	----------	---	---	------	------	---------

Экогель экстра, ВР (30 г/л) ООО БИОХИМТЕХ-БИОХИМ ИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГРН: 5177746104180 ПП 074-07-3127-1 27.04.2021 26.04.2031	25 мл/100 шт.	Виноград (черенки)	Активация роста и развития корневой системы, повышение приживаемости растений	Замачивание черенков перед посадкой на 20 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)	Активен
	10 мл/л воды(Л)	Томат (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - за 7 дней до высадки рассады в грунт, 2-е - через 14 дней после пересадки, 3-е - через 30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2	-(3)	1(-)	
	25 мл/кг	Огурец (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 12 часов Расход рабочей жидкости - 1-2 л/кг	-(1)	-(-)	
	12,5 л/га	Огурец (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Полив растений под корень: 1-й при высадке рассады, 2-й, 3-й с интервалом 30 дней Расход рабочей жидкости - 2500 л/га	-(3)	1(-)	
	15-70 мл/л воды	Декоративные культуры (кустарники, деревья)	Активация роста и развития корневой системы, повышение приживаемости растений, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, улучшение декоративных качеств	Полив растений под корень: 1-й - при пересадке или в начале возобновления вегетации, 2-й - через 15-30 дней после первого полива Расход рабочей жидкости - 20-40 л/растение	-(2)	1(-)	
	12,5 л/га	Томат (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Полив растений под корень: 1-й при высадке рассады, 2-й, 3-й с интервалом 30 дней Расход рабочей жидкости - 2500 л/га	-(3)	1(-)	

15 мл/л воды(Л)	Томат (защищен ый грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразователь-н ых процессов, увеличение урожайности	Полив растений под корень: 1-й при высадке рассады, 2-й, 3-й Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(3)	1(-)
10 мл/л воды(Л)	Огурец (защищен ый грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразователь-н ых процессов, увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - за 7 дней до высадки рассады в грунт, 2-е - через 14 дней после пересадки, 3-е - через 30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2	-(3)	1(-)
10 л/га	Томат (защищен ый грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е -за 7 дней до высадки рассады в грунт, 2-е - через 14 дней после пересадки, 3-е - через 30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	1(-)
10 л/га	Огурец (защищен ый грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е -за 7 дней до высадки рассады в грунт, 2-е - через 14 дней после пересадки, 3-е - через 30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	1(-)
15 мл/л воды(Л)	Огурец (защищен ый грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразователь-н ых процессов, увеличение урожайности	Полив растений под корень: 1-й при высадке рассады, 2-й, 3-й Расход рабочей жидкости - 100-200 мл/растение	-(3)	1(-)

25 мл/л воды(Л)	Огурец (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 12 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
25 мл/л воды(Л)	Томат (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 12 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
25 мл/кг	Томат (защищенный грунт)	Усиление роста и развития рассады, повышение приживаемости растений после пересадки и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 12 часов Расход рабочей жидкости - 1-2 л/кг	-(1)	-(-)
16-30 л/га	Виноград	Усиление роста и развития рассады, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания почек, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е –	-(8)	1(-)
15-70 мл/л воды(Л)	Декоративные культуры (кустарники, деревья)	Активация роста и развития корневой системы, повышение приживаемости растений, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, улучшение декоративных качеств	Полив растений под корень: 1-й - при пересадке или в начале возобновления вегетации, 2-й – через 15-30 дней после первого полива Расход рабочей жидкости - 20-40 л/растение	-(2)	1(-)

Малеиновый гидразид (калиевая соль)

Трафик, ВРК (270 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-07-1693-1 31.10.2017 30.10.2027	90-120 мл/3 л воды(Л)	Лук репчатый (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%) Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	60(1)	7(3)	Активен
	12-15	Картофель	Подавление прорастания и повышение устойчивости к болезням при хранении	Опрыскивание за 21-25 дней до уборки урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	7(3)	

	120-150 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм) Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	60(1)	7(3)	
	9-12	Лук репчатый (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая (при полегании – не более 50%) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	7(3)	
Гидрамак, ВРП (800 г/кг) ООО «Агросинтез» ОГРН: 1027739092920 III/III 429-07-3755-1 13.07.2022 12.07.2032	4-5	Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	3-4	Лук репчатый (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 10-14 день до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	7(3)	
Фазор, ВГ (800 г/кг) Ариста ЛайфСайенс Регистрейшнс Грейт Британ Лтд. ОГРН: - III/III 724-07-3201-1 08.07.2021 07.07.2031	3-4	Лук репчатый (на репку)	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 10-14 дней до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	4-5	Картофель	Подавление прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении продукции	Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая (при размере сформировавшихся клубней не менее 25 мм) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	7(3)	

Меламинавая соль бис(оксиметил) фосфиновой кислоты

Мелафен, ВР (10-4 г/л) ООО «НПО «БИОХИМСЕРВИС» ОГРН: 1101690004261 IV/III 547-07-3294-1 16.09.2021 15.09.2031	10 мл/г	Бобы кормовые	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	5-20 мл/г	Свёкла столовая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	
	10 мл/г	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

10 мл/т	Ячмень озимый и яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
0,02-0,05 мл/200 мл воды(Л)	Арбуз	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Замачивание семян перед посевом на 20 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100г	-(1)	-(-)
10 мл/т	Рапс пятилистная	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/т	Горох	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/т	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-6 листьев, 2-е – через 12-20 дней после первого опрыскивания, 3-е за 20-30 дней до уборки Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(3)	1(1)
2-5 мл/кг	Арбуз	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)

5 мл/га	Ячмень озимый и яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3-1 мл/100 мл воды(Л)	Фасоль	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
20-30 мл/га	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, повышение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала распускания почек, 2-е –	-(2)	1(1)
10 мл/т	Овёс	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/га	Свёкла столовая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Опрыскивание растений: 1-е -	-(2)	-(-)
0,02-0,05 мл/200 мл воды(Л)	Дыня	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Замачивание семян перед посевом на 20 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
0,2 мл/200 мл воды(Л)	Томат	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)

2-5 мл/кг	Дыня	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Дыня	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
0,5-2 мл/200 мл воды(Л)	Редис	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
0,5 мл/ 50 мл воды(Л)	Бобы кормовые	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 50 мл/ 100 г	-(1)	-(-)
3-10 мл/га	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
3-10 мл/т	Фасоль	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5 мл/ 50 мл воды(Л)	Горох	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 50 мл/100 г	-(1)	-(-)

10-30 мл/т	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-10 мл/га	Хлопчатник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
100 мл/т	Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/т	Просо кормовое	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Арбуз	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
1 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/10 кг	-(1)	-(-)

5 мл/га	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе всходов Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)
10 мл/т	Рапс яровой	Усиление ростовых процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(1)
0,2-0,3 мл/8 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, повышение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала распускания почек, 2-е – в фазе обособления бутонов – розовый бутон Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(2)	1(1)
5-10 мл/га	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)
1-5 мл/ 10 кг	Хлопчатник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 1 л/10 кг	-(1)	-(-)
10 мл/т	Рожь озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5 мл/га	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)

0,3-0,4 мл/3 л воды(Л)	Дыня	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	1(1)
100 мл/т	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/т	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,25 мл/8 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, увеличение урожайности, повышение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения, 2-е и 3-е –	-(3)	1(1)
0,5-2 мл/200 мл воды(Л)	Свёкла столовая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Замачивание семян перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 200 мл/ 100 г	-(1)	1(1)
2 мл/ кг	Томат	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
10 мл/га	Фасоль	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе второго тройчатого листа, 2-е – Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
10 мл/га	Редис	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)

15-25 мл/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, увеличение урожайности, повышение качества урожа	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней (не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	1(1)
3-10 мл/га	Томат	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожа	Опрыскивание растений в фазе начала цветения первой кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
1 л/т	Трава суданская	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожа	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3-0,4 мл/3 л воды(Л)	Арбуз	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайнос-ти, улучшение качества урожа	Опрыскивание растений в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100м2	-(1)	1(1)
5-10 мл/га	Рапс яровой	Усиление ростовых процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожа	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе стеблевания (при высоте растений 30-40 см), 2-е – Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(2)	-(1)
5 мл/га	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(1)
5-20 мл/т	Редис	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5 мл/га	Подсолнеч ник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе всходов, 2-е – в фазе 4-6 листьев Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)

	0,03-0,1 мл/3 л воды(Л)	Томат	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе начала цветения первой кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(1)	1(1)
	10 мл/га	Горох	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе первой пары листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
	5 мл/га	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе всходов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)
	10 мл/т	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
	10 мл/га	Бобы кормовые	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества семян	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе первой пары листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
	0,03-0,1 мл/2 л воды(Л)	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 2 л/100 м2	-(1)	1(1)

Метконазол + Пиракlostробин

Карамба Дуо, К, КЭ (80 г/л + 130 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - П/П, «БАСФ СЕ» ОГРН: -	0,5	Рапс озимый	Повышение устойчивости растений к полеганию, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-ое осенью в фазу 4-8 листьев, 2-ое – в период от начала возобновления вегетации весной – до фазы стеблевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(3)	Активен
--	-----	-------------	---	---	------	------	---------

II/III 014-07-1595-1 07.11.2017 06.11.2027	0,5-0,75	Рапс яровой	Повышение устойчивости растений к полеганию, активизация формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 4-8 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)	
---	----------	----------------	---	--	------	------	--

Натриевая соль бис(оксиметил) фосфиновой кислоты

Микромецен, ВР (0,0001 г/л) ООО «ЭКОХИМКОНСАЛТИН Г» ОГРН: 1031625404030 IV/III 817-07-3677-1 11.05.2022 10.05.2032	2,5-10,0 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества урожая	Опрыскивание растений в фазе 4-6 листьев и через 20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)	Активен
	10 мл/т	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	5-20 мл/га	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(1)	
	2,5-10 мл/га	Соя	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе первого тройчатого листа, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)	
	10-20 мл/т	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение морозостойкости, устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	

10 мл/т	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2,5-10 мл/га	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(1)
10-20 мл/т	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/т	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
5-20 мл/га	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в фазе 4-6 листьев Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)
2,5-10 мл/га	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательных процессов. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе всходов, 2-е - в фазе 4-6 листьев Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(1)

Ортокрезоксиуксусной кислоты (триэтаноламмониевая соль)

<p>Крезацин, КРП, ТАБ (950 г/кг) ООО «Флора-ЛиК» ОГРН: 1055000504118 IV/III 342-07-2099-1 06.02.2019 05.02.2029</p>	1,5 табл./ 10 л воды(Л)	Яблоня	Снижение осыпания завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений через 4-5 недель цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(-)	Активен
	2 г/т	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	4 г/т	Овёс	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и к температурному и водному стрессам (жара и засуха). Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1 табл./ 3 л воды(Л)	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	-(2)	-(-)	
	4 г/т	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, морозостойкости (для озимых культур), устойчивости растений к болезням и к температурному и водному стрессам (жара и засуха). Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

100 г/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений в фазе разрыхления соцветий Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(1)	-(-)
6 г/га	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, морозостойкости (для озимых культур), устойчивости растений к болезням и к температурному и водному стрессам (жара и засуха). Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение	Опрыскивание растений в фазе кущения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
2 табл./ 3 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
1 табл./ 2 л воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е в фазе бутонизации первой кисти Расход рабочей жидкости - 2 л/ 70 м ²	-(2)	-(-)
1 табл./ 200 мл воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)

3 г/кг	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 г/кг	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов. Усиление ростовых и формообразовательных процессов	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
4 г/т	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение жизнеспособности особенно на засоленных, загрязненных и низкоплодородных почвах, урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
150 г/га	Яблоня	Снижение осыпания завязей, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений через 4-5 недель цветения Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	-(-)
1 табл./100 мл воды(Л)	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Замачивание семян перед посевом на 30 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)

20 г/га	Табак	Повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 4-8 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
15 г/га	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов. Усиление ростовых и формообразовательных процессов	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е в фазе бутонизации первой кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
20 г/га	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
10 г/га	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 4-8 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
½ табл./1л воды(Л)	Можжевельник, ель голубая, роза, форзиция (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости	Замачивание черенков перед посадкой на 10 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)
6 г/га	Овёс	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и к температурному и водному стрессам (жара и засуха). Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

3 г/т	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)		
0,05 г/100 шт.	Можжевельник, ель голубая, роза, форзиция (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости	Замачивание черенков перед посадкой на 10 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)		
10 г/га	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, стимуляция корнеобразования, сокращение сроков приживаемости рассады, повышение холодо- и жаростойкости растений, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к болезням. Усиление	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)		
1 табл./ 2 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 2 л/50 кг	-(1)	-(-)		
1 табл./ 10 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений в фазе разрыхления соцветий Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(-)		
Крезолан, ВР (480 г/л) ООО НТП «Тетра» ОГРН: 1086670009612 IV/III 459-07-1645-1 12.12.2017 11.12.2027	24 мл/га	Хлопчатник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений за 10 дней до начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	Активен

<p>Крептон, КРП, ВРКАП (100 г/кг) ООО «СТАТУС» ОГРН: 1133443020480 III/III 764-07-3298-1 17.09.2021</p>	12 мл/га	Пшеница озимая, пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	l(1)	Активен
	1 мл/т	Хлопчатник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(1)	
	1 мл/т	Ячмень озимый, ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	1 мл/т	Пшеница озимая, пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	12 мл/га	Ячмень озимый, ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	l(1)	
	25 г/га	Ячмень яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	

25 г/т	Ячмень яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
15 г/т	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 г/га	Подсолнеч ник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 5-6 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
25 г/га	Пшеница озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
25 г/т	Ячмень яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
25 г/т	Пшеница озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 капсулы/1 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
100 г/т	Подсолнеч ник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

25 г/га	Ячмень яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
2 капсулы/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см), 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
2 капсулы/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см), 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
25 г/га	Пшеница озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
50 г/га	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см), 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 г/га	Подсолнеч ник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 5-6 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
50 г/га	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см), 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
2 капсулы/1 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)

	25 г/т	Пшеница озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	100 г/т	Подсолнечник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	15 г/т	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль + 1-хлорметилсилатран

Мивал-Агро, КРП (760 г/кг + 190 г/кг) ООО «АГРОСИЛ» ОГРН: 1057746544107 IV/III 467-07-1697-1 31.01.2018 30.01.2028	10-15 г/га	Горох	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листа, 2-е в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	Активен
	20 г/га	Виноград (техническое сорта)	Ускорение процессов восстановления после подмерзания, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е – в фазе формирования грозди Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	-(3)	1(1)	
	10 г/га	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)	

0,1 г/ 3 л воды(Л)	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	1(1)
20 г/т	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
10-15 г/га	Рапс яровой и озимый	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
0,15 г/ 3 л воды(Л)	Перец сладкий	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после высадки рассады, 2-е - в фазе бутонизация-начало цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	1(1)
10-15 г/га	Рожь озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)

0,2 г/ 200 мл воды(Л)	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, <u>улучшение качества</u>	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	1(1)
5 г/т	Ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, <u>улучшение качества</u>	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
15 г/га	Перец сладкий	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - через 10 дней после высадки рассады, 2-е - в фазе бутонизация-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
5 г/т	Пшеница озимая и яровая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, <u>улучшение качества</u>	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
15 г/га	Свекла сахарная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 пар настоящих листьев, 2-е - в период массового формирования корнеплодов Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)

2 г/т	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, увеличение выхода клубней товарной фракции, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
20 г/га	Яблоня	Снижение опадения плодов, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе «разрыхления бутонов», 2-е - в фазе «смыкание чашелистиков» Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	-(2)	1(1)
10-15 г/га	Соя	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизация – начало цветения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
5 г/т	Рожь озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
0,2 г/ 8 л воды(Л)	Виноград (технические сорта)	Ускорение процессов восстановления после подмерзания, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е – в фазе формирования грозди Расход рабочей жидкости - 8 л/100м ²	-(3)	1(1)

15 г/га	Виноград (столовые сорта)	Ускорение процессов восстановления после подмерзания, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е – в фазе формирования грозди, 4-е – в фазе созревания ягод Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	-(4)	1(1)
0,2 г/ 8 л воды(Л)	Плодовые культуры (яблоня, груша, хурма)	Ускорение процессов восстановления после подмерзания. активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений после обрезки на обратный рост или в фазе «зеленый конус» Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(1)	1(1)
0,2 г/л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	1(1)
10 г/га	Овес	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
0,2 г/ 4 л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых, формообразовательных и репродуктивных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала выдвижения цветоносов, 2-е в фазе цветения, 3-е в фазе завязывания и налива ягод Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(3)	1(1)
0,2 г/ 3 л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 3 л/100	-(2)	1(1)

0,1 г/ 3 л воды(Л)	Лук репчатый	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е- в период начала формирования луковицы Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)
0,1 г/ 3 л воды(Л)	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-е - в период массового формирования кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)
20 г/га	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе выметывания метелок Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
0,2 г/ 8 л воды(Л)	Яблоня	Снижение опадения плодов, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе «разрыхления бутонов», 2-е - в фазе «смыкание чашелистиков» Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(2)	1(1)
10 г/га	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-е - в период массового формирования кочана Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
15 г/т	Соя	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)

0,15 г/ 3 л воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов (после прорывки рассады), 2-е - в фазе бутонизация – начало цветения 1-ой кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	1(1)
2 г/кг	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	1(1)
10 г/га	Лук репчатый	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в период начала формирования луковицы Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
20 г/га	Подсолнеч ник	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 5-6 листьев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
15 г/т	Свекла сахарная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
20 г/т	Подсолнеч ник	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)

10 г/га	Лен - долгунец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе «елочка» Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
5 г/т	Овес	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
10-15 г/га	Ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
15 г/га	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе полных всходов (после прорывки рассады), 2-е - в фазе бутонизация – начало цветения 1-ой кисти Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
1 г/кг	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом на 30-40 мин Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	1(1)

10 г/га	Гречиха	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)
20 г/т	Горох	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
20 г/га	Плодовые культуры (яблоня, груша, хурма)	Ускорение процессов восстановления после подмерзания, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений после обрезки на обратный рост или в фазе «зеленый конус» Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га	-(1)	1(1)
20 г/га	Земляника	Активизация ростовых, формообразовательных и репродуктивных процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала выдвижения цветоносов, 2-е – в фазе начала цветения, 3-е – в фазе завязывания и налива ягод Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(3)	1(1)
5 г/т	Гречиха	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)

0,1 г/200 мл воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом на 30-40 мин Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	1(1)
0,2 г/ 8 л воды(Л)	Виноград (столовые сорта)	Ускорение процессов восстановления после подмерзания, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е – в фазе формирования грозди, 4-е – в фазе созревания ягод Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(4)	1(1)
10-15 г/га	Пшеница озимая и яровая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений в фазе кущения - начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	1(1)
20 г/т	Лен - долгунец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
10 г/га	Огурец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, неблагоприятным условиям среды, ускорение сроков созревания, повышение урожая, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)

	20 г/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, увеличение выхода клубней товарной фракции, повышение урожая, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начального периода роста (2-3 листьев), 2-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	1(1)	
	5 г/т	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды, повышение урожая, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)	

Паклобутразол

Палко, К (250 г/л) Глобакем НВ ОГРН: - III/III 586-07-3312-1 23.09.2021 22.09.2031	1	Яблоня	Снижение длины прироста однолетних побегов, повышение урожайности. Улучшение товарного вида, повышение качества продукции	Опрыскивание растений	60(1)	1(1)	Активен
--	---	--------	---	-----------------------	-------	------	---------

Поли-бета-гидроксимасляная кислота

Карбонадо, Т (6,2 г/кг) ООО «СТАТУС» ОГРН: 1133443020480 III/III 764-07-3293-1 16.09.2021 15.09.2031	1 мл/кг	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)	Активен
	250 мл/га	Виноград	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - после цветения, 3-е - в фазе начала роста ягод, 4-е - в фазе смыкания ягод в грозди, 5-е - в фазе окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 800- 1000 л/га	-(5)	-(-)	

10 г/л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
40 мл/т	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 г/10 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - через 10-15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
50-100 мл/т	Лён- долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
1 г/10 л воды(Л)	Виноград	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е - после цветения, 3-е - в фазе начала роста ягод, 4-е - в фазе смыкания ягод в грозди, 5-е - в фазе окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(5)	-(-)

100 мл/т	Свекла сахарная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
40 мл/га	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения-выхода в трубку, 2-е - в фазе колошения-цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
40 мл/га	Пшеница озимая и яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений:	-(2)	-(-)
50 мл/га	Лён-долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений в фазе «ёлочки» Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)

1 г/л воды(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
50 мл/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации,	-(2)	-(-)
40 мл/т	Пшеница озимая и яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

Поли-бета-гидроксимасляная кислота + калий фосфорнокислый + карбамид + магний сернокислый + калий азотнокислый

<p>Альбит, ТПС (6,2 г/кг + 91,1 г/кг + 181,5 г/кг + 29,8 г/кг + 91,2 г/кг) ООО «НПФ «Альбит» ОГРН: - IV/III, ООО «НПФ «Альбит» ОГРН: - IV/III 081-07-866-1 26.11.2015 22.12.2030</p>	1 мл/10 л воды (Л)	Цветочные культуры (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 7 л/100 м2	-(2)	-(-)	Активен
	30-40 мл/т	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

2 мл/л воды(Л)	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
200 мл/т	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества плолукиии	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 50 л/т	-(1)	-(-)
30 мл/га	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества плолукиии	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Кабачок	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества плолукиии	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 мл/л воды	Декоратив ные культуры (деревья и кустарник и), лесные культуры	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Замачивание черенков перед посадкой на 3-5 часов Расход рабочей жидкости - 1-10 л/50 черенков	-(1)	-(-)

30-40 мл/т	Ячмень яровой, ячмень озимый (пивоваренные сорта)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Салат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
70-100 мл/га	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления вегетации (весной), 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 700 л/га	-(2-3)	-(-)
30 мл/га	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе смыкания ботвы в рядках, 2-е - через 3 недели после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/га	Смородина черная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(3)	-(-)

50-60 мл/га	Рапс	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами и инсектицидами.	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе стеблевания, 2-е - в фазе бутонизации-начало цветения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(2)	-(-)
40 мл/га	Подсолнечник	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-7 листьев, 2-е – в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	-(-)
2 мл/10 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – через 10-15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение массы плода, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе выдвижения соцветий - розовый бутон, 2-е – после цветения, 3-е – через две недели после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 5 л/дерево	-(3)	-(-)
30 мл/га	Чечевица	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)

40 мл/га	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е и 3е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Перец сладкий	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
10 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
40 мл/га	Козлятник (галега восточная)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, усиление отрастания после скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности зеленой	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(1)	-(-)
50 мл/т	Люцерна	Повышение полевой всхожести, усиление отрастания после скашивания, увеличение количества соцветий, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями.	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)

1 мл/кг	Капуста белокочан ная	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
40 мл/га	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества полукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-6 листьев, 2-е – в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
50 мл/т	Гречиха	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества полукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(2)	-(-)
40 мл/га	Клевер	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, усиление отрастания после скашивания, увеличение количества соцветий, ускорение прохождения фаз развития, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), 2-е – в фазе стеблевания – начала бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/т	Соя	Повышение полевой всхожести, увеличение количества азотфиксирующих клубеньков, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями. снижение	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)

30-50 мл/т	Нут	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 мл/т	Горох	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
30 мл/га	Люпин	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Крыжовник	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1-2,5 л/куст	-(3)	-(-)
40 мл/га	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)

60 мл/га	Травы газонные	Активизация ростовых процессов, усиление отрастания после перезимовки и скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), 2-е – после скашивания травостоя Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(1-2)	-(-)
70 мл/га	Люцерна	Повышение полевой всхожести, усиление отрастания после скашивания, увеличение количества соцветий, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями	Опрыскивание растений: через 7 дней после каждого скашивания травостоя Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2-3)	-(-)
2 мл/кг	Кабачок	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
30 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формо-образовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, снижение содержания нитратов	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания (перед высадкой рассады в грунт) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100 мл/га	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение массы плода, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе выдвижения соцветий - розовый бутон, 2-е – после цветения, 3-е – через две недели после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)

50 мл/га	Лён-долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, <u>повышение</u>	Опрыскивание растений в фазе «ёлочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки <u>гербицидами</u>	Опрыскивание растений: 1-ое - в фазе кущения – выход в трубку, 2-ое – в фазе колошения – цветения Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	-(1-2)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, <u>повышение</u> урожайности, улучшение качества <u>получки</u>	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
50 мл/т	Рожь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, <u>повышение</u> урожайности, улучшение качества <u>получки</u>	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
20 мл/т	Овёс	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, <u>повышение</u> урожайности, улучшение качества <u>получки</u> , <u>снижение</u>	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

50-100 мл/т	Лён- долгунец	Повышение полевой всхожести, активизацияростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Травы газонные	Активизация ростовых процессов, усиление отрастания после перезимовки и скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), 2-е – после скашивания травостоя Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м2	-(1-2)	-(-)
30 мл/га	Фасоль	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
50 мл/га	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизацияростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – через 10-15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
30 мл/га	Салат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

40-50 мл/га	Соя	Повышение полевой всхожести, увеличение количества азотфиксирующих клубеньков, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями	Опрыскивание растений в фазе бутонизации (или в фазе 2-3 листьев) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
40 мл/га	Люцерна	Повышение полевой всхожести, усиление отрастания после скашивания, увеличение количества соцветий, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Баклажан	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
2 мл/кг	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, снижение содержания нитратов	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
50 мл/т	Чечевица	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)

70 мл/т	Козлятник (галега восточная)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, усиление отрастания после скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности зеленой	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание: 1-ое – в фазе кущение – выход в трубку, 2-ое – в фазе колошения – цветения Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	-(1-2)	-(-)
200-250 мл/га	Виноград	Повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, активизация восстановления ослабленных и поврежденных растений, увеличение выполненности и массы грозди, числа вызревших ягод в	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – после цветения, 3-е – в фазе начала роста ягод, 4-е – в фазе смыкания ягод в грозди, 5-е – в фазе окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(5)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
80 мл/т	Сорго	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)

100 мл/т	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 мл/т	Люпин	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
30-40 мл/га	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание: 1-ое – в фазе кущения – выход в трубку, 2-ое – в фазе колошения – цветения Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	-(1-2)	-(-)
5-10 мл/кг	Лук репчатый (на перо) (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение содержания	Замачивание луковиц перед посадкой на 1 час Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
100 мл/га	Лён масличный	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение	Опрыскивание растений в фазе «ёлочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

1 мл/10 л воды (Л)	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
50 мл/т	Просо	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 20 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, снижения содержания нитратов	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания (перед высадкой рассады в грунт) Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
5-10 мл/л воды(Л)	Лук репчатый (на перо) (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение содержания	Замачивание луковиц перед посадкой на 1 час Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
50-100 мл/т	Лён масличный	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)

40 мл/га	Капуста пекинская	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
3 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, активизация восстановления ослабленных и поврежденных растений, увеличение выполненности и массы грозди, числа <u>вызревших ягод в</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – после цветения, 3-е – в фазе начала роста ягод, 4-е – в фазе смыкания ягод в грозди, 5-е – в фазе окрашивания ягод Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(5)	-(-)
70 мл/га	Цветочные культуры (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 700 л/га	-(2)	-(-)
2 мл/кг	Перец сладкий	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формо-образовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение <u>содержания в плодах</u>	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
2 мл/кг	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u> <u>получения</u>	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

1 мл/10 л воды (Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 7-10 дней Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(3)	-(-)
100 мл/га	Вишня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)
20 мл/га	Рожь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Баклажан	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
80 мл/га	Сорго	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 3-5 листьев Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)

50 мл/т	Рис	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Свекла столовая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе смыкания ботвы в рядах, 2-е - через 3 недели после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
30 мл/га	Перец сладкий	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формо-образовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50-60 мл/т	Рапс	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами инсектицидами	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
250 мл/га	Хурма	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе, низким температурам и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – после цветения, 3-е – в фазе созревания плодов Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)

20 мл/га	Овёс	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции, <u>снижение</u>	Опрыскивание растений в фазе кушения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)
30 мл/га	Нут	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 4-5 листьев Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, <u>снижения содержания нитратов</u>	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е и 3е – с интервалом 2 недели Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(3)	-(-)

50 мл/га	Крыжовник	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(3)	-(-)
30-40 мл/га	Сахарная свекла	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, повышение	Опрыскивание растений в период с фазы 5-6 пар листьев до фазы смыкания рядков с интервалом 10-20 дней Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1-2)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Салат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)
1 мл/л воды (Л)	Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья и кустарники), лесные культуры	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Замачивание черенков перед посадкой на 3-5 часов Расход рабочей жидкости - 0,1-1 л/5 черенков	-(1)	-(-)
30 мл/га	Бобы кормовые	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

250 мл/га	Мандарин	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе, низким температурам и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стрессового действия и повышение эффективности	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – в период формирования плодов, 3-е – за месяц до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)
2 мл/кг	Баклажан	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формо-образовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 мл/10 л воды (Л)	Декоративные культуры (деревья и кустарники)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления вегетации (весной), 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1-10 л/растение	-(2)	-(-)
30 мл/га	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 мл/кг	Капуста пекинская	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

1 мл/10 л воды (Л)	Вишня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 2,5-5 л/дереву	-(3)	-(-)
100 мл/т	Кукуруза	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
100 мл/т	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 мл/т	Фасоль	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)
30 мл/га	Просо	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	-(1)	-(-)

1 мл/10 л воды (Л)	Смородин а черная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1-2,5 л/куст	-(3)	-(-)
2 мл/л воды(Л)	Перец сладкий	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
30 мл/га	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/т	Тритикале озимое, тритикале яровое	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 мл/кг	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

250 мл/га	Персик	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе, низким температурам и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – в период листообразования и роста побегов, 3-е – в период формирования плодов, 4-е – за 2 недели до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3-4)	-(-)
30 мл/га	Кабачок	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества продукции</u>	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
30-40 мл/т	Ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
2 мл/кг	Салат	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, <u>увеличение содержания</u>	Замачивание семян перед посевом на 3 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
30-50 мл/га	Тритикале озимое, тритикале яровое	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, <u>улучшение качества продукции</u>	Опрыскивание растений в фазе кущения Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(-)

	50 мл/т	Бобы кормовые	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 15 л/т	-(1)	-(-)	
	30-40 мл/га	Ячмень яровой, ячмень озимый (пивоваренные сорта)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами	Опрыскивание в фазе кущения – выход в трубку Расход рабочей жидкости - 50-100 л/га	-(1)	-(-)	
	1 мл/10 л воды (Л)	Кабачок	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	-(-)	
	30 мл/га	Баклажан	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)	

Полидиаллилдиметиламмоний хлорид

Артафит, ВРК (100 г/л) ООО «НПИЦ БиоГрадис» ОГРН: - Ш/Ш 300-07-683-1	0,6-1 л/га	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе «розовый бутон», 2-ое – в фазе «плод лещина», 3-е – в фазе «плод грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	-(-)	Активен
--	------------	--------	--	---	------	------	---------

15.06.2015
14.06.2025

0,15-0,3 л/га	Овес	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе кущения, 2-ое – в фазе колошения (выметывания метелки) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,15-0,3 л/га	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе кущения, 2-ое – в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,6-0,8 л/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
0,15-0,2 л/га	Лен - долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,1-0,12 л/т	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
30 мл/кг	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,1-0,15 л/т	Кукуруза	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,6-0,8 л/га	Козлятник, клевер, вика, люцерна, донник, люпин	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе двух пар листьев Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
30 мл/кг	Перец (открытый и защищенный грунт), баклажан (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,1-0,15 л/т	Лен - долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,6 л/га	Перец (открытый и защищенный грунт), баклажан (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
0,15-0,3 л/т	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,6 л/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт или в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-ое – в фазе бутонизации женских цветков, 3-е – через 14 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
30 мл/кг	Кабачок	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)

0,15-0,6 л/га	Морковь	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе 2-3-х листьев, 2-ое – в фазе пучковой спелости (8-10 листьев) Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
0,15-0,3 л/т	Овес	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
30 мл/кг	Томат (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,1-0,15 л/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе бутонизации, 2-ое – в фазе начала образования плодов Расход рабочей жидкости - 600 -800 л/га	-(2)	-(-)
0,15-0,6 л/га	Кабачок	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт или в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-ое – в фазе бутонизации женских цветков, 3-е – через 14 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	-(-)
0,1-0,15 л/т	Конопля (сорта, внесенные в Государств енный реестр селекцион ных достижени й, допущенн ых к использова нию)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,2 л/т	Козлятник, клевер, вика, люцерна, донник, люпин	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,15-0,6 л/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое – в фазе бутонизации 1-й кисти, 3-е – в фазе цветения 2-ой кисти Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(3)	-(-)
50 мл/кг	Лук репчатый (севок)	Ускорение отрастания, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, повышение урожайности	Замачивание севка перед посевом на 1 час Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
30 мл/кг	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,15-0,6 л/т	Соя, фасоль, горох, нут, бобы	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,2 л/га	Конопля (сорта, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе двух пар листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
30-40 мл/кг	Лук репчатый (семена)	Повышение энергии прорастания и полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
0,15-0,6 л/га	Соя, фасоль, горох, нут, бобы	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе полных всходов, 2-ое – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,3 л/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт или в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-ое – в фазе бутонизации женских цветков, 3-е – через 14 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	1(1)
0,3 л/га	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	1(1)

0,3 л/т	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,3 л/т	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе бутонизации – начала цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(2)	1(1)
0,3 л/га	Лен масличный	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе полных всходов, 2-ое - в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,3-0,6 л/га	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в начале отрастания листьев, 2-ое - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,3 л/га	Лен - долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе полных всходов, 2-ое - в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

1 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт или в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-ое – в фазе бутонизации женских цветков, 3-е – через 14 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	1(1)
0,15-0,6 л/га	Соя	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе полных всходов, 2-ое – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,15 л/га	Гречиха	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
0,6 л/га	Кукуруза	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе 4-5 листьев, 2-ое - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
1 мл/л воды(Л)	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе бутонизации 1-й кисти, 3-е - в фазе цветения 2-й кисти Расход рабочей жидкости - 4 л/100м ²	-(3)	1(1)
0,15-0,3 л/т	Рапс яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1,0 л/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе роста побегов, 2-ое – в конце фазы цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(2)	1(1)
0,75-1,25 мл/л воды(Л)	Смородин а черная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе распускания почек, 2-ое - в фазе образования завязи Расход рабочей жидкости - 8 л/100м ²	-(2)	1(1)

60 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе «розовый бутон», 2-ое - в фазе «плод лещина», 3-е - в фазе «плод грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м2	-(3)	1(1)
0,15 л/га	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе кущения, 2-ое – в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,6 л/га	Яблоня	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе «розовый бутон», 2-ое - в фазе «плод лещина», 3-е - в фазе «плод грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(2)	1(1)
0,75-1,25 мл/л воды(Л)	Смородина красная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе распускания почек, 2-ое - в фазе образования завязи Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(2)	1(1)
0,15-0,3 л/га	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе 4-6 листьев, 2-ое - в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
10 мл/8 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе роста побегов, 2-ое – в конце фазы цветения Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	-(3)	1(1)
0,15 л/т	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 мл/л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе 2-3 листьев, 2-е в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

30 мл/л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)
0,6-1,0 л/га	Смородина черная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе распускания почек, 2-ое - в фазе образования завязи Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(2)	1(1)
0,6 л/га	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, активизацияростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе 5-6 листьев, 2-ое – в начале фазы образования корзинок Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,15-0,3 л/т	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,4 мл/л воды(Л)	Цветочно- декоративн ые культуры (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-ое – в начале отрастания побегов, 2-ое - перед цветением Расход рабочей жидкости - 4-6 л/100 м2	-(2)	1(1)
0,15 л/т	Гречиха	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3 л/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-ое - в фазе 2-3 листьев, 2-е - в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

0,6 л/т	Кукуруза	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3 л/га	Пшеница озимая	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-ое - в фазе кущения, 2-ое – в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,15-0,3 л/га	Ячмень яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе кущения, 2-ое – в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,15-0,3 л/га	Рапс яровой	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе формирования розетки, 2-ое - в фазе стеблевания, 3-е - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
0,3 л/т	Лен масличный	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,3 л/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе бутонизации 1-й кисти, 3-е - в фазе цветения 2-й кисти Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(3)	1(1)
0,3 л/т	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,3 л/т	Лен - долгунец	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,6 л/т	Подсолнеч ник	Повышение полевой всхожести, активизацияростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,15-0,6 л/т	Соя	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1-2 мл/л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в начале отрастания листьев, 2-ое - в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,15-0,3 л/га	Цветочно- декоративн ые культуры (открытый и защищенн ый грунт)	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, болезням, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-ое – в начале отрастания побегов, 2-ое - перед цветением Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	-(2)	1(1)
0,6-1,0 л/га	Смородин а красная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое – в фазе распускания почек, 2-ое - в фазе образования завязи Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(2)	1(1)

Полиэтиленгликоль-1500 + полиэтиленгликоль-400 + гуминовые кислоты (калиевые соли)

Нертус ПлантаПер, Ж (500 г/л + 300 г/л + 4 г/л) ООО «Ярило» ОГРН: 1083123001500 IV/III 085-07-2125-1 22.02.2019 21.02.2029	0,25-0,3 л/т	Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	0,2-0,3 л/га	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	0,5-0,6 л/т	Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,3 л/га	Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе 8-10 листьев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	
	0,4 л/т	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	0,2-0,3 л/га	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е – в фазе 7-9 листьев Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)	

0,4 л/т	Соя	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,2-0,3 л/га	Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, ячмень озимый	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кущения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(-)

Полиэтиленоксиды + гуминовые кислоты натриевых солей

ВЛ 77, Ж (770 г/л + 30 г/л) МЧ НИП «Долина» ОГРН: - IV/III 088-07-1048-1 23.03.2016 22.03.2026	0,3-0,5 л/га	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе 3-5 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	Активен
	0,3-0,5 л/га	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе 4-6 листьев, 2-е – в фазе смыкания ботвы в рядках Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	0,3-0,5 л/га	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – после высадки рассады, 2-е – в фазе розетки, 3-е – в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)	
	0,8-1,5 л/га	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е- в фазе бутонизации; 2-е – в фазу цветения; 3-е – через 3 недели после 2-го Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)	

0,3-0,5 л/га	Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е в фазе 2-3 пар листьев; 2-е в фазе формирования корзинки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
10-15 мл/ 8 л воды(Л)	Плодовые культуры (семечковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе опадения лепестков, 2-е – фазе плод «лещина», 3-е – в фазе плод «грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 2-8 л/растение	-(3)	-(-)
3-5 мл/ 3 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – через 7 дней после высадки рассады в грунт, 2-е – и 3-е с интервалом 15 дней Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/м2	-(3)	-(-)
3-5 мл / 3 л воды(Л)	Капуста	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – после высадки рассады, 2-е – в фазе розетки, 3-е – в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 1- 1,5 л/м2	-(3)	-(-)
0,3-0,5 л/га	Пшеница озимая, пшеница яровая, рожь, тритикале, ячмень, овес	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе кушения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(-)
0,3-0,5 л/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации, 3- 3 – сразу после цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
1-1,5 л/га	Плодовые культуры (семечковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе опадения лепестков, 2-е - в фазе плод «лещина», 3-е в фазе плод «грецкий орех» Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)

0,3-0,5 л/т	Подсолнечник	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,3-0,5 л/т	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 л/га	Плодовые культуры (косточковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе опадения лепестков, 2-е и 3-е – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)
0,3-0,5 л/т	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
8-15 мл/ 8 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации; 2-е – в фазе цветения; 3-е – через 3 недели после 2-го Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение	-(3)	-(-)
0,5-1 л/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации, 3-е сразу после цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

5-10 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе бутонизации, 3-е – сразу после цветения Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л/м2	-(3)	-(-)
0,3-0,5 л/га	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е в фазе кущения – начало выхода в трубку, 2-е – в фазе молочной спелости Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	-(-)
0,3-0,5 л/т	Пшеница озимая, пшеница яровая, рожь, тритикале, ячмень, овес	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, иммунитета к неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
10 мл/ 8 л воды(Л)	Плодовые культуры (косточковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе опадения лепестков, 2-е и 3-е – с интервалом 14 дней Расход рабочей жидкости - 1,5-5 л/растение	-(3)	-(-)

Проантоцианидины + Дигидрокверцетин + параоксibenзойные кислоты

<p>ЭкстраКор, ВРП (650 г/кг + 160 г/кг + 140 г/кг) ЗАО «Аметис» ОГРН: 1042800015422 IV/III 253-07-2158-1 14.03.2019 13.03.2029</p>	20-40 г/т	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, устойчивости растений к грибным болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	20-40 г/т	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, устойчивости растений к грибным болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 7,5 л/т	-(1)	-(-)	

	8-16 г/га	Соя	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, устойчивости растений к грибным болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	8-16 г/га	Пшеница яровая	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, устойчивости растений к грибным болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – через 12-14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	

прогексадион кальция

Кудос, ВДГ (100 г/кг) Файн Агрокемикалс Лтд. ОГРН: - III/III 900-07-4298-1 11.12.2023 10.12.2023	1,25	Яблоня	Снижение длины ежегодного прироста побегов, повышение завязываемости плодов, урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-ая обработка – в начале активного роста побегов, при достижении 2-5 см, но не более 5 см, 2-е – через 3-5 недель после первой обработки (плоды достигли половины окончательного размера) Расход рабочей жидкости - 800 л/га	50(2)	3(3)	Активен
Регалис Плюс, ВДГ (100 г/кг) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-07-1150-1 13.09.2016 12.09.2026	2,5	Яблоня	Снижение длины ежегодного прироста побегов, повышение завязываемости плодов, урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание при достижении прироста однолетних побегов 5-7 см Расход рабочей жидкости - 800 л/га	60(1)	7(3)	Активен
	1,25	Яблоня	Снижение длины ежегодного прироста побегов, повышение завязываемости плодов, урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание при достижении прироста однолетних побегов 5-7 см и через 3 недели после первой обработки Расход рабочей жидкости - 800 л/га	60(2)	7(3)	

прогексадион кальция + мепикват-хлорид

Мессидор, К (50 г/л + 300 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-07-1182-1 01.08.2016 31.07.2026	0,6-1,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Повышение устойчивости растений к полеганию, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе кущения - выход в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	49(1)	-(3)	Активен
--	---------	---	---	--	-------	------	---------

прогексадион кальция + мепикват-хлорид + Пираклолостробин

Архитект, СЭ, С (25 г/л + 150 г/л + 100 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III, «БАСФ СЕ» ОГРН: - III/III 014-07-3176-1 07.06.2021 06.06.2031	1-1,5	Подсолнечник	Активация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений	70(1)	-(3)	Активен
---	-------	--------------	--	-----------------------	-------	------	---------

тиамин + 6-бензиламинопурин

Детка, ПС (0,5 г/кг + 11 г/кг) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 III/- 033-07-2071-1 06.03.2019 05.03.2029	1,5-2 мг/почку(Л)	Фиалка (сенполия)	Стимуляция размножения и цветения	Нанесение препарата на спящую почку в пазухе листа на цветоносе тонким слоем, специальным аппликатором	-(1)	-(-)	Активен
	1,5-2 мг/почку	Фиалка (сенполия)	Стимуляция размножения и цветения	Нанесение препарата на спящую почку в пазухе листа на цветоносе тонким слоем, специальным аппликатором	-(1)	-(-)	

Тринексапак-этил

Зернорост, К (250 г/л) ООО «Шанс» ОГРН: 1093668046812 II/II 126-07-4480-1 25.03.2024 24.03.2034	0,2-0,4	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание в период от фазы кущения – выхода в трубку до фазы появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2	Пшеница озимая	Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание первое - в фазе кущения, второе – в период от фазы выхода в трубку до фазы появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(2)	-(3)	
Костандо, К (250 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/III 018-07-2500-1 11.12.2019 10.12.2029	0,2-0,4	Рожь озимая, пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в период от фазы кущения – выхода в трубку до фазы появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2	Пшеница озимая	Предупреждение полегания, повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе кущения, 2-е – в период от фазы выхода в трубку до фазы появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(2)	-(3)	
Моддус, К (250 г/л) ООО «Сингента» ОГРН: 1037739325271 III/III 041-07-2326-1 24.07.2019 23.07.2029	0,2-0,4	Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый, рожь озимая	Предупреждение полегания, повышение урожайности и улучшение качества зерна	Опрыскивание растений в период от фазы начала кущения-выхода в трубку до фазы появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	0,2	Пшеница озимая	Предупреждение полегания, повышение урожайности и улучшение качества зерна	Опрыскивание растений: первое - в фазе начала кущения (осенью), второе – в период от фазы выхода в трубку до фазы появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га	60(2)	-(3)	
Сапресс, К (250 г/л) «КЕМИНОВА А/С» ОГРН: - III/III 058-01-583-1 04.03.2015 03.03.2025	0,2-0,4	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Уменьшение длины междоузлий, предупреждение полегания, повышение урожайности, качества зерна	Опрыскивание в период от фазы кущения – выход в трубку до фазы появления флагового листа	60(1)	-(3)	Не активен
	0,2	Пшеница озимая	Уменьшение длины междоузлий, предупреждение полегания, повышение урожайности, качества зерна	Опрыскивание: 1-е – осенью в фазе кущения, 2-е – весной в период от фазы кущения - выход в трубку до появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 250-300 л/га	60(2)	-(3)	

Тринексапак-этил + Хлормекватхлорид

Эммер, К (50 г/л + 375 г/л) ООО «Агро Эксперт Груп» ОГРН: 1027708006996 III/III 178-07-4523-1 25.04.2024	1,0	Пшеница озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательн ых процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений:	60(2)	-(3)	Активен
--	-----	-------------------	--	------------------------	-------	------	---------

24.04.2034	1,2-1,5	Рожь озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе стеблевания – начала появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)
	1,2-1,5	Ячмень яровой и озимый	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе конец кущения - начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)
	1,0	Ячмень озимый	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений:	60(2)	-(3)
	1,0-1,5	Пшеница яровая и озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	60(1)	-(3)

Тритерпеновые кислоты

Альфастим, ВЭ (100 г/л) ООО «ПОЛИДОН Агро» ОГРН: 1127747201713 Ш/Ш 098-07-564-1 19.02.2015 18.02.2025	1 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - через две недели после цветения, 2-е – через 21 день после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)	Не активен
	0,05 мл/кг	Травы газонные	Усиление ростовых процессов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 0,1 л/кг	-(1)	-(-)	
	0,5 мл/4 л воды(Л)	Декоративные кустарники и	Усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)	
	100 мл/га	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - через две недели после цветения, 2-е – через 21 день после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(2)	-(-)	
	50 мл/т	Ячмень яровой и озимый	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

30 мл/га	Пшеница озимая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/га	Томат	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения первой кисти, 2-е - в фазе цветения второй кисти, 3-е – в фазе цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
0,5 мл/100 м2(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е – через 12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(2)	-(-)
50 мл/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е – через 12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/т	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 мл/т	Пшеница яровая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,4 мл/100 м2(Л)	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в период массового завязывания кочанов Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)
0,15 мл/3 л воды(Л)	Огурец	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения, 4-е – через 7 дней после третьего опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(4)	-(-)
50 мл/т	Пшеница озимая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

0,5 мл/3 л воды(Л)	Томат	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения первой кисти, 2-е - в фазе цветения второй кисти, 3-е – в фазе цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)
40 мл/га	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4-х листьев, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
15 мл/га	Огурец	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения, 4-е – через 7 дней после третьего опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(4)	-(-)
50 мл/т	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
20 мл/га	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
40 мл/га	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в период массового завязывания кочанов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,2 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)
50 мл/га	Декоративные кустарники	Усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)
20 мл/га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)

	30 мл/га	Ячмень яровой и озимый	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	50 мл/га	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе 4-6 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	30 мл/га	Пшеница яровая	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	50 мл/га	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала раскрытия цветков нижних соцветий, 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
	20 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 4-5 пар листьев, 2-е – через 14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)	
Биосил, ВЭ (100 г/л) ООО «АГРОИМПЭКС» ОГРН: 1157746689484 Ш/Ш 347-07-1440-1 06.04.2017 05.04.2027	50 мл/га	Декоратив ные кустарник и	Усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 400 л/га	-(2)	-(-)	Активен
	50 мл/т	Ячмень яровой	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	
	20 мл/га	Соя	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)	
	50 мл/т	Пшеница озимая	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

30 мл/га	Ячмень озимый	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/га	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала раскрытия цветков нижних соцветий, 2-е – в фазе массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,5 мл/100 м2(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е – через 12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 6 л/100м2	-(2)	-(-)
0,5 мл/4 л воды(Л)	Декоративные кустарники	Усиление ростовых процессов, улучшение качественных характеристик	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)
0,2 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)
50 мл/т	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(-)	-(-)
20 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 4-5 пар листьев, 2-е – через 14 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/т	Ячмень озимый	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
0,5 мл/3 л воды(Л)	Томат	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения первой кисти, 2-е - в фазе цветения второй кисти, 3-е – в фазе цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	-(-)

50 мл/т	Пшеница яровая	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 мл/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения, 2-е – через 12 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	-(-)
0,05 мл/100 мл воды(Л)	Травы газонные	Усиление ростовых процессов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	-(1)	-(-)
20 мл/га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
40 мл/га	Подсолнеч ник	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4-х листьев, 2-е – в фазе начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
15 мл/га	Огурец	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения, 4-е – через 7 дней после третьего опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(4)	-(-)
40 мл/га	Капуста белокочан ная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в период массового завязывания кочанов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
50 мл/га	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе 4-6 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
30 мл/га	Пшеница озимая	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)

30 мл/га	Пшеница яровая	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
0,05 мл/кг	Травы газонные	Усиление ростовых процессов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 0,1 л/кг	-(1)	-(-)
30 мл/га	Ячмень яровой	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе начала выхода в трубку; 2-е – в фазе появления флагового листа Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
100 мл/га	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - через две недели после цветения, 2-е – через 21 день после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(2)	-(-)
1 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - через две недели после цветения, 2-е – через 21 день после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(2)	-(-)
0,15 мл/3 л воды(Л)	Огурец	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала цветения, 3-е – в фазе массового цветения, 4-е – через 7 дней после третьего опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(4)	-(-)
50 мл/т	Кукуруза	Усиление ростовых и формообразовательных	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
50 мл/га	Томат	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе цветения первой кисти, 2-е - в фазе цветения второй кисти, 3-е – в фазе цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
0,4 мл/100 м2(Л)	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в период массового завязывания кочанов Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(2)	-(-)

<p>Вэрва, ВЭ (10 г/л) ООО «Научно-технологическое предприятие Института химии Коми НЦ УрО РАН» ОГРН: - Ш/Ш 145-07-1604-1 21.11.2017 20.11.2027</p>	200 мл/га	Капуста белокочан ная	Активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(-)	Активен
	1,5 мл/кг	Морковь	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 6-12 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	3(-)	
	500 мл/га	Морковь	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 листьев, 2-е - в начале формирования корнеплодов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(-)	
	300 мл/га	Пшеница яровая и озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е – в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(-)	
	200 мл/га	Лен - долгунец	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов, 2-е - в фазе «елочки» Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(2)	3(-)	

2,5 мл/3 л воды(Л)	Томат	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период цветения 1-ой кисти; 2-е – в период цветения 2-ой кисти; 3-е - в период цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	3(-)
0,8 мл/3 л воды(Л)	Огурец	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев; 2-е – в фазе начала цветения 2-ой кисти, 3-е - в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100м2	-(3)	3(-)
25 мл/т	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести клубней, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(-)
500 мл/т	Ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(-)
500 мл/га	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести клубней, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е в начале фазы цветения, 2-е – в период массового цветения, 3-е – через 7 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	3(-)

0,15 мл/100 мл воды(Л)	Морковь	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 6-12 часов Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	3(-)
250 мл/га	Томат	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в период цветения 1-ой кисти, 2-е – в период цветения 2-ой кисти, 3-е – в период цветения 3-ей кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	3(-)
5 мл/3 л воды(Л)	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести клубней, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – в фазе полного цветения; 3-е – через 7 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(3)	3(-)
300 мл/т	Лен - долгунец	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(-)
2,5 мл/л воды(Л)	Картофель	Повышение энергии прорастания и всхожести клубней, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Обработка клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	3(-)

400 мл/т	Рапс яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(-)
1 л/га	Травы злаковые (однолетние и многолетние)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения, 2-е - в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(-)
80 мл/га	Огурец	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в начале фазы цветения 2-ой кисти, 3-е - в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	3(-)
300 мл/га	Свекла сахарная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 8-10 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(-)
500 мл/т	Пшеница яровая и озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	3(-)

300 мл/га	Ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	3(-)
2 мл/3 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	3(-)
500 мл/га	Рапс яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	3(-)
400 мл/га	Подсолнечник	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев, 2-е - в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	3(-)
5 мл/3 л воды(Л)	Морковь	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 листьев, 2-е - в начале формирования корнеплодов Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(2)	3(-)

<p>Новосил, ВЭ (100 г/л) ООО НПП «Биохимзащита» ОГРН: - ПП/П 128-07-4761-1 23.12.2024 22.12.2034</p>	1 мл/3 л воды (Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(3)	1(1)	Активен
	50 мл/га	Гречиха	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала раскрытия цветков нижних соцветий 2-е - в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	40 мл/га	Капуста белокочан ная	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 6-7 листьев, 2-е - в фазе массового завязывания кочанов. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
	50 мл/га	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений в фазе 5-6 листьев. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	
	0,2 мл/ 3 л воды (Л)	Фасоль	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости к болезням, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(3)	1(1)	
	50 мл/га	Овес	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)	

0,4 мл/ 3 л воды (Л)	Капуста белокочанная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 6-7 листьев, 2-е - в фазе массового завязывания кочанов. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(1)
1 мл/3 л воды (Л)	Лук репчатый (на репку)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 4-ого листа, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	1(1)
30 мл/га	Ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
20 мл/га	Соя	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)
30 мл/га	Ячмень озимый	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	1(1)

40 мл/га	Подсолнечник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев, 2-е - в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
30 мл/га	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения; 2-я – в фазе колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
50 мл/т	Кукуруза	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
0,5 мл/ 6 л воды (Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения, 2-е - через 12 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м ²	-(2)	1(1)
50 мл/т	Ячмень озимый	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)

50 мл/га	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения 1-ой кисти, 2-ое – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
20 мл/га	Свекла сахарная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 8-10 листьев, 2-ое – через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
20 мл/га	Фасоль	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к болезням, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е - в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
50 мл/т	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
100 мл/га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала цветения, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
50 мл/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения, 2-е - через 12 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(2)	1(1)

60 мл/т	Овес	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
50 мл/т	Пшеница озимая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
1 мл/3 л воды (Л)	Лук репчатый (семена)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе массового стрелкования, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	-(3)	1(1)
100 мл/га	Лук репчатый (семена)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе массового стрелкования, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	1(1)
50 мл/т	Ячмень яровой	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
50 мл/га	Люцерна на семена	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)

0,15 мл/3 л воды (Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 2-4 настоящих листьев, 2-е - в начале фазы цветения, 3-е - в фазе массового цветения, 4-е - через 7 дней после третьего опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	-(4)	1(1)
30 мл/га	Пшеница яровая	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе кущения; 2-я – в фазе колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
0,5 мл/л воды (Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе цветения 1-ой кисти, 2-ое – в фазе цветения 2-ой кисти, 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	-(3)	1(1)
75 мл/га	Хлопчатник	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе начала бутонизации, 2-е - в фазе начала цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)
50 мл/т	Рис	Повышение энергии прорастания и всхожести семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
15 мл/га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 2-4 настоящих листьев, 2-е - в начале фазы цветения, 3-е - в фазе массового цветения, 4-е - через 7 дней после третьего опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(4)	1(1)

	100 мл/га	Лук репчатый (на репку)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням. Повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе образования 4-ого листа, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	1(1)	
--	-----------	-------------------------	---	---	------	------	--

Триэтаноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кислоты + хлорметилсилатран

Биотран, К (750 г/кг + 150 г/кг) ООО «ЛОКФОРТ» ОГРН: 1173443025634 Ш/Ш 736-07-3233-1 19.07.2021 18.07.2031	5 г/т	Ячмень яровой, пшеница озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	Активен
	10 г/га	Ячмень яровой, пшеница озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения – начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200 л/га	-(1)	-(1)	

Флавоноиды ели

Вэрва-ель, ВЭ (10 г/л) ООО «Научно-технологическое предприятие Института химии Коми НЦ УрО РАН» ОГРН: - Ш/Ш 145-07-676-1 08.06.2015 07.06.2025	0,6 л/га	Пшеница озимая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-ое - в фазе кушения, 2-ое – в фазе колошения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(3)	Активен
	10 мл/3 л/л (Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е через 7 дней после предыдущей обработки Расход рабочей жидкости - 3 л/100м ²	-(3)	-(3)	
	0,7 л/т	Пшеница озимая	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)	

1 л/га	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е через 7 дней после предыдущей обработки Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(3)
100 мл/ л воды(Л)	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(3)
1 л/т	Картофель	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(3)

Хлормекватхлорид

<p>Атлет, ВР (600 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 ПП/П 012-07-772-1 07.09.2015 06.09.2025</p>	3 мл/л воды(Л)	Капуста	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив под корень: 1-й - в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/м²	-(3)	-(-)	Активен
	0,3 мл/300 мл воды(Л)	Перец (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание в фазе 3-4-х листьев Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(1)	-(-)	
	1,5 мл/л воды(Л)	Кустарник и декоративные	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды; уменьшение прироста побегов, повышение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – в фазе сформированных, неокрашенных бутонов, 2-е – через 5-8 дней, после первой обработки Расход рабочей жидкости - 0,1-0,3 л/растение	-(2)	-(-)	
	0,3 мл/300 мл воды(Л)	Томаты (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: первое - в фазе 3-4 листьев, второе и третье - с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)	
	0,3 мл/300 мл воды(Л)	Баклажан (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание рассады в фазе 3-4-х листьев Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(1)	-(-)	
	1,5 мл/л воды(Л)	Баклажан (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив под корень в фазе 3-4-х листьев Расход рабочей жидкости - 30 л/10 м2	-(1)	-(-)	
	1 мл/100-200 мл воды(Л)	Цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение декоративных качеств	Полив в фазе сформированных, но еще не окрашенных бутонов Расход рабочей жидкости - 50 мл/растение	-(1)	-(-)	
	1,5 мл/л воды(Л)	Томаты (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив под корень в фазе 3-4-х х листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/м2(30 мл/растение)	-(1)	-(-)	

	1,5 мл/л воды(Л)	Перец (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив под корень в фазе 3-4-х х листьев Расход рабочей жидкости - 3 л/м2(30 мл/растение)	-(1)	-(-)	
Цегран, ВК (750 г/л) ООО «АГРус» ОГРН: 5087746677893 Ш/Ш 097-07-567-1 20.02.2015 19.02.2025	1- 1,5	Пшеница озимая	Повышение устойчивости растений к полеганию, урожайности и качества продукции	Опрыскивание с фазы конец кущения до фазы начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	1- 1,5	Пшеница яровая	Повышение устойчивости растений к полеганию, урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1- 1,5	Ячмень яровой	Повышение устойчивости растений к полеганию, урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1- 1,5	Рожь озимая	Повышение устойчивости растений к полеганию, урожайности и качества продукции	Опрыскивание в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Антивылегалч, ВР (675 г/л) ООО «АДАМА РУС» ОГРН: 1062310039934 Ш/Ш 156-07-2120-1 22.02.2019 21.02.2029	1,2-2,0	Пшеница яровая и озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности	Опрыскивание растений в период от фазы кущения до фазы начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
ЦеЦеЦе 750, ВК (750 г/л) «БАСФ СЕ» ОГРН: - Ш/Ш 014-07-2535-1 19.02.2020 18.02.2030	1,0-1,5	Пшеница яровая	Предотвращение полегания, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Рожь озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Ячмень яровой	Предотвращение полегания, повышение урожайности	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности	Опрыскивание растений в период от фазы конец кущения до фазы начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)	
Крепень, ВР (600 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 Ш/Ш 008-07-1585-1 07.11.2017 06.11.2027	0,3 мл/10 м2	Томат (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)	Активен
	1,5 мл/л воды(Л)	Томат (открытый и защищен ный грунт)	Активизация роста корневой системы, улучшение приживаемости, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности	Полив под корень: 1-й – через 10 дней после высадки рассады, 2-й – через 14 дней после первого полива Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(2)	-(-)	
	0,85 мл/10 м2	Капуста белокочан ная (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание растений, 1-е – в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-е – через 7 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(2)	-(-)	

1,5 мл/л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Активизация роста корневой системы, улучшение приживаемости, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Полив под корень: 1-й – в фазе 3-х листьев, 2-й через – через 14 дней после первого полива Расход рабочей жидкости - 100 мл/растение	-(2)	-(-)
0,85 мл/300 мл воды(Л)	Капуста белокочанная (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-е – через 7 дней после первой обработки Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(2)	-(-)
1 мл/100-200 мл воды	Цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение декоративных качеств	Полив в фазу сформированных, но ещё не окрашенных бутонов Расход рабочей жидкости - 50 мл/растение	-(1)	-(-)
0,3 мл/10 м2	Перец сладкий (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)
1 мл/100-200 мл воды(Л)	Цветочные культуры (горшечные растения)	Повышение декоративных качеств	Полив в фазу сформированных, но ещё не окрашенных бутонов Расход рабочей жидкости - 50 мл/растение	-(1)	-(-)
0,3 мл/300 мл воды(Л)	Баклажан (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)
0,3 мл/300 мл воды(Л)	Перец сладкий (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)
1,5 мл/л(Л)	Цветочные культуры	Активизация роста корневой системы, улучшение приживаемости, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-4-х листьев, 2-е – через 7-10 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 мл/10м2	-(2)	-(-)
1,5 мл/1 л воды	Кустарник и декоративные	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды; уменьшение прироста побегов, повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе сформированных, неокрашенных бутонов, 2-е через 5-8 дней, после первой обработки Расход рабочей жидкости - 0,05-0,2 л/куст	-(2)	-(-)
0,3 мл/300 мл воды(Л)	Томат (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)
0,3 мл/10 м2	Баклажан (рассада)	Улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание: 1-е – в фазе 3-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м2	-(3)	-(-)
1,5 мл/л(Л)	Цветочные культуры	Активизация роста корневой системы, улучшение приживаемости, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Полив под корень: 1-й – в фазе 3-4-х листьев, 2-й – через 7-10 дней после первого полива Расход рабочей жидкости - 50 мл/растение	-(2)	-(-)

	1,5 мл/1 л воды(Л)	Кустарник и декоративные	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды; уменьшение прироста побегов; повышение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – в фазе сформированных, неокрашенных бутонов, 2-е через 5-8 дней, после первой обработки Расход рабочей жидкости - 0,05-0,2 л/куст	-(2)	-(-)	
	3 мл/л воды(Л)	Капуста белокочанная	Активизация роста корневой системы, улучшение приживаемости, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Полив под корень: 1-й – через 10 дней после высадки рассады, 2-й через – через 14 дней после первого полива Расход рабочей жидкости - 50 мл/растение	-(2)	-(-)	
Ретацел, ВК (750 г/л) «Лучбыны заводы Драсловка» а.с. ОГРН: - III/III 252-07-4667-1 18.09.2024 17.09.2034	1,5	Пшеница озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию; улучшение перезимовки, повышение устойчивости к низким положительным температурам. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и	Опрыскивание растений: 1-ое - в фазе 3-4 листьев (осенью); 2-е – в фазе конец кушения - начало выхода в трубку (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1,5	Пшеница озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию; улучшение перезимовки, повышение устойчивости к низким положительным температурам. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и	Опрыскивание растений в фазе конец кушения - начало выхода в трубку (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Рапс яровой	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания с добавлением 0,1 л/100 л воды ПАВ Авентрол, КЭ (960 г/л пинолена) или МультиМастр, КЭ (960 г/л пинолена) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1	Пшеница озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию; улучшение перезимовки, повышение устойчивости к низким положительным температурам. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и	Опрыскивание растений: 1-ое - в фазе 3-4 листьев (осенью); 2-е – в фазе конец кушения - начало выхода в трубку (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)	

0,5-1	Рапс яровой	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)
1,5	Пшеница озимая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию; улучшение перезимовки, повышение устойчивости к низким положительным температурам. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и	Опрыскивание растений в фазе конец кушения – начало выхода в трубку (весной) с добавлением 0,1 л/100 л воды ПАВ Авентрол, КЭ (960 г/л пинолена) или МультиМастр, КЭ (960 г/л пинолена) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)
1-1,3	Ячмень яровой	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в фазе кушения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)
1,2-2	Пшеница яровая	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений в период от фазы кушения до фазы начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)
2	Рапс озимый	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию; улучшение перезимовки, повышение устойчивости к низким положительным температурам. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 5-7 листьев (осенью); 2-е – в фазе начала стеблевания (при высоте растений – 30-40 см) (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)
1,5-2	Рапс озимый	Снижение высоты растений, повышение устойчивости к полеганию; улучшение перезимовки, повышение устойчивости к низким положительным температурам. Активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности и	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 5-7 листьев (осенью); 2-е – в фазе начала стеблевания (при высоте растений – 30-40 см) (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)

Стабилян, ВР (460 г/л) Нуфарм ГмбХ & КО КГ ОГРН: - П/П 024-07-2583-1 10.03.2020 09.03.2030	1,5	Ячмень яровой	Повышение устойчивости к полеганию и поражению болезнями, повышение урожайности	Опрыскивание растений в период от начала фазы кущения до фазы начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	Активен
	2-3	Рожь озимая	Повышение устойчивости к полеганию и поражению болезнями, повышение урожайности	Опрыскивание расходов в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Повышение устойчивости к полеганию и поражению болезнями, повышение урожайности	Опрыскивание растений в период от начала фазы кущения до фазы начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(1)	-(3)	
Теафол, ВР (750 г/л) ООО «ЛИСТЕРРА» ОГРН: 1057749556930 П/П 010-07-4584-1 23.05.2024 22.05.2034	1,5-2,0	Рапс озимый	Росторегулирующее действие, повышающее устойчивость к полеганию, способствующее образованию большого количества ветвей, стручков и семян на растении, повышающее урожайность	Опрыскивание: первое - в фазе 4-5 листьев (осенью), второе - в фазе начала стеблевания (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)	Активен
	1,0-1,5	Пшеница и ячмень яровые, рожь озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1,0-1,5	Пшеница озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в период от фазы кущения до фазы начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-1,2	Рапс озимый	Росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание: первое - в фазе 4-5 листьев (осенью), второе - в фазе начала стеблевания (весной) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(2)	-(3)	
	0,8-1,2	Рапс яровой	Росторегулирующее действие, повышающее устойчивость к полеганию, способствующее образованию большого количества ветвей, стручков и семян на растении, повышающее урожайность	Опрыскивание в фазе начала стеблевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
Центрино, ВК (750 г/л) ООО «Агро Эксперт Групп» ОГРН: 1027708006996 П/П 178-07-4502-1 04.04.2024 03.04.2034	1-1,5	Пшеница яровая	Повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к негативным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	Активен

	1-1,5	Ячмень яровой	Повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к негативным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-1,5	Рожь озимая	Повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к негативным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
	1-1,5	Пшеница озимая	Повышение устойчивости к полеганию. Активизация формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к негативным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в период от фазы конца кущения до фазы начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	
<p>Рэги, ВРК (750 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 Ш/Ш 021-07-1688-1 27.02.2015 021-07-1688-1/224 26.02.2025</p>	1,0- 1,5	Рожь озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	Не активен
	1,0- 1,5	Пшеница яровая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)	
	0,8-0,1	Рапс озимый	Повышение устойчивости растений к низким температурам, улучшение перезимовки. Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-ое в фазе 4-5 листьев (осень), 2-е в фазе начала стеблевания (весна) Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(3)	
	1,0- 1,5	Пшеница яровая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)	

1 мл/л воды	Томат, перец (рассада)	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев; 2-е и 3-е – с интервалом 5-8 дней Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(3)	-(-)
1 мл/100 мл воды	Цветочные культуры (горшечны е растения)	Активизация формирования корневой системы, снижение высоты растений, формирование компактного куста, повышение декоративных качеств, продление периода цветения	Полив растений: 1-й - в фазе сформированных, но ещё не окрашенных бутонов, 2-й – через 5-6 месяцев после первого полива Расход рабочей жидкости - 50-100 мл/растение	-(2)	-(-)
1,0- 1,5	Пшеница озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)
0,8-1,2	Рапс яровой	Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(3)
1,0- 1,5	Рожь озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)
1,0- 1,5	Ячмень яровой	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)
1,0- 1,5	Ячмень яровой	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)	-(3)
10 мл/л воды	Земляника	Повышение устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, уменьшение отрастания побегов (усов), увеличение количества ягод, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е - в начале фазы бутонизации, 2-е - через 7 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 мл/10 м ²	-(2)	-(-)
1,0- 1,5	Пшеница озимая	Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции	Опрыскивание в фазе конец кущения – начало выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 50 л/га	60(1)	-(3)
3 мл/л воды	Капуста (рассада)	Активизация формирования корневой системы, предотвращение перерастания рассады, улучшение качества рассады, повышение урожайности	Полив растений под корень: 1-й – в фазе семядольных листьев, 2-й и 3-й – с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 1 л/м ²	-(3)	-(-)

хлорметилсилатран

<p>Силацин, КРП, ТАБ (950 г/кг) ООО «Флора-Лик» ОГРН: 1055000504118 Ш/Ш 324-07-2045-1 06.11.2018 05.11.2028</p>	1 табл./ 100 мл воды(Л)	Баклажан	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)	Активен
	1 г/кг	Редис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)	
	1 табл./ 100 мл воды(Л)	Перец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции.	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)	
	40 г/га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 800 л/га	-(3)	-(-)	
	5-10 г/т	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)	

1 табл./ 200 мл воды(Л)	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 г/кг	Баклажан	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
2 г/т	Овес	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
20 г/т	Хлопчатни к	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян (оголенных) Расход рабочей жидкости - 30 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Капуста белокочан ная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
100 г/т	Хлопчатни к	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян (опушенных) перед посадкой на 24 часа Расход рабочей жидкости - 500 л/т	-(1)	-(-)

1 табл./500 мл воды(Л)	Виноград (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости	Замачивание черенков перед посадкой на 8-12 часов Расход рабочей жидкости - 500 мл/50 шт	-(1)	-(-)
0,2 г/100 шт.	Виноград (черенки)	Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости	Замачивание черенков перед посадкой на 8-12 часов Расход рабочей жидкости - 1 л/100 шт	-(1)	-(-)
2 табл./л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры (саженцы)	Повышение приживаемости	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 6-8 часов Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(1)	-(-)
1 г/кг	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./200 мл воды(Л)	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 мин Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)
100 г/га	Хлопчатник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе цветения – плодообразование Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
2-4 г/т	Пшеница озимая и яровая, ячмень озимый и яровой	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

1 г/кг	Капуста цветная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 г/кг	Перец	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции.	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
60 г/га	Плодовые культуры (семечков ые, косточков ые)	Снижение осыпания завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе опадения лепестков, 3-е - в фазе образования завязей Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)
4 табл./8 л воды(Л)	Виноград	Снижение осыпания завязей, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания листьев, 2-е - в фазе бутонизации, 3-е - в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 8 л/100м2	-(3)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/50 г	-(1)	-(-)

2 г/кг	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
2 г/10 шт.	Плодово-ягодные культуры (саженцы)	Повышение приживаемости	Замачивание корневой системы саженцев перед посадкой на 6-8 часов Расход рабочей жидкости - 10 л/10 шт	-(1)	-(-)
1 г/кг	Лук репчатый (чернушка)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Лук репчатый (чернушка)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
6 табл./ 10 л воды(Л)	Плодовые культуры (семечковые, косточковые)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Повышение сохранности плодов в период зимнего хранения. Улучшение перезимовки растений	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе бутонизации, 2-е – в фазе опадения лепестков, 3-е - в фазе образования завязей Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	-(-)
10 г/т	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)

4 г/кг	Томат	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, ускорение созревания плодов, повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 30-40 мин Расход рабочей жидкости - 2 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Редис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 табл./ 100 мл воды(Л)	Капуста цветная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)
1 г/кг	Капуста белокочанная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции. Снижение поступления тяжелых	Замачивание семян перед посевом на 30-40 минут Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)
5 табл./ 0,5 л воды(Л)	Картофель	Повышение всхожести и энергии прорастания, устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 0,5 л/50 кг	-(1)	-(-)

Хлорпрофам

Спад Ник Гранулы, Г (1000 г/кг) Ацето Экгрикалчерал Кемикалз Корпорейшн ОГРН: - III/III 569-07-2387-1 11.09.2019 10.09.2029	0,008	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Последующая пятикратная обработка клубней в хранилище с интервалом 30 дней с использованием термомеханического аэрозольного генератора Обработка семенного картофеля запрещена	20(5)	1(1)	Активен
	0,012	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Обработка клубней в хранилище при закладке на хранение	20(1)	1(1)	
Спад-Ник, Р (500 г/л) Ацето Экгрикалчерал Кемикалз Корпорейшн ОГРН: - III/- 569-07-4237-1 26.10.2023 25.10.2033	0,024	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Обработка клубней в хранилище при закладке на хранение с использованием температурного туманообразователя Вход в помещение допускается не ранее, чем через 24 часа после обработки, по достижении концентрации хлорпрофама в воздухе на уровне ниже ПДК воздуха рабочей зоны (2 мг/м ³) Обработка семенного картофеля запрещена! Использование обработанного препаратом картофеля рекомендуется не ранее 20 дней после последней	20(1)	1(1)	Активен
	0,016	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Обработка клубней в хранилище с интервалом 30 дней с использованием температурного туманообразователя Вход в помещение допускается не ранее, чем через 24 часа после обработки, по достижении концентрации хлорпрофама в воздухе на уровне ниже ПДК воздуха рабочей зоны (2 мг/м ³) Обработка семенного картофеля запрещена! Использование обработанного препаратом картофеля рекомендуется не ранее 20 дней после последней	20(5)	1(1)	
Харвест-Макс, Р (624 г/л) ООО «ВОЛГОХИМНЕФТЬ» ОГРН: 1023405968178 II/- 374-07-1131-1 07.06.2016 374-07-1131-1/386 386 06.06.2026	10-20 мл/т (суммарно в течение всего периода хранения - до 78 мл/т)	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Обработка товарных клубней в хранилище: 1-я обработка – в течение 3 недель после сбора урожа, 2-я, 3 –я и 4-я обработки с интервалом 4-16 недель Срок безопасного допуска людей в картофелехранилище после завершения фумигации и окончания стадии проветривания – 24 часа, при условии выключения местной вентиляции, обязательного применения средств защиты органов дыхания и кожи (в связи с возможным вторичным	20(1-4)	-(-)	Активен
	10-19 мл/т (суммарно в течение всего периода хранения - до 57 мл/т)	Картофель (столовые сорта) (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Обработка товарных клубней продовольственного картофеля	20(1-3)	-(-)	

Хлорпрофам, Р (500 г/л) ООО «Агрохим ХХ1» ОГРН: 5067746338150 П/- 197-07-4799-1 03.02.2025 02.02.2035	24 мл/т	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Обработка товарных клубней в хранилище при закладе на хранение с использованием температурного туманообразователя. Срок безопасного допуска людей в картофелехранилище после завершения обработки картофеля с использованием генератора «горячего тумана» и окончания стадии проветривания – 24 часа, при условии выключения местной вентиляции, обязательного применения средств защиты органов дыхания и кожи (в	20(1)	-(-)	Активен
	16 мл/т	Картофель (кроме семенного картофеля)	Подавление прорастания клубней картофеля при хранении, продление срока хранения	Последующая четырехкратная обработка клубней в хранилище с интервалом 30 дней с использованием температурного туманообразователя. Срок безопасного допуска людей в картофелехранилище после завершения обработки картофеля с использованием генератора «горячего тумана» и окончания стадии проветривания – 24 часа, при условии выключения местной вентиляции, обязательного применения средств защиты органов дыхания и кожи (в	20(4)	-(-)	

Этефон

ХЭФК, ВР (480 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 П/П 018-07-5000-1 08.06.2023 07.06.2033	2-3 мл/л воды(Л)	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание растений в период начала массового созревания (в фазе молочной спелости плодов) Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	5(1)	1(1)	Активен
	3-4,5	Лук репчатый	Повышение сохранности урожая, снижение прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	Опрыскивание растений за 21 день до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(1)	1(1)	
	1-1,5	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Ускорение созревания, повышение урожая, улучшение качества плодов	Опрыскивание растений в период начала массового созревания (в фазе молочной спелости плодов) Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	5(1)	1(1)	
	0,5-1	Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, ячмень озимый, тритикале озимый, тритикале яровой, рожь озимая	Повышение устойчивости к полеганию, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в конце фазы выхода в трубку Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-1(1)	1(1)	
	6-9 мл/л воды(Л)	Лук репчатый	Повышение сохранности урожая, снижение прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	Опрыскивание растений за 21 день до сбора урожая Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2	21(1)	1(1)	

Этиловый эфир арахидоновой кислоты + Этиловый эфир арахидоновой кислоты

<p>Иммуноцитифит, Т (20 г/кг + 0,167 г/кг) ЗАО «Агропромышленная компания Гинкго» ОГРН: - IV/III 121-07-3951-1 12.01.2023 11.01.2023</p>	2 табл./3 л воды(Л)	Смородин а	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания почек - начало цветения; 2-е - в конце цветения; 3-е - через 20-30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 3 л/50 м2	-(3)	-(-)	Активен
	1 табл./га	Свекла сахарная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе смыкания рядков (при внесении послевходовых гербицидов – в фазе 3-4 листьев); 2-е - через 40-45 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)	
	1 табл./га	Подсолнеч ник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)	
	1 табл./га	Горох	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации - начала цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)	
	1 табл./4 т	Цветочно- декоративн ые культуры	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Обработка посадочного материала перед посадкой Расход рабочей жидкости - 28-30 л/4 т	-(1)	-(-)	
	1 табл./га	Соя	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений в фазе ветвления и в фазе цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)	

1 табл./га	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе смыкания рядков (при внесении послевходовых гербицидов – в фазе 3-4 листьев); 2-е - через 40-45 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 -400 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев; 2-е - в фазе начала цветения; 3-е - в фазе массового образования плодов Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(3)	-(-)
1 табл./ 10-15 мл воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./т	Подсолнечник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./кг	Цветочно-декоративные культуры	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./га	Цветочно-декоративные культуры (рассада)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды	Опрыскивание в день посадки или через 1-2 дня после посадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)

1 табл./га	Земляника	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - перед цветением; 2-е - через 20-30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./10-15 мл воды(Л)	Лук репчатый (семена)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./га	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе кущения-выхода в трубку, 2-е - в фазе начала колошения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./1,5 л воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры (рассада)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды.	Опрыскивание растений в день посадки или через 1-2 дня после посадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м ²	-(1)	-(-)
1 табл./га	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев; 2-е - в фазе начала цветения; 3-е - в фазе массового образования плодов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Горох	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации - начала цветения Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м ²	-(2)	-(-)

1 табл./ 10-15 мл воды(Л)	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./ 10-15 мл воды(Л)	Арбуз	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./га	Лен	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности лыносомы и семян, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе «елочка» Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
2 табл./га	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений; 1-е - перед цветением; 2-е - через 10-20 дней после первого опрыскивания; 3-е - через 15-20 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	-(3)	-(-)
1 табл./1,5 л воды(Л)	Овощные культуры (рассада)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды.	Опрыскивание растений в день посадки или через 1-2 дня после посадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(1)	-(-)
1 табл./кг	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)

1 табл./т	Горох	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации; 2-е - в фазе цветения первой кисти; 3-е - в фазе цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(3)	-(-)
1 табл./га	Арбуз	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев; 2-е - в фазе начала цветения; 3-е - в фазе массового образования плодов Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
1 табл./т	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 10-15 мл воды(Л)	Капуста	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)

1 табл./га	Томат (открытый и защищен ый грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала бутонизации; 2-е - в фазе цветения первой кисти; 3-е - в фазе цветения третьей кисти Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(3)	-(-)
1 табл./кг	Лук репчатый (семена)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./кг	Огурец (открытый и защищен ый грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)
2 табл./5 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений; 1-е - перед цветением; 2-е - через 10-20 дней после первого опрыскивания; 3-е - через 15-20 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 5 л/50 м2	-(3)	-(-)
1 табл./га	Овощные культуры (рассада)	Усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности	Опрыскивание растений в день посадки или через 1-2 дня после посадки рассады в грунт Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 табл./т	Соя	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательн ых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)

1 табл./га	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений в фазе 2-5 листьев Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Капуста	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе розетки; 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
2 табл./га	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе обособления бутонов - розовый бутон; 2-е - после цветения; 3-е - в период образования завязи - роста плодов (через 20-30 дней после второго опрыскивания) Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	-(3)	-(-)
1 табл./га	Капуста	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе розетки; 2-е - в фазе завязывания кочана Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./кг	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Замачивание семян на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Земляника	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - перед цветением; 2-е - через 20-30 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)

1 табл./т	Гречиха	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Арбуз	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 2-4 листьев; 2-е - в фазе начала цветения; 3-е - в фазе массового образования плодов Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(3)	-(-)
1 табл./га	Лук репчатый (семена)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев; 2-е - через 30-40 дней после первого опрыскивания, Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
1 табл./га	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений в фазе выметывания метелки Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)	-(-)

1 табл./га	Лук репчатый (севок)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев; 2-е - через 30-40 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./га	Цветочно-декоративные культуры	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе формирования бутонов; 2-е - через 15-20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./кг	Морковь	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./10-15 мл воды(Л)	Подсолнечник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./140-160 мл воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Опрыскивание посадочного материала перед посадкой Расход рабочей жидкости - 140-160 мл/20 кг	-(1)	-(-)
1 табл./4 т	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Предпосадочная обработка клубней Расход рабочей жидкости - 28-30 л/4 т	-(1)	-(-)

1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Подсолнечник	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации - начала цветения Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
1 табл./т	Рис	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе смыкания рядков (при внесении послевходовых гербицидов – в фазе 3-4 листьев); 2-е - через 40-45 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Лук репчатый (севок)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев; 2-е - через 30-40 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Опрыскивание растений в фазе 2-5 листьев Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(1)	-(-)

1 табл./т	Свекла сахарная	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 10-15 мл воды(Л)	Свекла столовая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности, улучшение качества корнеплодов	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе формирования бутонов; 2-е - через 15-20 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
1 табл./10-15 мл воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./10-15 мл воды(Л) и защищенный грунт)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 10-15 мл/5 г	-(1)	-(-)
1 табл./ 140-160 мл воды(Л)	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Опрыскивание клубней перед посадкой Расход рабочей жидкости - 140-160 мл/20 кг	-(1)	-(-)

1 табл./га	Гречиха	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(2)	-(-)
1 табл./100-150 мл воды(Л)	Горох	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/50 г	-(1)	-(-)
1 табл./4 т	Лук репчатый (севок)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Предпосадочная обработка луковиц Расход рабочей жидкости - 28-30 л/4 т	-(1)	-(-)
1 табл./т	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества зерна	Предпосевная обработка семян Расход рабочей жидкости - 10-12 л/т	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Цветочно-декоративные культуры (комнатного цветоводства)	Усиление ростовых процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе формирования бутонов или новых листьев, 2-е – через 20-30 дней после первого опрыскивания, 3-е - через 20-30 дней после второго опрыскивания; в период покоя (осень-зима) с интервалом 1 месяц Расход рабочей жидкости - 1 табл./га	-(3-8)	-(-)
1 табл./кг	Арбуз	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)

2 табл./5 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе обособления бутонов - розовый бутон; 2-е - после цветения; 3-е - в период образования завязи - роста плодов (через 20-30 дней после второго опрыскивания) Расход рабочей жидкости - 5 л/50 м2	-(3)	-(-)
1 табл./кг	Капуста	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Замачивание семян на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 2-3 л/кг	-(1)	-(-)
1 табл./ 100-150 мл воды(Л)	Кукуруза	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества семян	Замачивание семян перед посевом на 2-3 часа Расход рабочей жидкости - 100-150 мл/50 г	-(1)	-(-)
1 табл./140-160 мл воды(Л)	Лук репчатый (севок)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание луковиц перед посадкой Расход рабочей жидкости - 140-160 мл/2 кг	-(1)	-(-)
1 табл./ 1,5 л воды(Л)	Лук репчатый (семена)	Повышение всхожести и энергии прорастания семян, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 4-5 листьев; 2-е - через 30-40 дней после первого опрыскивания Расход рабочей жидкости - 1,5 л/50 м2	-(2)	-(-)
2 табл./га	Смородина	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды. Повышение урожайности и качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе распускания почек - начало цветения; 2-е - в конце цветения; 3-е - через 20-30 дней после второго опрыскивания Расход рабочей жидкости - 600 л/га	-(3)	-(-)

	1 табл./га	Картофель	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости растений к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, повышение качества урожая	Опрыскивание растений: 1-е - в фазе полных всходов; 2-е - в фазе бутонизации-начала цветения Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	-(2)	-(-)	
--	------------	-----------	---	--	------	------	--

Янтарная кислота

Грин Дейл, ВРК (25 г/л) ООО «Ваше хозяйство» ОГРН: 1025203566728 III/III 008-07-3511-1 03.03.2022 02.03.2032	5-7 мл/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (астровые)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в период формирования бутонов Расход рабочей жидкости - 10 л/ м2	-(1)	-(-)	Активен
	1-1,5 мл/л воды(Л)	Цветочные культуры (лилейные)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Замачивание посадочного материала (луковиц, клубнелуковиц) перед посадкой	-(1)	-(-)	
	6-10 мл/10 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е - за 1-2 дня до высадки рассады, 2-е - в начале фазы бутонизации первой кисти; 3-е - в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(3)	-(-)	
	8-12 мл/л воды(Л)	Роза (черенки полуодревесневшие-зеленые)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; улучшение декоративных качеств	Замачивание черенков перед посадкой на 4 часа Расход рабочей жидкости - 10 л/10 растений	-(1)	-(-)	
	8-12 мл/10 л воды(Л)	Декоративные культуры (саженцы)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; улучшение декоративных качеств	Обмакивание корневой системы растений перед посадкой Расход рабочей жидкости - 10 л/10 растений	-(1)	-(-)	
	8-12 мл/10 л воды(Л)	Смородина	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(2)	-(-)	
	6-10 мл/10 л воды(Л)	Капуста белокочанная	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(2)	-(-)	
	6-10 мл/10 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(-)	

	6-10 мл/л воды(Л)	Перец	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)	-(-)	
	10-14 мл/10 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е -	-(2)	-(-)	
	6-10 мл/л воды(Л)	Горох	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышение урожайности	Замачивание семян перед посевом на 1-2 часа Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	-(1)	-(-)	
Янтарин БАУ, ВГ (0,05 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 IV/III 021-07-3869-1 11.11.2022 10.11.2032	700 мл/10-30 растений	Огурец (защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(1)	-(-)	Активен
	700 мл/10-30 растений	Цветочные культуры (многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Опрыскивание растений: 1-е – весной в фазе возобновления вегетации, 2-е и 3-е – с интервалом 20 дней Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(3)	-(-)	
	700 мл/ 25 м2	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(1)	-(-)	
	700 мл/10-30 растений	Томат (защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в период массового цветения Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(1)	-(-)	

	700 мл/10-30 растений	Цветочные культуры, в том числе орхидеи (горшечные комнатные растения)	Активизация ростовых процессов, улучшение качественных и декоративных характеристик растений	Опрыскивание растений в период активного роста с интервалом 15-20 дней Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(3)	-(-)	
	700 мл/ 4-8 растений	Смородина	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Флакон с курковым распылителем с готовым рабочим раствором	-(1)	-(-)	
Янтарная кислота, ВРП (50 г/кг) ООО «ОРТОН» ОГРН: 1025004916573 Ш/Ш 033-07-2821-1 05.10.2020 04.10.2030	10 г/5 л воды(Л)	Виноград	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 1-2 л/растение	-(1)	-(-)	Активен
	10 г/20 л воды(Л)	Цветочные культуры (однолетние и многолетние)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы бутонизации, 2-е – в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 0,3-0,5 л/10 м2	-(2)	-(-)	
	10 г/10 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 12-24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)	
	10 г/10 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 12-24 часа Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	-(1)	-(-)	
	10 г/20 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышение урожайности	Опрыскивание растений в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	
	10 г/20 л воды(Л)	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы цветения первой кисти, 2-е – в начале фазы цветения второй кисти Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(2)	-(-)	

	10 г/20 л воды(Л)	Цветочные культуры (однолетние и многолетние)	Усиление ростовых и формообразовательных процессов; улучшение декоративных качеств	Полив растений после появления всходов или весной в начале возобновления вегетации Расход рабочей жидкости - 4-10 л/м2	-(1)	-(-)	
	10 г/20 л воды(Л)	Яблоня	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе «розовый бутон» Расход рабочей жидкости - 2-6 л/растение	-(1)	-(-)	
	10 г/10 л воды(Л)	Картофель	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышение урожайности	Опрыскивание клубней за 0,5-2 часа до посадки Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	-(1)	-(-)	
	10 г/5 л воды(Л)	Земляника	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в начале фазы бутонизации, 2-е – в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(2)	-(-)	
	10 г/5 л воды(Л)	Смородина черная	Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 2-6 л/растение	-(1)	-(-)	
	10 г/20 л воды(Л)	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести и энергии прорастания; усиление ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, повышение качества продукции	Опрыскивание растений в начале фазы цветения Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2	-(1)	-(-)	
<p>Янтарин, ВРК (5 г/л) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/III 021-07-1823-1 10.03.2016 09.03.2026</p>	15 мл/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (однолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных декоративных характеристик растений	Полив под корень: 1-й – в фазе 2-х настоящих листьев, 2-й, 3-й и 4-й – с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/м2	-(4)	-(-)	Активен
	130 мл/10 л воды(Л)	Виноград	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(-)	

50 мл/10 л воды(Л)	Плодово-ягодные культуры	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 10 л/100м2	-(1)	-(-)
50 мл/4 л воды(Л)	Земляника	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение сроков созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в период массового цветения Расход рабочей жидкости - 4 л/100м2	-(1)	-(-)
30 мл/10 л воды(Л)	Цветочные культуры (многолетние)	Активизация ростовых процессов, повышение устойчивости растений к поражению болезнями, улучшение качественных декоративных характеристик растений	Полив под корень: 1-й – весной в фазе возобновления вегетации, 2-й и 3-й – с интервалом 20 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/м2	-(3)	-(-)

Моллюскоциды

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Метальдегид

Слизнеед Нео, Г (30 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 III/- 021-08-2660-1 23.04.2020 22.04.2030	7 г/10 м2(Л)	Плодовые, овощные, цветочные культуры, картофель, виноград, земляника	Брюхоногие моллюски	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади	-(3)	3(-)	Активен
Слизнякофф, Г (60 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» ОГРН: - II/- 141-08-3578-1 31.03.2022 30.03.2032	30 г/10 м2 (Л)	Земляника садовая	Слизни, улитки	Рассев гранул по поверхности почвы, междурядий и дорожек	-(3)	1(-)	Активен
	7	Кукуруза, подсолнечник, озимый рапс, озимая пшеница	Слизни, улитки	Рассев гранул по поверхности почвы, междурядий, дорожек	-(1)	-(1)	
	30 г/10 м2 (Л)	Овощные культуры (капуста, томат открытого грунта, салат)	Слизни, улитки	Рассев гранул по поверхности почвы, междурядий и дорожек	-(3)	1(-)	

<p>Гроза-6, Г (60 г/кг) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 -/- 012-08-4555-1 03.05.2024 02.05.2034</p>	30 г/10 м2	Овощные, ягодные, декоративн ые, плодовые культуры, виноград	Слизни, улитки	Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек	-(1)	10(1)	Активен
	7,0 г /10 м2	Овощные, ягодные, декоративн ые, плодовые культуры, виноград	Слизни, улитки	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м², расположенных на 10 м² защищаемой площади (не допуская попадания гранул на защищаемые растения). Интервал между обработками 7-14 дней	-(3)	10(1)	
<p>Деница, Г (60 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/- 018-08-4514-0 11.04.2024 10.04.2027</p>	7,0	Пшеница озимая	Слизни, улитки	Рассев гранул по поверхности почвы междурядий	-(3)	-(-)	Активен
<p>Аксела, Г (30 г/кг) Аркада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3527-1 15.12.2016 14.12.2026</p>	7	Овощные, ягодные культуры	Слизни, улитки	Рассев гранул в междурядьях	-(3)	-(1)	Активен
<p>Гроза-3, Г (30 г/кг) Аркада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3525-1 14.12.2015 13.12.2025</p>	7 г/10 м2 (Л)	Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград	Слизни, улитки	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади	-(3)	1(-)	Активен
	7 г/10 м2 (Л)	Плодовые и цитрусовы е культуры	Брюхоногие моллюски (слизни, улитки) без относительно видовой специфики	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади (не допуская попадания гранул на защищаемые растения). Интервал между обработками 7-14 дней	-(3)	1(-)	
	30 г/10 м2 (Л)	Овощные, ягодные, декоративн ые, плодовые и цитрусовы е культуры, виноград	Брюхоногие моллюски (слизни, улитки) без относительно видовой специфики	Рассев по поверхности почвы междурядий, дорожек	-(1)	1(-)	
<p>Слизнегон, Г (60 г/кг) ЗАО «Щелково Агрохим» ОГРН: 1025006519427 III/- 018-08-4305-1 11.12.2023 10.12.2033</p>	3,5 г/10 м2	Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград	Слизни, улитки	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади	-(3)	1(-)	Активен
<p>СтопУлит, Г (30 г/кг) Аркада Лтд ОГРН: - III/- 177-08-3524-1 08.08.2016 07.08.2026</p>	7 г/10 м2 (Л)	Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград	Слизни, улитки	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади	-(3)	1(-)	Активен

Хищник, Г (30 г/кг) Аркада Лгд ОГРН: - III/- 177-08-3526-1 08.08.2016 07.08.2026	7 г/10 м2 (Л)	Овощные, ягодные, декоративн ые культуры, виноград	Слизни, улитки	Рассев гранул на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м2, расположенных на 10 м2 защищаемой площади	-(3)	1(-)	Активен
--	------------------	---	----------------	--	------	------	---------

Репелленты

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применени я препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатыв аемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизи рованных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Alliumsativum

Кротомет, Г (150 г/кг) АО Фирма «Август» ОГРН: 1025006038958 IV/- 021-09-1822-1 30.12.2015 29.12.2025	10-14 г на нору (Л)	Овощные декоративн ые, цветочне и ягодные культуры, луга и газоны	Крот	Между двумя выбросами земли сделать вертикальный вырез в норе. В оба конца норы заложить по 5-7 г (1-2 столовые ложки препарата). Вырез закрывать дощечкой и засыпать землей. Через 2-3 дня проверить наличие препарата в норе. В том случае, если препарат засыпан землей, нора разрезается в другом месте и операция повторяется. Обработка по мере необходимости	-(-)	-(-)	Активен
---	------------------------	--	------	--	------	------	---------

Водорастворимые вещества, получаемые при перолизе древесины

Сочва, Г (8 г/л) ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН: 1037700040564 IV/III 012-09-3065-1 18.03.2021 17.03.2031	30 мл/ 100 м2 (Л)	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период заселения растений с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 2-4 л/ 100 м2	-(4)	-(-)	Активен
	30 мл/ 100 м2 (Л)	Морковь	Морковная муха	Опрыскивание в период лета морковной мухи с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 2-4 л/ 100 м2	-(3)	-(-)	
	30 мл/ 100 м2 (Л)	Огурец защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период заселения растений с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 10 л/ 100м2	-(4)	-(-)	
	30 мл/ 100 м2 (Л)	Лук	Луковая муха	Опрыскивание в период лета луковой мухи с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 2-4 л/ 100 м2	-(6)	-(-)	
	2,0	Огурец защищенн ого грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в начале заселения растений в концентрации 0,3% с интервалом 7 дней Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	-(4)	-(-)	

Феромоны

Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

(E,Z,Z)-3,8,11-тетрадекатриен-1-ил-ацетат + 6 мг/диспенсер (E,Z)-3,8-тетрадекадиен –1- ил-ацетата)

Шин-Етсу ТА, Д (59 мг/диспенсер + 59 мг/диспенсер) «Шин-Етсу Кемикал Ко., Лтд.» ОГРН: - IV/- 313-23-3872-1 11.11.2022 10.11.2032	1000 диспенсеров на га	Томат защищенного грунта	Томатная минирующая моль	Развешивание диспенсеров в теплицах за несколько дней до высадки рассады томатов	-(1)	-(-)	Активен
---	------------------------	--------------------------	--------------------------	--	------	------	---------

(E,Z)-7,9-Додекадиен-1-ил-ацетат

Шин-Етсу МД Л, Д (172 мг/диспенсер) «Шин-Етсу Кемикал Ко., Лтд.» ОГРН: - IV/- 313-23-1767-1 22.02.2018 21.02.2028	5 диспенсеров/100 м2(Л)	Виноград	Гроздевая листовёртка	Развешивание диспенсеров на виноградных кустах перед началом лета перезимовавшего поколения	-(1)	-(-)	Активен
	500 диспенсеров/га	Виноград	Гроздевая листовёртка	Развешивание диспенсеров на виноградных кустах перед началом лета перезимовавшего поколения	-(1)	-(-)	

Z-8-Додеценил ацетат + E-8-Додеценил ацетат + 1-додеканол + 1-Тетрадеканол + E,E-8,10-Додекадиен-1-ол + Z-8-Додеценол

Шин-Етсу МД Дуо ТТ, Д (1 мг/диспенсер + 5 мг/диспенсер + 39 мг/диспенсер + 7 мг/диспенсер + 240 мг/диспенсер + 1 мг/диспенсер) «Шин-Етсу Кемикал Ко., Лтд.» ОГРН: - IV/- 313-23-3610-1 12.04.2022 11.04.2032	500 диспенсеров/га	Яблоня	Яблонная плодожорка, восточная плодожорка	Развешивание диспенсеров на деревьях в начале лета восточной плодожорки перезимовавшего поколения	-(1)	-(-)	Активен
---	--------------------	--------	---	---	------	------	---------

Z-8-Додеценол + E-8-Додеценил ацетат + Z-8-Додеценил ацетат

Шин-Етсу МД ВП ТТ, Д (5 мг/диспенсер + 27 мг/диспенсер + 423 мг/диспенсер) «Шин-Етсу Кемикал Ко., Лтд.» ОГРН: - IV/- 313-23-3639-1 18.04.2022 17.04.2032	300 диспенсеров/га	Слива	Восточная плодожорка, сливовая плодожорка	Развешивание диспенсеров на деревьях в начале лета восточной плодожорки перезимовавшего поколения	-(1)	-(-)	Активен
	250 диспенсеров/га	Персик	Восточная плодожорка	Развешивание диспенсеров на деревьях в начале лета восточной плодожорки перезимовавшего поколения	-(1)	-(-)	

E,E-8,10-Додекадиен-1-ол + 1-додеканол + 1-Тетрадеканол + 1-Тетрадеканол

Шин-Етсу МД СТТ, Д (2,2x10 ⁻⁴ кг/диспенсер + 1,2x10 ⁻⁴ кг/диспенсер + 2,76x10 ⁻⁵ кг/диспенсер + 2,76x10 ⁻⁵ кг/диспенсер) «Шин-Етсу Кемикал Ко., Лтд.»	5 диспенсеров/100 м2 (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Развешивание диспенсеров в садах перед началом лета яблонной плодожорки I поколения	-(1)	-(-)	Активен
	5 диспенсеров/100 м2 (Л)	Яблоня	Яблонная плодожорка	Развешивание диспенсеров в садах перед началом лета яблонной плодожорки I поколения	-(1)	-(-)	

Лтд.» ОГРН: - IV/- 313-23-741-1 03.08.2015 02.08.2025	500 диспенсер ов/га	Яблоня	Яблонная плодожорка	Развешивание диспенсеров в садах перед началом лета яблонной плодояорки I поколения	-(1)	-(-)	
	500 диспенсер ов/га	Яблоня	Яблонная плодожорка	Развешивание диспенсеров в садах перед началом лета яблонной плодояорки I поколения	-(1)	-(-)	

н-тетрадецил ацетат + Кодлемон

Бриз, парообразу (42 мг/диспенсер + 178 мг/диспенсер) «БАСФ СЕ» ОГРН: - IV/- 014-23-1042-1 16.03.2016 15.03.2026	500 диспенсер ов/га	Яблоня	Яблонная плодожорка	Развешивание диспенсеров в садах перед началом лета яблонной плодояорки перезимовавшего поколения	-(1)	-(-)	Активен
---	---------------------------	--------	------------------------	--	------	------	---------

Фнгициды							
Название, препаративная форма, содержание д.в., заявитель, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации (число, месяц, год)	Норма применени я препарата (л/га, кг/га)	Культура, обрабатыв аемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизи рованных) работ	Статус пестицида
1	2	3	4	5	6	7	8

Азоксистробин

Ромбус, КС, КС (250 г/л) ООО «АНПП «Агрохим-ХХI» ОГРН: 1027700119710 III/II, Шанхай Е-Тонг Кемикал Ко., Лтд. ОГРН: - III/II 023(412)-02-1344-1 25.01.2017 023(412)-02-1344-1/305 305	0,2 (Л)	Картофель (кроме раннеспел ых сортов)	Ризоктониоз, серебристая парша, обыкновенная парша, черная ножка	Обработка клубней во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10 л/т Расход рабочей жидкости - 10	-(1)	-(-)	Активен
--	---------	--	---	---	------	------	---------

Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов

Применение пестицидов и агрохимикатов допускается в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, требованиями раздела XII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3; раздела XXV. «Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40; разделом IX Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.

**Классы опасности пестицидов для пчел
и соответствующие экологические регламенты их применения**

1 класс опасности - ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска - Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента

- проведение обработки растений вечером после захода солнца;
- при скорости ветра не более 1–2 м/с (авиаобработка не более 0-1 м/с)
- погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км)
- ограничение лёта пчел - не менее 4–6 сут; (авиаобработка не менее 4-6 сут)
- или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 сут.

2 класс опасности - СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска - Средний): необходимо соблюдение экологического регламента

- окашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида;
- проведение обработки растений вечером после захода солнца;
- при скорости ветра не более 2–3 м/с (авиаобработка не более 1-2 м/с)
- погранично-защитная зона для пчел не менее 3–4 км (авиаобработка не менее 4-5 км)
- ограничение лёта пчел не менее 2–3 сут (авиаобработка не менее 2-3 сут)

3 класс опасности - МАЛООПАСНЫЕ (категория риска - Низкий): необходимо соблюдение экологического регламента

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;
- при скорости ветра - не более 4–5 м/с (авиаобработка не более 2-3 м/с)
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км)
- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа)

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений “Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами” (Москва, ГАП СССР 1989 г.); в частности – обязательно предварительное за 4–5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения.

**В соответствии с письмом факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова от 4 марта 2021 г.
№ 96-21/106-03 Классы опасности пестицидов для пчел и соответствующие экологические регламенты
их применения**

1 класс опасности - ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска - Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента

- проведение обработки растений вечером после захода солнца;
- при скорости ветра не более 1–2 м/с (авиаобработка не более 0-1 м/с)
- погранично-защитная зона для пчел не менее 4–5 км (авиаобработка не менее 5-6 км)
- ограничение лёта пчел - не менее 4–6 сут; (авиаобработка не менее 4-6 сут)
- или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 сут.

2 класс опасности - СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска - Средний): необходимо соблюдение экологического регламента

- окашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида;
- проведение обработки растений вечером после захода солнца;
- при скорости ветра не более 2–3 м/с (авиаобработка не более 1-2 м/с)
- погранично-защитная зона для пчел не менее 3–4 км (авиаобработка не менее 4-5 км)
- ограничение лёта пчел не менее 2–3 сут (авиаобработка не менее 2-3 сут)

3 класс опасности - МАЛООПАСНЫЕ (категория риска - Низкий): необходимо соблюдение экологического регламента

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;
- при скорости ветра - не более 4–5 м/с (авиаобработка не более 2-3 м/с)
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км (авиаобработка не менее 3-4 км)
- ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа (авиаобработка не менее 20-24 часа)
- **ограничение лёта пчел не менее 36–48 час. (инсектициды) (авиаобработка не менее 36-48 часа)**

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений “Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами” (Москва, ГАП СССР 1989 г.); в частности – обязательно предварительное за 4–5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения.